

EDIZIONE NAZIONALE

MATHEMATICA ITALIANA

per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Comitato scientifico:

Simonetta Bassi
Università di Pisa

Umberto Bottazzini
Università Statale di Milano

Michele Ciliberto
Scuola Normale Superiore di Pisa

Giuseppe Da Prato
Scuola Normale Superiore di Pisa

Paolo Freguglia
Università di L'Aquila

Mariano Giaquinta
Scuola Normale Superiore di Pisa, Centro di ricerca matematica "Ennio De Giorgi", Presidente

Angelo Guerreggio
Università Bocconi di Milano

Michele Marini
Fourweb Service srl

Stefano Marmi
Scuola Normale Superiore di Pisa, tesoriere

Massimo Mugnai
Scuola Normale Superiore di Pisa

Pietro Nastasi
Università di Palermo

Luigi Pepe
Università di Ferrara

LEONARDO
PISANO

SCRITTI

VOLUME I

SCUOLA NORMALE
SUPERIORE
510.8
F 443
(2)
BARI
PISA

LA
PRACTICA GEOMETRIAE
DI
LEONARDO PISANO

SECONDO LA LEZIONE

DEL CODICE URBINATE n° 292

DELLA BIBLIOTECA VATICANA



140636

3894

510.81

F443 (2)

RARI



SCRITTI

DI

LEONARDO PISANO

MATEMATICO DEL SECOLO DECIMOTERZO

PUBBLICATI

DA

BALDASSARRE BONCOMPAGNI

SOCIO ORDINARIO DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA DE' NUOVI LINCEI E SOCIO
CORRISPONDENTE DELL'ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE DI TORINO.



VOLUME II.

(LEONARDI PISANI PRACTICA GEOMETRIAE ED OPUSCOLI)

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE

VIA LATA NUM. 211 A.

1862

*Incipit practica geometrię composita a Leonardo pisano
de filijs bonaccij anno .M.º cc.º xx.º*

fol. 1 recto.

ROGASTI AMICE DOMINICE ET REVERENDE magister, ut tibi librum in practica geometrię conscriberem; igitur amicitia tua coactus, tuis precibus condescendens, opus iam dudum inceptum taliter tui gratia edidi, ut hi qui secundum demonstrationes geometricas: et hi qui secundum uulgarem consuetudinem, quasi laicalj more, in dimensionibus uoluerint operari super .viiij. huius artis distinctiones, que inferius explicantur, perfectum inueniant documentum. Quarum prima est, qualiter latitudines camporum quatuor equales angulos habentium in eorum longitudines triplici modo multiplicentur. Secunda est de quibusdam regulis geometricis: et de inuentione quadratarum radicum in tantum quantum eis, qui per rationes solummodo geometricas uoluerint operari, necessarium esse putauit. Tertia de inuentione embadorum omnium camporum cuiuscunque forme. Quarta de diuisione omnium camporum inter consortes. Quinta de radicibus cubicis inueniendis. Sexta de inuentione embadorum omnium corporum cuiuscunque figure, que continentur tribus dimensionibus, scilicet longitudine, latitudine, et profunditate. Septima de inuentione longitudinum planitierum, et inuentione altitudinum rerum eleuatarum. Optaua de quibusdam subtilitatibus geometricis. Tamen antequam ad harum distinctionum perueniam doctrinam, quedam introductoria necessaria preponenda esse putauit. Ad hec igitur secundum ingenij mei capacitatem perficienda, tue correctionis aggressus fiducia, hoc opus curauit tuo magisterio destinare, ut que in eo fuerint emendanda, tua sapientia corrigantur.

Incipiunt introductoria:

PUNCTVS est id quod nullam habet dimensionem, idest quod non potest diuidj. **L**inea est longitudo carens latitudine, cuius termini puncta sunt. Recta linea est que de puncto ad punctum recte protrahitur. Superficies quidem est que latitudinem, et longitudinem tantum habet, cuius termini sunt linee: et est plana, cum undique infra suos terminos super rectas lineas dilatatur. Planus uero angulus est inclinatio duarum linearum sese in plano tangentium, cum non iaceant indirecto; et est rectilineus, cum linee continent angulum sunt recte. Cumque linea recta super lineam rectam steterit, feceritque circa se duos angulos sibi inuicem equales, dicitur rectus uterque angulus; et linea stans super ea, cui superstat, cathetus, siue perpendicularis appellatur. Amplus uero, uel obtusus angulus est qui maior est recto. Acutus namque qui minor recto inuenitur. Et terminus est finis rei. Figura quidem est que sub | uno, uel pluribus terminis iacet. Figura quidem rectilinea est que a rectis lineis circundatur. Trilatera quippe figure sunt que sub tribus rectis lineis continentur.

fol. 1 verso.


Quadrilatera uero sunt que quatuor rectis lineis ambiuntur. Multilatera autem figure sunt que sub pluribus quam quatuor lateribus comprehenduntur. Circulus enim est quedam plana figura sub una linea contenta; que linea uocatur circumferens, uel periferia, infra quem est punctus: a quo omnes recte protracte ad circumferentem lineam sibi inuicem sunt equales: punctus uero ille centrum circuli appellatur. Cumque per centrum aliqua recta protracta fuerit, et terminata in utraque parte periferie,



illa recta dýameter circuli nuncupatur, que diuidit circulum in duas equas portiones. Quarum una queque semicirculus dicitur. Portio uero circuli est figura, que continetur sub circuli periferia, et recta linea, siue maior, uel minor sit semicirculo. Sector uero circuli est quedam plana figura contenta sub duabus rectis a centro ad periferiam deductis, et arcu periferie ab ipsis rectis comprehenso. Recte linee, que in eadem superficie sunt, et ab utraque parte in infinitum protracte, et numquam sibi inuicem concurrunt, dicuntur equidistantes: in quibus si aliqua recta incidit, faciet duos angulos interiores ab una parte rectos, aut duobus rectis equales: et exterior angulus est equalis interiori angulo sibi opposito; et anguli qui permutati sunt, sibi inuicem equantur: ut si in duabus lineis equidistantibus *.a.b.* et *.g.d.* incidat quedam recta *.e.z.*; anguli quidem *.b.i.z.* et *.i.z.d.* aut recti sunt, aut duobus equales rectis. Illud idem est ex angulis *.a.i.z.* et *.i.z.g.*; et exterior angulus *.e.i.b.* interiori sibi opposito *.i.z.d.* est equalis; et angulus *.a.i.z.* ei, qui permutati (*sic*) iacet, scilicet angulo *.i.z.d.* equatur: adhuc ergo et angulus *.b.i.z.* angulo *.i.z.g.* est equalis, ut in geometria ostenditur. Multa enim sunt que oportet scire eos, qui in mensuratione, et diuisione corporum, secundum subtilitatem geometricam procedere uolunt, que in euclide aperte monstrantur. Ex quibus sunt hec: super datam rectam, et terminatam constituere trigonum equilaterum: et datum angulum, uel lineam in duo equa secare: et super datam rectam a puncto dato in ipsa cathetum erigere: et super datam rectam á dato puncto, quod non sit in ipsa, cathetum ducere. Et recta super rectam duos angulos facit circa se duobus rectis equales. Et cum due recte se inuicem secant, duo anguli, qui sunt a uertice oppositi, sibi inuicem sunt equales. Et cum in duabus rectis recta incidit, et facit ab una parte duos angulos interiores, minores duobus rectis; si ab ipsa parte, á qua anguli sunt minores duobus rectis, ipse recte linee fuerint protracte, sibi inuicem concurrent. Et duarum linearum equalium et equidistantium due recte copulate fuerint, ipse sibi inuicem equales, et equidistantes erunt. Et ad datam rectam, ad quod in ipsa punctum datum, dato angulo rectilineo, equalem angulum rectilineum constituere. Et per datum punctum date recte equidistantem rectam lineam ducere. Et trigona, et paralilogramina super equas bases: uel super eandem basem inter easdem equidistantes constituta, sibi inuicem equalia sunt, scilicet trigonum trigono: et paralilogramum paralilogramo, etiam paralilogramum duplum est trigono. Dicitur enim paralilogramum figura, que habet latera opposita equalia, et equidistantia; cuius anguli oppositi sibi inuicem sunt equales: et dýameter etiam secat ipsum in duo similia trigona, et equalia; etiam si aliquod latus trigoni ab aliqua parte protrahatur, tunc faciet unum angulum extra ipsum trigonum, qui erit equalis duobus angulis sibi oppositis infra trigonum existentibus; et tres anguli cuiuslibet trigoni duobus rectis equantur. Et eidem equalia, et alternis equalia sunt. Et si equalibus equalia apponantur, tota sunt equalia. Et si ab equalibus equalia auferantur, que relinquuntur, sunt equalia. Et si inequalibus equalia apponantur, tota sunt inequalia. Et si ab inequalibus equalia auferantur, reliqua sunt inequalia. Et eiusdem dupla equa sibi inuicem sunt, et eiusdem dimidia alternis equalia sunt; et super se inuicem coaptata sibi inuicem equalia sunt. Et totum sua parte maius est. Et due recte spatium non continent. Sine his omnibus, et sine radicum inuentione, ipsi qui secundum uulgarem modum procedere uoluerint:

fol. 2 recto.

et equidistantium ... inuicem equalia (fol. 1 verso, margine inferiore interno; pag. 2, lin. 23-26).



cum his que ostendam inferius, conuenienti loco poterunt sufficienter procedere. His ita determinatis; cum quibus mensuris mensurentur agri, breuiter proposui explicare.

Quidam enim mensurare consueuerunt agros cum mensuris cubitalibus, uel ulnis, aut cum passibus. Alij cum perticis, siue cum alio quolibet mensurabilij instrumento; que libet tamen suprascriptarum mensurarum intelligenda est quandoque linealis, quandoque superficialis. Linealis est que sola longitudine constat. Superficialis que tantum habet in longitudine, quantum in latitudine, et in se ipsa quadrata existens, et quatuor rectis constat angulis. Ex his superficialibus mensuris quidam in multiplicando colligunt quandam quantitatem, quam uocant iugerum, uel aripennium, siue carrucam, siue tornaturam, uel culturam, uel alias quantitates, que alijs censentur uocabulis. Ego uero, secundum pisanorum incedere uolens consuetudinem, a pertica summam initium. Pertica pisana linealis, sex linealibus pedibus constat: pes uero linealis decem et octo punctis linealibus constat. Pertica quoque quadrata, scilicet superficialis, sex pedibus superficialibus constat. Habet enim pes superficialis unam perticam in longitudine, et sextam partem pertice in latitudine. Vncia uero superficialis habet unam perticam in longitudine, et optauam decimam partem longitudinis pedis in latitudine. Quare superficialis pes est sexta pars superficialis pertice. Vncia superficialis est octaua decima pars superficialis pedis, uel centesima optaua pars superficialis pertice. Item superficialis pertica continet in se denarios .xxxvi. de mensura; et ita contingunt unicuique pedi denarij sex: et uncia superficialis est tertia pars denarij. Denarius quoque habet unum pedem in longitudine, et unum in latitudine; et ita denarius quadratus ex quatuor rectis constat angulis: et sic denarius est trigesima sexta pars totius pertice superficialis. Quatuor quidem pertice superficiales faciunt quandam mensuram, que uocatur scala. Quinque enim superficiales pertice, et semis faciunt unum panorum. Sexaginta nempe, et sex pertice quadrate faciunt mensuram quandam, que uocatur stariorum, ad quam uenduntur, et emuntur agri in episcopatu pisano; et ad quam mensuram colligere embada, hoc est areas camporum monstrabo: ex suprascripto uero starioro multiplicato colligitur quedam alia suma (*sic*), siue quantitas, que uocatur modiorum. Est enim modiorum id quod continet in se staiora .xxiii.^{or}

Item scale .xvi et semis sunt staiorum unum; et scala una est undecima pars de duabus tertijs stariori; uel est scala soldi .xij. de mensura. Rursus panora .xij. sunt stariorum unum; quare panorum est duodecima pars stariori; et est panorum soldi xvi, et stariorum est soldi cxcviiij. Mensurantur quidem agri, et spatia domorum cum perticis, et pedibus, et uncijs linealibus. Sed camporum embada colliguntur in starioris, et panoris, et soldis, et denarijs, uel in partes unius panori: domorum quoque spatia colliguntur in scalis, et in partibus scale, et in soldis, et denarijs. His ita explicatis, ostendendum est, quid ex multiplicatione perticarum, et suarum partium in suprascriptis mensuris eueniat. Quicquid enim multiplicatur in perticam uel perticas, illud idem procedit ex ipsa multiplicatione: ut si pertica, uel pertice multiplicentur in perticas, quicquid ex multiplicatione colligitur, pertice erunt. Verbi gratia: tres pertice in nouem perticas multiplicatae, faciunt perticas .xxvij. Et si pertica, uel pertice multiplicantur in panora, uel panora in perticas, quicquid ex multiplicatione consurgit, erunt panora. Verbi gratia: tres pertice multiplicatae in nouem panora, uel nouem panora in tres

perticas, faciunt panora .xxvij.; et ita intelligendum est de multiplicatione perticarum in scalas, et stariora, et modiora; uel ex multiplicatione scararum, et stariorum, et modiorum in perticas. Rursus pedes multiplicati in perticas, uel pertice in pedes, erunt pedes, siue medij solidj. Verbi gratia: tres pedes multiplicati in perticas nouem: uel nouem pertice in pedes tres, erunt pedes .xxvij., scilicet solidi xiiij., et $\frac{1}{4}$ de mensura. Item uncie multiplicatae in perticas, uel pertice multiplicatae in uncias faciunt uncias, uel tertias unius denarij. Verbi gratia: uncie .iiij.^{or} multiplicatae in perticas nouem, uel econtra, surgunt in uncias .xxxvij., hoc est in denarijs .xij. mensurg. Adhuc pedes multiplicati in pedes surgunt in denarios. Verbi gratia: pedes tres multiplicati in pedes quinque surgunt in denarios .xv. Iterum pedes multiplicati in uncias faciunt octauas decimas unius denarij. Et uncie multiplicatae in uncias faciunt octauas decimas partes | octauę decimę partis unius denarij, scilicet tercentimas uigexas quartas unius denarij.

fol. 3 recto.

Et nota quia semper mesure que multiplicantur sunt lineales; et que colliguntur ex multiplicatione earum sunt superficiales. Nec non sciendum est, quod pertice .100. superficiales sunt stariorum unum et dimidium; et insuper pertica una, et centenarium scararum est stariora sex; et insuper scala una, et centenarium panorum est stariora $\frac{1}{3}$ 8. Item quia soldi $\frac{1}{2}$ 16 sunt panorum unum; ergo soldi .33 sunt panora .2.; et soldi $\frac{1}{2}$ 49 sunt panora .3.; et soldi 66 sunt panora .4.; et soldi $\frac{1}{2}$ 82 sunt panora .5.; et soldi .99. sunt panora .6. Item scale $\frac{1}{2}$ 5 sunt panora .4.; et scale .11. sunt panora .8. Et nota quia ideo facimus mentionem de scalis, quia quidam utuntur colligere mensuras terrarum in scalis; et de ipsis scalis faciunt panora. Vnde nos relinquimus in hoc opere laborem de ipsis scalis; et docebimus colligere mensuram terrarum per stariora, et per panora, et per soldos, et per denarios. Vnde dicendum est, quod pertice $\frac{1}{2}$ 5 multiplicatae in perticas quotlibet, tot panora ex multiplicatione eueniunt, quot fuerint ille pertice, in quas pertice $\frac{1}{2}$ 5 multiplicatae fuerint: quare pertice .11. multiplicatae in perticas quotlibet reddunt tot panora bis, quot ille pertice sunt: quare pertice $\frac{1}{2}$ 16 multiplicatae in perticas quotlibet reddunt tanta panora ter; et pertice .22. quater tanta; et pertice $\frac{1}{2}$ 27 quinquies tanta; et pertice .33. sexies tanta; et pertice $\frac{1}{2}$ 38 septies tanta; et pertice .44. octies tanta; et pertice $\frac{1}{2}$ 49 nouies tanta; et pertice 55 decies tanta; et pertice $\frac{1}{2}$ 60 undecies tanta. Similiter et si pertice .66. multiplicatae sint in perticas quotlibet, duodecies tanta panora egrediuntur ex multiplicatione illarum perticarum, in quas pertice .66. multiplicatae fuerint, hoc est tot stariora, quot fuerint ille pertice: propter quod et pertice 132. multiplicatae in perticas quotlibet faciunt bis tanta stariora; et sic intelligas de similibus. Et hoc est quod diximus superius de panoris, et starioris, et modioris multiplicatis in perticas; quia illud idem est multiplicare perticas .22. in perticas .3., quod panora .4. in perticas .3. Est enim illud idem multiplicare perticas .132 in perticas quotlibet, quod multiplicare stariora .2. in eadem perticas. Et notandum, quod pertica una in latitudine, et $\frac{1}{2}$ 5 in longitudine est panorum unum; et pertica una in latitudine, et duplum de perticis $\frac{1}{2}$ 5. in longitudine est duplum unius panorj; et sic intelligas de triplo, et quadruplo et de alio quouis multiple perticarum $\frac{1}{2}$ 5, quod fuerit in longitudine, et pertica una in latitudine. Item pertica una in latitudine, et pertice .66. in longitudine est stariorum unum. Quare


pertice due in capite, et pertice .66. in longitudine sunt statoria .2.; et pertice .3. in capite, et pertice .66. in longo sunt statoria .3.; et sic intelligatur in similibus. Rursus duplum de pertica una in capite, et dimidium perticarum .66. in longum est unum statorum; et triplum unius pertice in capite, et tertium de perticis .66. in longum est similiter statorum unum: et hoc intelligas | de alio quouis multiplice unius pertice, si fuerint in capite; et ex eadem parte de perticis .66., si fuerint in longum. Vnde si queratur, cum pertice .6. fuerint in capite alicuius campi quadrati, quot pertice erunt in longo ipsius, ut perficiatur statorum; tunc quia .6. est sexcuplum de pertica una, sextum de perticis .66., scilicet .11. accipies, et habebis longitudinem ipsius agri. Item si in capite fuerint pertice .7., perficietur statorum: si in longum habueris septimam de perticis 63, egredientur pertice .9.; et de perticis tribus que restant á .63. usque in 66 fac pedes, erunt pedes .18.; quos diuide per .7., exhibunt pedes .2, et restant pedes .4. diuidendj; ex quibus fac uncias, erunt uncie .72.; quas diuide per .7, exhibunt uncie $\frac{2}{7}$ 10; et sic habemus perticas .9., et pedes .2, et uncias $\frac{2}{7}$ 10 pro $\frac{1}{7}$ perticarum .66.: sunt enim hec ualde utilia, ut in suo demonstrabitur loco.

Incipit distinctio prima de multiplicatione latitudinum camporum quadratorum rectos angulos habentium in eorum longitudine, in quibus multiplicationibus eorum embada continentur.


Si uolueris metiri campum quadrilaterum: equilaterum: et equiangulum .*a.b.c.d.* habentem in singulis lateribus perticas .2. Dico quod eius area est illud quod colligitur ex multiplicatione lateris .*a.c.* in latus .*a.b.* sibi contiguum, scilicet duarum perticarum in duo; et sic est eius embadum perticarum .4. superficialium. Diuidantur autem linee .*a.b.* et .*c.d.* in duo equalia super puncta .*e.f.*; et protrahatur linea .*ef.* Item diuidantur linee .*a.c.* et .*b.d.* in duo equalia super puncta .*g.h.*, et protrahatur linea .*gh.*; et sic erit diuisum quadrilaterum .*a.b.c.d.* in quatuor quadrata equalia et ortogonia, quorum unumquodque habet in singulis lateribus perticam unam; et sic sunt pertice .4. superficiales in toto embado quadrilateri .*a.c.d.b.* Est enim .*a.e.* recta equalis, et equidistans recte .*cf.*; quare recta .*ef.* est equalis et equidistans linee .*a.c.*; et .*ef.* est equalis et equidistans linee .*bd.*; cum ei sit equidistans et equalis linee .*a.c.*: similiter enim inuenietur linea .*gh.* equidistans et equalis utrique linee, scilicet .*ab.* et .*cd.*: et quoniam linea .*ef.* equidistans est linee .*ac.*, et linea .*ae.* linee .*cf.*; angulus ergo .*aef.* angulo .*acf.* sibi opposito est equalis. Rectus quidem qui sub .*acf.* Rectus uero qui sub .*aef.*: propter eadem ergo ostendetur rectus angulus .*efc.*, cum sit equalis recto angulo .*cae.* Quare ortogonium est quadrilaterum .*eaef.*, et continet in se duas perticas quadratas, quarum una est .*ea.gi.* quadrilaterum, et alia est .*ig.c.f.* Ostenditur enim per supradicta omnes angulos esse rectos, qui ad .*I.*, nec non et angulos, qui ad .*g.* et ad .*h.* Nam superficies .*ec.* continet dimidium superficiem .*bc.*; quare et superficies .*ec.* superficiem .*ed.* est equalis: ergo totius superficiem .*ad.* embadum est unj.^{or} perticarum, ut prediximus. Item sit quadrilaterum longum rectiangulum .*a.b.g.d.*, in cuius capita opposita, scilicet in .*ag.* et *bd* sint pertice due, et in unoquoque reliquorum laterum sint pertice tres. Dico quod eius embadum est perticarum .6., quod colligitur ex multiplicatione unius capitis in unum laterum, scilicet de .2. in .3.: ad hec itaque demonstranda, diuidatur recta | .*ag.* et *bd* in duo equalia

fol. 3 verso.

* in duo recte .*cf.* * (fol. 3 verso, lin. 16-21; pag. 5, lin. 22-28).



* capitis in unum diuidatur recta * (fol. 3 verso, margine inferiore interno; pag. 5, lin. 42-43).




fol. 4 recto.

super puncta *.ez.*; et copuletur recta *.ez.*; et diuidatur utraque rectorum *.ab.* et *.gd.* in tria equalia super puncta *.it.* et *.kl.*; et copulentur recte *.it.* et *.kl.*; tunc ostendetur per supradicti quadratj doctrinam, totum quadrilaterum *.abgd.* in sex quadrilatera equalia et ortogonia esse diuisum, quorum unumquodque continet in singulis lateribus perticam unam: denique his per demonstrationes ostensis, qualiter latitudines dictorum camporum per longitudinem multiplicari debeant, ostendamus. Si uoluerimus multiplicare perticas .7. in latitudinem per perticas 23. in longitudinem, multiplica primū perticas .7. per perticas .22., scilicet per panora .4., egredientur inde panora .28. suprascripta ratione: deinde multiplica unam perticam, que remanet de .23., per .7., erunt pertice quadrate .7.; ex quibus pertice $\frac{1}{2}$ 3 sunt panorum unum; et pertica $\frac{1}{2}$ 1. que remanet, est soldi $\frac{1}{2}$ 4; et sic habemus in summa panora 29, et soldos $\frac{1}{2}$ 4 mensurę, hoc est stariora .2., et panora 3, et soldos $\frac{1}{2}$ 4.

Item si uolueris multiplicare perticas .13 per perticas .31., multiplica primū perticas .11., scilicet panora .2., per perticas .31., erunt panora .62., scilicet duplum de .31.: deinde perticas .2., que remanent ex ipsis perticis .13., multiplica per perticas .31., erunt pertice 62. quadrate, que sunt panora .11., et denari .18.; que adde cum panoris .62. inuentis, erunt panora .73., et denari .18.; que diuide per .12.: ideo quia stariorum est panora 12., exhibunt stariora .6., et panorum vnum, et denari .18. mensurę. Item si uolueris multiplicare perticas 19. per perticas .41., multiplica primū perticas 19. per perticas .33., erunt media stariora .49., scilicet stariora $\frac{1}{2}$ 9.: deinde multiplica .8., que remanent de .41., per perticas $\frac{1}{2}$ 16, erunt panora .24.; quibus additis cum starioris $\frac{1}{2}$ 9, erunt stariora $\frac{1}{2}$ 11. Item quia remanent pertice $\frac{1}{2}$ 2, extractis perticis $\frac{1}{2}$ 16 de perticis .19., multiplicabis ipsas perticas $\frac{1}{2}$ 2 iterum per suprascriptas perticas .8., erunt pertice .20. superficiales; ex quibus pertice $\frac{1}{2}$ 16 sunt panora .3; et relique pertice $\frac{1}{2}$ 3 sunt soldi $\frac{1}{2}$ 10; quibus panoris .3., et soldis $\frac{1}{2}$ 10. additis cum starioris $\frac{1}{2}$ 11., faciunt in summa stariora .41., et panora .9., et soldos $\frac{1}{2}$ 10. Cuius multiplicationis causam uolo demonstrationibus declarare. Esto quadrilaterum longum *.abgd.* continens in unoquoque capite, que sunt *.ab.* et *.gd.*, perticas .19.; et in uno quoque longiorum laterum, que sunt *ag.* et *bd.*, perticas .41.; accipiatur ex latere *ag.* linea *.ae.* constans ex perticis .33., remanebit linea *.eg.* perticarum .8. Similiter ex linea *bd.* accipiatur linea *.bz.* equalis lineę *.ae.*; et copuletur recta *.ez.*, eritque *.ez.* perticarum .19., cum sit equalis et equidistans utriusque lineę *.ab.* et *gd.* Et *zd* quidem est equalis lineę *.eg.*, scilicet perticis .8. Rursus ex lineis *.ez.* et *gd.* accipiantur recte *.ei.* et *gt.*, quarum unaqueque sit perticarum $\frac{1}{2}$ 16; et copuletur recta *.it.*, eritque linea *.it.* equalis utriusque lineę *eg.* et *zd.* Cumque ex lineis *.ez.* et *gd.* auferantur lineę *.ei.* et *gt.*, quarum unaqueque est perticarum $\frac{1}{2}$ 16, remanebit unaqueque rectorum *.iz.* et *td.* perticarum $\frac{1}{2}$ 2: cum itaque multiplicauimus superius perticas .19. in .33; tunc habuimus embadum quadrilateri *.az.*, et remansit nobis quadrilaterum *.ez. dg.* ex toto quadrilatero *.abgd.*; et fuit area quadrilateri *.eabz.* stariora $\frac{1}{2}$ 9: deinde cum multiplicauimus .8. in perticas $\frac{1}{2}$ 16, scilicet in panora .3., habuimus stariora .2. pro embado quadrilateri *.eitg.* Rursus cum multiplicauimus perticas $\frac{1}{2}$ 2. in perticas .8., tunc habuimus perticas .20. quadrate, scilicet panora .3., et soldos $\frac{1}{2}$ 10 mensurę pro embado quadrilateri *.izdt.* Nam tria quadrilatera *.az.* et *.et.* et *.tz.* toti quadrilatero *.abgd.* equantur; et hoc uolumus demonstrare. Item si

ag. et *zd.* quarum unaqueque *s* (fol. 4 recto, margine inferiore interno; pag. 6, lin. 34-35).



fol. 4 verso.

uis multiplicare perticas .25. per perticas .52., multiplica primum perticas .22. ex ipsis perticis 25., scilicet panora .4., per perticas .52., erunt tertie unius stariori .52. propter panora .4., que sunt tertia pars unius stariori. Sunt enim tertie .52. stariori stariora $\frac{1}{3}$ 17: deinde perticas .3., que remanent á 22 usque in .25., multiplica per perticas $\frac{1}{2}$ 49 ex illis perticis .52., scilicet per panora .9., erunt panora .27.; quibus additis cum starioris $\frac{1}{3}$ 17, reddent stariora 19., et panora .7.: post hoc multiplica ipsas perticas .3. per perticas $\frac{1}{2}$ 2, que sunt á $\frac{1}{2}$ 49 usque in .52., erunt pertice $\frac{1}{2}$ 7, scilicet panorum unum, et soldi .6; et sic habebis in summa stariora .19., et panora .8., et soldos .6.: uel aliter multiplica 25 per 52, erunt pertice 1300., que sunt stariora 13 cum totidem medijs starioris, et insuper pertice .13., scilicet stariora .19., et panora .8., et soldi .6., ut predixi. Item si uis multiplicare perticas .31. per perticas .69., multiplica primum perticas .31. per perticas .66., scilicet per stariorum unum, erunt stariora .31. Item multiplica 3, que remanent á 66 usque in .69., per perticas .31., erunt pertice 93, que sunt panora .17, minus denari .18.; et sic habemus in summa stariora .32., et panora .5., minus denari .18. Item si uis multiplicare perticas 43. per perticas 85., multiplica primum perticas 43. per perticas $\frac{1}{2}$ 82., scilicet per panora .15., erunt panora quindecies .43., scilicet stariora 43. cum totidem quartis, hoc est stariora $\frac{3}{4}$ 53: deinde multiplica perticas $\frac{1}{2}$ 2, que remanent ab $\frac{1}{2}$ 82 usque in .85., per perticas .43.; tamen multiplicabis primum ipsas perticas $\frac{1}{2}$ 2 per perticas .33., scilicet per panora .6., erunt panora .15.; que adde cum starioris $\frac{3}{4}$ 53, erunt stariora .55.: et multiplicabis iterum ipsas perticas $\frac{1}{2}$ 2 per perticas .10., que remanent a 33 usque in .43., erunt pertice 25., que sunt panora .4., et soldi .9.; et sic habebis pro quesita multiplicatione stariora 55., et panora 4 et soldos 9. Item si uis multiplicare perticas .54. per perticas .113., multiplica primum perticas .54. per perticas .110., scilicet per panora 20., erunt panora 1080.; quibus diuisis per .12. reddunt stariora .90.: deinde multiplicabis perticas .3., que remanent á 110. usque in .113., per perticas .54., hoc est per panora 9 et perticas $\frac{1}{2}$ 4., erunt panora 27., et pertice $\frac{1}{2}$ 13, hoc est panora .29., et soldi $\frac{1}{2}$ 7.; quibus additis cum starioris 90, faciunt stariora 92., et panora 5., et soldos $\frac{1}{2}$ 7. Item si uis multiplicare perticas .72. per perticas 149., multiplica primum perticas .66. per perticas .149., erunt stariora .149.: deinde multiplica perticas .6., que remanent á 66 usque in .72, per perticas 149.; tamen primum per perticas 132, scilicet per stariora .2, et postea per perticas .17, que remanent á 132 usque in .149., erunt stariora .12., et pertice .102., hoc est stariora .13., et panora 6, et soldi 9.; quibus additis cum starioris .149., faciunt stariora 162, et panora 6, et soldos .9.

Nunc satis dictum est de multiplicatione perticarum integrarum in integras, modo de multiplicatione earundem cum pedibus dicere uolumus: et quia cum multiplicatur pes in perticas quotlibet, ut dictum est, ueniunt tot medijs soldi, quot sunt ille pertice: si duo pedes multiplicantur in perticas, ueniunt tot soldi, quot sunt ille pertice. Et si pedes .3. multiplicantur in perticas, ueniunt tot soldi, quot sunt pertice, et insuper totidem dimidij soldi. Et si pedes .4. multiplicantur in perticas, ueniunt duplicati soldi. Et ex pedibus .5. multiplicatis in perticas ueniunt item duplicati soldi ipsarum perticarum, et insuper totidem dimidij. Et ex multiplicatione pedum in pedes ueniunt denari, ut supra diximus.

Si uis multiplicare perticas .12. et pedem .1. per perticas .25. et pedes .2., multiplica

primum perticas 12 per perticas 25, erunt panora 54, et soldi .9.: retineas panora in manu dextra, et soldos in manu sinistra: deinde multiplica pedem .1. per perticas 25., erunt soldi $\frac{1}{2}$ 12; quos adde cum soldis 9., erunt in manu sinistra soldi .21; et cum pedibus retineas drios (*sic*) 6., qui super sunt super illis soldis .21. Signa uero pedum sunt hec: positio puncte pedis sinistri super punctam dextri signat .1.: positio puncte sinistri super floccam dextri .2.; tactus calcanei dextri cum puncta pedis sinistri .3.; ducere pedem sinistram post dextrum, et tangere punctam pedis dextri ab exteriori parte cum puncta sinistri .4.; ab eadem parte tangere cum puncta pedis sinistri nodum siue floccam dextri .5.: alia quinque signa sunt per ordinem eodem modo cum pede dextro tangendo sinistram; undecimum uero signum est, cum ponitur calcaneum pedis dextri super floccam pedis sinistri: pluribus signis non indigemus, cum denari .12 faciunt unum solidum, qui soldus retinetur in manu sinistra. De signis manuum nil dicendum est, cum ipsa sciant omnes, qui sciunt abbacam. Vnde reuertamur ad propositum: multiplicabis iterum pedes .2. per perticas .12, erunt soldi .12.; quibus additis cum soldis $\frac{1}{2}$ 21 seruatis, faciunt soldos $\frac{1}{2}$ 33. Item multiplicabis pedem .1. in pedes .2., erunt denari .2.; quos adde cum denarijs .6., qui seruantur in pedibus, erunt denari .8.; quos serua iterum cum pedibus; et sic habebimus panora .54., et soldos .33, et denarios .8., scilicet stariora .4., et panora .8., et denarios .8. pro quesita multiplicatione. Item si uis multiplicare perticas .17, et pedes .2. per perticas .36, et pedes .3., multiplica primum perticas .17. per perticas .36., erunt stariora .9., et panora .3., et soldi $\frac{1}{2}$ 4: retineas stariora in corde, panora retineas in manu dextra, soldos in sinistra, denarios in pedibus; super que omnia adde multiplicationem de pedibus .2. in perticas .36., scilicet soldos .36.; et multiplicationem de pedibus .3. in perticas .17., scilicet soldos $\frac{1}{2}$ 25.; et multiplicationem de pedibus .3. in pedes .2., scilicet denarios .6.; et quotiens excreuerint tibi soldi in manu sinistra, fac ex eis panora quotienscumque poteris; et sic habebis in summa stariora .9., et panora 7, et denarios .6. Item si uis multiplicare perticas .26, et pedes .4. per perticas .43., et pedes .5., multiplica primum perticas .26. per perticas .43., que sunt stariora .16., et panora .11., et soldi $\frac{1}{2}$ 4. Item multiplica pedes .4., scilicet soldos .2., per perticas .43., erunt soldi .86., scilicet panora .5, et soldi $\frac{1}{2}$ 3.: item multiplica pedes .5, scilicet soldos $\frac{1}{2}$ 2 per perticas 26, erunt soldi .65: item multiplica pedes .4. per pedes .5, erunt denari 20.; quibus quatuor multiplicationibus in unum coniunctis, faciunt in summa stariora .17., et panora .8, et soldos 8., et denarios .8. Sj uis multiplicare perticas .28., et pedem .1., et uncias .7. per perticas .53., et pedes .5., et uncias .12.; multiplica primum perticas .28., et pedem .1. per perticas .53., et pedes .5., erunt stariora .22, et panora .11., et soldi .11., et denari .5: deinde multiplica uncias .7., scilicet denarios $\frac{1}{2}$ 2, per perticas .53.; tamen primum per 48., scilicet per soldos .4., et postea per denarios .5., erunt soldi .10., et denari $\frac{2}{3}$ 3.: item multiplica uncias 12., scilicet denarios .4., per perticas .28.: primum quidem per .24., scilicet per soldos .2., et postea per .4., erunt soldi .9., et denari 4.: post hoc multiplica uncias .7. per pedes .5., et uncias .12. per pedem .1., erunt sexte unius uncie 47, scilicet denari $\frac{11}{12}$ 2; et multiplica uncias .7. per uncias .12, erunt $\frac{84}{24}$ unius denarij, de quibus mentio facienda non est, cum non sint uncia .1.: adde ergo reliquas multiplicationes in unum, reddent pro tota summa stariora .23., et soldos .14., et denarios .9. Item si uis multiplicare perticas .37, et pedes .2., et uncias $\frac{1}{3}$ 5 per perticas .67, et pedes .4., et uncias $\frac{1}{4}$ 10, multiplica primum perticas .37., et

*Numeratio pedum
usque in undecim.*

fol. 5 verso.

pedes .2., et uncias .5. per perticas .67, et pedes .4; et uncie .10. erunt stariora .38., et panora .4., et soldi .8., et denari .5. et parum amplius : super que adde multiplicationem de tertia unius uncie in perticas .67, et pedes .4., et uncias $\frac{1}{4}$ 10., scilicet parum amplius de uncijs $\frac{1}{2}$ 22. Et addes etiam multiplicationem de quarta unius uncie in perticas .37, et pedes .2., et uncias $\frac{1}{3}$ 5., scilicet parum minus de uncijs $\frac{1}{3}$ 9, erunt in summa stariora 38, et panora .4., et soldi .9., et denari .5. parum minus. Et sic crebro studio utendo suprascriptis multiplicationibus poteris habere notitiam similium.

Si uolueris multiplicare perticas .17, et pedes .3. in perticas .28., et pedes .4., collocabis pedes lateris longioris sub pedibus lateris breuioris, et perticas sub perticis, scilicet pedes .4. sub pedibus .3.; et post ipsos pedes pone perticas .28. sub perticis .17. uersus sinistram retro, ut hic ostenditur; et multiplicabis pedes .3. per pedes .4., erunt denari .12.; quia cum multiplicamus pedes in pedes, egrediuntur ex multiplicatione denari, ut dictum est. Serua ergo pro illis denarijs .12., soldum .1. in manu sinistra; et multiplicabis pedes .3. per perticas | 28; et pedes .4. per perticas .17. in cruce, secundum quod docui in multiplicationibus duarum figurarum contra duas in libro maioris guice abbaci; sed dimidiabis has multiplicationes multiplicando; hoc est multiplicabis dimidium pedum .3. in .28., uel dimidium de 28. in .3. Similiter multiplicabis dimidium pedum .4. per 17., uel dimidium de 17. per 4.; et hoc facies, quia ex multiplicato pede in perticam, egreditur inde pes, scilicet medietas unius soldi: quare multiplicatio pedum .3. in dimidium perticarum .28., scilicet in .14., faciunt soldos 42; quos adde cum soldo .1. seruato in manu, erunt soldi .43. in eadem manu; et multiplicatio medietatis pedum .4. in perticas .17. facit soldos .34; quibus additis cum soldis 43., faciunt soldos .77.; ex quibus facies panora, erunt panora .4., et soldi .11. Serua quidem bis panora in manu dextra, et soldos in sinistra : post hec multiplicabis perticas .17. per perticas .28. per demonstratum modum; quia de multiplicatione perticarum in perticas satis subtiliter dictum est superius; et habebis in summa stariora .7, et panora .7., et soldos .3, et denarios .6.

Et Si uolueris multiplicare tantum perticas .19. in perticas .41., et pedes .4., collocabis perticas .41. sub perticis .19.; et in loco pedum ante .19. pones zefirum; et sub ipso ante perticas .41. pones pedes .4., ut hic ostenditur; et multiplicabis zefirum per pedes .4., faciet zefirum; et zefirum per dimidium de 41 faciet iterum zefirum; medietatem de pedibus .4. in .19. faciunt soldi 38., qui sunt panora .2. in manu dextra, et soldi 5 in sinistra; et perticas 19. in perticas .33. faciunt stariora $\frac{1}{2}$ 9.; et sic habebis in corde stariora .9., et in manu dextra panora .8., et in sinistra soldos .5.: et multiplicabis perticas .8., que sunt a 33 usque in .41., in perticas .19., scilicet in .11., et in .8., facient panora .16., et perticas .64.; que pertice 64 sunt panora .11, et soldi .9.; et sic capiunt in summa stariora 12, minus denaris .12. Item si uolueris multiplicare perticas .20., et pedes .4., et uncias .11. in perticas .46, et pedes .5., et uncias .12., collocabis perticas sub perticis, et pedes sub pedibus, et uncias sub uncijs, ut hic ostenditur; et multiplicabis ad modum multiplicationum trium figurarum contra tres; et erunt uncie in loco prime figure, scilicet in loco unitatum, et pedes in loco secundę, scilicet decenarum; et pertice in loco tertię, scilicet centenariorum: quare multiplicabis uncias .11. per uncias .12, faciunt $\frac{132}{324}$ unius denarij; quia ex uncia multiplicata in unciam, prouenit $\frac{1}{324}$ unius denarij; nam regula de 324 est $\frac{1}{18} \frac{0}{18}$: quare si .132 diuiderimus per primum .18., qui est sub

est. Serua per perticas » (fol. 5 verso, lin. ultima, e margine inferiore esterno; pag. 9, lin. 13 e 14).

pertice	pedes
17	3
28	4

fol. 6 recto.

» .41. sub et perticas » (fol. 6 recto, lin. 14-17; pag. 9, lin. 28-32).

pertice	pedes
19	0
41	4

» et erunt ... et quod prouenit » (fol. 6 recto, lin. 25-29 e 30; pag. 9, lin. 39 — pag. 10, lin. 4).

pertice	pedes	unc.
20	4	11
46	5	12

uirgula, exhibunt $\frac{1}{3}$ 7; uel sextam unciarum .12. multiplica per .11.; et quod prouenerit diuide per sextam de 18, exhibunt similiter $\frac{1}{3}$ 7, que sunt $\frac{m^o}{18}$ unius denarij; seruabis .7. in manu, et fractiones seruabis in tabula, uel in corde; et multiplicabis uncias .11. in pedes .5.; et uncias .12. in pedes .4. in cruce; et adde has duas multiplicationes cum .7. seruatis, erunt .110., que sunt $\frac{m^o}{18}$ unius denarij; quia ex multiplicatione unciarum in pedes egredientur $\frac{m^o}{18}$ unius denarij: quare diuisis $\frac{1}{3}$ 110 per 18, faciunt denarios .6, et $\frac{1}{3} \frac{2}{18}$; seruabis denarios .6 in manu, et fractiones in tabula, uel in corde; super quos addes multiplicationem | tertie partis unciarum .11. in perticas 46., uel tertiam partem de perticis .46. in .11.; quia multiplicatio uncię in perticam facit $\frac{1}{3}$ unius denarij, erunt denari $\frac{2}{3}$ 174, qui sunt soldi .14., et denari $\frac{2}{3}$ 6; super quos adde iterum multiplicationem tertie partis unciarum .12. in perticas .20.; et multiplicationem de pedibus .4. in pedes .5, erunt in summa soldi .22., et denari $\frac{2}{3}$ 10.: addes $\frac{2}{3}$ unius denari cum $\frac{1}{3} \frac{2}{18}$ seruatis, faciunt $\frac{1}{3} \frac{44}{18}$ unius denari; et de soldis .22., et denaris 10. seruabis in manu dextra panorum unum, et in sinistra soldos .6., et in pedibus denarios .4.; super que addes multiplicationem medietatum pedum in perticas in cruce: et perticarum in perticas, ut in antecedentibus fecimus; et habebis in summa stariora .14., et panora .9., et soldos 4., et denarios $\frac{1}{3} \frac{44}{18}$ 4. Rursus si uis multiplicare perticas .21 per perticas 47, et pedes 2., et uncias .10, collocabis uncias .10 sub zefiro, et pedes .2 sub alio zefiro, et perticas 47. sub perticis 21., ut hic ostenditur; et multiplicabis uncias per uncias, scilicet zefirum per 10, facit zefirum: quod relinques, et multiplicabis .0. per 2., et .10 per 0. in cruce, faciunt zefirum; quod relinques iterum, et multiplicabis zefirum, quod est in loco unciarum, per $\frac{1}{3}$ de perticis 47., et 10 per $\frac{1}{3}$ de .21; et zefirum, quod est in loco pedum, per pedes .2, faciunt soldos .5., et denarios 10. Et multiplicabis zefirum, quod est in loco pedum, per $\frac{1}{2}$ de perticis 47, et $\frac{1}{2}$ duorum pedum in perticas .21., faciunt soldos 21.; et sic habes soldos 26, et denarios .10., hoc est panorum unum, et soldos 10, et denarios .4.: super quos adde multiplicationem de perticis .21. in perticas .47.; et habebis pro summa quesite multiplicationis stariora .15., et panorum unum, et soldum .1., et denarios .4. mensurę. Et sic studeas semper cum zefiris supplere gradus laterum multiplicantium; ut quot sunt gradus in uno latere, tot sunt in alio: dicimus enim primum gradum uncias: secundum pedes: tertium perticas. Verbi gratia: uolumus multiplicare perticas 13, et uncias .11. per perticas .28., et uncias .14.; collocabis perticas sub perticis in tertio gradu, et uncias sub unciis in primo; et suppleatur secundus gradus, ponendo zefira inter uncias, et pedes, scilicet in secundo gradu, ut hic ostenditur: et multiplicabis numeros, secundum quod docuimus, et habebis in summa stariora .5, et panora .7., et denarios $\frac{5}{3} \frac{44}{18}$ 1. Item uolumus multiplicare perticas 14, et pedes .2. in perticas .34, et uncias .15.; scribes eos sic. Et multiplicabis zefirum unciarum per uncias .15, faciet .0.; quo .0. diuiso per 18., facit iterum .0.; quod relinques, cum nihil sit: et multiplicabis .0. unciarum per .0. pedum, et uncias .15. per pedes .2., faciunt .30.; quibus diuisis per .18., facit denarium $\frac{2}{3}$ 1: et multiplicabis $\frac{1}{3}$ de zefiro unciarum per perticas 34., et $\frac{1}{3}$ unciarum .15. per perticas .14., et pedes .2 per .0. pedum; et addes cum denario $\frac{2}{3}$ 1., et faciunt soldos .6., minus $\frac{1}{3}$ unius denarij: et multiplicabis dimidium pedum .2. per perticas .34., et dimidium zefiri per perticas .14.; et addes cum soldis .6. seruatis, faciunt soldos .37., minus $\frac{1}{3}$ unius denarij, qui sunt panora .2, et soldi ., minus $\frac{1}{3}$ unius denarij: et de perticis .14. accipe perticas .11.; et mul-

fol. 6 verso.

* perticas, ut in ... in cruce »
(fol. 6 verso, lin. 8-12 e 13;
pag. 10, lin. 15-20).

pertice	pedes	unc.
21.	0.	0
47.	2.	10

* et denarios .4. et pedes »
(fol. 6 verso, lin. 19-23; pag.
10, lin. 27-33).

pertice	pedes	unc.
13.	0.	11
28.	0.	14

* per uncias .15 perticas
.14. » (fol. 6 verso, lin. 27-
31; pag. 10, lin. 36-41).

pertice	pedes	unc.
14	2	0
31	0	15

tiplica eas per perticas .31., erunt panora .62.; et multiplicabis perticas .3., que remanserunt de perticis .14., per perticas .31., primum per 22, et postea per .9.; uel in una multiplicatione per .31., erunt panora .16 et | soldi .15.; et habebis in summa stariora .6., et panora .9., et soldos .2, et denarios $\frac{2}{3}$ 5 mensurę.

fol. 7 recto.

Rursus si uis multiplicare perticas 17, et pedes .4., et uncias $\frac{1}{2}$ 9. per perticas .32, et pedes .5., et uncias $\frac{3}{4}$ 14; collocabis perticas sub perticis, et pedes sub pedibus, et uncias sub uncijs; multiplicabisque uncias $\frac{1}{2}$ 9 per uncias $\frac{3}{4}$ 14.; sic primum .9 per 14. faciunt .126; super que adde medietatem de 14, et $\frac{3}{4}$ de 9 in cruce, faciunt plus de 139; quibus diuisis per .18., ueniunt plus de .7.; que .7. serua in manu; et multiplicabis in cruce uncias $\frac{1}{2}$ 9 per pedes .5., et uncias $\frac{3}{4}$ 14 per pedes 4.; et adde cum .7 seruatis, et erunt plus de .113; que diuide per 18., erunt denari $\frac{1}{3}$ 6; et multiplicabis $\frac{1}{3}$ de $\frac{1}{2}$ 9, scilicet $\frac{1}{6}$ 3 per perticas .32., erunt denari $\frac{1}{3}$ 101; quibus additis cum denaris $\frac{1}{3}$ 6 seruatis, facient soldos .9., minus $\frac{1}{3}$ unius denarij: super quos adde multiplicationem tertie partis de uncijs $\frac{3}{4}$ 14. in .17., uel econtra; quam multiplicationem sic facies: de $\frac{3}{4}$ 14 accipe 12., cuius $\frac{1}{3}$ in integrum est .4.; que .4. multiplica per perticas .17, erunt denari .68.: post hec ex $\frac{3}{4}$ 2 accipe 2; et multiplica eas per 17., erunt uncie .34.; ex quibus fac denarios, scilicet diuide eas per 3, erunt denari $\frac{1}{3}$ 11; et sic habes denarios $\frac{1}{3}$ 79: post hec accipe $\frac{1}{3}$ de $\frac{3}{4}$ que restant, erit $\frac{1}{4}$; quod multiplica per 17, erunt denari $\frac{1}{4}$ 4; et sic habes denarios $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ 83 pro multiplicatione de $\frac{1}{3}$ unciarum $\frac{3}{4}$ 14. in 17.: uel aliter accipe $\frac{1}{3}$ de 17., quod est $\frac{5}{3}$ 5.; et multiplica ea per $\frac{3}{4}$ 14. sic: 5 per 14 faciunt denarios .70.; et $\frac{2}{3}$ de 14 sunt denari $\frac{1}{3}$ 9; et $\frac{2}{4}$ de 5 sunt denari $\frac{1}{4}$ 3.; et $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ sunt $\frac{1}{2}$ unius denarij; et sic habes denarios $\frac{7}{12}$ 83 ut supra: uel aliter: super $\frac{3}{4}$ 14 adde $\frac{1}{4}$, erunt 15; cuius $\frac{1}{3}$ accipe, quod est .5.; et multiplica per 17., erunt denari .85.; et ex ipso $\frac{1}{4}$, quam iunxisti, accipe $\frac{1}{3}$, erit $\frac{1}{12}$; quam partem accipe de .17., que est denarius $\frac{5}{12}$ 1; quem extrahe de 85., remanent, ut prediximus, denari $\frac{7}{12}$ 83.; et sic studeas in similibus procedere melius quod tibi uidebitur, secundum numerum unciarum: additis ergo denarijs $\frac{7}{12}$ 83. cum soldis 9, minus $\frac{1}{3}$ unius denarij, faciunt soldos 16, minus $\frac{2}{4}$ unius denarij; cum quibus adde multiplicationem peduum in pedes, scilicet 4. in .5., erunt denari .20., erunt soldi 17, et denari $\frac{1}{4}$ 7.: super quos adde, ut supra, multiplicationem medietatis peduum per perticas in cruce, et perticarum in perticas, et habebis in summa stariora 8, et panora 10., et soldos .7., et denarios $\frac{1}{4}$ 1.: potes enim aliter de fractionibus unciarum facere, uidelicet in principio, antequam incipias multiplicare. Accipe fractiones unciarum superiorum de perticis inferioribus: et fractiones unciarum inferiorum de perticis superioribus, ut in hac multiplicatione: pro uncia $\frac{1}{2}$, que est in superioribus uncijs, accipe medietatem de 32; et pro $\frac{3}{4}$, que sunt in uncijs inferioribus, accipe $\frac{3}{4}$ de 17 in cruce, erunt 16: et $\frac{3}{4}$ 12, hoc est uncie $\frac{3}{4}$ 28, que sunt fere denari .10., quos serua; et delebis ipsas fractiones unciarum de multiplicatione; et multiplicabis tantum perticas 17, et pedes .4., et uncias 9 per perticas 32, et pedes .5., et uncias .14.; et super summam adde denarios .10. seruatos. Si uolueris multiplicare perticas 13, et pedes .2. per perticas .21., et pedes .3, cum pes sit $\frac{1}{6}$ unius perticę, pone tot sextas post perticas, quot sunt pedes positi cum ipsis perticis, et habebis | perticas $\frac{2}{6}$ 13 ad multiplicandum per perticas $\frac{3}{6}$ 21: pone sextas sub sextis, et perticas sub perticis, ut hic ostenditur; et pones ex parte .6. bis sub una uirga; et nihil super sic $\frac{2}{6}$; et multiplicabis pedes 2 per 3, qui sunt super ambobus .6., erunt .6.; quem diuide

diuide per 18. 17, erunt
(fol. 7 recto, lin. 7 e 8-11;
pag. 11, lin. 11-15).

pertice	pedes	unc.
17	4	$\frac{1}{2}$ 9
32	5	$\frac{3}{4}$ 14

fol. 7 verso.

• perticas $\frac{2}{6}$ 13 retines •
(fol. 7 verso, lin. 1-4; pag. 11,
lin. 40 — pag. 12, lin. 2).

pertice	
$\frac{2}{6}$	13
$\frac{3}{6}$	21

• regulam perticarum super
alijs • (fol. 7 verso, lin. 10-
13; pag. 12, lin. 7-11).

pertice	
$\frac{3}{6}$	14
	41

primum .6., qui est ex parte sinistra sub uirga, quam modo posuimus, exhibit .1., remanet .0.: retines itaque ipsum .1. in manu, et remanens .0. pone super ipsum $\frac{0}{6}$; et multiplicabis .2., que sunt super .6., per 21.; et 3, que sunt super alium .6., per 13 in cruce; et addes multiplicationem eorum cum uno seruato, erunt .82.; que diuide per alium .6., exhibunt pertice .13, et remanent .4.: pone .4. super ipsum .6. sic: $\frac{0}{6} \frac{4}{6}$, et 13 serua in manu; super que adde multiplicationem perticarum .13. in perticas .21., erunt pertice .286.; quas diuide per $\frac{16}{116}$, scilicet per regulam perticarum stariori, exhibunt $\frac{0}{11} \frac{2}{6} 4$: copula hanc uirgulam cum prima, et habebis $\frac{0}{6} \frac{4}{6} \frac{0}{11} \frac{2}{6} 4$: scias quia cum ita feceris, quicquid extra uirgulam comprehenditur, sunt stariora; et super .6., qui est in capite uirgulę post integrum, sunt dupla panora; et super .11. sunt pertice: et intelliges unamquamque ipsarum esse soldos .3.; et super alijs duobus .6. sunt denari; quos accipies sic: multiplicabis figuram, que est super .6., per alium .6., qui est post ipsum; et addes figuram, que fuerit super ipsum .6. Verbi gratia: pro .4., que sunt extra uirgulam, habemus stariora .4.; et pro .2., que sunt super .6, habemus panora .4.; et pro 4, que sunt super alium .6., habemus soldos .2.; quia multiplicatio de .4. in .6., et addito zefiro, quod est super ipsum .6., surgit in denarijs .24. Item si uis multiplicare perticas .14., et pedes .5 per perticas .41.; sub .14. pone .41., et $\frac{0}{6}$ sub $\frac{5}{6}$ sic: et scias quia ideo posuimus $\frac{0}{6}$ post .41., ut equiparentur fractiones subteriores cum fractionibus superioribus; et pone $\frac{1}{6} \frac{0}{6}$ ex parte; et multiplicabis .5., quod est super 6., per .0., quod est super alium .6., faciet .0.: quare pones .0. super primum .6.; et multiplicabis in cruce 5 per 41., et .0. per .41., faciunt .205.; que diuide per sequentem .6., exhibunt 34., et remanet .1.: pone .1. super 6, et 34. serua in manu; super quem adde multiplicationem de 14. in .41., faciunt 608; que diuide per $\frac{1}{11} \frac{0}{6}$, que restant in uirgula diuisionis, remanebunt .3. super .11., et .1. super .6., et 9 extra uirgulam, ut in questione ostenditur: notantur enim in ipsa summa stariora .2., et soldi .9., et denari .6. mensurę. Item si uis multiplicare perticas .15., et pedes .3., et uncias 12 per perticas .42., et pedes .2., et uncias .15.; oportet ut uncias redigas in sextis unius pedis, scilicet in sextas sextę unius perticę: et quoniam uncie .18 faciunt pedem .1.; ergo uncie .3 faciunt $\frac{1}{6}$ pedis; quare uncie .12. sunt $\frac{2}{6}$ unius pedis; quas sextas pone in una uirga post $\frac{2}{6}$: propter eadem ergo pro uncijs .15 pones $\frac{5}{6}$ post $\frac{2}{6}$ sub alia uirga, et habebis perticas $\frac{4}{6} \frac{3}{6} 15$ ad multiplicandum in perticas $\frac{5}{6} \frac{2}{6} 42$, ut hic ostenditur: post hec protrahe uirgulam ex parte, sub qua pone per ordinem .iiii.^{or} sexnarios, et $\frac{1}{11} \frac{0}{6}$ cum ipsis sic: $\frac{0}{66666116}$; et multiplicabis .4. per .5., qui sunt super primis sextis; | et diuide per primum .6. uirgulę seruatę, exhibunt .3., et remanent .2. super ipsum .6.; et multiplicabis in cruce 4 per 2, et 5 per 3, que sunt super uirgis; et addes cum tribus seruatis, erunt .26.; que diuide per secundum .6., exhibunt .4, .et remanent .2. super ipsum .6.: et multiplicabis .4. per 42, et 5 per 15, et 3 per 2; multiplicando uidelicet in antea, sicut multiplicamus tres figuras contra tres retrocedendo; et addes cum .4. seruatis, erunt 253.; que diuide per tertium 6., exhibunt 42, et remanet .1. super ipsum .6.: super 42 uero addes multiplicationem de 3 in .42., et de 2 in .15 in cruce, facient .198.; que diuide per quartum .6., exhibunt 33, et remanet .0. super ipsum .6.: et super 33 adde multiplicationem de 15 in 42., erunt pertice 663; quas diuide per .11., exhibunt 60, et remanent .3. super ipsum .11.: deinde diuide .60. per 6., qui restant in capite uirgulę, exhibunt .10. ante uirgulam, et .0. super ipsum .6.; et sic habes in

fol. 8 recto.

• 42, et 5 ipsum .11.: de-
inde • (fol. 8 recto, lin. 4-9
• 10; pag. 12, lin. 36-42).

pertice		
$\frac{4}{6}$	$\frac{3}{6}$	15
$\frac{5}{6}$	$\frac{2}{6}$	42

summa stariora .10., et soldos 9, et denarium $\frac{1}{6} \frac{2}{6} \frac{3}{6} 1$ mensure: quia super primos duos senarios habemus partem unius denarij; et super alios duos .6. habemus denarios; et super .11. habemus perticas, scilicet triplos soldos; et super .6., qui est in capite uirgule, habemus dupla panora. Rursus si uis multiplicare perticas .16., et pedem .1., et uncias .10. per perticas .43., et uncias $\frac{1}{2} 14$; rediges uncias in sextas unius pedis, erunt sexte $\frac{1}{3} 3$; de qua tertia fac sextas, erunt due sexte; et sic habes in superiori latere perticas $\frac{2}{6} \frac{3}{6} \frac{1}{6} 16$: possumus aliter facere sextas unius pedis de unceis (sic) .10.: quoniam uncie .10. sunt $\frac{10}{19}$ unius pedis; ergo uncie .10. sunt $\frac{2}{9} \frac{0}{6}$ pedis: quare si diuiserimus .20. per regulam de 36., exhibunt $\frac{2}{6} \frac{3}{6}$ unius pedis, ut diximus: similiter duplabis uncias $\frac{1}{2} 14$, erunt $\frac{29}{36}$ unius pedis; et sic habes in subteriori latere perticas $\frac{5}{6} \frac{4}{6} \frac{0}{6} 43$, ut hic ostendimus: et pone sexties .6. sub una uirga post $\frac{1}{11} \frac{0}{6}$ sic: $\frac{666666116}{666666116}$; et multiplicabis numeros, qui sunt super uirgulis; et integros, qui sunt ante uirgulas, ad modum .111.^{or} figurarum in antea procedendo: uerbi gratia: multiplicabis .2. per 5, qui sunt super primo .6.; et diuides per primum .6.: deinde 2 per 4, et 5 per 3; et diuides per secundum .6.: post hec .2. per 0., et 5. per 1., et 3 per 4; et diuides per tertium 6.; et 2 per 43, et 5 per 16, et 3 per 0, et 4 per .1.; et diuides per quartum .6.; et habebis supra dictas .111.^{or} sextas partes tantum unius denarij: deinde multiplicabis .4. per 43, et 4 per 16, et 1. per .0, et diuides per quintum .6.; et habebis super ipsum denarios: deinde multiplicabis .1. per 43, et 0 per 16, et diuides per sextum .6.; et habebis super ipsum .6. medios soldos: ad ultimum multiplicabis perticas .16. per perticas .43., et diuides per $\frac{10}{116}$; et habebis super .11. triplos soldos, et super .6. dupla panora, et ante uirgulam stariora; et sic cum sextis sextorum pedis possumus procedere in infinitum, redigendo fractiones unciarum, que posite in multiplicationibus fuerint in sextis sextarum, si in ipsis ipse fractiones cadere potuerint: et si numerus sextarum unius lateris fuerit minus numero sextarum alterius, supplebis eas cum zefiris super ipsas sextas; hoc est si due sexte sunt in uno latere, et due sint in alio, et si tres tres, et deinceps. | Et si fractiones unciarum minime in sextis sextarum reducere poteris, nequaquam per hunc modum cum ipsis fractionibus operari poteris; sed derelinquas ipsas fractiones; et multiplicabis residuum de ipsis fractionibus, que in sextis sextarum cadere non possunt; et ex ipsis operaberis, secundum quod superius diximus.

In modo secundo.

Potes enim per modum suprascriptum multiplicandi doctrinam reperire modum multiplicandi in alijs regionibus, secundum diuersitates mensurarum ipsarum. Et ut ea, que in hac secunda distinctione promisimus plenarie demonstrentur, quedam huic operi necessaria dignum duximus preponenda. Videlicet *si numerus aliquis diuidatur in quantalibet partes, et multiplicabitur unaqueque pars per totum numerum summa illarum multiplicationum equabitur quadrato totius numeri*, scilicet multiplicationi ipsius numeri in se. Vt si numerus .*ab.* diuidatur in quantalibet portiones, que sint .*ag.* *gd.* *db.* Dico quod si multiplicabitur *ag.* in .*ab.*, et *gd.* in .*ab.*, et adhuc *db.* in .*ab.*, erunt ipse multiplicationes in unum coniuuncte equales multiplicationi totius numeri .*ab.* in se. Quotiens enim unitas est in portione .*ag.*, totiens numerus .*ab.* procreabitur ex multiplicatione *ag.* in .*ab.* Similiter quotiens unitas est in .*gd.*, totiens numerus .*ab.* procreabitur ex multiplicatione .*gd.* in .*ab.*: propter eadem ergo quotiens unitas

* hic ostendimus: et habebis » (fol. 8 recta, lin. 21-27; pag. 13, lin. 10-18).

pertice			
$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}$	16
$\frac{5}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{0}{6}$	43

fol. 8 verso.


* procreabitur *db.*, totiens » (fol. 8 verso, lin. 14; pag. 13, lin. 43 — pag. 14, lin. 1).

<i>a</i>	<i>g</i>	<i>d</i>	<i>b</i>
2	3	5	

in numero .db., totiens oritur numerus .ab. ex multiplicatione .db. in totum .ab. Quare quotiens unitas est in numero .ab., scilicet in portionibus .ag. .gd. et .db., totiens coadunabitur numerus .ab. ex multiplicationibus .ag. et .gd. et .db. in .ab. Verum quotiens unitas est in .ab., totiens numerus .ab. surgit ex multiplicatione .ab. in se. Quare summa multiplicationum .ag. et .gd. et .db. in .ab. equatur multiplicationi .ab. in se, quod oportebat ostendere. Nam ut hec clarius uideantur, esto recta .ab. .10. ulnarum; et portio .ag. sit .2.; .gd. uero .3; .db. quoque .5.; si autem multiplicentur 2. in .10., et 3 in .10., et .5. in .10., hoc est .ag. et .gd., et .db. in tota .ab.; et coniungantur multiplicationes in unum numerum .100. ex earum congregatione procreabuntur, que equantur multiplicationi de 10. in .10. Item si recta linea diuidatur in quantaslibet portiones; et unaqueque multiplicabitur per aliam quamlibet lineam, omnes multiplicationes in unum coniuncte equabuntur multiplicationi totius linee diuise in aliam lineam. Quod ostendamus cum numeris. Sit linea .10. ulnarum diuisa in .2., et 3., et 5.; et alia quelibet linea sit .12. ulnarum. Siquidem si multiplicentur 2, et 3, et 5. in .12, et iungantur eorum multiplicationes in unum, nimirum equabuntur multiplicationi de 10. in .12., scilicet .120. Rursus si recta diuidatur ubilibet in duas portiones, erit multiplicatio unius portionis in se cum multiplicatione eiusdem portionis in aliam, equalis multiplicationi eiusdem portionis in totam lineam: ut si linea .ab. diuidatur super punctum .g., erit multiplicatio .ag. in se cum .ag. in .gb. equalis multiplicationi .ag. in tota .ab.: adiaceat itaque quedam recta .d. equalis recte .ag.; et erit multiplicatio linee .d. in .ag., et in .gb. equalis multiplicationi .d. in totam .ab.: verum multiplicatio .d. in .ag. est sicut multiplicatio .ag. in se ipsam, cum recta .d. sit equalis recte .ag.; et multiplicatio recte .d. in .gb. est sicut multiplicatio recte .ag. in rectam .gb. Quare multiplicatio .ag. in se cum .ag. in .gb. equatur multiplicationi .ag. in .ab., ut oportebat ostendere. Vel si hoc cum numeris demonstrare uolumus, sit .ag. 3, et .bg. 7; quare tota .ab. erit .10.: multiplicatio quidem .ag. in se, scilicet de 3 in .3 cum multiplicatione de 3. in .7., scilicet de .ag. in .gb., surgunt in .30., que equantur multiplicationi .ag. in .ab., scilicet de 3. in .10. ut dictum est. Adhuc si recta linea diuidatur ut accidat in duas portiones, erunt duo quadrati utriusque portionis cum duplo multiplicationis unius portionis in aliam, equales quadrato, scilicet multiplicationi totius linee in se. Vt si linea .ag. diuidatur in duas portiones, que sunt .ab. et .bg. Dico quod multiplicatio .ab. in se cum multiplicatione .bg. in se, et cum duplo multiplicationis .ab. in .bg., equatur multiplicationi totius .ag. in se ipsam. Quoniam linea .ag. diuisa est in duo in puncto .b., erit multiplicatio .ab. in se cum .ab. in .bg., sicut multiplicatio .ab. in tota .ag.

Similiter et multiplicatio .bg. in se cum multiplicatione .gb. in .ba. est sicut multiplicatio .gb. in totam .ga.: ergo multiplicatio .ab. in se cum .bg. in se, et cum duplo multiplicationis .ab. in .bg. equantur duabus multiplicationibus, que sunt .ab. in .ag., et .bg. in .ag. Verum multiplicatio .ab. in .ag. cum .bg. in .ag. equatur multiplicationi .ag. in se. Quare quadratum .ab. cum quadrato .bg., et cum duplo multiplicationis .ab. in .bg. equatur quadrato linee .ag., quod oportebat ostendere. Quod etiam demonstrabimus cum numeris. Sit linea .ab. 3., et .bg. 7.; quare tota linea .ag. erit .10. Vnde si acceperimus quadratum linee .ab., scilicet .9.; et quadratum

a multiplicatio|ne eiusdem totam lineam (fol. 8 verso, lin. 30 e 31; pag. 14, lin. 17-18).



a et erit ... recte .ag. (fol. 8 verso, lin. 33-35; pag. 14, lin. 20-23).



fol. 9 recto.

a ostendere. Quod quare (fol. 9 recto, lin. 17; pag. 14, lin. 41-42).



bg., scilicet *.49.*, et duplum *.ab.* in *.bg.* equabuntur *.100.*, scilicet multiplicationi *.ag.* in se ipsam. Iterum si recta linea diuidatur ubilibet in duas portiones, erit duplum multiplicationis unius portionis in totam lineam cum quadrato alterius portionis, equale duobus quadratis, scilicet quadrato totius linee, et quadrato ipsius portionis, que multiplicatur bis in totam lineam. Vt si linea *.bg.* diuidatur ubilibet super punctum *.a.* Dico quod duplum multiplicationis *.ab.* in *.bg.* cum quadrato linee *.ag.* equatur duobus quadratis linearum *.bg.* et *.ba.* Quoniam linea *.bg.* diuisa est in duo super punctum *.a.*, erit multiplicatio *.ba* in se cum *.ba.* in *.ag.*, sicut multiplicatio *.ba.* in *.bg.* Quare in duplo multiplicationis *.ba.* in *.bg.* est bis quadratus linee *.ba.*, et bis multiplicatio *.ba.* in *.ag.* Verum semel quadratus *.ba.* cum quadrato *.ag.* cum duplo multiplicationis *.ba.* in *.ag.* equatur quadrato totius linee *.bg.* Quare duo quadrati linee *.ba.* cum quadrato linee *.ag.*, et cum duplo multiplicationis linee *.ba.* in *.ag.* equatur duobus quadratis linearum *.bg.* et *.ba.* Sed duo quadrati linee *.ba.* cum duplo multiplicationis *.ba.* in *.ag.* ostensi sunt equales duplo multiplicationis linee *.ba.* in totam lineam *.bg.*: propter quod duplum multiplicationis linee *.ba.* in totam lineam *.bg.* cum quadrato linee *.ag.* equatur duobus quadratis linearum *.bg.* et *.ba.*, quod oportebat ostendere. Quod idem ostendamus cum numeris. Sit tota linea *.bg.* 10; de qua sit portio *.ba.* 3., et portio *.ag.* 7.; duplum quidem multiplicationis *.ba.* in *.bg.*, scilicet de 3. in *.10.*, cum multiplicatione linee *.ag.* in se, que surgit in *.49.*, nimirum in *.109.* ascendunt, que equantur multiplicationi linee *.bg.* in se, scilicet *.100.*, et linee *.ab.* in se, scilicet *.9.* Si recta linea diuidatur in duo equalia, et totidem inequalia, erit multiplicatio inequalium portionum, scilicet unius in aliam cum quadrato linee, que iacet inter utramque sectionem, equalis quadrato dimidie linee diuise. Vt si linea *.ab.* diuidatur in duo equalia super punctum *.g.*, et inequalia super *.d.* Dico quod multiplicatio *.ad.* in *.db.* cum quadrato linee *.dg.* equatur quadrato linee *.ag.* Quoniam linea *.db.* diuisa est ubilibet super punctum *.g.*, cui adiacet quedam alia recta *.ad.*, erit multiplicatio *.ad.* in *.db.* equalis duabus multiplicationibus linee *.ab.* in *.bg.* et in *.gd.* Verum linee *.bg.* equalis iacet linea *.ga.* Quare multiplicatio linee *.ad.* in lineam *.ag.*, et in lineam *.gd.* est sicut multiplicatio linee *.ad.* in lineam *.db.* Rursus quoniam linea *.ag.* diuisa est ubilibet in duo super *.d.* punctum, erit multiplicatio portionum *.ad.* et *.gd.* in *.ag.*, sicut multiplicatio *.ag.* in se. Sed *.dg.* in *.ag.* equatur quadrato *.dg.*, et multiplicationi *.ad.* in *.dg.* Ergo multiplicatio *.ad.* in *.ag.* cum *.ad.* in *.dg.*, et cum quadrato linee *.dg.* equatur multiplicationi *.ag.* in se. Inuenimus autem superius *.ad.* in *.ag.* cum *.dg.* in *.da.* equari multiplicationi *.ad.* in *.db.* Quare *.ad.* in *.db.* cum quadrato *.dg.* equatur quadrato linee *.ag.*, quod oportebat ostendere. Quod etiam ostendamus cum numeris: sit linea *.ab.* 10. ulnarum diuisa in 5., et 5. super punctum *.g.*; et in 3., et in 7. super punctum *.d.*; erit tunc multiplicatio *.ad.* in *.db.*, scilicet de 3. in 7., cum quadrato *.dg.* equalis multiplicationi *.ag.* in se, scilicet de 5 in 5. Si recta linea diuidatur in duo equalia, et adiungatur ei in directo quedam alia linea cuiuslibet longitudinis, erit multiplicatio totius linee, que fit ex prima linea, et ex adiuncta in lineam adiunctam cum quadrato dimidie linee diuise, equalis quadrato linee, que fit ex dimidio prime linee, et ex adiuncta. Vt si linea *.ab.* diuidatur in duo equalia super punctum *.g.*, et adiungatur

quadratis linearum ... a., erit s. (fol. 9 recto, lin. 25; pag. 15, lin. 7-8).


$$\begin{array}{r} b \qquad a \qquad g \\ \hline 3 \qquad 7 \end{array}$$

fol. 9 verso.

linee *.ad.* ... multiplicatio *.ag.* s. (fol. 9 verso, lin. 12 et 13; pag. 15, lin. 29-31).

$$\begin{array}{r} a \qquad d \qquad g \qquad b \\ \hline 5 \end{array}$$

* multiplicationum, que est equalis » (fol. 9 verso, lin. 29 e 30; pag. 16, lin. 4 e 5).



fol. 10 recto.

* in .bg. equalis Verum quadratus » (fol. 10 recto, lin. 13; pag. 16, lin. 24 e 25).



ei in directo alia quedam linea *.bd.* cuiusuis longitudinis. Dico quod multiplicatio linee *.ad.* in *.bd.*, hoc est *.bd.* in *.ad.* cum quadrato linee *.gb.*, uel *.ga.* equatur quadrato linee *.gd.* Quoniam linea *.ad.* diuisa est ubilibet super puncta *.g.* et *.b.*, erit multiplicatio *.bd.* in tota *.ad.* equalis summe trium multiplicationum, que sunt *.bd.* in *.ag.* in *.gb.* et in *.bd.* Sed quia linea *.ag.* est equalis linee *.bg.*; equa est ergo multiplicatio linee *.bd.* in *.ag.* multiplicationi *.bd.* in *.gb.* Quare due multiplicationes *.bd.* in *.ag.*, et *.bd.* in *.gb.* summam constituunt, que est dupla multiplicationis *.bd.* in *.gb.* Quare quadratus linee *.bd.* cum duplo multiplicationis *.bd.* in *.gb.* equatur multiplicationi linee *.bd.* in totam *.ad.*: comuniter accipiatur quadratum linee *.gb.*, erunt duo quadrati linearum *.bd.* et *.bg.* cum duplo multiplicationis *.bd.* in *.gb.* equales summe, que fit ex multiplicatione linee *.bd.* in *.ad.*, et ex quadrato linee *.bg.* Sed duo quadrati linearum *.bd.* et *.bg.* cum duplo *.bd.* in *.gb.* equatur quadrato linee *.gd.* Quare et multiplicatio linee *.bd.* in *.ad.* cum quadrato linee *.bg.* equalis erit quadrato linee *.gd.*, quod oportebat ostendere. Quod etiam ostendatur cum numeris: sit linea *.ab.* 10. diuisa in duo equalia, scilicet in .5 et 5. super punctum *.g.*, cui addatur in directo linea *.bd.* trium uinarum, erit tota linea *.ad.* 13., et *.gd.* 8.: multiplicatio quidem *.bd.* in *.ad.*, scilicet de .3 in 13. cum quadrato linee *.gb.*, scilicet cum .25., surgit in .64., scilicet in quadrato linee *.gd.* Si recta linea diuidatur in equalia, et in inequalia; qui ab inequalibus totius portionis quadrati dupli sunt eius qui á dimidia, et eius qui ab ea, que est inter sectiones quadrati. Vt si linea *.gd.* diuisa fuerit in equalia super punctum *.a.*, et in inequalia super punctum *.b.* Dico quod quadrati portionum *.gb.* et *.bd.* dupli sunt duorum quadratorum linearum *.da.* et *.ab.* Quoniam linea *.ag.* diuisa est in duo super punctum *.b.*, erunt duo quadrati linearum *.gb.* et *.ba.* cum duplo multiplicationis *.ab.* in *.bg.* equalis quadrato linee *.ga.*, hoc est quadrato linee *.ad.* Verum quadratus linee *.ba.*, cum semel *.ba.* in *.bg.* est sicut *.ba.* in *.ag.* Quare quadratus *.bg.* cum *ba.* in *.ag.*, et cum *ba.* in *.bg.* equatur quadrato linee *.ad.*: comuniter adiaceat quadratus linee *.ba.*, erunt duo quadrati *.gb.* et *.ba.* cum *ba.* in *.ga.*, et cum *ba.* in *.bg.* equales quadratis linee *.ad.*, et linee *ab.* Sed quadratus linee *.ba.* cum *ab.* in *.bg.* est sicut *.ba.* in *.ag.*; ergo quadratus *.gb.* cum duplo *ba.* in *ga.* equatur duobus quadratis linearum *da.* et *ab.* Quare quadratus linee *da.* cum quadrato linee *ab.* superhabundat quadratum linee *gb.* in duplo multiplicationis linee *ba.* in *ga.*, hoc est *ba.* in *ad.* Item quoniam linea *bd.* diuisa est in duo super punctum *a.*, quadrati linearum *da.* et *ab.* cum duplo *ba.* in *ad.* equantur tetragono, scilicet quadrato linee *bd.*: ergo tetragonum *bd.* superhabundat tetragona *da* et *ab.* in duplo multiplicationis *ba.* in *ad.*; ergo quantum tetragona *da* et *ab.* superhabundant tetragonum *bg.*, tantum superhabundatur a tetragono *bd.* Quare tetragona *gb* et *bd.* dupla sunt quadratis *da.* et *ab.*, quod oportebat ostendere. Que etiam ostendamus in numeris. Sit linea *gd.* 10. in 5, et in .5. diuisa super *a.*, et in 3 et 7 super *b.*, erit tetragonum *gb.* 9, et *bd.* 49.; que insimul iuncta surgunt in .58., hoc est in duplum quadratorum *da.* et *ab.*; quia quadratus *da.* est .25., et *ab.* 4.

Irem Si recta linea diuidatur in duo equalia, cui addatur in directo quedam alia linea, erit tetragonum totius linee effectę cum tetragono linee adiunctę duplum eius, quod fit á media linea diuisa, et eius quod fit á media et ab adiuncta. Vt

si linea *ab.* in duo equalia diuisa fuerit super *g.*; et apponatur ei in directo linea *bd.* Dico quod tetragonum linee *ad.* cum tetragono linee *bd.* duplum est tetragonorum linee *ag.* et linee *gd.* Quoniam linea *ad.* in duo utlibet diuisa est super *b.*; erit itaque quadratus linee *ad.* cum quadrato linee *bd.* equalis quadrato *ab.* et duplo *bd.* in *ad.* Sed duplum *bd.* in *ad.* est sicut duo quadrati linee *bd.* cum duplo *bd.* in *ba.*; ergo tetragonum *ab.* cum duobus quadratis linee *bd.*, et cum duplo *bd.* in *ab.* equantur quadratis linearum *ad.* et *bd.* Verum multiplicatio *bd.* in *ab.* dupla est multiplicatione *bd.* in *gb.*, cum dimidia sit *bg.* ex *ab.* Quare duplum *bd.* in *ab.* est quadruplum ex *bd.* in *gb.*; ergo tetragonum *ab.* cum duobus quadratis linee *bd.*, et cum quadruplo *bd.* in *gb.* equatur duobus quadratis linearum *ad.* et *bd.*

Sed tetragonum linee *ab.* quadruplum est tetragoni, quod á media *ab.* describitur, scilicet á linea *gb.*; ergo quadruplum tetragoni *gb.* cum duobus tetragonis linee *bd.*, et cum quadruplo multiplicationis *bd.* in *gb.* equatur duobus quadratis linearum *ad.* et *bd.* Rursus quoniam linea *gd.* in duo diuisa est super *b.*, erunt duo quadrati portionum *gb.* et *bd.* cum duplo *bd.* in *bg.* equales quadrato linee *gd.* Quare duplum quadrati linee *gb.* cum duobus quadratis linee *bd.*, et cum quadruplo *bd.* in *gb.*, erit duplum quadrati linee *gd.* Reliquum uero duplum quadrati linee *gb.* duplum est quadrati linee *ga.* Ergo quadruplum quadrati linee *gb.*, et duo quadrati linee *bd.* cum quadruplo *bd.* in *gb.* dupli sunt tetragonorum portionum *ab.* et *bd.* Sed quadruplum quadrati linee *gb.*, et duo quadrati linee *bd.* cum quadruplo *bd.* in *gb.* ostensi sunt equales duobus quadratis linearum *ad.* et *bd.* Quare et quadrati linearum *ad.* et *bd.* dupli sunt quadratorum portionum *ag.* et *gb.*; quod oportebat ostendere. Que etiam ostendamus cum numeris. Sit linea *ab.* 10. diuisa super punctum *g.* in .5 et 5.; cui addatur in directo linea *bd.* trium unarum, erit tota *ad.* 13., et *gd.* 8.: quadratus quidem linee *ad.* est 169., et *bd.* est 9.; qui insimul iuncti surgunt in 178., scilicet in duplo de 89., que sunt summa quadratorum *ag.* et *gd.*, scilicet de 25 et 64. Quoniam superfluum uidetur nostris demonstrationibus demonstrare omnia, que Euclides super ostensionibus assignauit. Idcirco quedam ex ipsius libro huic operi necessaria sine demonstratione proponere procuramus. Si tres numeri, uel tres quantitates proportionales fuerint, ita quod sicut primus numerus fuerit ad secundum, ita secundus sit ad tertium; tunc multiplicatio primi numeri in tertium equatur quadrato secundi numeri, scilicet multiplicationi eius in se. Exempli causa: sunt 4, et 6., et 9. in una proportione; quia sicut 4. sunt ad 6., ita 6. sunt ad 9.: uel sicut 9. sunt ad 6., ita 6. sunt ad 4. Quare multiplicatio de 4. in 9. surgit in multiplicatione de 6. in 6. Vnde quando ex tribus datis numeris multiplicatio primi in tertium facit quadratum secundi numeri; tunc illi tres numeri continue proportionales sunt. Item cum quatuor numeri proportionales (*sic*) sunt; fueritque sicut primus ad secundum, ita tertius ad quartum; tunc multiplicatio primi in quartum equatur multiplicationi secundi in tertium. Verbi gratia: sicuti primus numerus 6. est ad secundum 8., ita tertius 9. est ad quartum 12.; erit quidem multiplicatio de 6. in 12. equalis multiplicationi de 8. in 9. Surgit enim utraque multiplicatio in 72.: ex hoc uero comprehenditur, quod cum multiplicatio primi numeri in quartum est equalis multiplicationi secundi in tertium; tunc illi quatuor numeri proportionales sunt, in ipsa uidelicet proportione, in qua

fol. 10 verso.

^a *bd.* in *ad.* ... duplo *bd.* (fol. 10 verso, lin. 4-5; pag. 17, lin. 5-7).

$\frac{a \quad g \quad b \quad d}{\quad}$


fol. 11 recto.

primus est ad secundum, in eadem est tertius ad quartum. Et notandum, cum aliquis numerus diuiditur per aliquem numerum, si illud quod ex diuisione euenerit, multiplicabitur per diuisorem, nimirum diuisus numerus ex ipsa redibit multiplicatione. Vt si .20. diuidantur per .4., exhibunt .5.; et ex multiplicatione igitur de .4. in .5. redijt diuisus numerus .20. Si autem ex tribus numeris proportionalibus duo erunt noti, scilicet primus et secundus, et tertius ignotus erit: quadratum secundi numeri per primum numerum diuide, et quod ex diuisione euenerit, erit tertius numerus. Verbi gratia: sit primus numerus .4., secundus .6., et tertium ignoramus. Quadratum de .6., scilicet .36., per .4., scilicet per primum numerum diuidemus, exhibunt .9. pro tertio numero. Quare si exeuntem .9. per diuisorem .4. multiplicauerimus, redibunt .36., scilicet diuisum numerum: ergo cum ex multiplicatione primi numeri in tertium egreditur quadratum secundi numeri, tunc illi tres numeri proportionales sunt. Est ergo sicut .4. ad .6., ita .6. ad .9. Nam si ignorauerimus primum numerum, diuidemus eundem .36. per tertium .9., et egreditur primus .4.; et si ignorauerimus secundum numerum, multiplicabimus primum per tertium, scilicet .4. per .9., exhibunt .36.; quorum radix, que est .6., est secundus numerus. Item sit sicut primus numerus .a. ad secundum .b., ita tertius .g. sit ad quartum .d. Quoniam multiplicatio primi in quartum, scilicet .a. in .d., est equalis multiplicationi .b. in .g., scilicet secundi numeri in tertium. Si noti fuerint .a. et .b. et .g.; fueritque .d. ignotus, multiplicationem itaque ex .b. in .g. diuidemus per .a., et egreditur .d. Et si eadem multiplicatio, scilicet de .b. in .g., diuidatur per .d., egreditur .a.: propter eadem ergo si multiplicatio de .a. in .d. diuidatur per .b., egreditur .g.; et si diuisa fuerit per .g., egreditur .b. Verbi gratia: sit .a. 4. et .b. 6. et .g. 8. et .d. 12.; si multiplicatio .b. in .g., scilicet 48, diuidatur per .a., scilicet per .4., egreditur .d., scilicet 12.: que .48. si per 12 diuisa fuerint, scilicet per quartum numerum, egreditur .4., scilicet primus numerus. Simili quoque modo si multiplicationem primi numeri in quartum, scilicet de .4. in 12, hoc est .48., diuiserimus per secundum numerum, scilicet per .6., egreditur .8. pro tertio numero; que etiam .48. diuisa per tertium numerum, scilicet per .8., egreditur numerus secundus. HIS itaque memorie commendatis, dicendum est: cum in circulo due recte se inuicem secant, erit multiplicatio unius portionis unius linee in alteram sui partem equalis multiplicationi unius portionis alterius linee in suum residuum. Vt si in circulo .abgd. due recte .ag. et .bd. se inuicem secauerint super punctum .e.; multiplicatio quidem .ae. in .eg. equatur multiplicationi .be. in .ed. in Euclide ostenditur. Nunc uero ad radices numerorum inueniendas ueniamus.

exhibunt .36. per .a., et s
(fol. 11 recto, lin. 19-22; pag.
18, lin. 15-19).

$$\frac{a}{b} = \frac{g}{d}$$

egreditur numerus *Distinctio secunda.* s (fol. 11 recto, lin. 30-35; pag. 18, lin. 28-35).



fol. 11 verso.

Distinctio secunda.

Incipit capitulum de inuentione radicum.

Cum autem per geometricales regulas campos mensurare uolumus, oportet nos in quibusdam dimensionibus radices quinque numerorum inuenire. Quare qualiter radices numerorum inueniatur, secundum quod in hoc opere sufficere uideatur, presentialiter demonstrare curauimus. Est enim radix numeri latus alicuius quadrature; quia cum multiplicatur latus in se ipsum, perficitur embadum illius quadrature: quare summa multiplicationis lateris recte dicitur quadratus; cum in se quadratam contineat superficiem. Et est notandum, quia una figura est radix numerorum unius figure, et duarum; due

figure sunt radix trium figurarum, et quatuor; tres figure sunt radix quinque figurarum, et sex; quatuor figure sunt radix septem figurarum, et octo, et sic deinceps. Radices autem quadratorum numerorum unius figure, et duarum oportet scire cordatenus, ut possimus cum ipsis in inuentione radicum plurium figurarum subtilius procedere. Est enim unum radix de .1; quia semel vnum, vnum facit; et 2 sunt radix de .4., et 3 de 9, et 4 de 16., et 5 de 25., et 6 de 36, et .7 de 49, et 8 de 64, et 9 de 81., et 10 de .100. Reliqui uero, qui sunt infra hos quadratos numeros, non habent radicem. Sed possumus radici ipsorum cum minutis quantum necesse est per plures modos subtiliter appropinquare; quod in suo demonstrabitur loco. Cvm autem uolueris inuenire radicem integram alicuius numeri trium figurarum, inuenias primum radicem ultimę figure; et pones eam sub secundo gradu; cum scias duas figuras esse necessarias in radice trium figurarum; et sic erit una sub secunda, et alia cadet sub prima: et quod superauerit ex ipsa tertia figura, pones super ipsam tertiam figuram; et copulabis ipsum superfluum cum secunda figura; et pones aliam figuram sub prima, scilicet ante figuram, que est posita sub secunda; que multiplicata per duplum positę figure in radice, faciat ita prope dictę copulationis, ut de superfluo quod inde superfuerit copulato cum prima figura possis extrahere multiplicationem ipsius figure in se ipsam; et non remaneat inde ultra duplum radice inuentę: et si de ultima figura nihil remanserit, intelliges euenire de secunda figura hoc quod diximus de copulatione superflui tertię figure cum secunda. Verbi gratia: uolumus reperire radicem de .153., inuenies radicem de .1., quod est in tertio gradu, que est .1.; quod .1. pone sub .3., et ante ipsum .1. pone .2 sub .3.; quia multiplicato .2. in duplo radice inuentę, scilicet in .2., faciunt .4.; quibus extractis de .5., remanet .1. super ipsum .5.; quo .1. copulato cum .3. primi gradus, facit 13.; de quo possumus extrahere multiplicationem de .2. in se ipsum, et remanet inde .9., que sunt minus duplo radice inuentę, scilicet de .24.: ergo integra radix de .153. est .12, et remanent .9. Item si uis inuenire radicem de .864., pone .2 sub .6., cum .2 sint integra radix de .8.; et 4 que remanent | pone super .8.: deinde dupla ipsa .2, erunt .4., que pone sub .2.; et per ipsa .4 diuide .46., scilicet copulationem superflui tertię figure cum secunda, exhibunt .11.: ex qua diuisione possumus habere arbitrium sequentis ponende figure, que multiplicanda est per duplum prime figure positę; et postea per se ipsam, erit ipsa figura aut parum minus, aut totidem quantum ex ipsa diuisione euenit; quod cognosces ex usu. Quare ponemus arbitrio .9. sub prima figura, que sunt minus de .11. predictis; et multiplicabis .9. per .4., scilicet per duplum inuenti binarij, et extrahes de 46. predictis, et ex remanentibus .10. pones 0. super .6., et .1. super .4.; et copulabis ipsa 10. cum .4. primi gradus, erunt .104.; de quibus extracta multiplicatione nouenarij in se ipso, remanent .23.; que .23. sunt minus dupla radice inuentę.

Rursus si radicem de .960 inuenire uolueris, pone radicem de .9., scilicet .3 sub .6.; et duplica ipsa .3., erunt .6., que pones sub ipso .3.; per que .6. oportet quamdam figuram multiplicare, que ponenda est ante .3.; et ipsam multiplicationem de .6. superiore extrahere, et remaneat inde figura; que cum fuerit copulata cum .0.; et possis extrahere multiplicationem ipsius figure in se ipsam, et non remaneat ultra duplum radice inuentę; eritque illa figura .0.: quod .0. cum multiplicatum fuerit per .6., que fuerunt duplum de .3.; et ipsa multiplicatio extracta fuerit de .6., remanebunt eadem

* remaneat inde cum .3. (fol. 11 verso, lin. 25 e 26-31; pag. 19, lin. 18-24).

				(9)
			1	
	1	5	3	
		1	2	
			2	

fol. 12 recto.

* pone super .8. de 46. predictis (fol. 12 recto, lin. 1-7; pag. 19, lin. 27-34).

				(23)
			1	
	4	0		
	8	6	4	
		2	0	
			4	

* extrahere, et 60., que (fol. 12 recto, lin. 13 e 14-19; pag. 19, lin. 40— pag. 20, lin. 2).

				(60)	
			9	6	0
			3	0	
			6		

* secundum hoc sunt figure * (fol. 12 recto, lin. 23-25; pag. 20, lin. 5-11).

					(9)
		3			
	1	2	3	4	
			3	5	
				6	

fol. 11 verso.

* habes 35 sunt ante * (fol. 12 verso, lin. 4-9; pag. 20, lin. 21-26).

					(58)
		1	2	1	2
		6	1	4	2
				7	8
				1	4

* .78. pro radice cum deficiat * (fol. 12 verso, lin. 20-25 e 26; pag. 20, lin. 37-42).

					(72)
		81	71		
			90		
				18	

6.; que cum copulata fuerint cum .0., quod est in primo gradu, faciunt .60.; de quibus .60. cum extracta fuerit multiplicatio de .0. in se ipso, remanebunt .60., que sunt duplum de 30, scilicet de radice inuenta. Si autem uolueris scire radicem numeri quatuor figurarum, inuenias primum radicem duarum figurarum ultimarum; et superfluum copulabis cum remanentibus duabus figuris, et operabis secundum hoc quod diximus in tribus figuris: ad cuius rei euidenciam sint .1234.; quibus uolumus radicem inuenire: pone sub .3. radicem ultimarum figurarum, scilicet de .12.; que radix est .3., et remanentia .3. pones super .2. de .12.; et copulabis ipsa .3. cum sequentibus figuris, erunt .334.; et duplicabis radicem inuentam, erunt .6.; que pones sub .3.; scilicet sub radice inuenta: et considera, quot sunt multiplicationes, que multiplicande sunt secundum hoc quod dictum est superius; et quot sunt figure in numero, de quo debemus extrahere ipsas multiplicationes: sunt enim multiplicationes due, quarum una est multiplicatio ponende figure per duplum radice inuenta, scilicet per .6.; alia multiplicatio est ipsius ponende figure in se ipsam: has quidem duas multiplicationes debemus extrahere de .334., et finire ultimam multiplicationem sub figura primi gradus. Ideo primam multiplicationem oportet extrahere de copulatione duarum figurarum ultimarum, scilicet de .33.; et ex copulatione superflui, et quaternarij, qui est in primo gradu, extrahes aliam. Quare pones .5. sub primo gradu; quia diuisis .33 per .6, reddunt .5.; et multiplicetur .5 per .6., et extrahatur ipsa multiplicatio, scilicet 30 de 33, et remanebunt .3. in secundo gradu: que .3. copula cum .4. primi gradus, faciunt .34.; de quibus extrahe multiplicationem de .5. in se ipsum, remanent 9.; et sic habes 35 pro radice de 1234, et remanent .9. Rursus si uolueris inuenire radicem de .6142. Inuenias radicem de .61., quem (sic) est .7., et remanent .12: pone .7. sub .4., et 12 pone super .61.; et duplicabis .7. inuenta, erunt .14.; pones .4. sub .7., et 1 post ipsum septenarium; et intelligas copulationem remanentium .12. cum .42.; que copulatio facit .1242., in quo numero sunt .4. figure, ex quibus sunt extrahende tres multiplicationes. Quarum prima est ponende figure per positum vnum, et alia per .4., que sunt ante ipsum .4., et alia per se ipsam: quas tres multiplicationes debemus gradatim extrahere de .4. dictis figuris, ita ut ultima multiplicatio cadat in primo gradu. Et quoniam numerus figurarum excedit numerum multiplicationum in una figura, pro ipsa una figura oportet copulare ultimam figuram de 1242. cum sequente, erunt .12.; de quo .12. extrahe primam multiplicationem; et deinceps cadet secunda multiplicatio sub secundo gradu, et ultima sub primo: quare pones .8. ante posita .7.; et multiplicabis .8. per .4. predictum, et extrahes de .12., remanebunt tibi .4.: que copulabis cum sequentibus .4., que sunt in secundo gradu, erunt .44.; de quibus extrahe multiplicationem de .8. in .4.; que .4. sunt sub .7., remanent .12., que pone super .44.; et copulabis ipsa cum .2. primi gradus, erunt .122.: de quibus extrahes 64., scilicet multiplicationem de .8. in se, remanent .58.; et sic habes .78. pro radice de .6142., et remanent .58. Verum si radicem de .8172. reperire uolueris, radicem de 81., scilicet .9., pone sub .7.; et de duplo ipsius .9 pone .8 sub .9., et .4. post ipsum uersus sinistram; in quibus .4. et 8 oportet multiplicare ponendam figuram singulariter, et de incept ipsam figuram in se ipsam; et sic sunt tres multiplicationes, que sunt extrahende gradatim de 72., que remanent de .81. post inuentionem radice de 81.: unde euidenter cognoscimus, nullam post se cadere preter .0., cum deficiat gradus, unde possit extrahi prima multiplicatio; quia si prima multiplicatio extrahatur de .7., oportet secun-

dam extrahere de .2.; et sic non habemus unde extraheremus tertiam multiplicationem. Vel aliter, quoniam primus gradus quemcumque gradum multiplicat, ipsum gradum surgit ex multiplicatione; quare ponenda figura, que cadit in primo gradu multiplicata in tertio gradu, scilicet in .1., facit tertium gradum; qui gradus minime est in .72.: ergo radix de .8^m., et 172 est 90, et remanent .72. Et si uolueris radicem alicui numero quinque figurarum inuenire, inuenies per premissam doctrinam radicem tribus ultimis figuris: et si inde aliquid superfuerit, pones illum superfluum super ipsum gradum; uel gradus de quo, uel de quibus superfuerit; et copulabis ipsum superfluum cum duabus reliquis figuris; et pones duplum inuentę radicis sub ipsa radice; similem gradum sub simili gradu; et per premissam notitiam studebis ponere aliam figuram sub primo gradu; quia prima figura in radice quinque figurarum cadit sub tertio gradu, cum tres figure sint radix numerorum quinque figurarum. Verbi gratia: uolumus inuenire radicem de 12345. Inuenias quidem primum radicem de 123., que est .11, et remanent .2; et cum inueneris ipsa .11., pones primam .1. de .11. sub .3., et aliam sub .4.; et duplicabis ipsum .11., erunt .22, que pone sub .11.; et .2. que remanserunt pone super .3.; et copulabis ipsum .2 cum sequentibus figuris, erunt .245., in quo numero sunt tres figure; et multiplicationes quidem fiende erunt similiter tres. Quare de singula figura exit singula multiplicatio. Vnde oportet ponere talem figuram ante posita .11.; que cum multiplicata fuerit per primum binarium, postea per secundum, postea per se ipsam, possit prima multiplicatio exire de .2., que remanserunt super .3.; et alia de .4.; et alia de .5., que sunt in primo gradu; eritque illa figura .1.: multiplicato quidem .1. per primum binarium extracta; et extracta ipsa multiplicatione de duobus, que sunt super .3., remanet nihil. Item multiplicato ipso .1. per sequentem binarium, et extracto de .4., remanent .2. super .4.; quibus .2. copulatis cum .5. primi gradus, faciunt .25.; de quibus extracto .1., quod surgit ex multiplicatione de .1. in se ipso, remanent .24.; et sic habes .111. pro radice de 12345., et remanent .24. Quod si rectum est, ita per qualem uis probam cognoscitur: probam de .111. in se ipsam multiplica, et ex ipsa multiplicatione probam accipe; et super acceptam probam adde probam de .24.; et si ex hoc habueris, scilicet probam de 12345., rectum est quod fecimus. Verbi gratia: proba de 111. per .7 est .6; quia diuisis .111. per 7, remanent .6; quibus in se multiplicatis, faciunt .36.; quibus per .7. diuisis, remanent .1.; quo addito cum proba de .24., que est .3, faciunt .4., scilicet probam de 12345.; quia diuisis .12345 per .7., remanent .4.; et hoc uolumus: et secundum hunc modum probabis semper in inuentione radicem. Rursus si uis inuenire radicem de 98765., inuenies radicem de .987., que est .31., et remanent .26.: pone .3. sub .7., et .1. sub .6., remanentem .26. pone super 87., scilicet 2. super .8, et 6 super .7.; et copulabis .26. cum alijs duabus figuris, erunt .2665.; et duplicabis 31, et habebis .6. sub .3., et 2 sub .1.: et quia quatuor restant figure in numero, quas gradatim debemus delere per tres multiplicationes, que fieri debent cum figura ponenda ante .31.; quarum una erit per .6., et alia per 2, et alia per se ipsam; oportet itaque, ut primam multiplicationem accipiamus de .26.: quare diuides .26. per 6., que sunt duplum de 3 inuentis in radice; et positis sub .3., exhibunt .4.; et ideo ponenda sunt .4. ante .31.: ponemus ergo .4. ante .31., cum fieri possit; et multiplicabis ipsa .4 per .6., et extrahes de .26., et remanentia .2. pone super .6; et copulabis ipsa cum .6., que sunt in secundo gradu, faciunt 26.: de quo numero extrahes multiplicationem de .4. in .2.,

fol. 13 recto.

* copulabis ipsum . . . per sequentem * (fol. 13 recto, lin. 6 e 7-13; pag. 21, lin. 15-23).

						(24)
						2
1	2	3	4	5		
						1 1 1
						2 2

* remanentem .26. . . . remanentia .2. pone * (fol. 13 recto, lin. 24 e 25-32 e 33; pag. 21, lin. 34-42).

						(169)
						1
						2
						2 6 8
9	8	7	6	5		
						3 1 4
						6 2

fol. 13 verso.

* superfaerit, copulabis35.
Quo * (fol. 13 verso, lin. 4-11;
pag. 22, lin. 5-13).

							255
						2	
						9	
					1	2	3
					4	5	6
					3	5	1
					7	0	

* Inuenies primum cognosci-
mus ponendam * (fol. 13 ver-
so, lin. 17-23 ; pag. 22, lin.
17-24).

								1605
							1	6
							4	8
							7	5
						9	8	7
						6	5	4
						9	9	3
						1	9	8

fol. 14 recto.

* et sequentem tres figuras *
(fol. 14 recto, lin. 1-5 ; pag.
22, lin. 36-40).

								4379
							1	6
							9	8
						7	6	5
						4	3	
						3	1	4
						2		

que posita sunt sub .1., remanent .18., uidelicet .1. super .2, et .8 super .6.: et copulabis ipsa .18 cum .5 primi gradus, erunt .185.; de quibus | extrahes multiplicationem de .4. in se ipsis, remanent .169.; et sic habes .314 pro radice de 98765, et remanent 169. Et si uolueris inuenire radicem alicui numero sex figurarum. Inuenias primum radicem quatuor ultimis figuris; et residuum quod superfuerit, copulabis cum sequentibus duabus figuris; et deinceps operabis ut supra. Verbi gratia: uolumus reperire radicem de 123456. Inuenies primum radicem de .1234, que est 35, et remanent .9.; et pone .35 sub .45.; et .9. que remanent pone sub .4.; et copulabis ipsa .9. cum .56., faciunt .956.; et duplicabis inuentum .35., erunt .70.; de quibus pone .0. sub .5., et 7 sub .3.; et quoniam figure sunt tres que restant; et multiplicationes sunt tres, quarum prima debet fieri per .7., secunda pro zefiro, tertia exponenda figura in se; tunc scimus, quia prima multiplicatio debet exire de .9.: quare diuide .9. per .7., exhibit unum pro ponenda figura ante .35. Quo uno multiplicato per .7., et extracta ipsa multiplicatione de .9., remanent .2. super .9.; quibus copulatis cum .5., et inde extracta secunda multiplicatione, scilicet de .1. in zefiro, remanent 25: quibus copulatis cum sequente figura, faciunt .256.: ex quibus extracta multiplicatione de .1. in se ipso, remanent .255.; et sic habemus .351. pro radice de .123456., et remanent .255. Rursus si uolueris inuenire radicem de 987654 Inuenies primum radicem de .9876., que est .99., et remanent .75.: pone .99. sub 65., et 75 super .76.; et duplicabis radicem inuentam, erunt .198.: de quo numero pones 8 sub .9., que sunt in secundo gradu, et 9 sub 9, que sunt in tertio gradu; et .1. pones post ipsa; et copulabis 75 cum 54., erunt .7554., in quo numero sunt quatuor figure, quas debemus delere gradatim per quatuor multiplicationes, quas facere debemus cum ponenda figura, scilicet per tres figuras de .198., et per se ipsam: quare primam multiplicationem oportet extrahere de .7. tantum: et si cognoscimus ponendam figuram esse .3. ante .99.; quo .3. multiplicato per .1. de .198., et extracta ipsa multiplicatione de .7., remanent .4. super ipsis .7.: quibus copulatis cum .5. tertij gradus, faciunt .45.: de quo extracta multiplicatione de .3. in .9. de .198., remanent .18. super quartum et tertium gradum: quo 18 copulato cum .5., qui est in secundo gradu, faciunt .185.; de quibus extracta multiplicatione de .3. in .8. de 198, remanent .161. super quartum, et tertium, et secundum gradum: quibus 161. copulatis cum .4. primi gradus, faciunt 1614.: de quibus extracta multiplicatione de .3. in se, remanent .1603.; et in radice habemus .993. Item si uolueris inuenire radicem alicuius numeri septem figurarum. Inuenias primum radicem quinque figuris ultimis; et residuum, si fuerit, copulabis cum reliquis duabus figuris; et operaberis ut supra. Verbi gratia: uolumus inuenire radicem de .9876543.; et quoniam radix septem figurarum sunt quatuor figure, oportet ponere primam figuram radice sub quarto gradu, | et sequentem figuram sub tertio, aliam sub secundo: quas tres figuras inuenies inueniendo radicem quinque figurarum ultimarum, scilicet de 98765.; quorum radix est .314., et remanent .169. super quintum, et quartum, et tertium gradum: quibus 169. copulatis cum duabus reliquis figuris, scilicet cum .43, faciunt .16943.: deinde duplica inuenta .314., et habebis .8. sub .4., et 2 sub .1., et 6 sub .3.: per quas tres figuras multiplicanda est gradatim ponenda figura, et deinceps in se ipsam; et sic erunt quatuor multiplicationes, quas debemus extrahere gradatim de quinque figuris predictis, scilicet de 16943: quare prima multiplicatio extrahenda est de duabus ultimis figuris, scilicet

de .16.; quare diuides .16. per .6., qui primus multiplicandus est, exhibunt .2.: quare pones .2. in primo gradu radicis; et multiplica ea per .6. de 628., erunt .12.; que extrahes de .16., remanent .4. super .6.; que copulabis cum .9, faciunt, .49: de quibus extrahes multiplicationem de .2. in .2, remanent .45 super 49; que copulabis cum .4. secundi gradus, faciunt .454.; de quibus extrahes multiplicationem de .2. in .8., remanent .438., scilicet .4 super quartum gradum, et 3 super tertium, et 8 super secundum: et copulabis .438. cum .3 primi gradus, faciunt 4383; de quibus extrahes multiplicationem de 2 in se ipsis, remanent .4379., que sunt minus duplo radicis inuentę; et radix est .3142. Similiter si uis inuenire radicem octo figurarum, inuenies radicem sex figuris ultimis; et copulabis residuum cum reliquis duabus figuris, ut dictum est. Et sic cum his que dicta sunt possunt radices in infinitum quorumlibet numerorum inueniri. Nam si scire desideras quot figure erunt in radice alicuius numeri multarum figurarum, considera si numerus figurarum ipsius numeri fuerit par, uel impar. Si fuerit par, dimidia ipsum numerum; et quot unitates sunt in medietate, tot figure erunt in radice ipsius. Si uero fuerit impar, adde numero ipsorum unum, ut efficiatur numerus figurarum par. Et tunc quot unitates erunt in medietate numeri ipsarum, tot figure similiter erunt in radice. Et tunc incipies ponere primam figuram sub ipso gradu sub quo ceciderit. Nam si fractiones, que cadunt de superfluo inuentarum integrarum radicum, prope ueritatem nosse desideras, considera utrum numerus ille, cui radicem inuenieris, fuerit perticarum secundum geometriam, aut graduum secundum astronomiam.

Quia in radicibus perticarum fractiones in pedibus, deinde in unceis, et in partes unciarum reducere necesse est. In radicibus quoque graduum fractiones in minutis, et in secundis, et in partibus secundorum reducende sunt. Est enim pertica, ut diximus, pedes .6.; et pes est uncie .18.; et uncia est $\frac{1}{18}$ pedis; et pes est sexta perticę; pertica tota est uncie .108. Item gradus diuiditur in minutis .60., et minutum in secunda 60., et secundum similiter in tertia .60.; quare totus gradus est secunda .3600., et tertia 216000.: quibus ad memoriam reductis, cum uolueris radicem alicui numero perticarum inuenire, multiplica ipsas perticas per multiplicationem de 108. vicibus 108., hoc est per .11664.; et sume (*sic*) multiplicationis radicem inuenias; et habebis numerum unciarum, que sunt in radice quesita: quibus unceis diuisis per .18., reddunt pedes, qui sunt in illa radice. Quibus pedibus in .6. diuisis, reddunt perticas. Verbi gratia: uolumus inuenire radicem de perticis 67., multiplica 67 per 11664., erunt 781488.; quibus inuenias radicem, que est .884., et remanent .32.: que 32 diuide per duplum de .884.; uel dimidium de 32, scilicet .16, diuide per 884., exhibit fere $\frac{1}{55}$: ergo radix de perticis 67. sunt uncie 884, et $\frac{1}{55}$; quibus unceis diuisis per .18. reddunt pedes 49, et remanent uncie 2, et $\frac{4}{55}$: quibus pedibus .49. diuisis per 6 reddunt perticas 8, et remanent pes (*sic*) .1.: ergo radix de perticis .67 est pertice .8., et pes .1., et uncie 2, et $\frac{4}{55}$; et sic studeas facere in omnibus similibus. Et si uolueris radicem numero graduum inuenire. Multiplica secunda unius gradus, scilicet 3600. in se ipsis, erunt .12960000; per quem numerum multiplica gradus, quibus radicem inuenire desideras; et summe multiplicationis radicem inuenias; et superfluum diuide per duplum radicis inuentę, et habebis secunda, que fuerint in radice quesita: quibus secundis diuisis in .60. reddent minuta: quibus minutis diuisis in .60., reddent gradus; et sic habebis gradus, et minuta, et secunda, et partes unius secundi, que fuerint

in radice quorumlibet graduum. Et si primum perticas, deinde pedes, post hoc uncias, ad extremum partes uncie, que sunt in radice quarumlibet perticarum, gradatim inuenire desideras. Inuenias primum radicem perticarum, ut dictum est: deinde de perticis que remanserint, fac dimidios soldos, scilicet pedes; et diuide eos per duplum perticarum inuentarum in radice, et habebis pedes; et ex hoc quod remanserit, fac denarios; ex quibus extrahe multiplicationem peduum inuentorum in se ipsos; residuumque triplicabis, scilicet facies inde uncias; quas diuides iterum per duplum perticarum, et pedum inuentorum in radice, et habebis perticas, et pedes, et uncias, et partes uncie, que sunt in radice quarumlibet perticarum. Verbi gratia. Volumus iterum radicem de perticis 67. inuenire; primum quidem radix de perticis .67. sunt pertice .8. in integrum, et remanent pertice .3., que sunt medij soldi, uel pedes .18.: quibus diuisis per duplum de .8., scilicet per 16, egreditur pes .1., et remanent pedes .2., qui sunt denarij .12.: ex quibus extrahe multiplicationem unius pedis in se ipso, scilicet denarium unum; quia cum pes multiplicatur in pedem, facit denarium, ut dictum est, remanent denarij .11.: quibus multiplicatis per .3. faciunt uncias .33.; quibus diuisis per duplum de perticis .8., et pedem .1., scilicet scilicet (*sic*) per $\frac{1}{8}$ 16, ueniunt uncie 2, et remanet $\frac{1}{8}$ unius uncie; de qua $\frac{1}{8}$ si extraxerimus multiplicationem inuentarum duarum unciarum in se ipsis, remanebit ex ipsa tertia uncie, quasi $\frac{1}{8}$ unius uncie; cum diuiserimus ipsum superfluum per duplum radicis inuentę. Rursus | si uolueris inuenire per hunc modum radicem de perticis .111., accipe radicem integram ipsarum, scilicet .10.; et duplica, erunt .20.; per quem diuide pedes perticarum .11. superfluarum, scilicet 66., exhibunt pedes .3., et remanent pedes .6., scilicet denarij .36.: ex quibus extractis denarijs .9., qui procreantur ex multiplicatione peduum .3. in se, remanent denarij .27.; quibus triplicatis faciunt uncias 81.; quibus diuisis per duplum radicis inuentę, scilicet per .21., exhibunt uncie $\frac{6}{7}$ 3, et non remanet inde aliquid, unde possis extrahere multiplicationem unciarum inuentarum in se ipsis: quare pone aliquantulum minus de $\frac{6}{7}$ unius uncie; et sic habebis perticas .10., et pedes .3., et uncias $\frac{6}{7}$ 3. pro radice de perticis .111. Et nota ea que superius diximus de multiplicatione perticarum, et pedum, et unciarum in perticas, et pedes, et uncias; et cognosces unde procedunt ea que facimus in inuentione peduum, et unciarum in radicibus.

fol. 15 recto.

Item si uis inuenire radicem de perticis 1234. Integra quidem radix ipsarum est pertice 35., et remanent pertice .9; que pertice 9. sunt pedes .54.: per quos pedes .54., cum sit minus duplo radicis inuentę, scilicet de .70., cognoscimus in hac radice nequaquam cadere pedes: quare de pedibus 54 facies uncias, erunt uncie .972.; quas diuide per .70., exhibunt uncie .13, et $\frac{2}{7}$; et non remanet inde unde extrahas multiplicationem de unceis $\frac{7}{8}$ 13. in se ipsis: quare per $\frac{7}{8}$ pone minus, scilicet $\frac{6}{7}$, uel $\frac{5}{6}$, uel $\frac{4}{5}$, uel $\frac{3}{4}$ ad libitum; quia ita faciendo, parum poteris deuiare; et sic, secundum hunc modum, potes cuiuslibet numero perticarum, uel perticarum et peduum; etiam et perticarum, et peduum, et unciarum radicem subtiliter inuenire.

De fractionibus quidem graduum in minuta et secunda inueniendis in libro nostro abaci satis aperte monstrauiimus; vere quidem radices numerorum, qui non sunt quadrati, in lineis haberi possunt, in numeris uero minime. Est enim modus reperiendi radices in lineis, ut protrahas lineam illius quantitatis, uel numeri, cuius radicem ha-


here desideras, eique lineam unius unitatis super addas, et in medio illius lineę centrum figas, in spatio dimidię lineę circulum ducas; et a puncto, quod est inter unitatem et lineam, ad rectos angulos lineam usque ad circulum protrahe; et illa linea erit uera radix quesiti numeri. Exempli causa: uolumus radicem .67. inuenire. Adiaceat quedam recta .ab., que sit 67.; cui addatur in directo unitas .ag., erit tota .gb. 68: diuidaturque .gb. in duo equalia super punctum .d.; et spatio .dg. uel .db. circulus circinetur .gebz. Et protrahatur ad rectos angulos linea .ae.; dico quod linea .ae. uera radix est lineę .ab., scilicet de 67.

Protrahatur quidem recta .ea. in directo ad punctum .z.; et quoniam recta .ba. stat super rectam .ez., facit duos angulos, aut rectos, aut duobus rectis equales. Rectus quidem qui sub .bae., rectus quoque, qui sub .baz. Et quoniam recta .ag. per centrum ducta secat quamdam rectam .ez. ad rectos angulos, ipsam rectam per equalia secare necesse est. Equalis ergo recte .ea. recta .az. Rursus quoniam in circulo .gebz. due recte, que sunt .bg. et .ez. se inuicem secant supra punctum .a., erit multiplicatio .ba. in .ag., sicut | multiplicatio .ea. in .az. Sed multiplicatio .ae. in .az. est sicut multiplicatio .ea. in se ipsam. Quare multiplicatio .ba. in .ag. est sicut multiplicatio .ae. in se. Multiplicatio quidem .ba. in .ag., scilicet de .67. in .1., facit 67. Et multiplicatio uero ex .ae. in se facit similiter .67.; et hoc uolumus.

De multiplicatione radicum.

Nunc autem ostendamus, qualiter radices numerorum per radices multiplicentur. Et qualiter insimul addantur. Et quomodo minores de maioribus extrahantur. Etiam et quo ordine inter se diuidantur. Cum autem uolueris multiplicare radicem de 16 per radicem de 25, cum 16 et 25 sint quadrati numeri. Accipe radices eorum, que sunt 4 et 5; et multiplica eas insimul, egredientur .20. pro quesita multiplicatione. Si uero radicem de 16 per radicem de 30. multiplicare uis; cum radix de 30 sit surda, multiplicabis .16 per 30, erunt .480.; quibus inuenies radicem quam propius poteris, et habebis summam dicte multiplicationis. Rursus si uolueris multiplicare radicem de 20 per radicem de 30., multiplica 20 per 30, erunt .600.; quibus inuenies radicem, et habebis propositum. Verbi gratia: sit .a. 20., et .b. .30., et g sit radix de .20., et .d. sit radix de .30.; multiplicato quidem .a. in .b. faciat .e., scilicet .600.; et multiplicato .g. in .d. faciat .z. Dico quoniam .z. radix est sexcentorum, scilicet ex .e. Sed primo dicendum est, quod sicut aliquis numerus est ad aliquem numerum, ita est quoduis multiplex unius ad idem multiplex alterius; et que uis pars unius ad eandem partem alterius: quod probabimus in .12 et 24.: in qua enim proportione sunt 12 ad 24., in eadem est duplum de 12 ad duplum de 24., et triplum ad triplum, et deinceps quadruplum, et que secuntur multiplicia. Similiter in qua proportione est 12 ad 24, in eadem proportione est dimidium de 12. ad dimidium de 24., et tertium ad tertium, et deinceps: his itaque demonstratis, reuertamur ad proposita. Quoniam numerus .g. radix est numeri .a., scilicet de 20.; ergo .g., se ipsum multiplicans, .a. facit; et .g. quidem .d. multiplicans, numerum .z. facit. Quam multiplex ergo est a ex .g., tam multiplex est .z. ex .d.: quare sicut .g. est ad .d., ita .a. est ad .z. Rursus quoniam .d. radix est ex .b., scilicet de 30; cum .d. itaque se ipsum multiplicat, .b. facit. Sed .d. multiplicans .g, z facit. Quam multiplex ergo est .z. ex .g., tam multiplex est .b. ex .d. Quare sicut .g. est ad .d., ita .z.

* .bg. et .ez.ag., sicut * (fol. 15 recto, margine interiore esterno; pag. 25, lin. 14 e 15).



fol. 15 verso.

* de 20 per quod sicut * (fol. 15 verso, lin. 12-15; pag. 25, lin. 27-32).

20	600	30
a	e	b
g	z	d

est ad *b.*: fuit itaque sicut *g.* ad *d.*, ita *a.* ad *z.*: per equale uero est sicut *a.* ad *z.*, ita *z.* ad *b.* Quare multiplicatio *a.* in *b.* est sicut multiplicatio *z.* in se. Sed multiplicatio *a.* in *b.* facit *e.*, scilicet 600. Et multiplicatio quidem de *z.* in se facit similiter *e.* Ergo *z.* radix est ex *e.*; quod oportebat ostendere. Et notandum, cum numeri, quorum radices insimul multiplicantur, habent inter se proportionem quadratorum numerorum eorum, multiplicatio surgit in quadratum numerum. Quare multiplicatio radicum ipsorum surgit in numerum rationabilem. Verbi gratia: uolumus multiplicare radicem de 8. per radicem de 18.; quorum proportio est sicut 4. ad 9., scilicet sicut quadratus numerus ad quadratum numerum. Dico quod multiplicatio de 8. in 18. surgit in quadratum numerum, scilicet in 144; quorum radix, que est 12., est summa multiplicationis radice de 8. in radicem de 18. Item si uis multiplicare 10 per radicem de 20., multiplica quadratum de 10., scilicet 100., per 20., erunt 2000.; quorum radix est summa dictę multiplicationis. Et nota quod id quod prouenit ex multiplicatione de 10. in radicem de 20., est equale 10. radicibus de 20. Vnde cum 10. radices de 20. uolumus redigere in radicem unius numeri, tunc multiplicamus quadratum de 10. in 20., et habemus 2000.; quorum radix est id quod aggregatur ex ipsis 10. radicibus: et hoc idem intelligendum est de similibus: vnde si radicem alicuius numeri in plures radices alterius redigere uis, diuide ipsum numerum per aliquem quadratum numerum; et quot unitates fuerint in radice ipsius quadrati numeri, tot radices uenient ex euntis numeri ex diuisione. Verbi gratia: vis reducere radicem de 1200. in plures radices alterius numeri, diuides 1200. per aliquem quadratum numerum, ut dicamus per 16., et uenient 75; et accipe radicem de 16., que est 4.; et tot radices de 75. habebis pro una radice de 1200.: et si diuiserimus 1200. per 25, quorum radix est 5., habebimus 5. radices de 48. pro una radice de 1200. Et sic possumus radicem de 1200. in plures radices diuersorum numerorum reducere.

fol. 16 recto.


De additione radicum.

RADICES quidem numerorum quandoque cum radicibus ita iunguntur, ut suma (*sic*) iunctionis earum surgit in aliquem numerum ratiocinatum, aut in radicem alicuius numeri; et quandoque non possunt coniungi, ut ex eorum coniunctione numerus, aut radix numeri egrediatur.

Cum autem radices quadratorum in unum coniungere uolumus, tunc ex eorum coniunctione numerus procreatur: ut si radicem de 16 cum radice de 25 addere uolumus, coadunabimus 4 et 5, scilicet radices de 16 et de 25, egredientur 9. pro quesita coniunctione.

Quando uero radices numerorum inter se proportionem quadratorum habentium coniungere uolumus, tunc egreditur radix alicuius numeri ratiocinati. Vnde qualiter addantur, dupliciter ostendamus. Volumus addere radicem de 27 cum radice de 48.; inuenias quadratos, qui sunt in eorum proportione; eruntque 9 et 16.; quorum radices addas in unum, erunt 7.; que multiplica in se, erunt 49.; que triplica propter 27 et 48., que sunt triplum de 9 et de 16., erunt 147.; quorum radix est summa predictę iunctionis. Que regula probatur per proportiones similium triangulorum hoc modo: adiaceant in directo rectę *ab.* et *bg.*; quarum *ab.* sit radix de 27., et *bg.* de 48.; et a puncto *a.* angulum faciens protrahatur recta *ad.* *de.*; et *ad* sit 3., et *de.* sit 4.; et copuletur *eg.*

erunt 7. et . . . et .de. sit .
(fol. 16 recto, lin. 27-31; pag.
26, lin. 39-43).




et *db*: est itaque quadratum linee *ab*. triplum quadrati linee *ad*., et quadratum linee *bg*. triplum quadrati linee *de*. Ergo sicut *ab*. recta est ad *ad*., ita recta *bg*. ad *de*. Quare recta *db*. equidistans est linee *eg*. Vnde trigonum *adb*. simile est trigono *age*.; habent angulum *a*. comunem; et angulus *adb*. angulo *age*.; et angulus *adb*. angulo *age*. sunt equales, scilicet exteriores interioribus. Est ergo sicut quadratus linee *ab*. ad quadratum linee *ad*., ita quadratus linee *ag*. ad quadratum linee *ae*. Sed quadratus linee *ab*. quadrati linee *ad* triplus est; quare quadratus linee *ag*. quadrati linee *ae*. est similiter triplus: sed quadratus linee *ae*. est .49; quare quadratus linee *ag*. est triplus, scilicet .147. Ergo ex coniunctione linearum *ab* et *bg*. egreditur radix de 147., ut oportebat ostendere. Et nota, quod omnes radices numerorum proportionales habentium inter se possunt reduci ad radices unius numeri, diuidendo antecedentem numerum per antecedentem quadratum, et consequentem per consequentem. Verbi gratia: si uis reducere radices de 27 et de 48. in radices unius numeri, diuides antecedentem numerum, scilicet 27, per antecedentem quadratum, scilicet per 9; et sequentem .48. per sequentem quadratum, scilicet per .16., et euenient .3. ex unaquaque diuisione. Ergo quot unitates sunt in radice de .9., tot radices de 3 sunt in radice de .27.; et quot unitates sunt in radice de 16., tot radices de .3. sunt in radice de 48.; et sic pro una radice de .27 habentur tres radices de 3; et pro una radice de 48 habentur 4 radices de .3. Vnde si eas aggregare uolumus, habebimus .7 radices de .3. pro earum aggregatione: quas si ad radicem unius numeri reducere uis, multiplica quadratum de .7. per 3; et eius quod prouenerit radicem accipe; et pro earum aggregatione habebis radicem de .147., ut supra. Aliter iungantur primum .27 cum .48., erunt .75.; et multiplicentur 27. per 48., et illius multiplicationis radicem duplica, erunt .72.; que cum .75. adde, et habebis similiter .147. pro quadrato dictę iunctionis.

Que etiam demonstrabimus per exemplum: adiaceat in directo recta *ab*. recte *bg*.; et sit *ab*. radix de .27., et *bg* de .48. Volumus itaque quantitatem scire totius linee *ag*. Quoniam linea *ag*. diuisa est in duo super punctum *b*. , erunt duo quadrati portionum *ab*. et *bg*. cum duplo multiplicationis *ab*. in *bg*. equales quadrato totius linee *ag*. Sed quadrati *ab* et *bg*. sunt .27 et 48, scilicet .75; et multiplicatio linee *ab*. in *bg*. surgit in radicem multiplicationis de .27. in .48., scilicet in .36.; quorum duplum sunt .72.; quibus additis cum .75., reddunt .147. pro quadrato linee *ag*. , ut prediximus. Si autem uolumus addere radicem de .20. cum radice de .30.; quia 20. et 30 inter se proportionem non habent, sicut quadratus numerus ad quadratum numerum; et hoc cognoscitur, quia multiplicatio de 20. in 30. surgit in numerum non habentem radicem. Ideo suma iunctionis earum radicum non surgit in numerum, neque in radicem numeri. Verbi gratia: sit recta *ba*. radix de .20, et recta *ag*. sit radix de 30., erit quadratus linee *ba*. cum quadrato linee *ag*. .50.; et multiplicatio *ba*. in *ag*. surgit in radicem de 600.; quare duplum multiplicationis *ba*. in *ag*. surgit in radicem quadrupli de 600., scilicet in radicem de 2400. : que cum radicem non habeant, scimus quod ex adiunctione predicta non possumus habere | numerum, aut radicem numeri; sed habemus pro earum coniunctione radicem numeri, et radicis, hoc est radicem de 50., et radicis de 2400. Vnde, ut inde habeamus illud quod possumus, inueniatur radix de .2400. quam propius potest, que est 49, minus $\frac{1}{98}$; et addantur 50 supradictis, erunt .90,

fol. 16 verso.


« linee *ab*. diuidendo antecedentem » (fol. 16 verso, lin. 4-8; pag. 27, lin. 7-11).



« portionum *ab*. in *bg*. » (fol. 16 verso, lin. 23 e 24-25; pag. 27, lin. 28-30).



« radicem non *ba*. radix » (fol. 16 verso, lin. 34; pag. 27, lin. 35-36).




fol. 17 recto.

minus $\frac{1}{98}$; quibus inuenies radicem, et habebis propositum: uel inuenias radicem de 20 et de .30. quam propius potes; et adde eas insimul, et habebis similiter propositum.

De extractione radicum.

Si uero radicem quadrati numeri de radice quadrati numeri extrahere uolueris, ut radicem de 16 ex radice de 49., extrahes radicem de .16., scilicet .4., ex radice de .49., scilicet de .7., remanebunt .3. pro residuo dicte extractionis. Et si radicem de .45 ex radice de .125 extrahere uis; quia proportio eorum est proportio quadratorum, scilicet de .9. et de 25., extrahe radicem de 9 ex radice de .25., scilicet .3 de .5, remanent .2.; que multiplica in se, erunt .4.; que multiplica per 5. propter 45 et .125., que sunt quincupla de 9 et de .25., exhibunt 20.; quorum radix est residuum dicte extractionis. Verbi gratia: adiaceat recta .ab., que sit radix de 125.; et a puncto .a. protrahatur recta .ag. faciens angulum .bag.; et sit .ag. .5., scilicet radix de 25.; et auferatur ex .ag. recta .gd., que sit 3, remanebit .da. 2.; et per punctum .d. protrahatur recta .de. equidistans lateri .gb.; et quoniam in trigono .agb. protracta est recta .de. equidistans lateri .bg., erunt latera .ab. et .ag. proportionaliter secta in punctis .de., scilicet quod est sicut .ae. ad .eb., ita .ad. ad .dg. Coniunctim ergo est sicut .ba. ad .be., ita .ga. ad .gd.: et si permutauerimus, erit sicut .ba. ad .ag., ita .be. ad .gd. Quare est sicut quadratum lateris .ba. ad quadratum lateris .ag., ita quadratum linee .be. ad quadratum linee .gd. Sed quadratum lateris .ba. est quincuplum quadrati lateris .ag.; quare et quadratum recte .be. est quincuplum quadrati linee .gd.: est enim .9. quadratum linee .gd.; quare quadratum linee .be. est 45.: ergo linea .be. est radix de 45.; quam uolumus extrahere ex .ab., scilicet ex radice de .125., et inuenire residuum, scilicet lineam .ae.; cuius quadrati proportio est ad quadratum linee .ad., sicut quadratum linee .be. ad quadratum linee .gd. Quare quadratum linee .ae. est quincuplum quadrati linee .ad. Sed quadratum linee .ad. est .4.; ergo quadratum linee .ae., scilicet quesiti residui, est .20.; et sic .ae. inuenta est esse radix de .20., ut supra. Vel si radices de 45 et de 125. reduxerimus in radices de .5., habebimus pro radice de .45. tres radices de .5., et pro radice de 125. habebimus .5. radices de .5.: unde si de 5 radicibus de .5. auferantur .3. radices de .5., remanent 2 radices de .5., que sunt una radix de .20., ut inuentum est. Aliter adde .45 cum .125., erunt .170.; de quibus extrahes duplum radices multiplicationis de .45. in .125., idest 150., remanent .20. pro quadrato quesiti residui. Ad cuius exemplum sit linea .ab. radix de .125.; de qua summatur linea .bg., que sit radix de 45.: dico quod | linea .ga. est radix de 20. Quoniam linea .ab. in duo diuisa est super punctum .g., erunt duo quadrati linearum .ab. et .gb. equales quadrato .ag., et duplo multiplicationis .gb. in .ab.: sunt enim duo quadrati .ab. et .gb. .170.; quibus equantur quadratus linee .ag., et duplum multiplicationis .bg. in .ba. Sed .bg. in .ba. est radix multiplicationis de 45 in 125., scilicet .75.; que .75. duplicata faciunt .150.; que extracta de 170, remanent .20. pro quadrato linee .ag.; quod oportebat ostendere. Et si uis extrahere radicem de 20 ex radice de 30.; quia .20 et 30 non sunt in proportione quadratorum numerorum. Inuenies radicem de .20. et de 30 quam propius potes; et extrahe radicem de 20 de radice de 30.; et sic habebis residuum non ad plenum, sed fere: uel aliter adde .20 cum .30., erunt .50.; et multiplica .20 per 30., erunt .600.; de quibus accipe duas radices, scilicet duplum radices eius, hoc est radicem quadrupli

* 20.; quorum ad .dg. Con-
iunctim * (fol. 17 recto, lin.
13-18 e 19; pag. 28, lin. 10-
16).



* .ab. radix de dico quod *
(fol. 17 recto, lin. ultima; pag.
28, lin. 32-33).

a ——— g ——— b

fol. 17 verso.

* remanent .20. si uis ex-
trahere * (fol. 17 verso, lin.
5, 6 e 7; pag. 28, lin. 38-39).

a ——— g ——— b

de 600., que est fere 49., minus $\frac{1}{98}$; et extrahe eam de 50., remanet $\frac{1}{98}$; cui inuenias radicem, et habebis quesitum residuum, secundum propinquitatem.

De diuisione radicvm.

Si vis diuidere radicem de 600 per radicem de 40., diuide 600. per 40., exhibunt 15.; quorum radix cadit ex diuisione predicta. Verbi gratia: sit .a. 40., et .b. 600., et .g. 15.; et .d. sit radix ex .a., et .e. ex .b.: diuidatur quidem .e. per .d., scilicet radix de 600., per radicem de 40., egrediatur .z. Dico .z. esse radicem ex .g., scilicet de 15.; quoniam diuiso .e. per .d. facit .z.: si .d. multiplicat .z., facit .e. Sed .d. se ipsum multiplicans facit .a. Quam multiplex ergo est .a. ex .d., tam multiplex est .e. ex .z. Quare est sicut .d. ad .z., ita .a. ad .e. Rursus .z. multiplicans .d. facit .e.; et .z. se ipsum multiplicans facit .I. Est ergo sicut .d. ad .z., ita .e. ad .I. Sed sicut .d. ad .z., ita repertum est .a. ad .e. Quare est sicut .a. ad .e., ita .e. ad .I. Sunt ergo .a. e. i. continue proportionales. Quare multiplicatio .a. in .I. est sicut .e. in se. Sed multiplicatio .e. in se facit .b.; ergo .a. in .I. facit similiter .b., scilicet 600. Sed .b. diuiso per .a. uenit .g. Ergo multiplicatio .a. per .g. facit .b.; et .a. multiplicato per .I. facit .b. Quare numerus .I. equalis est numero .g. Sed .z. se ipsum multiplicans .I. facit .b. Quare ex multiplicatione .z. in se egredietur similiter .g.; ergo .z. radix est ex .g., quod oportebat ostendere. Aliter .d. multiplicans .z. facit .e.; et .e. se ipsum multiplicans facit .b.; ergo multiplicatio .d. in .z. multiplicata per .e. facit .b. Item .d. se ipsum multiplicans .a. facit; et .a. multiplicans .g. facit .b.; ergo multiplicatio .d. in se, multiplicata per .g., facit .b. Quare multiplicatio .d. in .z. producta in .e. equa est multiplicationi .d. in se producte in .g.: comuniter relinquatur multiplicatio .d., remanebit multiplicatio .z. in .e. equa multiplicationi .d. in .g. Quare est sicut .d. ad .z., ita .e. ad .g., sed sicut .d. ad .z., ita est .e. ad .I.; ergo .e. ad .g. et ad .I. eandem proportionem habent: quare .g. equalis est .I. Sed .z. radix est ex .I.; quare .z. radix erit ex .g. Et si radicem de 40. per radicem de 600. diuidere uis, diuide 40. per 600., exhibit $\frac{1}{15}$; cui inuenias radicem, et habebis propositum. Sed qualiter radices fractionibus inueniantur, demonstrare procurabimus. Sed primum notandum est, cum inter se diuiduntur radices numerorum quadratorum, uel eorum proportionem habentium, tunc semper egreditur numerus rationalis. Verbi gratia: uolumus diuidere radicem de 64. per radicem de 16.: diuisio 64. per 16., egrediuntur 4.; quorum radix, scilicet 2., egreditur ex dicta diuisione. Nam 8., que sunt radix de 64., diuisio per radicem de 16., scilicet per 4., egrediuntur similiter 2. Et nota, quia illud idem egreditur ex diuisione radicum omnium numerorum habentium eandem proportionem, quam habet 16. ad 64.: ut si radicem de 80. per radicem de 20. diuidere uolumus, egredientur 2. similiter ex dicta diuisione. Si alicui fractioni uel fractionibus radicem inuenire desideras, dupliciter tibi hoc facere demonstrabimus. Primus modus est, ut ipsam partem, uel partes accipias ex aliquo magno numero; et quot habueris, multiplica per ipsum numerum; et sume multiplicationis radicem inuenias; ipsamque per supradictum numerum diuide; et sic habebis propositum. Verbi gratia: uolumus inuenire radicem de $\frac{2}{3}$: accipe $\frac{2}{3}$ ex aliquo magno numero. Sitque numerus ille 60. Nam quanto maiorem numerum acceperis, tanto propius uere radici deuenieris: $\frac{2}{3}$ quidem de 60. sunt 40.; quibus multiplicatis per 60., reddent 2400.; quorum radix, que est 49., minus

* multiplicat .z. in se facit .a. (fol. 17 verso, lin. 17 e 18-22 e 23; pag. 29, lin. 8-14).

40	15	600
<u>a</u>	<u>g</u>	<u>b</u>
<u>d</u>	<u>z</u>	<u>e</u>

fol. 18 recto

$\frac{1}{98}$, diuide per 60, et habebis propositum. Nam si hoc in pedibus, et unceis habere desideras, accipe $\frac{2}{3}$ ex unceis unius perticę, scilicet de .108., exhibunt .72.; quibus multiplicatis per .108., ueniunt 7776; quibus accipias radicem, eritque $\frac{2}{11}$ 88; et tot uncię sunt in radice de $\frac{2}{3}$ unius perticę. Similiter si uis habere in minutis et secundis radicem de $\frac{1}{5}$ unius gradus, accipe $\frac{1}{5}$ ex secundis unius gradus, scilicet ex .3600, erunt 2880; que multiplica per .3600., erunt quarta 10368000.; quorum radix dabit tibi secunda, que sunt in radice de $\frac{1}{5}$.

Aliter uolumus inuenire radicem de $\frac{2}{3}$ unius perticę; quia ex multiplicatione pedis (*sic*) in pede egreditur denarius. Iccirco fac denarios de $\frac{2}{3}$ unius perticę, erunt denari .24.; quibus inuenias radicem, exhibunt pedes .4., et remanent .8.; ex quibus fac octauadecimas unius denarij, erunt .144.; quas diuide per duplum radicis inuentę, scilicet per .8., egredientur uncię .16., et remanent $\frac{16}{18}$; quos multiplica per 18, erunt $\frac{288}{18}$; ex quibus extrahe multiplicationem de unceis .16. in se, scilicet $\frac{256}{18}$, remanebunt $\frac{8}{18}$ unius denarij; quibus diuisis per duplum radicis inuentę, egredietur circa $\frac{2}{11}$ unius uncię. Vel aliter: accipe radicem de denarijs 24., erit pedum (*sic*) .5., et deest tibi denarius .1.; ex quo fac octauadecimas, erunt .18.; quas diuide per duplum radicis inuentę, scilicet per .10., exhibit uncię $\frac{1}{5}$; quibus extractis de pedibus .5., remanent pedes .4., et uncię $\frac{1}{5}$ 16.

Incipit distinctio tertia

in mensuratione omnium camporum.

HANC itaque distinctionem in quinque partes diuidere decreui. In prima quarum mensurabimus triangulos. In secunda quadrilateros. In tertia multilateros, qui ex rectis lineis constant. In quarta circulos, et eorum portiones, et obliquas figuras insuper, et commixtas ex rectis et curuis lineis. In quinta mensurabimus ipsos campos, qui in ascensione montium iacent. |

Incipit pars prima tertię distinctionis de mensuratione triangulorum.


CAMPI qui triangulj uel trilateri sunt, alij orthogonij, scilicet rectianguli; alij oxigonij, scilicet acutianguli; alij quoque ampligonij appellantur: et hec nomina recipiunt ab angulis. Orthogonium quidem trigonum est, quod habet unum ex tribus angulis rectum. Reliqui uero duo anguli uni recto sunt equales. Oxigonium quoque trigonum est, quod omnes tres angulos acutos habet. Ampligonium autem est, quod unum ex tribus angulis habet maiorem recto. Recipiunt quidem trianguli nomina a lateribus, ex quibus quidam ysopleuri, idest equilateri; quidam uero ysocheli, idest equicrurij; et quidam diuersilateri, qui scalem appellantur. Equilateri quidem sunt, quorum omnia tria latera sibi inuicem equantur. Equicrurij autem sunt, qui duo latera sibi inuicem equalia habent. Diuersilateri quippe sunt, qui omnia tria latera habent inequalia. Et notandum, quia in omni triangulo tres catheti, scilicet perpendiculares, exigi possunt. Ex quibus unaqueque cadit a quolibet angulorum super latus subtendens, uel recipiens ipsum angulum.

In orthogonijs autem trigonis una perpendicularium cadit infra trigonum; et est illa que producitur ab angulo recto super latus subtendens ipsum angulum. Reliquę quidem perpendiculares sunt duo latera continentia angulum rectum. In oxigonijs autem trigonis omnes tres perpendiculares cadunt interius. In ampligonijs namque due cadunt exterius, et alia interius. *Colligitur quippe embadum, scilicet area omnium trian-*

*g*ulorum ex multiplicatione dimidij cathetus in totam basem, uel ex multiplicatione medietatis basis in totam perpendicularem; que cum demonstrationibus ostendere procurabo. Si in trigono ab angulo, qui non sit minor alicui reliquorum angulorum, cathetus supra latus subtendens ipsum angulum erigatur, infra trigonum cadet. Si in trigono *abg.* sit angulus *bag.* non minor angulo *abg.* uel *bga.*; dico, si a puncto *a.* super rectam *bg.* cathetus erigatur, infra trigonum *abg.* cadet.


Non enim; sed si possibile est, cadat extra trigonum a latere *b.*; et ducatur itaque *gb.* in directo in infinitum super punctum *e.*; et protrahatur super *ge.* recta cathetus *az.*; eritque trigonum *azb.* orthogonium habens angulum, qui sub *azb.* rectum: et quoniam in trigono *azb.* unum latus eductum est extra trigonum, scilicet *zb.* in *bg.* Exterior quidem angulus, qui sub *abg.* maiorem opposito et interiori, qui sub *azb.*: rectus quidem, qui sub *azb.*; maior ergo recto, qui sub *abg.* Sed qui sub *bag.* non minor est eo, qui sub *abg.*; maior enim recto, qui sub *abg.* Similiter et qui sub *bag.* maior est recto. In trigono quidem *abg.* sunt duo anguli duobus rectis maiores; quod est impossibile. Cum omnes tres anguli cuiuslibet trigoni duobus rectis sint equales, ut ait euclides 32.^a primi: non ergo cathetus ab *a.* super latus *bg.* ducta extra trigonum cadet ex parte *b.* Similiter ostendetur, neque extra ex parte *g.* intus enim cadet; quod oportebat ostendere. Ex hoc enim comprehenditur, quod in oxigonio trigono ab angulo minore existente in ipso, et in ortogonio ab angulo recto, et in ampligonio ab angulo obtuso; si cathetus supra latera subtendentia ipsos angulos erigatur, infra ipsa trigona cadet. Demonstramus itaque, qualiter in orthogonio trigono latera continentia angulum rectum sit cathetus in ipso. Adiaceat quidem trigonum orthogonium *bgd.* rectum habens angulum, qui sub *bgd.* Dico, rectam *bg.* perpendicularem esse super *gd.* rectam, et *dg.* super *bg.*: protrahatur recta *gd.* in directo ad punctum *a.*; et quoniam super rectam *ad.* stat recta *bg.*, facit circa se duos angulos, aut rectos, aut duobus rectis equales. Rectus quidem, qui sub *bgd.* rectus manet, qui sub *bga.* Quare *bg.* cathetus est super *ad.* Similiter si protrahatur recta *bg.*, ostendetur, rectam *dg.* esse cathetum super *bg.* Dico iterum: a puncto *b.* alia cathetus cadere non posse super rectam *ad.* preter cathetum *bg.* Sed si possibile est; esto *ba.* cathetus super *ad.*, erit tunc in trigono *bag.* duo anguli recti; quod est inconueniens. Similiter si fecerimus eam cadere inter *gd.* super punctum *e.*, erit in triangulo *abe.* duo anguli recti, qui sub *bge.*, et qui sub *geb.*; quod est impossibile: non enim super rectam *ad.* cathetus cadit preter *bg.* Similiter ostendetur, nec a puncto *d.* super *bg.* cathetum cadere posse preter *dg.*; quod oportebat ostendere. Si in oxogonio trigono ab angulo minore existente in ipso super latus subtendens ipsum angulum cathetus trahatur, infra trigonum cadet. Exempli causa: sit oxogonium trigonum *abg.* minorem habens angulum, qui sub *bag.* Dico; si ab *a.* erigatur cathetus super rectam *bg.*, infra trigonum cadet. Non enim; sed si possibile est cadat exterius super *d.* punctum. Et quoniam recta *ad.* cathetus est super rectam *dbg.*, rectus est angulus, qui sub *adb.* Sed angulus qui sub *abg.*, qui est extra trigonum *adb.*, maior est interiori sibi opposito, qui sub *adb.* Sed qui sub *adb.* est rectus; quare angulus, qui sub *abg.* maior est recto; quod est inconueniens, cum acutiangulum sit trigonum *abg.*: non enim cadit cathetus ab *a.* extra trigonum *abg.*: intus enim cadit; quod oportebat ostendere.

gb. in directo ... *bag.* maior » (fol. 18 verso, lin. 23-31 e 32; pag. 31, lin. 8-14).




fol. 19 recto.


« ostendit re. Ex hoc ... rectos, aut » (fol. 19 recto, lin. 1-8; pag. 31, lin. 18-26).



« angulum cathetus ... trigonum *adb.* (fol. 19 recto, lin. 19-23; pag. 31, lin. 35-40).




^a Dico, si ab cathetum posse ^a
(fol. 19 recto, lin. 30-35; pag.
32, lin. 8-9).




fol. 19 verso.

^e infra trigonum ergo semi-
circulus ^a (fol. 19 verso, lin.
1-12 e 13; pag. 32, lin. 9-20).



^e puncto .g. triangulo .agb. ^a
(fol. 19 verso, lin. 20 e 21-
28; pag. 32, lin. 29-37).



fol. 20 recto.

In ampligonio trigono si ab angulo acuto cathetus trahatur super latus subtendens ipsum angulum, extra trigonum cadet. Sit trigonum ampligonium .bdg., amplum habens angulum, qui sub .bdg. Dico, si ab angulo .dbg. cathetus ducatur super .gd. rectam, extra trigonum .bdg. cadet. Non enim; sed si possibile est, cadat inter .dg. ad punctum .a. Et quoniam .ba. cathetus est super rectam .gd.; angulus quidem, qui sub .bad., rectus est. Est enim maior recto, qui sub .bda. Quare in trigono .bda. sunt duo anguli duobus rectis maiores; quod est impossibile. Non enim a puncto .b. super .gd. cathetus infra trigonum .bdg. cadit. Similiter ostendetur, nec a puncto .g. super lineam .bd. cathetum posse | infra trigonum .bgd.: exterius enim cadunt; quod oportebat ostendere. Si in duabus lineis angulum continentibus recta aliqua incidit; et in medio ipsius sumatur punctus; et á puncto ad angulum protrahatur recta; si ipsa recta equalis fuerit linee iacentis á dicto puncto usque ad unam linearum continentium angulum, tunc angulus ille rectus erit. Exempli causa: sint due linee .ab. et .bg. continentes angulum .abg.; et in eis incidit recta .de.; in medio cuius accipiatur punctus .z., protrahatur .zb. Dico quoniam si .zb. recta equalis est recte .ze. uel .zd., quod angulus .abg. est rectus. Quoniam tres linee, que sunt .zb. et .zd. et .ze. sibi inuicem equales sunt; si a puncto .z. spatio unius ipsarum circulus circinabitur, nimirum per puncta .d.b.e. ueniet; infra quem circulum coaptata est quedam recta .de., infra quam est centrum circuli; ideo recta .de. est dyameter illius circuli; á quo dyametro comprehensus est arcus .d.b.e.: ergo semicirculus est .d.b.e., infra quem est angulus .dbe. Angulus quidem, qui est in semicirculo, rectus est; ut Euclides in tertio suo libro ostendit. Ex hoc enim manifestum est, quod si recta .zb. maior esset quam recta .zd. uel .ze.; angulus quidem .dbe. acutus esset. Si uero minor esset .zb. quam .zd. uel .ze., obtusus esset angulus .abg.

In orthogonio quidem trigono quadratus lateris subtendentis angulum rectum equus est duobus quadratis laterum continentium angulum rectum. Sit trigonum orthogonium .abg. rectum habens angulum, qui sub .agb. Dico quoniam quadratum linee .ab. equalem esse duobus quadratis linearum .ag. et .gb.; protraham super rectam .ab. a puncto .g. cathetum .gd.; eritque trigonum .abg. diuisum in duobus trigonis orthogonijs, que sunt .gdb. et .gda.; et sunt sibi inuicem similia et toti, ut Euclides in sexto libro demonstrauit. Et quoniam simile est trigonum .gdb. trigono .agb., circa comunem angulum .b. habent latera proportionalia. Est enim sicut .db. ad .bg. ex trigono .dbg., ita .gb. ex trigono .bag. est ad lineam .ab. Quare multiplicatio .db. in .ba. equa est quadrato linee .bg. Rursus quoniam simile est trigonum .gda. trigono .agb., circa comunem angulum ipsorum .a. latera habent proportionalia. Est ergo sicut recta .da. ad .ag. ex triangulo .gda., ita recta .ga. ex triangulo .agb. est ad rectam .ab. Quare .ad. in .ab. equatur quadrato linee .ag. Demonstratum quidem est et .db. in .ba. equari quadrato linee .gb. Quare multiplicatio .db. in .ba. cum multiplicatione linee .ad. in .ab. equatur duobus quadratis linearum .bg. et .ga. Sed multiplicatio .db. in .ab. cum .da. in .ab. equa est quadrato linee .ab.; ergo quadratus linee .ab. equatur duobus quadratis linearum .bg. et .ga.; quod oportebat ostendere. His itaque demonstratis, qualiter trigona mensurentur, demonstramus. Sed notandum primum, quod ex trigonis orthogonijs ampligonijs alia | sunt equicruria,


alia diuersilatera. Oxigoniorum quidem, alia sunt equilatera, alia equicruria, alia uero diuersilatera. Vnde, ut doctrinam mensurandi omnia genera trigonorum perfecte habeamus, hanc partem, scilicet primam huius tertie distinctionis, in tres differentias diuidimus. In prima quarum mensurabimus trigona orthogonia : in secunda oxigonia : in tertia ampligonia.

Incipit differentia prima.


AREA omnium trigonorum orthogoniorum colligitur ex multiplicatione unius lateris in dimidium alterius continentibus angulum rectum. Exempli causa: Sit trigonum orthogonium et equicrurium *abc.* habens in singulis lateribus *ab.* et *bc.* perticas .10.; latus quoque *ac.* sit radix de perticis .200.; multiplicabis dimidium lateris *ab.* in totum latus *bc.*, uel e conuerso, scilicet .5 per .10.; et sic reddet pro area totius trigoni perticas .50. superficiales: et hoc probabitur, si á puncto *a.* super lineam *ba.*, secundum rectum angulum, lineam *ad.* equalem linee *bc.* protraxeris; et copulaueris lineam *dc.*, que erit equalis linee *ab.* Ideo quia quadrilaterum est *abcd.* equilaterum, et orthogonium, ex quo trigonum *abc.* dimidium continere in suprascripta figura aperte declaratur: totum ergo quadratum *abcd.* est perticarum .100., que colliguntur ex multiplicatione de .10. in .10., scilicet ex uno latere in se ipso: quare trigonum *abc.* cum sit dimidium ipsius quadrati, perticas 50 continere necesse est. Item est trigonum orthogonium diuersilaterum *bcd.*, cuius latus *bc.* est perticarum .8.; latus quoque *cd.* est perticarum 6.; latus uero *bd.* perticarum .10.; et angulus rectus est, qui ad *c.* Quare multiplicabis dimidium *bc.* per totam *cd.*, hoc est .4. per .6.; uel dimidium *cd.* in totam *cb.*, scilicet .3. per .8., et habebis perticas .24. pro area trigoni *bcd.*; quod esse uerum cognoscitur suprascripti trigoni doctrina: uel aliter diuidatur *bc.* in duo equalia supra punctum *e.*; et á puncto *e.* equidistans et equalis linee *cd.* protrahatur linea *ef.*; et copuletur *df.* Et quoniam linea *cd.* equidistans est et equalis linee *df.*, erit linea *fd.* equalis, et equidistans linee *ce.*, ut in geometria aperte declaratur. Quare linea *df.* est pertice .4., et est equalis linee *eb.*; et *bh.* est equalis *hd.*; et angulus *ebh.* angulo *hdf.* est equalis: unde recta *eh.* recte *hf.* equatur. Quare trigonum *hfd.* equalis trigono *beh.*: totum ergo trigonum *bcd.* equalis est quadrilatero *ecfd.* orthogonio, quod continetur ex multiplicatione linee *ec.* in lineam *cd.*, scilicet de 4 in 6. Quare trigonum *bcd.* continetur ex multiplicatione dimidij *bc.*, scilicet ex *ec.* in *cd.*, ut prediximus.

Similiter ostendetur, si á puncto *i.*, scilicet dimidio *cd.*, protrahatur linea *ia.* equidistans et equalis linee *cb.*; et copuletur recta *ba.*; et erit triangulus *abh.* equalis triangulo *hid.*: comuniter si addatur quadrilaterum *bcih.*, erit totum quadrilaterum *abci.* equale triangulo *bcd.*; cuius quadrilateri area habetur ex *ic.* in *cb.*, hoc est de .3. in .8., ut supradiximus. Nam si latus *bd.* per reliqua latera inuenire uolueris, multiplica latus *bc.* in se, scilicet per 8., erunt .64.; cui superadde multiplicationem lateris *cd.* in se, scilicet .36., erunt .100.; cuius radix, que est .10., est longitudo *bd.* ypotenusę. Sit ypotenusa *bd.* pertice .10., et basis *cd.* pertice .6.; et queratur longitudo catheti *bc.*; multiplicabis ypotenusam in se, scilicet .10 per 10., erunt .100.; de quibus tolle multiplicationem basis in se, scilicet .36., remanent 64.; quorum radix, scilicet .8., est longitudo catheti *bc.* Item ypotenusa sit .10., et cathetus sit .8.;

* dimidium alterius et orthogonium, * (fol. 20 recto, lin. 6, 7-13; pag. 33, lin. 8-15).



* uero .b.d. quod continetur * (fol. 20 recto, lin. 19-28; pag. 33, lin. 20-30).



fol. 20 verso.

et ignoraueris basem .*cd*. Ex tetragono quidem .*bd*., scilicet de .100., extrahe tetragonum .*bc*., scilicet .64., remanent .36.; quorum radix, scilicet .6., est latus .*cd*.


Incipit Differentia secunda.

Omniū trigonorum oxigoniorum area colligitur ex multiplicatione catheti in dimidium basis, uel ex multiplicatione basis in dimidium catheti. Ad cuius rei euidenciam sit trigonum acutiangulum, et equilaterum .*abc*. habens in singulis lateribus perticas .10.: protrahatur super rectam .*bc*. cathetus .*ad*.; quoniam .*ad*. cathetus est super rectam .*bc*., equalis est uterque angulorum, qui ad .*d*.; ergo orthogonia sunt trigona .*adb*. et .*adc*.; et quoniam equalis est linea linea (sic) .*ab*. linee .*ac*.; et linea .*ad*. comunis est utrique triangulo; basis ergo .*bd*. basi .*bc*. equalis erit; et trigonum .*adb*. trigono .*adc*. equale erit. Et quoniam orthogonium est trigonum .*adb*., area ipsius colligitur ex multiplicatione catheti .*ad*. in dimidium basis .*bd*., scilicet in $\frac{1}{2} \cdot 2$. Similiter quoniam orthogonium est trigonum .*adc*., area ipsius colligitur ex multiplicatione catheti .*ad*. in dimidium basis .*dc*.; quare area totius .*abc*. trigoni colligitur ex multiplicatione catheti .*ad*. in dimidium basis .*bc*., ut supra diximus.


Eisdem uero dispositis ostendetur, quod area .*abc*. trigoni colligitur ex multiplicatione totius basis .*bc*. in dimidium catheti .*ad*. Nam si longitudinem catheti .*ad*. scire desideras, tetragonum linee .*bd*., hoc est multiplicationem ipsius, uel potentiam extrahe ex potentia totius linee .*ab*., scilicet .25., de .100., remanebunt .75.; cuius numeri radix, scilicet parum minus de perticis $\frac{2}{3}$ 8., est longitudo catheti .*ad*.; quibus perticis $\frac{2}{3}$ 8. multiplicatis per medietatem basis .*bc*., scilicet per .5., reddunt parum minus de perticis $\frac{1}{3}$ 40. pro area totius trigoni .*abc*. Similiter multiplicatio totius basis, scilicet .10., in dimidio catheti, qui est parum minus de perticis $\frac{1}{3}$ 4., facit fere de perticis $\frac{1}{3}$ 43.; uel .*bd*. per .*ad*., hoc est .5. per radicem de .75. multiplica, et habebis radicem de .1875. pro embado trianguli .*abc*.; que radix est secundum propinquitatem $\frac{1}{3}$ 43., minus $\frac{1}{20}$. Et si embadum suprascripti trianguli aliter inuenire uis ex quadrato unius laterum, scilicet de .100. tertiam et decimam partem accipe; et quod prouenerit, erit embadum secundum propinquitatem. Est enim proportio aree cuiuscumque trianguli equilateris ad quadratum sui lateris parum minus de proportione, quam habent .13. ad .30. Item sit equicrurium trigonum et acutiangulum .*def*., habens latera .*de*. et .*df*. equalia; quorum unumquodque sit pertice .10.; latus quoque .*ef*. sit pertice .12.: inter equalia quidem crura ipsius, scilicet super basem .*ef*. cathetus protrahenda est; ideo quia cadit super dimidium .*ef*.; et protracte | catheti | .*dg*. studeas longitudinem inuenire; uidelicet extrahere potentiam .*eg*. ex potentia lateris .*de*., scilicet .36. de .100., remanent .64.; qui numerus est potentia catheti .*dg*.; quare .*dg*. est perticarum .8., scilicet radix de .64.: similiter .8. multiplicatis per dimidium basis .*ef*., scilicet in .6.; uel tota base in dimidio catheti, scilicet .12. per .4., ueniunt pertice .48. pro area totius trigoni .*def*. Nam cum multiplicatur cathetus in dimidium basis, tunc constituitur ex ipso triangulo quadrilaterum longum, habens in longitudinem perticas .8., scilicet quantitatem catheti, et in latitudinem perticas .6., scilicet dimidium basis. Verbi gratia: describatur iterum trigonum .*def*.; et a puncto .*d*. protrahatur linea .*dh*., equidistans et equalis linee .*gf*., hoc est equalis linee .*ge*.; et copuletur recta .*hf*., que erit equalis catheto .*dg*.

Quare quadrilaterum .*dgfh*. equale est trigono .*def*. Nam quadrilaterum .*dgfh*.

* protrahatur super area totius .*abc*. * (fol. 20 verso, lin. 31, 12-18; pag. 34, lin. 7-14).




* embadum secundum et protracte * (fol. 20 verso, lin. 31-35; pag. 34, 27-33).



fol. 21 recto.


* radix de .64. trigonum .*def*. * (fol. 21 recto, lin. 2-7; pag. 34, lin. 35-41).



constat ex multiplicatione catheti *dg.* in *gf.*, scilicet in dimidio *ef.* Item sit trigonum diversilaterum et acutiangulum *abc.*; cuius latus *ab.* sit pertice .13.; latus *ac.* sit pertice .15.; basis *bc.* sit pertice .14. In hoc enim triangulo cathetus inueniri non potest, donec primum inueniatur casus supra basem, in quo perpendicularis, scilicet cathetus, cadat; qui casus tribus modis inueniri potest. Primus quidem modus est, ut potentia unius lateris cum potentia basis iungas; et ex eorum summa extrahas potentiam alterius lateris; residuique dimidium per longitudinem basis divide; et quod ex diuisione prouenerit, erit casus ab illa parte, á qua coniungitur potentia lateris cum potentia basis. Vt in trigono suprascripto, cuius potentia basis, scilicet de .14. in se ipso, est .196.; que addita cum potentia lateris *ab.*, scilicet cum multiplicatione de .13. in se, que est .169., faciunt .365.; de quibus extracta potentia lateris *ac.*, scilicet .225., remanent .140.; quorum dimidium, scilicet .70., per basem, scilicet per .14., divide, exhibunt .5., que sunt casus á latere *ab.*, scilicet quantitas *bd.*; reliquum uero *dc.* erit pertice .9., scilicet differentia, que est a .3. usque in .14.


Item potentia lateris *ac.*, scilicet .225., addita cum potentia basis *cb.*, scilicet cum .196., facient .421.; de quibus extracta potentia lateris *ab.*, scilicet .169., remanent .252.; quorum dimidium, scilicet .126., diuisum per basem, reddunt .9. pro casu *cd.* Modus alius est, ut addas perticas utriusque ypotenusæ, ut in hoc trigono .13. cum .15. erunt .28.; quas divide per .2., erunt .14.; quas multiplica per differentiam, que est ab una ypotenusarum usque in ipsis .14., scilicet per .1., erunt .14.; quas divide per dimidium basis, scilicet per .7., exhibunt .2.; quas adde super dimidium basis, erunt .9.; que sunt maior casus á latere maioris ypotenusæ *ac.* Similiter extractis ipsis .2. ex ipsis .7., relinquetur minor casus *bd.* perticarum .5., ut per primum modum inuentum est. Tertius modus est, ut per potentiam minoris ypotenusæ de potentia maioris extrahe, scilicet .169. de .225.; residuum uero, scilicet .56. per basem, scilicet per .14. divide, exhibunt .4. que adde cum base, erunt .18. quorum dimidium, scilicet .9., est maior casus: uel .4. extrahe de base, remanent .10.; quorum dimidium, scilicet .5., est minor casus. Et hic uidetur mihi actior reliquis. Inuencto itaque casu, si perpendicularem *ad.* inuenire uolueris, extrahe potentiam minoris casus, scilicet .25., de potentia lateris *ab.*, scilicet de .169., remanebunt .144.; quorum radix, scilicet .12., est cathetus *ad.*: uel potentiam maioris casus, scilicet multiplicationem de .9. in se ipso, scilicet .81., extrahe de potentia *ac.*, scilicet de .225., remanebunt similiter .144. pro potentia catheti *ad.*: quare cathetus *ad.* est .12., ut prediximus. Multiplicatio quidem catheti in dimidium basis, uel e conuerso, reddit perticas .84. pro area totius trigoni *abc.* In suprascripto quidem trigono equicrurio ostendimus, ipsum equalem esse ei quadrilatero rectiangulo, qui habet in longitudine quantitatem catheti eiusdem trigoni, et in latitudine quantitatem dimidij sup basis. In hoc uero uolumus demonstrare, qualiter trigona equiparantur ipsis quadrilateris rectiangulis, qui habent in longitudine quantitatem totius basis trigonorum, et in latitudine quantitatem dimidij catheti: diuidatur cathetus *ad.* in duo equalia supra punctum *e.*, ut in hac alia cernitur formula; et per punctum *e.* linea trahatur *fg.*, que sit equalis, et equidistans lineæ *bc.*; et copulentur recte *fb.* et *gc.*, que erunt equalis et equidistantes sibi inuicem; propter quod recta *fg.* est equidistans et equalis lineæ *bc.*: et quoniam cathetus *ad.* in duo equalia diuisus est secundum punctum *e.*; et per punctum

constat ex multiplicatione ... scilicet cathetus (fol. 21 recto, lin. 44-44; pag. 35, lin. 1-5).



fol. 21 verso.

quantitatem dimidij ... erunt equalles (fol. 21 verso, lin. 10-15 e 16; pag. 35, lin. 36-41).



.e. protracta est basis *.bc.* equidistans rectę *.fg.*, que secat rectas *.ab.* et *.ac.* in duo equalia in punctis *.h.* et *.l.*, secundum quod in geometria declaratur; et anguli, ad *.e.* recti erunt, sicut sunt anguli, qui ad *.d.*: quare anguli *.f.* et *.g.* recti sunt: ideo si scindatur recta *.ae.* ab *.a.* in *.e.*, et recta *.eh.* ab *.e.* in *.h.*; et ponatur trigonum *.aeh.* super trigonum *.bfh.*, recta *.ae.* super rectam *.fb.* cadet: ideo quia recta *.fb.* equalis est rectę *.ed.*, que est equalis rectę *.ea.*; et recta *.eh.* super rectam *.hf.*; et recta *.ah.* super rectam *.hb.*; et angulus *.f.* equalis erit angulo *.aef.* Quare angulus *.f.* rectus est: propter eadem ergo rectus angulus qui ad *.g.*, et trigonum *.cig.* equale est trigono *.aei.*: totum ergo *.abc.* trigonum quadrilatero *.fbcg.* equale est, quod habet in uno latere quantitatem basis; in alio quantitatem dimidij catheti, ut oportebat ostendere. Nec pretermittendum est, quod in quadrilatero *.fbcg.* angulus, qui sub *.bcg.* equalis est angulo, qui ad *.f.*; ideo quia oppositi sunt: quare et angulus *.fbc.* equalis est angulo qui ad *.g.*; que omnia in libro euclidis aperte declarantur, ubi ostenditur, quod omnes figure que habent latera opposita, equalia habebunt similiter et angulos equales: quare angulus *.fbc.* et *.bcg.* recti sunt: orthogonium ergo est quadrilaterum *.fbcg.*, ut oportet. In secundo quidem euclidis libro demonstratur, unde procedit prima inuentio casus perpendicularis in oxigonio trigono.


fol. 22 recto.

Et nos unde procedit inuentio eiusdem casus, per secundum et tertium modum uolumus figuris geometricis demonstrare. Describatur rursus trigonum suprascriptum *.abc.*; et protrahatur in eo cathetus *.ad.*; et per puncta *.bc.* ad rectos angulos protrahantur rectę *.eb.* et *.fc.*; et sit recta *.eb.* equalis rectę *.ac.*, scilicet 15; et recta *.fc.* equalis rectę *.ab.*, scilicet 13; et copulentur *.fe.* et *.fd.* et *.de.*; et diuidatur recta *.ef.* in duo equa super punctum *.g.*; et á punto *.g.* utrisque rectis *.fc.* et *.eb.* equidistans protrahatur recta *.gh.*; et per punctum *.f.* rectę, et equidistans *.bc.* protrahatur recta *.fik.*

Rursus per punctum *.g.* rectis *.cb.* et *.fik.* equidistans protrahatur recta *.gl.*; et quoniam orthogonia sunt trigona *.adc.* et *.adb.* rectos habentia angulos, qui sub *.adc.* et *.adb.*; potentia quidem lateris *.ac.* equatur duobus potentijs linearum *.ad.* et *.dc.*; et potentia lineę *.ab.* equatur duobus potentijs linearum *.ad.* et *.db.* Quare si comuniter auferatur potentia lineę *.ad.*, poterit potentia maioris casus *.dc.* plus potentia minoris *.db.*, quantum potest potentia lineę *.ac.* plus potentia lineę *.ab.*

Quare potentie linearum *.ab.* et *.dc.* equantur potentijs linearum *.ac.* et *.db.* Sed recta *.fc.* equalis est rectę *.ab.*, et recta *.eb.* rectę *.ac.* Quare potentia linearum *.fc.* et *.cd.* equatur potentie linearum *.eb.* et *.bd.* Sed potentie linearum *.fc.* et *.cd.* equa est potentia lineę *.fd.* cum angulus *.fcd.* sit rectus. Simili quoque modo potentia lineę *.de.* equatur potentie linearum *.eb.* et *.bd.*: quare lineę *.fd.* et *.de.* sibi inuicem sunt equales. Equicrurium ergo est trigonum *.fde.* Et quoniam basis *.ef.* in duo equa diuisa est super punctum *.g.*; linea quidem *.dg.* cathetus est super lineam *.ef.*: quare rectus est uterque angulus, qui sub *.dge.* et *.dgf.* Rursus quoniam recta *.gh.* equidistans est rectę *.fc.*; et in eis incidit recta *.cb.*; anguli quoque qui sub *.fch.* et *.ghc.* duobus rectis sunt equales. Sed qui sub *.fch.* rectus est; quare qui sub *.ghc.* rectus erit; exterior angulus qui sub *.ghd.* est rectus; quia equalis est interiori et opposito, qui sub *.fch.*: cathetus ergo est linea *.gh.* super rectam *.bc.* Item quoniam per punctum *.f.* protracta est linea *.fik.* equidistans lineę *.cb.*; et linea *.be.*

* comuniter auferatur et op-
posito, qui » (fol. 22 recto, lin.
9, 10-23; pag. 36, lin. 29-42.



est equidistans linee $fc.$; paralilogramum ergo est quadrilaterum $kbcf.$ Quare opposita latera sibi inuicem sunt equalia: equalis ergo est recta $fk.$ recte $bc.$, et recta $bk.$ recte $cf.$ Ergo $bk.$ est 13, remanet $ke.$ 2. Nam recta $ih.$ equalis est utrique rectarum $fc.$ et $kb.$


Paralilogramina enim sunt quadrilatera $kbhi.$ et $ihcf.$ Ergo recta $hi.$ est 13. Item quoniam in equidistantibus $eb.$ et $gh.$ recta incidit $ef.$, exterior angulus, qui sub $figi.$ equalis est opposito interiori, qui sub $gel.$ Et angulus quidem qui sub $fig.$ equalis est $ei.$, qui sub $gle.$: est enim uterque rectus. Reliquus qui sub $gfi.$ reliquo, qui sub $egl.$ est equalis; et recta $fg.$ recte $ge.$ est equalis. Quare reliqua latera reliquis lateribus equalia erunt, que equales angulos subtendunt: latus quippe $gi.$ lateri $el.$ est equalis; et latus $fi.$ lateri $gl.$ est similiter equalis. Sed recta $gl.$ recte $ik.$ est equalis; quia paralilogramum est quadrilaterum $lkig.$ Ergo recta $fi.$ equalis est recte $ik.$; quare recta $ch.$ equa est recte $hb.$: diuisa est ergo basis $bc.$ in duo equa super punctum $h.$; quare $ch.$ est 7. Item quia paralilogramum est quadrilaterum $lkig.$; equalis est recta $lk.$ recte $ig.$ Sed recta $ig.$ demonstrata est esse equalis recte $le.$; quare et $kl.$ equa est recte $le.$ Sed tota $ke.$ est 2.; ergo unaqueque rectarum $kl.$ et $le.$ et $ig.$ est 1.: vnde tota $hg.$ est 14. Rursus quoniam rectus est angulus $dgh.$, duo quidem anguli qui sunt $dgh.$ et $hgf.$ uni recto sunt equales. Similiter quoniam orthogonium est trigonum $gif.$ habens rectum angulum, qui sub $gif.$; reliqui duo anguli qui sub $igf.$ et $gfi.$ uni recto sunt equales; ergo anguli $dgh.$ et $hgf.$ sunt equales angulis $hgf.$ et $gfi.$ Quare si comuniter auferatur angulus $hgf.$, remanebit angulus $dgh.$ equalis angulo $gfi.$ Nam et angulus $gif.$ angulo $ghd.$ est equalis. Reliquus $igf.$ reliquo $hdg.$ est equalis. Simile ergo est trigonum $fig.$ trigono $ghd.$; quare est sicut $fi.$ ad $ig.$, scilicet sicut 7. est ad unum, ita $gh.$, scilicet 14., est ad $hd.$ Quare multiplicatio $gi.$ in $gh.$ diuisa per $fi.$ reddit $hd.$; et hoc est quod in secundo modo fecimus. Videlicet addidimus latus $ab.$ cum latere $ac.$, hoc est $fc.$ cum $eb.$, et habuimus 28.; quorum dimidium, scilicet 14., fuit linea $gh.$; que multiplicauimus per $ig.$, quod est id, in quo $gh.$ recta superhabundat rectam $fc.$, hoc est $ab.$, uel $gi.$ est illud, in quo $ac.$, scilicet $eb.$, superhabundat lineam $gh.$; ex qua multiplicatione habuimus 14.; que diuisimus per dimidium basis $bc.$, scilicet per $ch.$, hoc est per $fi.$; quarum unaqueque est 7., et habuimus 2. pro quantitate $hd.$; que addidimus dimidio basis, scilicet $ch.$, que est 7., et habuimus 9. pro $cd.$ recta, que est maior casus; uel extraximus $hd.$ ex $hb.$, scilicet 2. de 7., remanserunt nobis 5. pro minore casu $db.$; quod oportebat ostendere.

modus tertius.

Adiaceat iterum supradictum trigonum $abg.$, cuius latus $ab.$ sit 13.; latus quoque $ag.$ sit 15.; basis quidem $bg.$ sit 14.; et protrahatur super $bg.$ cathetus $ac.$, et quoniam maior est latus $ag.$ quam $ab.$, maior est casus $gc.$ quam $cb.$: quare ex $cg.$ auferatur $cd.$, que sit equalis recte $cb.$, et erit recta $bd.$ diuisa in duo equa super punctum $c.$; cui recte $bd.$ in directo addita est $dg.$ Quare multiplicatio $dg.$ in $bg.$ cum quadrato linee $cd.$, uel $cb.$ equatur quadrato linee $cg.$ Quare quadratus linee $cg.$, scilicet maioris casus, superhabundat quadrato linee $bc.$, scilicet minoris casus

fol. 23 verso.

• Adiaceat iterum . . . quantitate multiplicationis • (fol. 23 verso, lin. 23-29 e 30; pag. 37, lin. 37-43 — pag. 38, lin. 1).



in quantitate multiplicationis linee $.dg.$ in lineam $.bg.$ Sed ostensum est superius in alia figura, quod superhabundantia quadrati casus $.cg.$ ad quadratum casus $.cb.$ est sicut superhabundantia quadrati lateris $.ag.$ ad quadratum lateris $.ab.$ Quare superhabundantia quadrati lateris $.ag.$ ad quadratum lateris $.ab.$ est sicut multiplicatio recte $.dg.$ in rectam $.bg.$ Sed quadratum lateris $.ag.$, scilicet $.225.$, superhabundat potentiam lateris $.ab.$, scilicet $.169.$ in $.56.$; quare multiplicatio $.dg.$ in $.bg.$ surgit in $.56.$ Sed $.bg.$ est $.14.$; in quibus diuisis $.56.$, reddunt $.4.$ pro quantitate linee $.dg.$; quibus $.4.$ extractis ex base $.bg.$, scilicet de $.14.$, remanet linea $.bd.$ $.10.$; quorum dimidium, scilicet $.5.$, erunt in minori casu $.bc.$; quod oportebat ostendere.

Incipit differentia tertia.


Si autem trigonum ampligonium, et equicrurium fuerit, protrahes cathetum in ipso super latus maius; et operaberis secundum quod superius in trigono acutiangulo et equicrurio diximus. Sed si trigonum ampligonium diuersilaterum fuerit, vt trigonum $.abg.$, cuius latus $.ab.$ sit pertice 13; et latus $.bg.$ pertice 4; latus quoque $.ag.$ pertice 15; si ab angulo $.b.$ obtuso cathetum protrahere uolueris super maius latus, scilicet super $.ag.$, infra triangulum cadet. Casum itaque seu cathetum, nec non et embadum ipsius inuenies, secundum quod docuimus in triangulo acutiangulo diuersilatero. Sed si ab angulo $.a.$, uel ab angulo $.g.$ cathetos protrahere uolueris, extra triangulum cadent.

Quare qualiter casus ipsorum extra bases reperiantur, indicare necesse est. Ex potentia maioris lateris, que est $.225.$, extrahes potentiam reliquorum duorum laterum; quorum potentia $.ab.$ est $.169.$, et potentia $.bg.$ est $.16.$, remanebunt $.40.$; quorum dimidium, scilicet $.20.$, si per basem $.bg.$ diuiseris, scilicet per $.4.$, exhibunt $.5.$ pro quantitate casus $.bd.$, super quem cathetus $.ad.$ erigitur. Et si eadem $.20.$ per basem $.ab.$, scilicet per $.13.$, diuiseris, habebis pro casu $.be.$ perticam $\frac{7}{13} 1.$, super quem cathetus $.ge.$ eleuatur. Deinde si potentiam $.db.$, que est $.25.$, ex potentia $.ab.$, que est $.169.$, extraxeris; uel si potentiam $.dg.$, que est $.81.$, ex potentia $.ag.$ dempseris, remanebunt pro potentia catheti $.ad.$ $.144.$; cuius radix, scilicet $.12.$, est longitudo catheti $.ad.$: quam si in dimidium sue basis, scilicet in $.2.$, multiplicaueris, reddent perticas $.24.$ pro area trigoni $.abg.$: uerbi gratia: trigonum $.adg.$ orthogonium est; et colligitur area ipsius ex multiplicatione dimidij catheti $.ad.$, scilicet de $.6.$ in totam basem $.dg.$, scilicet in $.9.$; quare area trigonij $.adg.$ est pertice $.54.$; ex qua si extraxeris aream trigonij orthogonij $.adb.$, que est $.30.$, que colligitur ex multiplicatione eiusdem dimidij catheti $.ad.$ in basim $.db.$, remanebunt pro area trigonij $.abg.$ pertice $.24.$; que colliguntur iterum ex multiplicatione dimidij catheti $.ad.$ in basim $.bg.$, uel ex multiplicatione catheti $.ad.$ in dimidium basis $.bg.$, ut prediximus. Similiter si multiplicaueris cathetum $.ge.$ in dimidium basis $.ba.$, eandem habebis aream. Cathetum enim $.ge.$ inuenies, si extraxeris potentiam linee $.eb.$ ex potentia linee $.bg.$, uel potentiam linee $.ea.$ ex potentia linee $.ag.$ Et est cathetus $.ge.$ perticarum $\frac{2}{13} 3.$; quorum dimidium, scilicet $\frac{1}{13} 1.$, si per basem $.ab.$, scilicet per 13 multiplicauerimus, ad easdem perticas 24 pro embado trigonij $.abg.$ ueniemus.

Est enim in secundo Euclidis libro aperte demonstratum, unde procedit modus supradictus in reperiendis casibus perpendicularium, que cadent extra obtusum angulum in ampligonij trigonis. Possumus quidem per alios duos modos ipsos casus reperire |

fol. 23 recto.


inuenies, secundum . . . 144.;
cuius (fol. 23 recto, lin. 9, 10-
20; pag. 38, lin. 17-27).




videlicet per eos, quos demonstrationibus superius demonstraui. Et est iste primus modus: adde .13. cum .15., scilicet latus .ab. cum latere .ag., erunt .28.; quorum dimidium, scilicet .14., multiplica per differentiam, que est ab ipsis .14. usque ad unum ex lateribus predictis, scilicet per .1., erunt .14.; que si diuiserimus per .2., scilicet per dimidium basis, egredientur .7.; de quibus demptis .2., scilicet .bf., remanebunt .5. pro casu .bd.: super quibus namque .7., si addiderimus lineam .fg., habebimus .9. pro tota linea .dg. Alius quidem modus est, ut potentiam lineę .ab. ex potentia lineę .ag. extrahas, scilicet .169. de .225.; residuumque, scilicet .56., per basem .bg. diuidas, scilicet per .4.; et que de ipsa diuisione peruenit, .4., scilicet basem extrahas, remanebunt .10.; quorum dimidium, scilicet .5., est casus .bd. Que euidentissime monstrabuntur, si lineam .gd. protraxerimus in puncto .h.: et sit linea .dh. equalis lineę .db.; et copuletur .ah., ut in hac alia cernitur formula. Est enim in trigono .ahg., et infra ipsum trigonum cathetus ducta .ad.; et quoniam recta .hd. equalis est rectę .db., et in eis est cathetus .ad., equalis est recta .ah. rectę .ab.: ergo recta .ah. est 13, et recta .ag. est .15., et recta .bg. est .4., et recta .bh. est ignota; et est diuisa in duo equa supra punctum .d., cui iacet in directo linea .bg.; et est linea .dg. maior casus; linea quoque .dh. minor in trigono .ahg. Quare potentia lineę .dg. superhabundat potentiam lineę .dh. in quantitate, in qua superhabundat potentia lineę .ag. potentiam lineę .ah., scilicet in .56. Sed potentia lineę .dg. superhabundat potentiam lineę .dh. in multiplicatione .bg. in lineam .gh. Quare .bg. ducta in .gh. facit .56.: quare diuisis .56. per .bg. reddent .14. pro tota linea .hg.; de quibus dempta linea .bg., scilicet .4., nimirum .10. remanebunt pro linea .bh.; quorum dimidium, scilicet .5., est casus .bd., ut superius inuentum est. Nam si super rectam .hg. protraherimus ad rectos angulos lineas .gc. et .hi. Quarum .gc. sit equalis utrique linearum .ab. et .ah.; et linea .hi. equatur lineę .ag.; et copuletur .ci.; et expleatur figura, secundum quod fecimus in trigono oxigonio. Inuenies lineam .kl. esse dimidium laterum .ah. et .ag.; et .hl. esse dimidium basis .hg. Quare .dl. est .2, et .lg. remanet ignota; et .mk. est 1., scilicet differentia, que est a linea .kl. ad quamlibet linearum .cg. uel .hi.; et est trigonum .dlk. simile trigono .kmc. Quare est sicut .dl. ad .lk., ita .km. ad .mc. Quare multiplicationem .kl. in .km. diuides per .2., scilicet per .dl., egredientur .7. pro linea .mc., scilicet pro .lg.; quibus additis .2, scilicet .ld., habebis .9. pro linea .gd.; de qua extracta .gb., scilicet .4., remanebunt .5. pro casu .bd., ut oportet. Aliter adiaceat rursus trigonum ampligonium .acb. obtusum habens angulum, qui sub .acb.; et sit .ac. .13., et .ab. 20., et .bc. 11.; et protrahatur extra ipsum cathetus .ag. super lineam .bg.; et a punctis .c. et .b. | ad rectos protrahatur .bd. et .cf., quarum .bd. sit equa lineę .ac. et .cf. lineę .ab., erit .bd. 13., et .cf. 20.; et copuletur .df. et .fg. et .dg.; et a puncto .a. scilicet a medio lineę .df., protrahatur cathetus .eh. super lineam .gb.; et copuletur recta .eg.; et per punctum .d. protrahatur .dk. equidistans lineę .bh.: et quoniam orthogonia sunt trigona .agc., et .agb. equatur potentia lineę .ac. duobus potentijs linearum .ag. et .gc.; et potentia lineę .ab. potentijs linearum .ag. et .gb. Quare potentia linearum .ac. et .gb. equatur potentie linearum .ab. et .gc., hoc est potentia linearum .fc. et .gc. equatur quadratis linearum .db. et .bg.: quare rectę .dg. et .gf. sibi inuicem sunt equales; et recta .ge. est cathetus super .df.; et per reliqua supradicta ostendetur, .hk. esse .13., scilicet

fol. 23 verso.

videlicet per eos, ... quorum dimidium * (fol. 23 verso, lin. 1-9; pag. 39, lin. 1-10).




hac alia cernitur ... superhabundat potentia * (fol. 23 verso, lin. 12-18; pag. 39, lin. 12-18).




dempta linea .b.g., ... trigonum ampligonium * (fol. 23 verso, lin. 22-33; pag. 39, lin. 21-32).

fol. 24 r.




erit .*b.d.* 13. reddet pro area *
(fol. 24 recto, lin. 2-15; pag. 39,
lin. 35-43 — pag. 40, lin. 1-7).



equalem lineę .*db.* et .*ke.* esse superhabundantiam lineę .*he.* ad .*bd.*; et trigonum .*ghe.* esse simile trigono .*ekd.* Quare est sicut .*dk.* ad .*ek.*, ita .*eh.* est ad .*hg.* Quare si multiplicatio .*ek.* in .*eh.* diuidatur per .*dk.*, scilicet per .*bh.*, que est dimidium lineę .*bc.*, exibat linea .*hg.* $\frac{1}{2}$ 10.; ex quibus extracta linea .*ch.*, scilicet $\frac{1}{2}$ 5., remanebit casus .*cg.* .5., ut oportebat ostendere. Quare cathetus .*ag.* erit .12.; cuius dimidium, si per basem .*cg.*, scilicet .6. per .11. multiplicauerimus, nimirum perticas .66. reddet pro area trigoni .*acb.* Nam ut mensurandi doctrina perfecte in hoc libro contineatur; qualiter quodlibet trigonum sine inuestigatione catheti mensurari possit, indicabimus. Trigonj latera in unum coniunge, et dimidium sumę accipe eorum; de qua extrahe per ordinem latera trigonj; et multiplica residuum unius lateris per residuum alterius; et sumam multiplica per residuum alterius lateris; quod totum per medietatem trium laterum multiplica; et summe radicem inuenias, que erit area totius trigonj. Verbi gratia: additis in unum lateribus suprascripti trigoni, scilicet .13. et .11. et .20., faciunt .44.; cuius dimidium est .22., a quo maius latus distat perticis .2.; secundum perticis .9.; tertium perticis .11.: multiplicatio quidem residui primi lateris, scilicet .2., in residuo secundi lateris, scilicet in .9., multiplicata per residuum tertij lateris, scilicet per .11., faciunt .198.; quo numero iterum multiplicato per dimidium laterum, scilicet per .22., faciunt .4356.; que sunt potentia areę trigonj, quorum radix est .66., ut pro area ipsius superius inuenimus. AD cuius rei demonstrationem adiaceat trigonum .*abg.*; et diuidantur in duo equa anguli, qui sub .*abg.* et .*agb.* á rectis .*bt.* et .*tg.*; et á puncto .*t.* cathetus protrahantur .*th.* .*te.* et .*tz.*; et copuletur .*at.*; et quoniam rectus est qui sub .*thg.*, et qui sub .*tzg.*, equalis est angulus qui sub .*thg.* angulo qui sub .*tzg.*, nec non et angulus qui sub .*tgh.* angulo, qui sub .*tgz.* est equalis. Quare reliquus qui sub .*gth.* reliquo qui sub .*gtz.* equatur: equianguli enim sunt trianguli .*thg.* et .*tgz.*: et quoniam latus .*gt.* est comune eorum; reliqua quidem latera, que equos angulos subtendent, equalia habebunt; latus quoque .*th.* lateri .*tz.*, et .*hg.* lateri .*gz.* equantur. Similiter ostendetur rectam .*hb.* recte .*be.*, et rectam .*th.* recte .*te.* esse equalis; et trigonum .*thb.* equari trigono .*teb.*: et quoniam utraque rectarum .*te.* et .*tz.* equalis sunt recte .*th.*, et sibi inuicem equalia sunt; ergo equalis est recta .*te.* recte .*tz.*: comunis adiaceat recta .*ta.*; due ergo, que sunt .*et.* et .*ta.*, duabus, que sunt .*at.* et .*tz.*, equantur; et angulus qui sub .*aet.* angulo qui sub .*azt.* est equalis; et latus .*at.* est comune. Quare equiangulum et equilaterum est trigonum .*aet.* trigono .*azt.* Quare latus .*az.* lateri .*ae.* equatur. Et quoniam equalis est recta .*az.* recte .*ae.* Si comune adiaceat eis recta .*eb.*, erit quidem recta .*ab.* equalis duabus rectis, que sunt .*az.* et .*eb.*, hoc est .*az.* et .*bh.* Rursus quoniam recta .*zg.* equalis est recte .*gh.*; erunt quidem due recte, que sunt .*ag.* et .*hb.*, equalis duobus rectis .*ab.* et .*gh.*; ergo .*ag.* et .*hb.*, scilicet .*eb.*, sunt medietas laterum trigonj .*abg.* Quare .*eb.* est id in quo medietas laterum trigonj .*abg.* superhabundat latus .*ag.* Similiter ostendetur, rectam .*ae.* esse illud, in quo medietas laterum trigonj .*abg.* superhabundat latus .*bg.*; et .*hg.*, uel .*gz.* esse superhabundantiam á latere .*ab.* Quare recte .*ab.* et .*hg.* sunt medietas laterum trigoni .*abg.* Similiter et recte .*ag.* et .*hb.* sunt medietas laterum eiusdem trigoni: protrahantur ergo recte .*ab.* et .*ag.* in directo in punctis .*L.M.*; et sit .*bl.* equalis recte .*hg.*, et .*gm.* equalis recte .*hb.*; erit ergo utraque re-

fol. 24 verso.


Quare reliquus Similiter ostendetur * (fol. 24 recto, lin. 2 ab infra; pag. 40, lin. 24-27).



ctarum *.al.* et *.am.*, sicut medietas laterum trigoni *.abg.* Deinde producat *.at.* in puncto *.k.*; et copulentur recte *.lk.* et *.km.*; et sit rectus qui sub *.alk.* Quare rectus erit qui sub *.amk.*; quia due recte *.al.* et *.ak.* equales sunt rectis *.ak.* et *.am.*; et angulus qui sub *.lak.* angulo, qui sub *.kam.* est equalis: quare et latus *.lk.* lateri *.mk.* equatur; et reliqui anguli reliquis angulis, qui ab equalibus rectis subtenduntur, equabuntur: angulus quidem qui sub *.akl.* ei qui sub *.akm.*, et qui sub *.alk.* ei qui sub *.amk.*; sed rectus qui sub *.alk.*; ergo rectus qui sub *.amk.*, ut prediximus. Et secetur á linea *.bg.* equalis linee *.bl.*; et sit *.bn.*; et copulentur *.nk.* et *.kg.* et *.kb.*: et quoniam *.gh.* est superhabundantia dimidij laterum trigoni *.abg.* á latere *.ab.*, equalis est linee *.bl.*, hoc est *.bn.* Quare *.ng.* equatur *.gm.*; cum sit superhabundantia medietatis laterum á latere *.ag.* Et quoniam trigona *.gmk.* et *.klb.* orthogonia sunt, potentia linee *.gk.* equatur duabus potentijs linearum *.gm.* et *.mk.*, hoc est *.gn.* et *.mk.*; et potentia linee *.bk.* equatur duabus potentijs linearum *.kl.* et *.bl.*, hoc est *.kl.* et *.bn.* Sed potentie linee *.lk.* equa est potentia linee *.km.* Quare quantum potentia linee *.kg.* superhabundat potentiam linee *.kb.*, tantum potentia *.ng.* superhabundat potentiam *.nb.* Quare linea *.kn.* cathetus est super lineam *.bg.*, et est equalis linee *.kl.* Et quia anguli *.knb.* et *.blk.* recti sunt, remanent anguli *.nbl.* et *.lkn.* duobus rectis equales. Sed angulj *.ebn.* et *.nbl.* similiter duobus rectis sunt equales. Quare angulus *.ebn.* equalis est angulo *.lkn.*; et angulus *.lkb.* dimidium est anguli *.lkn.*; erit ergo equalis | angulo *.ebt.*, qui est medietas anguli *.ebh.*; et angulus qui ad *.l.* est equalis ei qui ad *.e.*; cum ambo sint recti; et remanet angulus *.etb.* equalis angulo *.kbl.*: trigonum ergo *.kbl.* simile est triangulo *.ebt.*: proportio ergo *.kl.* ad *.lb.* sicut proportio *.be.* ad *.et.*: ductus ergo *.kl.* ad *.et.* sicut ductus *.lb.* ad *.be.* Sed proportio tetragoni *.et.* ad ductum *.et.* ad *.lk.*, sicut proportio *.et.* ad *.lk.*; et proportio *.et.* ad *.lk.* sicut *.ae.* ad *.al.*; cum *.et.* sit equidistans linee *.lk.*: proportio ergo *.ae.* ad *.al.* sicut proportio tetragoni *.et.* a ductu *.et.* ad *.lk.* sicut ductus *.eb.* ad *.bl.*: proportio ergo *.ae.* ad *.al.* sicut proportio tetragoni *.et.* ad ductum *.eb.* ad *.bl.*: ductus ergo tetragoni *.et.* ad *.al.* sicut ductus *.ae.* ad ductum *.eb.* ad *.bl.* Et ductus tetragoni *.et.* ad tetragonum *.al.* est sicut ductus *.ae.* ad ductum *.eb.* ad *.bl.*, et producti *.al.* Sed ductus tetragoni *.et.* ad tetragonum *.al.* est sicut tetragonum superficiei trigoni *.abg.*; quod in sequenti demonstrabimus. Quare multiplicatio *.ae.*, que est superhabundantia medietatis laterum trigoni *.abg.* a latere *.bg.* in *.eb.*, que est superhabundantia á latere *.ag.* ducta in *.bl.*, que est superhabundantia á latere *.ab.*, et producti in *.al.*, scilicet in medietate laterum trigonj *.abg.*, reddit tetragonum areę trigoni *.abg.*, ut oportebat ostendere. Sed ostendendum est, qualiter ductus tetragoni *.et.* ad tetragonum *.al.* est sicut tetragonum areę trigonj *.abg.* Quoniam trigonum *.abg.* in tribus trigonis resolutum est a puncto *.t.*, que sunt *.atb.* et *.btg.* et *.gta.*; et catheti uniuscuiusque sunt equales sibi inuicem; et sunt *.te.* et *.th.* et *.tz.*; ergo ductus *.et.* in dimidio basis *.ab.* reddit aream trigoni *.atb.*: similiter ductus *.th.*, scilicet *.te.*, in dimidio *.bg.* reddit aream trigoni *.btg.*: propter eandem ergo et ductus *.tz.*, hoc est *.te.*, in dimidio *.ag.*, reddit aream trigoni *.atg.*


Quare ductus *.et.* in *.al.*, scilicet in dimidio laterum trigoni *.abg.*, reddit aream trigoni *.abg.*: quare ductus tetragonj *.et.* ad tetragonum *.al.* est sicut tetragonum aree

* trigoni *.abg.* ... angulus quidem qui * (fol. 24 verso, lin. 12-22; pag. 40, lin. 38-43 — pag. 41, lin. 1-6).




fol. 25 recto.

* reddit tetragonum ... laterum trigoni *.abg.*, * (fol. 25 recto, lin. 16-23; pag. 41, lin. 35-42).




* trigoni .*abg.*, ... est minor recto * (fol. 25 recto, lin. 24, 25-32; pag. 42, lih. 1-8).




fol. 25 verso.


* erit lateri .*ag.*: ... ergo sicut .*b.d.* * (fol. 25 verso, lin. 1-6; pag. 42, lin. 12-17).



* ducto per .*g.b.*, ... quadrato linee * (fol. 25 verso, lin. 13-20; pag. 42, lin. 23-31).



* si proportio .*b.e.* ... Et si unum * (fol. 25 verso, lin. 23-25; pag. 42, lin. 33-43 - pag. 43, lin. 1).



trigoni .*abg.*, ut oportebat ostendere. Er si in trigono aliquo duo tantum latera proponantur nota; et uolueris per ea habere embadi, et alterius lateris notitiam, ut in trigono .*abg.*, cuius latera .*ab.* et .*bg.* sint nota; considerandum est primum, utrum angulus contentus á notis lateribus, scilicet angulus .*abg.* sit rectus, uel minor, aut maior recto. Esto primum rectus; quare recta .*ab.* super rectam .*bg.* cathetus est. Ex ductu ergo .*ab.* in .*bg.* dimidium prouenit area trigoni .*abg.*; et si acceperimus in unum quadrata linearum .*ab.* et .*bg.* notarum, proueniet notum quadratum linee .*ag.*, cuius radix habebitur pro linea .*ag.* Sed si angulus qui sub .*abg.* est minor recto, tunc accipies in lineam .*ab.* punctum aliquod, quod sit .*d.*; á quo super lineam .*bg.* cathetus trahatur .*de.* et mensurabis latera trianguli .*deb.*; et si proportio .*be.* ad .*bg.* est equalis proportionij .*bd.* ad .*ba.*, angulus qui ad .*g.* erit rectus; quia linea .*ad.* equidistans erit lateri .*ag.*: quare si ex quadrato lateris .*ab.* auferatur quadratum lateris .*bg.*, remanebit quadratum lateris .*ag.* notum: uel quia linea .*de.* equidistans est linee .*ag.*, erit proportionaliter sicut .*bd.* ad .*ba.*, ita .*ed.* ad .*ga.*: quare si multiplicauerimus latus .*ba.* in .*ed.*; et diuiserimus sumam per .*db.*, proueniet utique latus .*ag.* notum. Verbi gratia: sit latus .*ab.* 20., et .*bg.* 12.; et sit angulus qui sub .*abg.* minor recto; et sit .*bd.* perticarum .5., et .*de.* sit .4., et .*eb.* tres: erit ergo sicut .*bd.* ad .*ba.*, scilicet sicut .5. ad .20., ita .3. ad .12., hoc est .*be.* ad .*bg.*: quare recta .*de.* equidistat recte .*ag.*; quare angulus qui sub .*agb.* est rectus, cum rectus est qui sub .*deb.*: quare si ex quadrato lateris .*ab.* auferatur quadratum lateris .*bg.*, scilicet .144 ex 400., remanebunt .256. pro quadrato lateris .*ag.*; quarum radix, scilicet .16., est longitudo lateris .*ag.*: uel si multiplicauerimus .*ba.* in .*ed.*, scilicet .20. per .4.; et diuiserimus per .*db.*, scilicet per .5., prouenient utique .16. pro latere .*ag.*; quorum dimidio ducto per .*gb.*, scilicet .8. per .12., uenient .96. pro embado trianguli. Et si proportio .*be.* ad .*bg.* fuerit minor proportione .*bd.* ad .*ba.*, ut in hoc alio trigono cernitur; tunc angulus qui sub .*agb.* erit minor recto: quare oxigonium erit trigonum .*abg.*; et á puncto .*a.* cathetus cadat inter .*bg.*; unde ut habeamus casum ipsius, fiat sicut .*bd.* ad .*ba.*, ita .*be.* ad .*bf.*; et copuletur .*af.*, quia ipsa erit cathetus super .*bg.* rectam. Verbi gratia: sit iterum .*ab.* 20., et .*bg.* 17., et erit .*bf.* 12.; cum sit sicut .*bd.* ad .*ba.*, ita .*be.* ad .*bf.*: quare per ea que dicta sunt, inuenies, cathetum .*af.* esse .16.; cuius quadratum, scilicet .256., si addiderimus cum quadrato linee .*fg.*, scilicet cum .25., habebuntur .281. pro quadrato linee .*ag.*: et si multiplicauerimus dimidium catheti .*af.* in totam .*gb.*, uenient .136. pro embado trianguli .*abg.* ET si proportio .*be.* ad .*bg.* fuerit maior proportione .*bd.* ad .*ba.*, erit angulus qui sub .*agb.* maior recto; unde cathetus a puucto .*a.* cadet extra trigonum .*abg.* Quare protrahatur linea .*bg.* in puncto .*h.*; et sit .*be.* ad .*bh.* sicut .*bd.* ad .*ba.*; et copuletur .*ah.*, qui erit cathetus, super lineam .*hb.* Verbi gratia: sit latus .*ab.* 20., et .*bg.* sit .7., et .*bd.* 5., et .*be.* sit .3., et .*de.* sit .4.; quare .*bh.* erit .12.: que reperies si multiplicationem ex .*be.* in .*ba.* diuiserimus per .*db.*; cum sit .*be.* ad .*bh.* sicut .*bd.* ad .*ba.*: et erit iterum .*ed.* ad .*ah.*, sicut .*bd.* ad .*ba.* Quare diuisa multiplicatione ex .*de.* in .*ba.* per .*db.* prouenient .16. pro catheto .*ah.*: et si ex .*bh.*, scilicet ex 12, auferatur .*bg.*, scilicet 7, remanebunt 5 pro casu .*gh.*; cuius quadratum, scilicet .25., si addatur quadrato linee .*ah.*, habebuntur .281. pro quadrato linee .*ag.*: quare latus .*ag.* est radix de .281.; et ex ducto dimidio .*ah.* in .*gb.* proueniunt .56. pro embado tri-

goni .*abg*. Et si unum tantum latus alicuius trigoni proponatur notum; et uolueris per ipsum reliquorum laterum, et ipsius embadi habere notitiam. Vt trigoni .*dez*.; cuius latus .*dz*. sit notum, accipiam in rectam .*dz*. partem aliquam, que sit .*az*.; et a puncto .*a*. super rectam .*az*. protraham lineam .*ab*. equidistantem linee .*de*.; et mensurabo lineas .*ab*. et .*bz*.; ut sint nota latera trigoni .*abz*.; et quia recta .*ab*. equidistat recte .*de*.; proportionaliter est sicut .*za*. ad .*zd*.; ita recta .*zb*. ad .*ze*.; nec non et recta .*ab*. ad .*de*. Sed proportio .*za*. ad .*zd*. est nota; quare latera .*de*. et .*ez*. erunt nota. Verbi gratia: sit .*dz*. 18., et .*az*. 6., et .*ab*. sit .7., et .*bz*. sit .3.; et sic .*zd*. ex .*za*. est tripla; quare .*de*. erit tripla ex .*ab*.; et .*ez*. ex .*bz*. similiter est tripla: ergo latus .*de*. est .21., et latus .*ez*. est .15.; et cum latera trigoni .*dez*. sint nota, erit notum embadum ipsius per ea que dicta sunt superius. Vel habeatur embadum trigoni .*abz*. per modum predictum, scilicet accipiat dimidium laterum ipsius, quod est .9.; et accipiamus differentiam laterum, que est usque in .9., scilicet .2., et .3., et .4.; et multiplicemus .2. per .3.; quod totum per .4.; quod totum per .9., erunt .216.; quorum radix est embadum trianguli .*abz*.


Et quoniam simile est trigonum .*abz*. trigono .*dez*.; erit embadum trigoni .*abz*. ad trigonum .*dez*.; sicut quadratum lateris .*za*. ad quadratum lateris .*zd*.; ut euclides ostendit: et quia latus .*dz*. est triplum ex .*az*.; erit quadratum linee .*dz*. nonuplum quadrati linee .*az*.; quare embadum trigoni .*dez*. est nonuplum trigoni .*abz*. Quare si multiplicaueris .216. per quadratum nouenarij, scilicet per .81., habebis .17496. pro quadrato embadi trigoni .*dez*.; quorum radix, que est parum plus de $\frac{1}{4}$ 132., habebitur pro embado ipsius. Diximus autem, simile esse trigonum .*abz*. trigono .*dez*.; cum ad inuicem habeant angulos equales: est enim recta .*ab*. equidistans recte .*de*.; quare angulus .*zab*. equalis est angulo .*zde*.; exterior interiori: propter eadem et angulus .*zba*. equalis est angulo .*zed*.; et habent enim angulum qui sub .*dze*. comunem; quare equiangulum est trigonum .*abz*. trigono .*dez*.; et sic ipsa trigona sunt similia.

Modus uulgaris quo uti debent agrimensores, et est sufficiens in mensuratione omnium trigonorum.

STET mentor super maiorem trigoni angulum, et aspiciat super latus maius, ubi ab ipso angulo cathetus cadere debeat; et si hoc ad oculum perfecte comprehendere nequiverit, habeat lensam fili, et figat unum caput in ipso angulo; et extendat ipsum filum in partes, in quibus cathetus cadere ei uidebitur; et producat ipsum aliquantulum extra maius latus trigoni; et tunc ducat eam lensam circiter, donec in utraque parte cum manu tanget ipsum maius latus; et signet utrumque contactum, et diuidat spatium quod fuerit inter utrumque in duo equalia, et ibi erit casus catheti: tunc mensuret cum pertica cathetum, et multiplicet eam per longitudinem dimidię basis, scilicet per medietatem maioris lateris; et habebit aream trigoni. Ad cuius euidenciam esto trigonum .*abc*. habens latus .*bc*. maius quam .*ab*.; uel quam .*ac*. Quare ab angulo .*a*. cathetus dirigendus est super latus .*bc*.; et si latus .*ab*. equalis est lateri .*ac*.; cadet cathetus in medio lateris .*bc*.; si minus cadet uersus .*b*.; et si maius cadet uersus .*c*. Vnde stabit mentor super punctum .*a*.; et considerabit ubi ab ipso puncto .*a*. cadere debeat super lineam .*bc*.: quo facto figet lensam in puncto .*a*.; et extendet eam super lineam .*bc*. uersus .*ab*. latus, cum sit minor lateri .*ac*.: sitque lensa illa .*ad*.;


fol. 26 recto.

* gratia: sit .*dz*. 18. trianguli .*abz*. * (fol. 26 recto, lin. 6-14; pag. 43, lin. 8-16).



* .*b.c*.; et si ... lineam .*b.c*. * (fol. 26 verso, lin. 4-3; pag. 43, lin. 39-42).

fol. 26 c.




tenebit cum manu lensam super punctum *d.*, scilicet aliquantulum extra trigonum ducet ipsam lensam uersus *c.*, donec *d.* punctus tangat lineam *bc.*; sitque contactus eius punctus *c.*; quare lensa *ac.* erit lensa *ad.*; deinde ducet lensam uersus *b.*, donec punctus *d.* tangat lineam *bc.*, ubi sors dediderit; sitque contactus ipsius punctus *f.*, hoc est cum lensa *af.* sit lensa *ad.*; et diuidat lineam *ef.* in duo equalia supra punctum *h.*; et a puncto *a.* in punctum *h.* protrahet lineam *ah.* Dico quoniam *ah.* cathetus est super lineam *bc.*; ideo quia equalis est linea *af.* linee *ac.*, et linea *fh.* linee *he.*; quare mensurabit cum pertica cathetum *ah.*, nec non et latus *bc.*; et multiplicabit dimidium catheti per totam basem *bc.*, uel econuerso, et habebit aream trigoni *abc.* Nam si trigonum suprascriptum *abc.* tam magnum fuerit, uel lensa quam habuerit, fiat minor catheto, aut area trigoni uineata, uel arborata fuerit, aut plena segetibus, ita quod cathetus ordine suprascripto habere non possit; tunc quot sunt pertice in latere *ab.*, tot pedes sint in linea *ai.*; similiter et quod pertice fuerint in latere *ac.*, tot pedes sint in linea *ak.*; et copuletur linea *ik.*, et inueniat cathetum cum lensa, suprascripto modo, in trigono *aik.*; sitque *al.*, et protrahet cathetum *al.* in directo supra punctum *m.*; linea uero *am.* est cathetus trigoni *abc.*, ut in geometria aperte declaratur.

*De proportionibus et accidentijs, que fiunt in trigonis
per protractionem linearum in ipsis.*


Cum duo sint nota latera trigoni; et in eis recta protrahatur equidistans reliquo lateri; et sectiones unius lateris note fuerint; tunc sectiones alterius note erunt, et linea protracta nota erit. Sit trigonum *abg.*, et in ipso protracta sit linea *de.* equidistans basi *bg.*, secansque latera *ab.* et *ag.*; et sit *ad.* 4., et *bd.* 9., et *ag.* 15., et *bg.* 14. Dico quod sectiones *ae.* et *eg.* note erunt.

Quoniam equidistans est linea *de.* linee *bg.*, proportionaliter secta sunt trigoni latera, ut Euclides in sexto libro ostendit. Est enim ut *ad.* ad *db.*, ita *ae.* ad *eg.* Ergo sicut 4. est ad 9., ita *ae.* est ad *eg.* Similiter erunt coniuncte proportionales sicut *ad.* ad *ab.*, ita *ae.* est ad *ag.*, scilicet sicut 4. ad 13., ita *ae.* ad *ag.*, scilicet ad 15. Quare multiplicatio de 4. in 15. est sicut multiplicatio de 13. in lineam *ae.*; ergo diuisis .60. per 13., ueniunt $\frac{8}{13}$ 4. pro linea *ae.*; quibus extractis ex *ag.*, scilicet de 15., remanent $\frac{5}{13}$ 10. pro linea *eg.* Vel aliter, quia permutatim est sicut *ab.*, scilicet 13., ad *db.*, scilicet 9., ita *ag.*, scilicet 15., est ad *eg.* Quare si diuiserimus nouies 15., scilicet 135., per 13., nimirum ad eadem $\frac{5}{13}$ 10. ueniemus pro linea *eg.*; uel quia est sicut 4. ad 9., ita *ae.* est ad *eg.*; diuidenda est | linea *ag.* in 4. et 9., scilicet in 13. partes, et erunt pro linea *ae.* $\frac{4}{13}$ ex tota *ag.*; et pro linea *eg.* erunt $\frac{9}{13}$ similiter ex *ag.*; quare acceptis $\frac{4}{13}$ et $\frac{9}{13}$ de 15., habebimus suprascripta $\frac{8}{13}$ 4. et $\frac{5}{13}$ 10. Sed sit *ad.* 4., et *db.* 9., et *ae.* $\frac{8}{13}$ 4.; et *eg.* sit ignota. Quoniam est sicut 4. ad 9., ita $\frac{8}{13}$ 4. sunt ad *eg.*; multiplicabis itaque 9. per $\frac{8}{13}$ 4.; et diuides per 4., exhibunt $\frac{5}{13}$ 10. pro linea *eg.*; et si ignorauerimus lineam *ae.* tantum, multiplicandum erit 4. per $\frac{5}{13}$ 10., et diuidendum per 9.; quia sicut *bd.* ad *da.*, ita *ge.* ad *ea.* Similiter demonstrabimus, lineam *de.* esse notam; cum ipsa sit equidistans linee *bg.*, erit simile trigonum *ade.* ei quod est *abg.* Quare circa equales angulos latera sunt proportionalia: est ergo sicut *ad.* ad *de.*, ita *ab.* ad *bg.* Quare si multiplicatio ex *ad.* in *bg.*, scilicet de 4. in 14., diuisa fuerit per *ab.*, egredientur $\frac{4}{13}$ 4. pro linea *de.*, que oportebat ostendere.

* lensa quam et protrahet *
(fol. 26 verso, lin. 14, 15-19;
pag. 44, lin. 10-15).



* et in ipso 60. per 13. *
(fol. 26 verso, lin. 25-31; pag.
44, lin. 21-29).




fol. 27 recto.

Volumus inuenire quantitatem lineae protractae, et terminate in notis terminis duorum laterum trigoni, quae non sit equidistans reliquo lateri. Sit idem trigonum *bag.*; et protracta sit linea *.ez.* et sit *.eb.* due tertie lineae *.ba.* et *.z.* sit in medio *.bg.*: ergo *.be.* est $\frac{2}{3} 8.$, remanet *.ea.* $\frac{1}{3} 4.$: uolumus ergo scire quantitatem *.ez.*: protrahatur cathetus *.bd.*, quam esse *.12.* superius demonstrauiamus; et est minor casus *.ad.* 5.; maior quoque *.dg.* est 9.; et per punctum *.e.* basi *.ag.* equidistans ducatur *.ei.*; et per punctum *.z.* equidistans catheto *.bd.* protrahatur *.ztk.* Et quoniam linea *.zk.* equidistans est lineae *.bd.*, est sicut *.zg.* ad *.gb.*, ita *.gk.* ad *.gd.*, et *.zk.* ad *.bd.*: sed *.gz.* ex *.gb.* est medietas. Quare *.gk.* ex *.gd.* et *.zk.* ex *.bd.* sunt medietas.

Ergo *.gk.* est $\frac{1}{2} 4.$, et remanet *.kd.* totidem, et *.zk.* est 6. Rursus protrahatur *.ef.* equidistans catheto *.bd.*; eritque sicut *.ac.* ad *.ab.*, ita *.af.* ad *.ad.*, et *.ef.* ad *.bd.* Quare *.af.* est $\frac{2}{3} 1.$, remanet *.fd.* $\frac{1}{3} 3.$, et *.ef.* est 4., scilicet tertia pars ex *.bd.* Et quoniam equidistantes sunt lineae *.ef.* et *.tk.* catheto *.bd.*; et sibi inuicem equidistantes sunt, et copulant equidistantes *.et.* et *.fk.*; quare *.tk.* est equalis *.ef.*, et *.et.* lineae *.fk.* Sed *.fk.* equatur duabus, quae sunt *.kd.* et *.df.*, hoc est $\frac{1}{3} 4.$ et $\frac{1}{3} 3.$ Quare tota *.kf.* est $\frac{5}{3} 7.$ Ergo *.te.* est $\frac{5}{6} 7.$ Similiter *.tk.* est 4, cum sit equa *.ef.*, remanet *.tz.* 2. Et quoniam in duabus equidistantibus *.ei.* et *.ag.* recta incidit *.zk.*; exterior angulus *.zte.* equalis est opposito, et interiori *.zkf.* Sed rectus *.zkf.*, cum rectus sit qui sub *.bdk.*, rectus quoque qui sub *.zte.* Orthogonium ergo est trigonum *.zte.*; et sunt duo latera nota, illa uidelicet quae continent angulum rectum. Quare tertium latus, scilicet *.ez.*, notum erit, ut prediximus; cum quadratus eius aequetur duobus quadratis linearum *.zt.* et *.te.* Nam quadratus ex *.zt.* est 4., et ex *.te.* est 61., et tertia, et trigesima sexta pars unius; quibus additis cum 4., reddent $\frac{43}{19} 65.$ pro quadrato lineae *.ez.*; quorum radix, quae est parum amplius ex $\frac{1}{19} 8.$, est quantitas lineae *.ez.*; quod oportebat ostendere. Possumus autem aliter ad notitiam

* aliter ad notitiam » (fol. 27 verso, margine inferiore verso l'angolo esterno; pag. 45, lin. 24).




linearum *.zt.* et *.te.* deuenire. Est enim trigonum *.zti.* simile trigono *.bdg.* propter rectam *.ti.*, quae est equidistans lineae *.dg.* et *.zt.* lineae *.bd.*: est enim latus *.zi.* lateri *.bg.* simile; et *.it.* lateri *.gd.*; reliquum *.zt.* reliquo *.bd.* est simile: est ergo sicut *.zi.* ad *.bg.*, ita *.it.* ad *.gd.*, et *.zt.* ad *.bd.*; est enim *.gi.* tertia pars ex *.gb.*; et *.gz.* est medietas ex *.gb.* Quare *.iz.* est sexta pars ex *.gb.*, scilicet $\frac{1}{2}$. Ergo *.zt.* est sexta ex *.bd.*, scilicet 2.; et *.it.* est sexta ex *.gd.*, scilicet $\frac{1}{2} 1.$; quo extracto ex *.ie.*, quae est $\frac{1}{3} 9.$, remanet *.te.* $\frac{5}{6} 7.$, ut prediximus.

fol. 27 verso.

Aliter protrahatur *.ic.* equidistans lineae *.bd.*; et erit trigonum *.icg.* simile trigonis

.bdg. et *.zti.* : est ergo sicut *.gi.* ad *.gb.*, ita *.gc.* ad *.gd.*, et *.ic.* ad *.bd.* Est enim *.gi.* tertia pars ex *.gb.*; et *.gc.* est tertia ex *.gd.*; et *.ic.* est tertia similiter ex *.bd.*: ergo *.gi.* est 5, et *.gc.* 3, et *.ic.* 4. Et quoniam trigonum *.zti.* simile est trigono *.icg.*, est sicut *.zi.* ad *.ig.*, ita *.ti.* ad *.cg.*: est enim *.gi.* medietas ex *.ig.*; quare *.it.* est medietas ex *.gc.* et *.zt.* est medietas ex *.ic.*; que oportebat ostendere.

Verum si lineas *.ze.* et *.ga.* extra trigonum in puncto *.h.* protraherimus; et uoluerimus scire quantitatem linearum *.ah.* et *.eh.*; ducemus lineam *.te.* in *.ef.*; et diuidemus summam in *.zt.*, et habebimus lineam *.fh.*; et hoc faciemus, quia trigonum *.zte.* simile est trigono *.efh.*: est enim *.te.* equidistans recte *.gh.*; et in eis incidit recta *.zh.* exterior angulus, qui sub *.zet.* equalis est interiori et opposito, qui sub *.ehf.*; et angulus *.zte.* equalis angulo, qui sub *.efh.*; cum ambo sint recti. Reliquus autem qui sub *.tze.* reliquo, qui sub *.feh.* est equalis. Quare est sicut *.zt.* ad *.te.*, ita *.ef.* ad *.fh.* Quare multiplicatio *.te.* in *.ef.* diuisa per *.zt.*, reddit lineam *.fh.* Vel quia permutatim est sicut *.zt.* ad *.ef.*, ita *.te.* ad *.fh.* Est enim *.zt.* medietas ex *.ef.*; quare *.te.* est medietas ex *.fh.*, hoc est *.fh.* est duplum ex *.te.* Sed *.te.* est $\frac{5}{6}$ 7; quare *.fh.* est $\frac{2}{3}$ 15; de quibus extractis *.fa.*, remanet *.ah.* 14. Item enim est sicut *.zt.* ad *.ef.*, ita *.ze.* est ad *.eh.* Quare est duplum ex *.ez.* Sed quia *.ez.* est surda, accipiemus proportionem in quadratis earum, uidelicet est sicut quadratus linee *.zt.* ad quadratum linee *.ef.*, hoc est sicut 4 est ad 16, ita quadratum linee *.ze.* est ad quadratum linee *.eh.* Quare quadratum linee *.eh.* est quadruplum quadrati linee *.ez.* Vel adde in unum quadrata linearum *.af.* et *.fh.*; et ueniet quadratum linee *.eh.* Aliter protrahatur linea *.hz.* extra trigonum, donec concurrat linee *.bl.* in puncto *.l.*; et sit *.bl.* equidistans linee *.hg.* Et quoniam equidistantes inter *.bl.* et *.hg.* incidit linea *.hl.*, angulus qui sub *.elb.* equalis est *.ei.*, qui sub *.zhg.*; et angulus qui sub *.lbz.* ei qui sub *.zgh.* est equalis; reliqui qui ad *.z.* equales sibi inuicem, qui sunt a uertice. Ergo trigonum *.lbz.* simile est trigono



fol. 28 recto.


.hgz. Quare est sicut *.gz.* ad *.zb.*, ita *.hg.* ad *.bl.*: est enim *.gz.* equalis *.zb.*; et *.hg.* equatur *.bl.* Rursus quia similia sunt trigona *.leb.* et *.eha.*, erit quidem sicut *.ae.* ad *.eb.*, ita *.ah.* ad *.bl.*, hoc est ad *.hg.* : est enim *.ae.* ex *.ab.* tertia pars. Quare *.ae.* est medietas ex *.eb.*; et *.ha.* erit medietas ex *.bl.*, hoc est ex *.hg.*; remanet *.ag.* medietas ex *.hg.* Quare *.ha.* equatur *.ag.* Sed *.ag.* est 14; quare *.ah.* erit similiter 14; et quelibet rectarum *.hg.* et *.bt.* erit 28. Nam si coniunctionem linearum *.ze.* et *.eh.* habere uolumus; quia est sicut *.zt.* ad *.ef.*, ita *.ze.* ad *.eh.* Sed *.zt.* est ad *.ef.* sicut medietas *.zt.* ad medietatem ex *.ef.*, hoc est sicut 1 est ad 2. Adiaceat quidem quidam recta *.mno.*;

sibi inuicem, . . . est trigono
(fol. 27 verso, margin inferiori;
pag. 46, lin. 25).

et sit *zni.*, et non sit *.2.* Et quia est sicut *.mn.* ad *.no.*, ita *.ze.* ad *.eh.*; et coniuncte proportionales erunt; eruntque sicut *.mn.* ad *.mo.*, ita *.ez.* ad *.zh.* Quare est sicut quadratum lineae *.mn.* ad quadratum lineae *.mo.*, hoc est sicut *.1.* est ad *.9.*, ita quadratum lineae *.ze.* est ad quadratum lineae *.zh.* Quare quadratum lineae *.zh.* erit nonuplum ex quadrato lineae *.ze.* Quare si per *.9.* multiplicauerimus $\frac{12}{28} 65.$, que sunt quadratum lineae *.ze.*, habebimus $\frac{1}{4} 588.$ pro quadrato lineae *.zh.*

Aliter quia trigonum *.zkh.* orthogonium est habens angulum qui ad *.k.*; inngantur quidem quadrata linearum *.zk.* et *.kh.*; et habebimus quadratum lineae *.zh.* Nam *.kd.* inuenta est superius esse $\frac{1}{2} 4.$, et *.da.* *.5.*, et *.ah.* *.14.*: quare tota *.kh.* est $\frac{1}{2} 23.$; cuius quadratum est $\frac{1}{4} 532.$; et quadratum lineae *.zk.* est *.36.*; et sic habemus pro quadrato lineae *.zh.* $\frac{1}{4} 588.$, ut prediximus. Rursus sit trigonum *.bgd.* cuius *.bg.* latus, ut diximus, sit *.13.*, *.gd.* *.14.*, et *.bd.* *.15.*; et emictatur *.gd.* in punctum *.a.*, et sit *.ga.* *.10.*; et super *.gb.* accipiatur punctus *.z.*; et sit *.gz.* *.5.*, remanebit *.zb.* *.8.* Queritur; si protrahatur *.az.*, et emictatur usque in *.e.*, quanta erit quantitas sectionum *.de.* et *.eb.* Ducatur quidem per *.b.* punctum linea *.bi.* equidistans lineae *.gd.*; et emictatur linea *.ae.* in punctum *.i.*, eruntque duo trigona *.bzi.* et *.azg.* sibi inuicem similia. Quare est sicut *.ag.* ad *.gz.*, ita *.ib.* est ad *.bz.* Sed *.ag.* est duplum ex *.gz.*; quare *.ib.* erit *.16.*, scilicet duplum ex *.bz.* Item quia trigonum *.aed.* simile est trigono *.eib.*, est sicut *.ad.* ad *.bi.*, ita *.de.* ad *.eb.* Nam *.ad.* ad *.bi.* est sicut octaua pars ex *.ad.* ad octauam partem ex *.bi.*: est enim *.3.* octaua ex *.ad.*, et *.2.* est octaua ex *.bi.*; ergo est sicut *.3.* ad *.2.*, ita *.de.* ad *.eb.*; et coniunctim proportionales erunt.

Quare sicut *.3.* est ad *.5.*, ita *.de.* ad *.db.* Quare *.de.* est $\frac{3}{5}$ ex *.db.*, scilicet *.9.*, et *.eb.* *.6.*; que oportebat ostendere. Sint itaque note portiones *.bz.* et *.zg.* et *.be.* et *.ed.*; et sint eodem suprascripte; et trigonum sit idem; et ignorantur *.ag.* et *.bi.*: primum quidem quia est sicut *.de.* ad *.eb.*, scilicet sicut *.3.* est ad *.2.*, ita



.ad. ad *.bi.* Ergo *.ad.* est semel *.bi.*, et dimidium eius. Rursus quia est sicut *.gz.* ad *.zb.*, scilicet sicut *.5.* est ad *.8.*, ita *.ag.* ad *.bi.* Ergo *.ag.* est $\frac{5}{8}$ ex *.bi.*: tota quidem *.ab.* inuenta est esse duodecim octaue ex *.bi.*; cum tota *.ad.* sit semel *.bi.*, et dimidium eius. Quare extractis $\frac{5}{8}$ ex $\frac{12}{8}$, remanet *.gd.* $\frac{7}{8}$ ex *.bi.* Ergo est sicut *.7.* ad *.8.*, ita *.gd.* ad *.bi.* Quare multiplicatis *.8.* per *.14.*, scilicet per *.gd.*; et diuisa summa per *.7.* Vel septimam de *.14.*, scilicet *.2.*, multiplica per *.8.*, egredientur *.16.* pro linea *.bi.*; ex quibus *.16.* acceptis $\frac{5}{8}$, egredientur *.10.* pro linea *.ag.* Item sit idem trigonum *.abg.*; et extra ipsum summatur *.d.* punctus, qui non sit indirecto lineae *.bg.*; et per *.d.* punctum protrahatur linea *.de.*


* est *.14.* quare *.ah.* ... pro quadrato lineae *.a.* (fol. 28 recto, lin. 6-15; pag. 46, lin. 31-33 — pag. 47, lin. 1-6).




* ad *.2.* ita *.a.* (fol. 28 recto, nel margine inferiore, angolo esterno; pag. 47, lin. 25).

fol. 28 verso.


* *.ad.* ad *.bi.* ... egredientur *.16.* (fol. 28 verso, lin. 1-6; pag. 47, lin. 26-31).




Et sumatur ita .gi. > fol. 28 verso, lin. 11-17; pag. 48, lin. 2-8).




sit trigonum transierit linea > (fol. 28 verso, lin. 19-23; pag. 48, lin. 9-16).



ostendere. Et si est trigonum > (fol. 28 verso, lin. 4 ab infra; pag. 48, lin. 22-27).



.bd. nota est, equidistans catheto > (fol. 29 recto, lin. 5-10; pag. 48, lin. 29-35).



equidistans basi .bg.; et sint .de. et .bg. note, remanebit .ea. nota; cum tota .ab. sit nota. Et sumatur in .ab. punctus .z. notus; et copuletur .dz.; et emictatur in punctum .i. Dico, quod proportio .gi. ad .ia. erit nota; compleatur figura. Et quoniam trigonum .dze. simile est trigono .zat., est sicut .ez. ad .za.; quorum proportio est nota, ita nota .de. est ad .ad. Quare .at. erit nota. Rursus quoniam similia sunt trigona .hzb. et .zat., est sicut .az. ad .zb., que sunt note, ita .at. nota est ad .bh. Quare .bh. erit nota posita est .bg.; ergo nota est tota .hg. Et quoniam similia sunt trigona .hig. et .iat. est sicut .hg. nota ad notam .at., ita .gi. ad .ia.; ergo proportio .gi. ad .ia. est nota, ut oportebat ostendere. Rursus sit trigonum notum .gab., cuius cathetus sit .gd.; et sumatur in ipso punctus notus .e.; et per puncta quidem .ae. protrahatur linea .aez. Dico quidem, quod proportio .bz. ad .zg. erit nota: protrahatur itaque linea .gi. equidistans linee .ab.; et producat .az. in .i., et erunt trigona .aed. et .ieg. sibi inuicem similia. Quare est sicut .de. ad .eg., ita .ad. ad .gi.; erit itaque nota .gi., cum nota sit .ad.; ad quam .gi. proportionem habet recta .ab., sicut .bz. ad .zg.: ergo proportio .bz. ad .zg. est nota; quod oportebat ostendere.

Et si punctus, per quem transierit linea ab angulo nequaquam in catheto fuerit, ut in trigono .dez., in quo datus est punctus .a. in lineam .dg., que non est cathetus, per quem punctus transit linea .eab.; et sit nota proportio .ga. ad .ad., nec non et sit nota .ge. Dico quidem, proportionem .zb. ad .bd. notam esse: eisdem dispositis. Compleatur quidem figura; et quoniam est sicut .ga. nota ad .ad. notam, ita .eg. nota ad .di. Quare .di. nota erit; et est sicut .ez. nota ad notam .di., ita .zb. ad .bd.: ergo proportio .zb. ad .bd. nota est, ut oportebat ostendere. Et si proportio sectionum linee transeunctis per punctum .a. datum, que sit equidistans catheto, nota fuerit que linea terminata sit ab una parte super basem in puncto .g., et ab alia super lineam .di. in puncto .t., ut in hac alia cernitur figura. Dico iterum, proportionem .zb. ad .bd. notam esse. Quoniam simile est trigonum | .eag. ei quod est .ait., est sicut .ga. ad .at., ita .eg. ad .ti.: protrahatur quidem in trigono .dez. cathetus .dk., et erit .dt. equalis .gk.; quia paralilogramum est quadrilaterum .dg. Quare si addatur linee .ti. equalis linee .gk., scilicet .td., erit nota tota .di.: et quoniam est sicut .ez. ad .di., ita .zb. ad .bd. Quare proportio .zb. ad .bd. nota est, ut prediximus. Et si punctus datus infra trigonum fuerit inter cathetum, et angulum, a quo per punctum extenditur linea ad latus subtendens ipsum angulum; similiter sectiones illius lateris note erunt. Sitque in trigono .abg., cuius cathetus est .ad. datus, punctus .e.; et a puncto .b. per .e. ducta est linea .bez.


Dico iterum, sectiones .gz. et .za. note erunt: protrahatur per punctum .a. linea .it. equidistans linee .bg.; et expleatur linea .bt., et per punctum .e. equidistans catheto .ad. protrahatur .hi.; et sit nota proportio .he. ad .ei.; et sint nota latera trigoni .abg., nec non et linea .bh. sit nota: et quoniam nota sunt latera trigoni .abg., notus erit et casus .bd.; de quo si extrahatur .bh. nota, reliqua .hd. nota erit. Quare et .ia. nota est, cum sit equalis .hd. propter .id. paralilogramum; et quia trigona .beh. et .eit. similia sunt, est sicut .he. ad .ei., ita .bh. ad .it.; ergo nota erit .it.; de qua si auferatur .ia., remanebit .at. nota. Et quoniam est sicut .bg. ad .at., ita .gz. ad .za. Ergo sectiones .gz. ad .za. nota erunt, ut prediximus. Similiter si per punctum datum infra trigonum a puncto dato in uno laterum trigoni linea protrahatur usque ad unum. Ex

lateribus trigoni inuenietur proportio sectionis illius lateris. Exempli causa: in trigono .bdg. sit datus punctus, punctus notus .e. in base .gd.; et infra trigonum sit datus punctus .a. Similiter notus in linea .zk., que est equidistans catheto .bi.; et per puncta .ea. linea protrahatur .et. Dico, proportionem .dt. ad .tb. notam esse: compleatur figura. Et quoniam linea .zk. equidistans est catheto .bi., et .bk. est equidistans .iz.; ergo equalis est .bk. recte .iz. et .zk. catheto .bi.: que cum sit nota, eritque nota .zk. et .za. nota est, remanet .ak. nota: et quoniam est sicut .za. ad .ak., ita .ez. ad .kh. Ergo .kh. est nota: cui si addatur .kb., scilicet .zi., que nota esse ponitur, erit .bh. nota. Et quoniam similia sunt trigona .etd. et .tbh., est sicut .ed. ad .bh., ita .dt. ad .tb.; quod oportebat ostendere. Item sit trigonum .abg., cuius .ab. sit .13., et .bg. 14., et .ag. 15.; cuius cathetus .ad. est .12.; et summatur punctus .d. extra trigonum, a quo ducatur recta .az. equidistans catheto .ad.; et sit .ez. 2., et .zb. 1.; quare .zd. erit .4.: et sumatur iterum infra trigonum punctus .i.; et sit .it. 3.; et sit equidistans catheto .ad.; et sit .tz. 9.; et per puncta .ei. protrahatur linea .eik. Dico quod proportio .gk. ad .ka. est nota: protrahatur linea .al. equidistans basi .bg.; et emittetur .eh. in puncto .l., et .i. in punctis .h. et .m.; et sit .tm. equalis .ez.; et copuletur .em.; et quoniam recte .ez. et .it. equidistantes sunt catheto .ad., erit recta .tm. equidistans recte .ze., et sunt equales sibi inuicem, erit recta .em. equalis et equidistans recte .zt.: ergo .em. est .9.; et est equidistans recte .al.; et .th. est .12., cum sit equalis .ad.: tota ergo .mh. est .14.: est enim .mi. 5., remanet .ih. 9.; est ergo sicut .mi. ad .ih., ita .em. ad .hl.; hoc est sicut .5. est ad .9., ita .9. est ad .hl.; ergo .hl. est $\frac{1}{3}$ 16. Quare tota .al. est $\frac{1}{3}$ 21. Item quia equidistans est .ez. recte .ti., similia sunt trigona .enz. et .int. Quare est sicut .ti. ad .ez., ita .tn. ad .nz. Quare .tn. est $\frac{2}{3}$ 5. Vel aliter: quia trigona .nit. et .lih. sunt similia sibi inuicem, est sicut .ti. ad .ih., hoc est sicut .3. est ad .9., ita .nt. est ad .hl.; ergo .nt. est tertia ex .hl., scilicet $\frac{2}{3}$ 5.: cui si addatur .tg., erit .ng. $\frac{2}{3}$ 9.; et est sicut .ng. ad .al., ita .gk. ad .ka.: est enim .al. $\frac{1}{3}$ 21, que sunt quinte .106., et in .gn. sunt quinte .47.; ergo sicut .47. est ad coniunctum de .47. et de .106., scilicet ad .153., ita .gk. est ad .ga., scilicet ad .15.: quare est sicut .47. ad tertiam de .153., scilicet ad .51., ita .gk. est ad tertiam de .15.; scilicet ad .5. Quare si multiplicauerimus .5. per .47., et summam diuiserimus per .51., exhibunt $\frac{1}{3} \frac{13}{17}$ 4. pro linea .gk. Reliquum quidem est usque in .15., scilicet $\frac{2}{3} \frac{6}{17}$ 10. remanebit pro .ka. Aliter emittantur linee .em. et .ag. in .o., erit sicut .eo. ad .al., ita .ek. ad .ka.: per hanc quidem proportionem inueniemus .ak., et tunc habebimus .kg.; quod oportebat ostendere.


Nam notitiam ex .go. et ex .oe. habebitur pro premissa; quia trigonum .agd. simile est trigono .afo. Item si notitiam puncti .c., per quem linea .el. secatur, cathetum .ad. habere uolumus; quia trigonum .ncd. est simile trigono .lca., est sicut .nd. ad .al., scilicet sicut due quinte sunt ad se, et ad quintas .106., scilicet sicut 2 sunt ad .108., ita .dc. est ad .da. Quare .dc. est $\frac{2}{9}$. unius integri, remanet .ca. $\frac{7}{9}$ 11. Vel si protraxerimus cathetum .nx., erit sicut .ex. ad .xn., ita .nd. ad .dc.: est enim .ef. equalis .dz., et .dn. equalis .fx. Quare .ex. nota est.

Rursus sit .ge. uice .ez. in hac alia figura, et sit 2; Latera uero trigoni et cathetus, nec non et linea .ti. sint ubi prediximus; et sit angulus .egt. rectus. Quare equidistans erit rectis .it. et .ad.: et protrahatur per puncta .ei. linea .ef. Volumus ergo


* .gz. ad .za.et. Dico 2 (fol. 29 recto, lin. 17-22; pag. 48, lin. 41-43 — pag. 49, lin. 1-4).




* catheto .ad. et copuletur .em.; (fol. 29 recto, lin. 33-35 e margine inferiore esterno; pag. 49, lin. 13-16).




* ita .9. est47. ad tertiam * (fol. 29 verso, lin. 6-12 e 14; pag. 49, lin. 21-28).



• Quare equidistans . . . remanet
ha. $\frac{3}{4}$ 2. (fol. 29 verso, lin.
 28-35; pag. 49, lin. 42, 43 —
 pag. 50, lin. 1-6).



• *d.* ad punctum . . . Sed propor-
 tio (fol. 30 recto, lin. 8-35 e
 margine inferiore esterno; pag. 50,
 lin. 12-39).




scire sectiones linearum *gb.* et *ad.*, nec non et *ab.* Emictatur quidem linea *ef.* in puncto *c.*, et linea *ti.* in puncto *l.*; et copuletur *cal.*; et sit equidistans linee *bg.*; eritque ut *eg.* ad *ti.*, ita *gz.* ad *zt.* Quare erit sicut *eg.* et *ti.* ad *ti.*, hoc est sicut *.5.* ad *.3.*, ita *gt.* ad *zt.*: ergo *zt.* erit $\frac{2}{3}$ 2., cum *gt.* sit *.4.* Item est sicut *ti.* ad *il.*, ita *zt.* ad *tc.* Quare *lc.* est $\frac{1}{3}$ 7; de qua dempta *la.*, remanet *ac.* $\frac{1}{2}$ 2. Item est sicut *td.* ad se et ad *ac.*, ita *dh.* ad *da.* Quare *dh.* est $\frac{1}{4}$ 9, remanet *ha.* $\frac{3}{4}$ 2. | Rursus quia est sicut *zb.* ad se et ad *ac.*, ita *bf.* ad *ba.*; erit ergo *bf.* $\frac{3}{7}$ 11; reliqua *fa.* erit $\frac{70}{73}$ 1.

IN TRIGONO orthogonio notorum laterum protrahatur extra trigonum latus subtendens angulum rectum per longitudinem notam; et á termino ipsius linee ad angulum rectum recta producat, erit etiam ipsa linea nota. Exempli causa: sit trigonum orthogonium *abc.* notorum laterum, habens angulum *abc.* rectum; et emittatur latus *ac.* extra trigonum in punto *d.*; et sit tota *ad.* nota; et á puncto *d.* ad punctum *b.* protrahatur recta *bd.* Dico, lineam *db.* notam esse; quod sic probatur. Protraham rectam *ab.* secundum rectitudinem in infinitum per punctum *c.*; et per punctum *d.* protraham rectam *de.* equedistantem linee *bc.*; et erit angulus *aed.* rectus; cum sit equalis angulo *abc.*: quia cum in duabus rectis equidistantibus recta incidit, erit interior angulus equalis exteriori et opposito. Nam in equidistantibus *bc.* et *ed.* recta incidit *ae.*; quare angulus *aed.* equalis est angulo *abc.*. propter eadem ergo et angulus *ade.* equalis angulo *acb.*; et angulus qui ad *a.* est comunis. Quare trigona *abc.* et *aed.* equiangula sunt, et sibi inuicem similia.

Similia uero trigona circa equales angulos latera habent proportionalia. Quare est sicut *ac.* ad *cb.*, ita *ad.* ad *de.*: permutatim ergo erit sicut *ad.* nota ad *ac.* notam, ita *ed.* ad *bc.* notam. Quare recta *ed.* erit nota. Similiter est sicut *ad.* ad *ac.*, ita *ae.* ad *ab.* notam. Quare recta *ae.* erit nota: de qua si auferatur recta *ab.* nota, remanebit recta *be.* nota; cuius quadratum si addatur cum quadrato linee *de.*, egredietur quadratum linee *bd.* notum: et sic ostenditur, lineam *bd.* esse notam, ut predixi. Ex hac quidem figura egreditur solutio subscriptę questionis mihi proposita á quodam ueronense. qui proposuit, arborem quamdam erectam esse prope ripam cuiusdam fluminis; et fuit longitudo arboris pedum *.40.*: quam longitudinem pono lineam *bg.*; et spatium, quod erat á pede arboris usque ad flumen, posuit esse pedum *.5.*; quod spatium posui lineam *bc.*; et fuit in arbore *bg.* acceptus punctus quidam *a.*; et fuit *ba.* *10.* pedum; et in puncto *a.* secta fuit arbor, et cecidit superior pars *ag.*, que erat *.30.* pedum super lineam *ad.* tangens punctum *c.*; et fuit linea *ad.* *30.*: petijt quanta esset quantitas lineę *db.* egredientis á puncto summitatis arboris usque ad punctum pedis ipsius. Vnde cum uellem hanc questionem soluere, intellexi figuram suprascriptam; et aggregaui quadrata linearum *ba.* et *bc.*, hoc est *.100.* et *.25.*, et habui *.125.* pro quadrato lineę *ac.*: et quia erat sicut *ad.* ad *ac.*, ita *ed.* ad *bc.*, fuit sicut quadratum lineę *ad.* ad quadratum lineę *ac.*, hoc est sicut *.900.* ad *.125.*, ita quadratum lineę *ed.* ad quadratum lineę *bc.*, quod est *.25.* Sed proportio | de *.900.* ad *.125.* est in minimis numeris sicut *.36.* ad *.5.*; ergo est sicut *.36.* ad *.5.*, ita quadratum lineę *ed.* ad *.25.*: permutatim ergo fuit *.36.* ad quadratum lineę *ed.*, sicut *.5.* ad *.25.* Sed *.5.* de *.25.* est quinta pars; quare *.36.* fuit $\frac{1}{5}$ quadrati lineę *ed.* Quare multipicaui *.36.* per *.5.*, et habui *.180.* pro quadrato lineę *ed.*: quod quadratum extraxi ex quadrato lineę *ad.*, scilicet de

.900., remanserunt .720. pro quadrato linee .ae.: vel aliter quia est sicut .ad. ad .ac., ita .ae. ad .ab.: fuit ergo sicut .36. ad .5., ita quadratum linee .ea. ad quadratum linee .ba., hoc est ad .100.: quare permutatim est sicut .5. ad .100., ita .36. ad quadratum linee .ae. Quare multiplicanda sunt .36. per .20.; quia .5. sunt $\frac{1}{20}$. de .100.; et habentur similiter .720. pro quadrato linee .ae.; ergo .ae. fuit radix de .720.: de qua extraxi lineam .ab., que est .10., remansit mihi radix de .720. minus .10. pro linea .eb.: quam multiplicavi in se, et habui .820. minus radice de .288000. pro quadrato linee .eb.; cui addidi quadratum linee .ed., quod est .180., et habui .1000. minus radice de .288000. pro quadrato linee .bd. Quare .bd. est radix de .1000. minus radice de .288000. Et ut hec reducerem ad numerum ratiocinatum, accepi radicem de .288000., quam inveni esse $\frac{2}{3}$ 536. minus $\frac{4}{9}$; quam etiam extraxi de .1000., remanserunt $\frac{41}{92}$ 463.: de quibus etiam accepi radicem, et habui $\frac{1}{3}$ 21., et unam quadragesimam unius pedis pro quantitate linee .bd. Nec etiam pretermittendum est demonstrare uiam habendi quadratum linee .eb., que recisum uel abscisio, seu residuum nuncupatur; cum sit differentia, que est inter duas lineas potentia solum commensurabiles, scilicet inter .ae. et .ab. rectas; quarum .ae. est radix numeri ratiocinati, scilicet de .720., et .ab., que est .10., est numerus. Et quoniam recta .ae. diuisa est in duo in puncto .b. Quadrata linearum .ae. et .ab. equantur duplo multiplicationis .ab. in .ae., et quadrato linee .eb., ut superius demonstratum est: ergo si ex quadratis linearum .ae. et .ab., scilicet ex .720. et ex .100., hoc est de .820. auferatur duplum multiplicationis ex .ab. in .ae.; quod duplum est equale .20. radicibus de .720.; que etiam equantur uni radici numeri prouenientis ex multiplicatione quadrati de .20., hoc est de .400. in .720.; et qui numerus est .288000., remanebunt .820. minus radice de .288000., ut superius demonstraui. Rursus si in trigono .abg. ab angulis .gb. egrediantur recte .be. et .gd. se inuicem secantes super punctum .z.; et sit nota proportio ex .ge. ad .ea., et ex .bd. ad .da., erunt utique note proportionibus .bz. ad .ze. et .gz. ad .zd. Sed antequam hec demonstrare possimus, oportet nos tractare de compositione proportionum ex duabus, uel pluribus proportionibus. Nam illa proportio composita dicitur, que prouenit ex multiplicatione omnium antecedentium ad multiplicatum omnium consequentium duarum, uel plurium proportionum. Verbi gratia: ex proportione, quam habent .2. ad .3., et ex ea quam habent .4. ad .5. componitur proportio ex .8. ad .15.; cum ex multiplicatione de .2. in .4. prouenient .8.; ex .3. in .5. uenient .15. Item ex proportione quam habent .2. ad .3. et .4. ad .5. et .6. ad .7. componitur | proportio quam habent .48. ad .105.: cum ex multiplicato omnium antecedentium prouenient .48, scilicet ex 2. in .4. productam in .6.; et ex multiplicato consequentium, scilicet ex .3. in .5. ducto in .7., ueniunt .105.; sed proportio de .48. ad .105. est illa in minimis numeris, quam habent .16. ad .35. Et est intellectus talis compositionis, quod inter .16. et .35. cadunt tres numeri in proportionibus suprascriptis, uidelicet sicut .2. ad .3., ita .16. ad .24.; et sicut .4. ad .5., ita .24. ad .30.; et sicut .6. ad .7., ita .30. ad .35. Ex his enim procedit compositio proportionis duarum quantitatum, uel duorum numerorum: cum inter ipsas quantitates eiciatur quantitas aliqua, erit tunc proportio prime quantitatis ad secundam composita ex proportione, quam habet prima quantitas ad eiectam, et ex ea quam habet quantitas eiecta ad secundam. Cuius exemplum ponamus in numeris: sint .7. eiecta inter .3. et .10. Dico quod proportio de .3. ad .10. componitur ex ea quam habet .3. ad .7., et ea quam

* uni radici . . . prouenient .8. *
(fol. 30 verso, lin. 25-34; pag. 51,
lin. 21-31).



fol. 81 recto.


habent .7. ad .10. Nam multiplicatio ex antecedentibus ad multiplicatum ex consequentibus fit sicut .3. ad .10.; quam si multiplicauerimus insimul antecedentes, scilicet .3. per .7., prouenient .21.: et si multiplicauerimus insimul consequentes, scilicet .7. per .10., proueniunt .70.: proportio quidem de .21. ad .70. est proportio septimo partis de .21. ad septimam partem de .70.; et est illa quam habent .3. ad .10., ut diximus. Similiter inter duas quantitates possunt eici due, uel plures quantitates; et erit proportio ipsarum duarum quantitarum composita ex ipsis proportionibus: ut si inter .3. et .10. eiciantur .5. et .6. et .7., erit proportio de .3. ad .10. composita ex proportione, quam habent .3. ad .5., et ex eis quam habent .5. ad .6., et .6. ad .7., et .7. ad .10.

His optime intellectis, oportet nos etiam demonstrare, quomodo et ex proportione data extrahatur proportio aliqua: ut si uolueris ex proportione quam habent .7. ad .8., extrahere proportionem quam habent .6. ad .5.; multiplicabis antecedens proportionis, de qua extrahenda est proportio, per consequens proportionis extrahendę, scilicet .7. per .5., prouenient .35. pro antecedente proportionis residuo: et multiplicabis antecedens extrahendę proportionis per consequens, de qua extrahitur proportio, scilicet .6. per .8., crunt pro consequente residuo questionis: ergo si ex proportione quam habent .7. ad .8. auferatur proportio de .6. ad .5., remanebit utique proportio de .35. ad .48. Vnde si addiderimus proportionem quam habent 6 ad 5, et 35 ad 48, proueniet proportio quam habent .210. ad .240.; et est ipsa eadem quam habet trigesima pars unius ad trigesimam partem alterius, scilicet .7. ad .8. His itaque intellectis, oportet nos ostendere, antequam redeamus ad propositum, quomodo proportio quam habet in suprascripto trigono .*abg.* recta .*ga.* ad .*ea.* componatur ex proportione, quam habet tota reflexa .*gd.* ad partem suam .*zd.*, et ex proportione quam habet .*bz.* ad .*be.*; et est ista demonstratio, que uocatur cata coniunctum: a puncto quidem .*e.* protrahatur recta .*ei.* equidistans linee .*gd.*, ut in hac alia ostenditur figura; et erit trigonum .*aie.* simile trigono .*adg.* Quare | erit sicut .*ga.* ad .*ae.*, ita .*gd.* ad .*ei.*: eiciatur itaque recta .*zd.* inter .*gd.* et .*ei.*; et erit per ea, que supra diximus, proportio .*gd.* ad .*ei.* composita ex proportione .*gd.* ad .*dz.* et ex .*dz.* ad .*ei.* Sed proportio .*zd.* ad .*ei.* est sicut proportio .*bz.* ad .*be.*, cum simile sit trigonum .*bzd.* trigono .*bei.*, cum .*zd.* equidistet recte .*ei.*: ergo proportio .*gd.* ad .*ei.* componitur ex proportione .*gd.* ad .*dz.* et .*bz.* ad .*be.* Sed proportio .*gd.* ad .*ei.* est sicut proportio .*ga.* ad .*ae.*; ergo proportio .*ga.* ad .*ae.* componitur, ut diximus, ex proportione .*gd.* ad .*dz.* ex .*bz.* ad .*be.* Dico iterum quod proportio .*ga.* ad .*ae.* componitur ex proportione .*gd.* reflexa ad reflexam .*be.*, et ex ea quam habet .*bz.* ad .*zd.*; quoniam equalis est proportio .*gd.* ad .*ei.* proportioni .*ga.* ad .*ae.* Si inter proportionem quam habet .*gd.* ad .*ei.* eiciatur recta .*be.*, erit proportio recte .*ga.* ad .*ae.* composita ex proportione quam habet .*gd.* ad .*be.*, et .*be.* ad .*ei.* Sed proportio .*be.* ad .*ei.* est sicut proportio .*bz.* ad .*zd.*; ergo proportio .*ga.* ad .*ae.* componitur ex proportione .*gd.* ad .*be.*, et ex .*bz.* ad .*zd.*; quod oportebat ostendere.

Nam semper contingit, cum aliqua proportio composita fuerit ex duabus proportionibus, erit etiam ipsa eadem proportio composita ex proportione antecedentium ad permutatos consequentes. Verbi gratia: proportio de .8. ad .15. est composita ex proportione quam habet .2. ad .3., et .4. ad .5.; erit etiam proportio de .8. ad .15. composita ex permutatis proportionibus, sicut ex ea quam habet .2. ad .5., et ex ea quam habet

fol. 31 verso.


* *gd.* ad .*dz.* ad .*ei.* Sed *
(fol. 31 verso, lin. 3-12; pag. 52,
lin. 27-36).




.4. ad .3.; quia multiplicatio de .3. in .5. equa est multiplicationi de .5. in .3.; et sunt .3. et .5. in utraque compositione consequentes; et .2. et .4. sunt antecedentes. Simili quoque modo ostendetur, quod proportio .ba. ad .ad. componitur ex proportione .be. ad .ez.; et ex ea quam habet .gz. ad .gd.; si protraxerimus infra trigonum a puncto .d. lineam equidistantem lineae .be.; et sic ex proportione quam habet .ga. ad .ae. ostensa est una concubinatio compositarum proportionum. Rursus dico, quod proportio .bd. ad .da. componitur ex proportione .bz. ad .ze., et ex proportione .ge. ad .ga.; quod sic probatur: a puncto quidem .a. protrahatur recta .at. equidistans lineae .be., ut in hac alia cernitur figura, que cata dicitur disiunctum; et emictatur recta .gd. usque ad punctum .t.; et quia equidistantes sunt recte .at. et .zb.; et in eis incidit recta .ab., equalis est angulus, qui sub .tad. angulo, qui sub .dbz.: propter eadem et angulus qui sub .atd. equalis est angulo, qui sub .dzb.; et anguli qui ad .d. cum sint a uertice sibi inuicem sunt equales: ergo equiangula sunt trigona .atd. et .dbz., et circa equales angulos habent latera proportionalia: quare erit sicut .db. ad .bz., ita .da. ad .at.: permutatim ergo erit sicut .bd. ad .da., ita .bz. ad .at.: eiciamus ergo rectam .ze. inter .zb. et .at.; erit tunc proportio .bz. ad .at., hoc est proportio .bd. ad .da. composita ex proportione, quam habet .bz. ad .ze., et ex ea quam habet .ze. ad .at., hoc est .ge. ad .ga.; cum simile sit trigonum .gez. trigono .gat.: ergo proportio .bd. ad .da. componitur ex proportione .bz. ad .ze., et .ge. ad .ga. Vel proportio .bd. ad .da. componitur ex proportione .bz. ad .ga., et ex proportione .ge. ad .ez.; quod sic ostenditur: inter .bz. et .at. eiciatur recta .ga., erit proportio quidem .bz. ad .at. composita ex proportione .bz. ad .ga., et ex proportione .ga. ad .at. Sed proportio .ga. ad .at. est sicut proportio .ge. ad .ez.; ergo proportio .bz. ad .at., hoc est proportio .bd. ad .da. componitur ex proportione .bz. ad .ga., et ex proportione .ge. ad .ez.; quod oportebat ostendere. Et sic ostensa est una combinatio compositionis proportionis .bd. ad .da. Similiter ostendetur, quod proportio .ge. ad .ea. componitur ex proportione .gz. ad .zd., et ex proportione .bd. ad .ba.: si protraxerimus a puncto .a. equidistantem lineae .gd., et copulauerimus eam cum linea .be. NVNC reuertamur ad propositum; et ostendam, quod si proportionem .ge. ad .ea., et .bd. ad .da. fuerint note; eruntque utique proportionem .bz. ad .ze. et .gz. ad .zd. note. Cum itaque proportio quam habet .ge. ad .ea. nota componatur ex proportione quam habet .gz. ad .zd., et ex proportione quam habet .bd. ad .ba. Si ex proportione quam habet .ge. ad .ea. auferatur proportio .bd. ad .ba., que est nota, remanebit nota proportio .gz. ad .zd. Similiter si ex proportione quam habet .bd. ad .da. auferatur proportio .ge. ad .ga., remanebit nota proportio .bz. ad .ze.: que omnia ut clarius uideantur, ponamus lineam .ag. esse 16, et lineam .ab. esse .15.; et sit .ge. tertia pars ex .ea.; et .bd. sit dimidium ex .da.; erit ergo proportio .ge. ad .ea. sicut 1 ad 3: de qua si extrahatur proportio .bd. ad .ba., scilicet ea quam habet 1 ad 3, remanebit proportio .gz. ad .zd., sicut .3. ad .3.; quare equalis est recta .gz. recte .zd.; et sic proportio .gz. .zd. inuenta est nota. Similiter si ex proportione quam habet .1. ad .2., scilicet .bd. ad .da., extraxerimus proportionem quam habet .1. ad .4., scilicet .ge. ad .ga., remanebit proportio, quam habet .2. ad .1., proportione .bz. ad .ze. Et quanuis proportionem sectionum reflexarum sint note, tamen longitudines ipsarum reflexarum habere non possumus nisi per basis notitiam; quam ponamus esse radicem de .97.; et studeamus super latus

fol. 32 recto.

ad .ze., ... et ex proportione .
(fol. 32 recto, lin. 3-10 et 11;
pag. 53, lin. 19-26.)




inuenta est ... quod est .16. .
(fol. 32 recto, lin. 24-32; pag.
53, lin. 39-43 — pag. 54, lin. 1-4).



.*ag.* inuenire casum perpendicularis cadentis super eam ab angulo *b.*; et inueniemus ipsum esse, per ea que demonstrata sunt inuentione casuum, punctum *e.*; quare recta *be.* cathetus est super rectam *ag.* Orthogonia ergo sunt trigona *beg.* et *eba.*: quare si quadratum lateris *eg.*, quod est *.16.*, auferatur ex quadrato linee *bg.*, scilicet de *.97.*, remanebunt *.81.* pro quadrato linee *be.*; quare recta *be.* est *.9.*: et quia *bz.* ad *ze.* est sicut *.2.* ad *.4.*; si coniungerimus proportionem *bz.* ad *ze.*, inueniemus ipsam sicut *.3.* ad *.4.* Quare | recta *be.* tripla est recte *ze.*: quare cum *be.* sit *.9.*, erit *ze.* *3.*, et *zb.* erit *.6.* Item ut inueniamus longitudinem recte *gd.*, faciemus cadere cathetum a puncto *g.* super lineam *ab.*, que sit linea *gk.*; et erit notus casus *bk.* per ea que demonstraui in inuentione casuum: quare *kd.* remanebit nota, et erit $\frac{4}{5} 2.$: unde si ex quadrato linee *gb.* extraxerimus quadratum linee *bk.*, que est $\frac{4}{5} 2.$, remanebunt pro quadrato linee *gk.* $\frac{4}{5} 92.$; quibus si addiderimus quadratum linee *dk.*, scilicet *.8.* minus $\frac{4}{5} 3.$, uenient *.100.* pro quadrato linee *gd.*; ergo linea *gd.* est *.10.*: quare quelibet rectarum *gz.* *zd.* est *.5.*, cum ambe sibi inuicem inuente sint equales. Iterum sine base reiteretur figura trigoni supradicti, dico quod proportio *gd.* ad *dz.* componitur ex duabus proportionibus linearum *ga.* ad *ae.*, et *be.* ad *zb.*; quod sic probatur. In puncto quidem *z.* protraham lineam *zi.* equidistantem linee *ga.*; et erit trigonum *dzi.* simile trigono *dga.*; quare proportionaliter est sicut *gd.* ad *dz.*, ita *ga.* ad *zi.*: et eiciatur *ae.* inter *ga.* et *zi.*; et erit proportio *ga.* ad *zi.* composita ex proportione *ga.* ad *ae.*, et ex *ae.* ad *iz.* Sed proportio *ea.* ad *zi.* est sicut proportio *eb.* ad *zb.*, cum simile sit trigonum *bzi.* trigono *bea.*; ergo proportio *ga.* ad *zi.*, hoc est proportio *gd.* ad *dz.*, componitur ex proportione *ga.* ad *ae.*, et ex proportione *eb.* ad *zb.*; quod oportebat ostendere. Ex hoc ergo manifestum est, quod quando proportio duarum quantitatum componatur ex proportione tertie quantitatis ad quartam, et ex proportione quinte quantitatis ad sextam; tunc proportio tertie quantitatis ad quartam erit composita ex proportione prime quantitatis ad secundam, et sexte ad quintam: fuit enim proportio prime quantitatis *ag.* ad secundam *ae.* composita ex duabus proportionibus, scilicet ex ea quam habet tertia quantitas *gd.* ad quartam *zd.*, et ex proportione quinte *bz.* ad sextam *be.*: modo inuenimus, proportionem tertie quantitatis *gd.* ad quartam *zd.* compositam esse ex proportione prime quantitatis *ga.* ad secundam *ae.*, et ex proportione sexte quantitatis *be.* ad quintam *bz.* Ostendam rursus in eadem figura, quod proportio *gd.* ad *dz.* componitur ex proportione *ga.* ad *zb.*, et ex proportione quam habet *be.* ad *ae.*; quod sic probatur: est enim sicut *gd.* ad *dz.*, ita *ga.* ad *zi.*: adiaceat quidem recta *zb.* inter *ea.* et *zi.*; et erit proportio *ga.* ad *zi.* composita ex *ga.* ad *zb.*, et ex *zb.* ad *zi.*: si proportio *bz.* ad *zi.* est sicut proportio *be.* ad *ea.*; ergo proportio *ga.* ad *zi.*, scilicet proportio *gd.* ad *dz.* componitur ex proportione *ga.* ad *zb.*, et ex proportione *be.* ad *ea.*, ut prediximus: et sic in hac figura ostensa est alia combinatio proportionum. Sunt enim decem et octo combinationes proportionum, que ostendi possunt in hac figura cata, et quas etiam in libro meo in regula baracti demonstraui. Sed quia ex his | colligitur tantum scientia habendi notitiam alicuius ignote quantitatis per notitiam quinque quantitatum notarum; ex quibus sex quantitibus proportio unius ad aliam componatur ex duabus proportionibus reliquarum quatuor quantitatum, non curo reliquas combinaciones ostend-

fol. 32 verso.

* *ga.* ad secundam ... hac figura *
(fol. 32 verso, lin. 26-34; pag. 54, lin. 30-39).



fol. 38 recto.

dere. Sed qualiter ad notitiam quantitatis ignotę per quinque quantitates notas uenire debeamus, ex ordine cum suprascriptis numeris demonstrare curauimus. Sit itaque proportio primę quantitatis *a.* ad secundam *b.* composita ex proportione tertię quantitatis *g.* ad quartam *d.*, et ex proportione quintę quantitatis *e.* ad sextam *z.*; et sit ignota quantitas *a.*: et quia proportio *a.* ad *b.* prouenit ex proportione multiplicati antecedentium duarum reliquarum proportionum ad multiplicatum duarum consequentium earundem, erit multiplicatio multiplicati ipsarum antecedentium in quantitatem *b.* equalis multiplicationi ipsarum consequentium in quantitatem *a.* Quare si multiplicauerimus multiplicationem ex *e.* in *g.*, que sunt quantitates antecedentes, per quantitatem *b.*; et diuiserimus summam per factum ex multiplicatione *d.* in *z.*, que sunt consequentes, prouenit utique quantitas *a.* nota. Verbi gratia: sit *a.* 16., et *b.* sit 12., et *g.* sit 10., et *d.* sit 5., et *e.* sit 6., et *z.* sit 9.; et multiplicentur 6. per 10., scilicet 60. in *g.*, uenient 60.; quibus ductis in 6., scilicet in 12., prouenient 720. Similiter si multiplicauerimus 9. per 5.; quod totum per 16., prouenient 720. ergo cum equalis sit multiplicatio ex *e.* in *g.* ducta *b.* multiplicationi *z.* in *d.* ducta in *a.*; si multiplicationem ex *z.* in *d.* diuiserimus factum ex multiplicatione ex *e.* in *g.* ducta in *b.*, scilicet 720. per 45., prouenient utique 16. pro quantitate *a.* Sed si quantitas *b.* ignota; et relique quinque quantitates sint note; diuiserimus 720., que proueniunt ex 9. multiplicatis in 5.; quod totum in 16. per 60., que proueniunt ex 6. multiplicatis in 10., prouenient 12. pro quantitate *b.* Sed sit ignota quantitas 9.; diuidemus iterum 720., que proueniunt ex *a.* in *d.* et in *z.* per factum ex *b.* in *e.*, scilicet per 72., prouenient 10. pro quantitate *g.* Sed sit ignota tantum quantitas *d.*; diuidemus iterum 720., que proueniunt ex *e.* ducta in *g.*; quod totum in *b.* per factum ex *a.* in *z.*, scilicet 44., prouenient 5. pro quantitate *d.*

Rursus sit tantum ignota quantitas *e.*; diuidemus iterum 720. que proueniunt ex *z.* in *d.* et in *a.* per factum ex quantitatibus *bg.*, scilicet per 120., prouenient *b.* pro quantitate *e.* Ad ultimum sit ignota quantitas *z.*; et relique quantitates sint note; diuidentur iterum 720., que proueniunt ex *e.* in *g.* ducta in *b.* per factum ex *a.* in *d.*, scilicet per 80., prouenient 9. pro quantitate *z.* Et notandum, quod quantitates *adz.* uocantur societates prime. Relique uero tres quantitates, scilicet *bge.*, uocantur societates secunde. Componitur quidem proportio unius cuiuscumque quantitatis prime societatis ad unamquamque secundę ex duabus | proportionibus reliquarum quatuor quantitatum, secundum unam combinationem, uidelicet proportio quantitatis *a.*, que est ex societate quantitatis primę ad quantitatem *b.*, que est ex societate secunde componitur ex duabus proportionibus reliquarum quatuor quantitatum, scilicet ex proportione, quam habet *g.* ad *d.*, et ex ea quam habet *e.* ad *z.*, secundum quod demonstratum est: uel componitur proportio *a.* ad *b.* ex proportione quam habet *g.* ad *z.*, et *e.* ad *d.* Item componitur proportio quantitatis *a.* ad quantitatem *z.* ex proportionibus *b.* ad *d.* et *e.* ad *z.* Vel ex proportione quam habet *b.* ad *z.* et *e.* ad *d.* Componitur etiam proportio quantitatis *a.* ad quantitatem *e.* ex proportionibus *b.* ad *z.* et *g.* ad *d.*, uel ex proportionibus *b.* ad *d.* et *g.* ad *z.* Simili quoque modo componitur proportio quantitatum *dz.*, que sunt ex societate prime ad tres quantitates reliquas ex proportionibus quatuor reliquarum quantitatum; et sic sunt nouem

ad quartam *d.* ... sit 5., et *e.* ...
(fol. 33 recto, lin. 8-15; pag. 55,
lin. 4-12).

prima.	tertia.	quinta
16.	10.	6
a	g	e
secta	quarta	sexta
12.	5.	9
b	d	z

fol. 33 verso.

proportiones composite ex tribus quantitatibus societatis primę ad tres quantitates societatis secundę : eodemque modo egredientur alie nouem compositiones proportionis ex quantitatibus societatis secundę ad tres societates quantitatis primę ; et quelibet ipsarum compositionum proueniet combinata; et sic erunt inter omnes decem et octo combinationes proportionum in ipsis sex quantitatibus: et quanuis mutantur proportiones, tantum non uocantur societates predictę: quare multiplicatum unius cuiusque societatis erit 720, ut superius inuenimus; et est illud quod procedit ex antecedente composite proportionis in consequentes compositionum. Non enim aliqua ex sex quantitatibus predictis proportionem compositam habere poterit ad aliquam ex sua societate ex proportione reliquarum quatuor quantitatum, uidelicet proportio quantitatis .a. ad quantitatem .d., uel ad quantitatem .z. componi non potest ex proportionibus reliquarum quatuor quantitatum; nec etiam proportio quantitatis .d. ad quantitatem .z.; uel ad quantitatem .z. componitur; neque proportio quantitatis .z. ad quantitatem .d.a. componi poterunt ex reliquis quatuor quantitatibus.


Similiter non componetur proportio quantitatum .b.g.e. inter se, cum sint unius societatis; et sic erunt duodecim proportiones in his sex quantitatibus, que non componuntur ex duabus proportionibus reliquarum quatuor quantitatum. His itaque explicatis, ueniamus ad mentionem quadrilaterorum camporum.

*Incipit pars secunda tertię distinctionis
de mensuratione quadrilaterorum.*

fol. 24 recto.

AREE quidem camporum quadrilaterorum rectos angulos habentium colliguntur, secundum quod superius in alia distinctione docuimus. Qui cum habent latera equalia, multiplicatur unum ex lateribus in se; et cum habent latera inequalia, multiplicantur | longitudines ipsorum per latitudines; et sic habemus embadum ipsorum. Reliqua uero quadrilatera in quatuor differentias diuiduntur; in prima quarum sunt rumbi, in secunda rumboides, in tertiã capita abscissa, que duo tantum latera habent equidistantia; in quarta sunt diuersilatera, quorum nullum laterum reliquis equidistat; quorum omnium mensurationes aperte in suo loco monstrabuntur. Sed antequam ad dimensiones ipsorum quadrilaterorum ueniamus, quedam super prescriptis quadrilateribus, que ad notitiam huius artis animum introducunt, proposui demonstrare. Que pertinent ad solutionem sex regularum, que ueniunt ex tribus essentijs, que sunt in numeris. Sunt enim numeri et fractiones eorum, aut radices quadratorum, aut quadrati, aut numeri simplices. Quando numeri in se multiplicantur radices dicuntur facti ex multiplicatione quadrati, seu census appellantur. Cum autem numeri non habent respectum ad radices uel ad quadratos numeros, tunc simpliciter numeri uocantur. Quare secundum hanc distinctionem omnis numerus est quandoque radix, uel quadratus, uel simplex. Nam ex hiis tribus essentijs tres regule simplices, totidemque composite proueniunt. Simples enim sunt quando in questionibus arithmetiis uel geometricis inueniuntur, radices equari quadratis, uel numero quadrati, uel partes unius quadrati equari radicibus, uel numero. Vel cum numerus equatur radicibus, uel quadratis et econuerso. Composite quidem sunt quando inueniuntur, radices equari quadratis et numero, uel quadrati radicibus et numero, aut numerus radicibus et censibus. Quadratum autem quod radicibus equatur est ac si dicas. Quadratum equatur quatuor radicibus; radix ergo

quadrati est .4.; et quadratum est .16., hoc est latus superficiei quadrate et equilaterae et equiangule est .4.; et eius embadum est .16. Nam quot unitates sunt in unoquoque laterum ipsius, tot radices in eius embado continentur, ut in hoc quadrilatero *abcd.* ostenditur, quod habet in unoquoque laterum perticas .4. Quare embadum eius equatur quatuor radicibus, quarum una est quadrilaterum *ae.*; secunda *zt.*; tertia *ik.*; quarta quadrilaterum *lk.cd.*: et si latus quadrati fuerit .5., equabitur radicibus; et erit quadratum .25. Et cum dicitur: quatuor quadrati equantur .24. radicibus, tunc unum quadratum equatur sex radicibus; et unaquæque radix est .6., et quadratus est .36.: et cum dicitur: medietas quadrati, siue census equatur quatuor radicibus, tunc census equabitur .8. radicibus; et erit census .64., et radix eius erit .8. Item quinta pars quadrati equatur tribus radicibus; ergo quadratum, scilicet embadum eius, equatur .15. radicibus. Quare embadum est .225., et latus quadrati est .15. Similiter quoque quod fuerit maius quadrato



aut minus, ad unum reducendum est quadratum. Et eodem modo fit quando radices equantur censibus, inueniende sunt radices, que equantur uni censui. Item quando dicitur: quadratum equatur numero, ut dicamus perticis .36.; tunc embadum est .36., et eius latus est .6.: et cum quinque quadrata equentur .125., tunc quadratum est .25., et eius radix est .5.: uel cum quarta pars quadrati equetur secundum arithmetricam dragmis .16.; tunc census, scilicet quadratum, erit .64., et eius radix est .8.


Similiter omnis census augmentatus et diminutus ad unum reducendus est censum. Et eodem modo fit quando numerus equatur censibus. Radices uero que numeris equantur, est sicut si dicas: radix equatur quatuor; ergo radix est .4.; et census qui est ex ea est .16.: et sicut si dicas: sex radices equantur .30.; una igitur radix equatur .5.: et similiter si dicas: medietas radices equatur .9.; ergo radix est .18.; et census qui est ex ea est .324. Radices siquidem, que equantur quadratis et numero sunt ac si dicas: .36. radices equantur tribus censibus et .105. dragmis; hoc .12. radices equantur uni censui, et dragmis .35.: et si dicas: .5. radices equantur dimidio censui, et dragmis .12.; hoc radices .10. equantur uni censui et .24. dragmis. Quadrata autem que equantur radicibus et numero sunt ac si dicas: tria quadrata equantur .12. radicibus et dragmis .36.; hoc unus census equatur .4. radicibus et .12. dragmis: et si dicas: quarta census equatur duabus radicibus et .12. dragmis; hoc est quadratus equatur octo radicibus et dragmis .48. Numerus quoque qui equatur quadratis et radicibus est ac si dicas: .78. dragme equantur duobus quadratis et .10. radicibus; hoc est unum quadratum et .5. radices equantur .39. Et si dicas: .32 equantur dimidio quadrati et sex radicibus; hoc est unum

* quadrato * (fol. 34 recto, lin. ult. margine inferiore interno ed esterno; pag. 57, lin. 12).

fol. 34 verso.

quadratum, et duodecim radices equantur .64. dragmis: et sic semper debemus questiones redigere ad unum censum; et secundum illud quod proportionaliter ceciderit reductio plurium quadratorum, uel partes unius quadrati ad unum quadratum in eadem proportione reducende sunt radices et numeri, qui cum quadratis, uel contra eos proponentur, ut ueniamus ad notitiam quadratorum et radicum eorum, ut in sequentibus ostendemus. Si in quadrato quidem *abgd.*, quod in singulis lateribus habet perticas .10., dyametrum eius *ag.*, uel *bd.* habere desideras, ipsius embadum, scilicet .100., duplica, erunt .200.; quorum radicem accipe, et habebis longitudinem unius dyametrorum. Verbi gratia: quoniam rectus est angulus, qui sub *abg.* orthogonium est est, trigonum *abg.*; quare multiplicatio lateris *ag.* in se, quod recto sub tenditur angulo, equatur duobus quadratis linearum *ab.* et *bg.* Sed quadratum lateris *bg.* est embadum tetragoni *abgd.*; et quadratum lateris *ab.* equatur quadrato lateris *bg.*; quare duo quadrata linearum *ab.* et *bg.* dupla sunt quadrato

* quadrato lateris *a* (fol. 34 verso, lin. ultima, margine inferiore interno ad externo; pag. 58, lin. 12-13).




fol. 35 recto.

lateris *bg.* Sed quadratum dyametri *ag.* equum est quadratis linearum *ab.* et *bg.*; ergo quadratum dyametri *ag.* duplum est quadrati lateris *bg.*; sed quadratum lateris *bg.* est area tetragoni *abgd.*; ergo quadratum lateris *ag.* duplum est embado tetragoni *abgd.*; quod oportebat ostendere.


Et est id in quo census equatur numero, scilicet embadum equatur 100. Quare duplum embadi, scilicet quadratum dyametri, erit 200. Dico iterum, dyametrum *ag.* equum esse dyametro *bd.*; quoniam recta *bg.* equa est recte *ad.* Si comuniter accipiatur recta *ad.*, erunt due recte *ab.* et *bg.* equales duabus rectis *ba.* et *ad.*; et angulus *abg.* equalis est angulo *bad.*; quare dyametrum *ag.* equum est dyametro *bd.* Dico iterum quod dyametri *ag.* et *bd.* se se inuicem secant per equalia super punctum *e.* Quoniam sibi inuicem equales sunt recte *ad.* et *bg.*; et in eorum terminis copulate sunt recte *ab.* et *gd.*, que sibi inuicem equantur; erunt siquidem equidistantes recte *ad.* et *bg.*; et quoniam in eis recte incidunt *bd.* et *ag.*, equatur quidem angulus *adb.* angulo *dbg.*; et angulus *dag.* angulo *agb.*; reliquus *aed.* reliquo *beg.* est equalis. Quare trigonum *aed.* trigono *beg.* equatur; et recta *be.* recte *ed.* est equalis. Similiter et recta *ge.* recte *ae.* est equalis; ergo per equalia sese secant dyametri *ag.* et *bd.*; que oportebat ostendere. Nam si dyameter tetragoni dati fuerit radix ducentorum; et ignoraueris embadum, nec non et eius latus, accipe dimidium de .200., erunt .100., que habeas pro embado; et earum radicem, scilicet .10., habebis pro

* dyametro *bd.* sunt recte * (fol. 35 recto, lin. 7-14; pag. 58, lin. 20-25).



latere; hoc est duo quadrati equantur .200.: quare unum quadratum, scilicet embadum tetragonj, erit .100. Et si quadratum dyametri cum embado tetragonj fiant .300.; ergo tres quadrati equantur .300.; quare tertia pars eorum, scilicet .100., erit embadum. Relique quidem .cc. habebuntur pro quadrato dyametri; et radix embadi erit latus tetragoni. Et si embadum et quatuor eius latera faciunt .cxl.; et uis separare latera ab embado. Adiaceat tetragonum .ezit., et addatur ei superficies .ae. rectiangula; et sit .ai. indirecto recte .it., et .be. indirecto .ez.; et sit unaqueque rectarum .be. et .ai. 4. propter numerum laterum tetragonj; quare superficies .ae. equatur quatuor lateribus tetragonj .et., cum latus ipsius .ei. sit unum ex lateribus superficiei .ae.; et superficies quidem .et. continet embadum tetragonj .zi., nec non et quatuor eius latera; ergo superficies .za. est .140.; et hoc est illud quod diximus, uidelicet census cum quatuor radicibus equantur .140.; et est census tetragonum .et., quatuor eius radices sunt superficies .ae. Diuidatur quidem recta .ai. in duo equa super punctum .g.; et quoniam linea .ti. addita est linee .ai., erit superficies rectiangula .it. in .at. cum quadrato linee .gi. equa tetragono linee .gt. Sed superficies .it. in .at. est sicut superficies .zt. in .at., cum .it. equa sit ex .tz. Ergo superficies .zt. in .at. cum quadrato linee .gi. equatur quadrato linee .gt. Sed .zt. in .at. est superficies .za., que est .140.; quibus addito quadrato linee .gi., scilicet .4., reddunt .144. pro quadrato linee .gt.; quare .gt. est .12., scilicet radix de .144. Quare si ex .gt. relinquatur .gi., scilicet .2., remanebit .it. 10., quod est latus tetragoni .et.; cui embado, scilicet .100., si addatur quatuor eius latera, que sunt .40., erunt .140., ut oportet. Et sic fiat in omnibus questionibus, in quibus numerus equatur uni quadrato et radicibus, uidelicet super ipsum numerum addatur quadratum medietatis radicum, et summe radix inueniatur; ex qua tollatur medietas positarum radicum, remanebit radix quesiti census; que in se multiplicata faciet censum. Verbi gratia: dragme .133. equantur uni censui et duodecim radicibus. Quare si quadratum medietatis radicum, scilicet .36., addiderimus super .133., facient .169.; de quorum radice, scilicet de .13, extractis 6., scilicet medietas radicum, remanebunt .7. pro radice quesiti census; et census erit .49.


« tetragonj .zi. superficies .zt. »
(fol. 35 recto, lin. 20-25; pag. 59, lin. 40-45).



fol. 35 verso.

Item est tetragonum, ex cuius embado si tollantur quatuor eius latera, remanent 77. Adiaceat tetragonum .bd., et sumatur punctus .a. in .gd. rectam; et sit .ga. 4. per ticularum; et per punctum .a. producat recta .az. equidistans ubilibet rectarum .gb. et .de.: et quoniam .ga. est .4. superficies .ba.; quatuor latera, scilicet .4. radices ex tetragono .bd. continere necesse est. Quare si de tetragono .bd. extrahatur quadrilaterum .ba., scilicet quatuor eius latera, remanebit superficies .zd. 77. Et quoniam due superficies .ba. et .zd. equantur tetragono .bd.; ergo census equatur radicibus et numero, hoc est quadratus .bd. equatur .4. suis radicibus et .77. Diuidaturque .ga. in duo equa. Et quoniam recta .ga. diuisa est in duo equa super punctum .i., et ei adiuncta est in directo recta .ad., erit multiplicatio .ad. in .gd. cum quadrato linee .ai. equalis quadrato linee .di. Sed multiplicatio .ad. in .dg. est sicut multiplicatio .da. in .de.; cum .de. equa sit linee .dg. Sed .da. in .de. est superficies .zd., que est .77.; ergo .da. in .de. facit .77.: quibus si addatur quadratum linee .ai., quod est .4., erunt .81. pro quadrato linee .di., cuius radix, scilicet .9., est linea .di.: cui si addatur linea .ig., habebitur .11. pro latere .dg. Quare embadum quadrati .bd. est undecies undecim, sci-

« .77. Et quoniam due est superficies .zd. » (fol. 35 verso, lin. 20-25; pag. 59, lin. 34-40).




licet .121.; et quatuor eius latera, scilicet superficies .*ba.*, est .*ba.* est .44., remanet superficies .*zd.* 7., ut oportebat. Et sic faciendum est in omnibus questionibus, in quibus quadratum equabitur radicibus et numero; uidelicet super numerum addatur quadratum medietatis radicum; et de summa collecta accipiatur radix, eique addatur medietas radicum; et sic habebitur radix quadrati, que in se multiplicata faciet quesitum quadratum: ut si proponatur quod census equatur decem radicibus et .39. dragmis, addatur quadratum quinque radicum, scilicet .25. super .39., erunt .64.; super quorum radice, scilicet super .8., addatur medietas radicum, scilicet .5., et habebis .13. pro radice census; et census erit .169.; et eius decem radices sunt .150., que procreantur ex multiplicatione de .10 in 13. ITEM est tetragonum, cuius embadum si tollatur ex summa quatuor laterum ipsius, scilicet ex quatuor suis radicibus, remanebunt pertice .3. Adiaceat tetragonum .*ge.* habens in singulis lateribus minus de perticis .4.; et adiaceat .*de.* linea .*da.*; et sit tota .*ae.* 4; et diuidatur .*ae.* in duo equa super punctum .*b.*; et protrahatur recta .*az.* equidistans et equalis .*dg.*; et protrahatur .*fg.* in punctum .*z.*; et quoniam recta .*ae.* est 4, et .*ef.* est latus tetragoni .*ge.*; erit itaque .*fe.* in .*ea.*, scilicet superficies .*ze.*, equalis quatuor radicibus, scilicet lateribus tetragoni .*ge.*: ex quibus si tollatur tetragonum .*ge.*, remanet superficies .*ga.* 3. perticarum. Sed tetragonum .*ge.*, et superficies .*ga.* equantur superficiei .*ze.*; ergo quatuor radices equantur censui, et perticis tribus: oportet itaque ut inueniamus censum et eius radicem. Quoniam linea .*ae.*, que est 4., diuisa est in duo equalia super punctum .*b.*, et in duo inequalia super punctum .*d.*, erit multiplicatio .*ed.* in .*da.* cum quadrato linee .*bd.* equalis quadrato linee .*be.*, quod describitur a medietate linee .*ae.* Sed ex multiplicatione .*ed.* in .*da.* oritur superficies .*ga.*, que est 3.; cum .*dg.* equalis sit .*de.*; ergo superficies .*gd.* in .*da.* cum quadrato linee .*bd.* equatur quadrato linee .*be.*, qui est 4.; ergo quadratum .*bd.* est 4.; cuius radix, scilicet 2., si tollatur ex linea .*be.*, remanebit de 2., que est latus tetragoni .*ge.*; cuius embadum, scilicet quesitus census, erit similiter 4. Et si medietas linee .*ag.* fuerit inter .*de.* super punctum .*b.*, ut hac alia cernitur figura; adde super .*eb.*, scilicet super 2., lineam .*bd.*, et erit tota .*de.* 3., que est radix quadrati .*ge.* quesiti; et quadratum erit 9.; et superficies .*ga.* erit similiter 3., ut prediximus. Et sic fiat semper in omnibus questionibus, in quibus radices equentur quadrato et numero. Videlicet ex quadrato medietatis radicum tollatur numerus, et residuo inueniatur radix, que tollatur ex medietate dicta, uel addatur super eam, et habebis radicem quesiti quadrati. Vt in hac in qua proponitur, duodecim radices equari uni quadrato et 27. dragmis: medietas itaque radicum est 6., quorum quadratus est 36.; de quibus extractis 27., remanent 9.; quorum radix, scilicet 3., si extrahatur ex medietate radicum, remanebunt 3. pro radice quesita; et census erit 9.: uel si 3. addantur super 6., habebis pro radice quesita 9.; et quadratum erit 81: et sic semper, cum radices equantur censui et numero, soluuntur questiones dupliciter. Vnde in quibusdam questionibus quandoque cadet una solutio, quandoque alia. Item quadratum dyametri et embadum, nec non et quatuor dati tetragoni latera equantur perticis 279; et queritur quantitas lateris tetragoni. Quoniam quadratus dyametri est duplum tetragoni; ergo quadratus dyametri cum tetragono tripla erunt tetragoni; et tria quadrata et quatuor radices equantur 297. Quare ut reducas hec ad censum unum, accipe tertiam

fol. 36 recto.

* equalis quatuor equantur censui (fol. 36 recto, lin. 9-11; pag. 60, lin. 16-18).




* radicem, tollatur 3. pro radice quesita (fol. 36 recto, lin. 25-30; pag. 60, lin. 31-36).



fol. 36 verso.


ex omnibus predictis, et inuenies, censum et radicem $\frac{1}{9}$ equari perticis 93. Accipe ergo medietatem radicem, scilicet $\frac{2}{9}$, et multiplica eas in se, erunt $\frac{4}{9}$; que adde cum 93, erunt $\frac{1}{9}$ 93; de quorum radice tolle $\frac{2}{9}$, scilicet medietatem radicem, remanent 9 pro latere tetragoni; ergo embadum est 82, et quadratus dyametri est 162. Rursus quatuor tetragoni latera equantur $\frac{2}{9}$ totius tetragoni. Adiaceat tetragonum *abgd.*; et in *bg.* et *ad.* rectis accipiantur puncta *ez.*; et sit unaqueque rectarum *be.* et *az.* perticarum 4; et copulentur recte *ez.*, eruntque paralilogramina *ae.* et *zg.* sub equidistantibus *ad.* et *bg.*; quare erit sicut paralilogramum *ae.* est ad paralilogramum *zg.*, ita basis *be.* est ad basem *eg.* Sed paralilogramum *ae.* equatur quatuor radicibus tetragoni *ag.*; ergo paralilogramum *ae.* est $\frac{2}{9}$ ex tetragono *ag.*; remanet itaque paralilogramum *zg.* $\frac{7}{9}$ ex tetragono *ag.*; ergo superficies *ae.* ad superficiem *ze.* est sicut .2 ad 7. Quare est sicut .2 ad 7., ita *be.*, scilicet .4., est ad *eg.* Quare multiplica .4 per .7, et diuide per .2., exhibunt .14. pro linea *eg.*; uel aliter quoniam dupla sunt .4 ex 2., ita dupla est recta *eg.* ex .7.; ergo *eg.* est .14.; quibus additis .4., scilicet *eb.*, habebis pro *bg.* .18., scilicet pro latere tetragoni *ag.*; quod oportebat ostendere. Vel aliter secundum computationem algebrę, quoniam superficies *ae.* equatur quatuor radicibus, uel $\frac{2}{9}$ tetragoni *ag.*; ergo quatuor radices equantur $\frac{2}{9}$ census. Vnde ut reintegretur census, multiplica .9 per 4., et diuide per .2.; uel medietatem de .9. multiplica per .4. Quia quotiens due none sunt in .9. nonis, scilicet in censu, totiens .4. erit in radice tetragoni *ag.* Quare quadratum *ag.* equatur .18. radicibus, ut prediximus; et continentur in eius embado pertice .324. Rursus .4. latera et $\frac{2}{9}$ embadi tetragoni equantur $\frac{1}{2}$ 77. Quare redige $\frac{2}{9}$ census ad censum unum, et habebis quod census et radices $\frac{2}{9}$ 10. equantur $\frac{2}{9}$ 206.; et hoc inueniemus multiplicando radices .4. et $\frac{1}{2}$ 77. per 8., et diuidendo utramque multiplicationem per .3. Dimidia itaque radices, erunt $\frac{1}{3}$ 5.; quorum quadratum accipe quod est $\frac{1}{9}$ 28.; quem numerum adde cum $\frac{2}{9}$ 206., erunt $\frac{1}{9}$ 235.; de quorum radice, scilicet de $\frac{1}{3}$ 15. deme dietatem radicem, remanent .10. pro latere tetragoni; et embadum est .100. Er si quatuor eius latera equentur embado tetragoni, tunc quatuor eius radices equantur censui. Quare unum quodque latus est .4., et census est .16. Et si latera duplum essent embadi, tunc quatuor radices equarentur duabus radicibus; ergo latus tetragoni esset .2., et area esset .4. ITEM si ex area tetragoni auferantur tria latera, scilicet tres radices eius, remanent .40., ergo tres radices et .40. equantur censui. Medietatem quidem radicem in se multiplica, erunt $\frac{1}{4}$ 2.; que adde super .40., erunt $\frac{1}{2}$ 42.; super quorum radicem, scilicet super $\frac{1}{2}$ 6., adde medietatem radicem, erunt .8., que sunt latus tetragoni. ITEM diuisi aream quadrati per dyametrum eius, et prouenit .10., quanta est dyameter et latus eius. Quoniam ex diuisione embadi per dyametrum proueniunt .10.; ergo ex multiplicatione dyametri in .10. prouenit embadum. Quare ex multiplicatione dyametri in duplo de .10. prouenient duplum embadi. Sed duplum embadi equatur quadrato dyametri; ergo ex multiplicatione dyametri in .20. prouenit quadratum dyametri. Sed ex multiplicatione dyametri in se prouenit idem quadratum. Quare dyameter est .20., et eius quadratum .400.; et embadum est dimidium eius, scilicet .200. : latus quoque est radix de .200., que est parum minus de $\frac{1}{3}$ 14. ITEM demptis quatuor lateribus ex area remaneant .4.; quantum est ergo eius latus. Adiaceat tetragonum *abgd.*; et sumantur puncta *ez.*; et sit unaqueque rectarum *az.* et *de.* 4.; et copuletur *ze.*

ergo medietatem ... ad paralilogramum (fol. 36 verso, lin. 4-10 e 11; pag. 61, lin. 2-8).




fol. 37 recto.

* $az.$ et $de.$ $4.$... si addatur *
(fol. 37 recto, lin. 43-49; pag. 61,
lin. 43 — pag. 62, lin. 1-7).




* tetragono $gh.$... rectam $on.$ *
(fol. 37 verso, lin. 31-35 e mar-
gine inferiore esterno; pag. 62, lin.
18-22).



fol. 37 verso.

* superficies $gn.$... $ai.$; ergo *
(fol. 37 verso, lin. 14-18; pag. 62,
lin. 31-39).



Erit itaque superficies $dz.$ equalis quatuor lateribus tetragoni $db.$, remanet itaque superficies $eb.$ $4.$; ergo quatuor radices et $4.$ equantur tetragono $db.$; diuidatur itaque recta $az.$ in duo equalia super $1.$; eritque multiplicatio $zb.$ in $ab.$ cum quadrato lineae $iz.$ sicut tetragonum lineae $ib.$ Sed $zb.$ in $ab.$ est sicut $zb.$ in $ze.$ Sed $zb.$ in $ze.$ facit superficiem $eb.$, scilicet $4.$; ergo ex $zb.$ in $ab.$ proueniunt $4.$; quibus addito trigono lineae $iz.$, erunt $8.$ pro quadrato lineae $ib.$; ergo recta $ib.$ est radix de $5.$; cui si addatur recta $ia.$, scilicet $2.$, habebimus $2.$ et radicem de $8.$ pro tota linea $ab.$, que est latus tetragoni $db.$

Er si dyametri quadrati supra unumquodque latus eiusdem quadrilateri addatur $6.$; quantum erit latus eius. Multiplica itaque $6.$ in se, erunt $36.$; que duplica, erunt $72.$; supra radicem quorum adde $6.$, et habebis latus; ergo latus est $6.$ et radix septuaginta duorum. Verbi gratia. Adiaceat quedam recta $ab.$, et sit equalis diametro dati quadrilateri; et latus eius sit $bg.$, remanet $ga.$ $6.$, in quibus dyameter superhabundat latus: et constituatur super rectam $ab.$ tetragonum $ad.$; et protrahatur in ipso dyameter $eb.$; et per punctum $g.$; protrahatur recta $gz.$ equidistans rectis $ae.$ et $bd.$; et per punctum $i.$ protrahatur recta $tk.$ equidistans rectis $ed.$ et $ab.$; deinde summatur in $bg.$ recta punctus $l.$; et sit $gl.$ equalis $ga.$; et compleatur figura eadem in tetragono $gk.$; et quoniam tetragonum est quadrilaterum $ad.$, tetragona sunt ea que sunt circa dyametrum ipsius, scilicet $tz.$ et $gk.$; est enim latus tetragoni $tz.$ recta $ti.$, que est equalis recte $ag.$; ergo $ti.$ est $6.$; et tetragonum $tz.$ est $36.$ Item tetragona sunt quadrilatera $om.$ et $lp.$; sunt enim circa dyametrum tetragoni $gk.$; et est tetragonum $om.$ equale tetragono $tz.$ propter rectam $on.$, que est equalis recte $gl.$, et $gl.$ recte $ga.$, et $ga.$ recte $ti.$ ostensa est equalis. Et quoniam recta $bg.$ est latus tetragoni, cuius $ba.$ est dyameter; quod a recta $ba.$ describitur tetragonum duplum est eius, quod describitur a recta $bg.$; ergo tetragonum $ad.$ duplum est tetragoni $gk.$ Quare gnomon $q.r.s.$ equatur tetragono $gk.$; auferatur itaque ex gnomone $q.r.s.$ tetragonum $tz.$; et ex tetragono $gk.$ tetragonum $om.$, que sunt equalia, remanent supplementa $ai.$ et $id.$ equalia gnomonj $c.f.h.$ Sed supplementum $ai.$ equale est superfici ei $il.$; habet enim unum latus comune, quod est $ig.$; et recta quidem $lg.$ recte $ga.$ est equalis. Similiter et supplementum $id.$ equale est superfici ei $ip.$; ergo due superficies $il.$ et $ip.$ equalis sunt gnomonj $c.f.h.$ Quare si comuniter auferatur superficies $gn.$ et $nk.$, remanebit duplum tetragoni $om.$ equale tetragono $lp.$ Sed tetragonum $om.$ est $36.$ Quare tetragonum $lp.$ est $72.$; cuius latus, scilicet $bl.$, est radix septuaginta duorum: cui si addatur $lg.$, que est $6.$, habebimus pro tota $6.$ et radicem septuaginta duorum, ut oportebat ostendere. Cui si addatur $ga.$, erit tota $ag.$, scilicet dyameter dati quadrilateri $12.$ et radix septuaginta duorum. Vel aliter quoniam recta $ag.$ est $6.$; et $gi.$ est latus tetragoni, cuius dyameter est equalis lineae $ab.$, erit propter hoc quadrilaterum $ai.$ equale sex radicibus tetragoni $gk.$; et est quadrilaterum $id.$ equale quadrilatero $ai.$; ergo quadrilaterum $id.$ est sex radices quadrati $gk.$; et quadratum $tz.$ est $36.$; quare totum gnomon $q.r.s.$ est $36.$ et $12.$ radices tetragoni $gk.$ Et est gnomon $q.r.s.$ equale tetragono $gk.$, ut ostensum est. Vnde si ponamus rectam $bg.$ rem, erit tetragonum $gk.$ census, qui equatur $12.$ suis radicibus et $36.$ dragmis: operare ergo in hoc secundum quod dictum est quando census equatur radicibus et numero.


Rursus multiplicauit dyameter per latus, et prouenit .100.; quanta est ergo dyameter et latus tetragonj. Quoniam multiplicato dyametro per latus proueniunt .100. Si multiplicauerimus quadratum dyametri per quadratum lateris, scilicet per aream tetragonj, prouenit quadratum de .100., scilicet decem milia. Quare si multiplicauerimus quadratum dyametri per duplum embadi, scilicet per quadratum dyametri, proueniet duplum eius, scilicet uiginti milia. Ergo dyameter est radix radicis uiginti milium. Quare embadum, cum sit medietas ex quadrato dyametri, erit radix quinque milium; quare latus erit radix radicis quinque milium. Item multiplicauit dyameter per aream tetragonj, et prouenit .500.; quanta est ergo dyameter et latus eius. Quoniam multiplicatio dyametri per embadum facit .500.; erit itaque multiplicatio dyametri per duplum embadi, scilicet per quadratum dyametri, .1000.; ergo dyameter est radix cubica de .1000. Nam radix cubica de .1000 est 10.; | ergo dyameter est .10.; et quadratum eius est .100.; et area est dimidium eius, scilicet .50.; et latus est radix de .50.

Explicit de quadrilatero: incipit de parte altera longiori.


ADIACEAT quadrilaterum parte altera longius *abcd.*, habens in singulis lateribus breuioribus, que sunt *ab.* et *dc.*, perticas .6.: in longioribus quoque *ad.* et *bc.* perticas .8.; eiusque embadum colligitur ex multiplicatione lateris *ab.* in *bc.*; quare area ipsius est .48. Nam si eius dyameterum *ac.* habere desideras, adde quadrata linearum *ab.* et *bc.* in unum, scilicet 36 et 64., erunt .100.; quorum radix, scilicet .10., est dyameter *ac.* Item sit dyameter .10., et latus *cb.* sit .8.; quantum est ergo latus *ab.*: de quadrato linee *ac.* extrahe quadratum linee *bc.*, et remanebit quadratum linee *ab.*, et econuerso, ut in trigono orthogonio superius diximus. Simili quoque modo inueniemus dyameterum *bd.* esse .10. propter equalitatem trigonorum *abc.* et *bad.* Dico quidem quod ipsa dyametra sese per equalia secant super punctum *e.*; sunt enim equidistantes recte *ad.* et *bc.*; quare angulus *ade.* angulo *ebc.* est equalis: propter eadem ergo et angulus *dae.* angulo *ecb.* est equalis: reliquus *aed.* reliquo *bec.* est equalis: equiangula enim sunt trigona *aed.* et *bec.*, et habent latera *ad.* et *bc.* sibi inuicem equalia; quare reliqua latera reliquis lateribus, que equalibus angulis subtendantur, sibi inuicem equalia erunt; latus quoque *be.* lateri *ed.* Et latus *ce.* lateri *ea.* Et quoniam dyameterum *ao.* equale est dyametro *bd.*, et sunt secta per equalia super *i.* punctum. Quantum enim recte, que sunt *ia.* et *ib.* et *ic.* et *id.* sibi inuicem equalia sunt: est enim unaqueque earum .5., scilicet dimidium sui dyametri; que oportebat ostendere. Nam si area fuerit .48.; et latus breue aggregatum fuerit cum longiore sint .14.; et uis scire quantum sit longius, uel breuius latus; medietatem itaque de .14., scilicet .7., in se multiplica, erunt .49.; de quibus tolle aream, remanet .1.; cuius radicem adde super .7., erunt .8. pro latere longiori; a quibus usque in .14. desunt .6. pro breuiore latere. Verbi gratia: adiaceat quadrilaterum *b.g.d.e.* parte altera longius; et sit *bg.* breuius latus, et *gd.* sit longius; et protrahatur recta *bg.* in puncto *a.*; et sit recta *ga.* equalis recte *gd.*; et diuidatur recta *ab.* in duo equa super punctum *c.*; erit ergo tota linea *ba.* .14.; quare *bc.*, uel *ac.* est .7.: et quoniam recta *ba.* diuisa est in duo equalia et totidem inequalia super punctis *gc.*, erit *bg.* in *ga.* cum quadrato linee *gc.* equalis quadrato linee *ca.* Sed *bg.* in *ga.* est sicut *bg.* in *gd.*; et ex *bg.* in *gd.* prouenit area; ergo *bg.* in *ga.* est .48.: cui si addatur quadratum linee *ge.*,

fol. 38 recto.

* est equalis *ab.* et *bc.* et * (fol. 38 recto, lin. 15-19; pag. 63, lin. 26-31).




* longius; et protrahatur addat super * (fol. 38 recto, lin. 26-35 e margine inferiore esterno; pag. 63, lin. 38-43 — pag. 64, lin. 1-3).



fol. 38 verso.

faciet .49.: ergo quadratus linee .gc. est .1.; cuius radix, scilicet .1., est linea .gc. quadrata super .ac., erit tota .ag., scilicet .gd. 8, quod est maius latus; remanet ergo .gb. 6., ut prediximus. Item sit area 48 et latus longius addat super breuius secundum quantitatem duorum. Accipe medietatem ipsorum duorum, erit .1.; cuius quadratum adde super .48., erunt .49.; de quibus accipe radicem, que est .7., et adde super eam .1., quod fuit medietas duorum supradictorum, erunt .8., quod est latus longius; de quo tolle .2., in quo longius latus superhabundat breuius, remanent .6.; quod etiam possumus comprehendere in figura suprascripta. Sit longius latus ut prediximus .gd., cui iacet equalis recta .ga.; et auferatur a recta .ga. recta .gf., que sit .2.; erit ergo recta .af. equalis recte .gb. Diuidatur itaque recta .gf. in duo equalia super punctum .c., erit recta .ac. equalis recte .cb.; ergo recta .ab. diuisa est in duo equalia super punctum .c., et in duo inequalia super punctum .g.; et est recta .gc. .1., que inter iacet sectionibus. Est ergo multiplicatio .ag. in .gb. cum quadrato linee .gc. equalis quadrato linee .ac. Sed .bg. in .ga. est .48.; et quadratum ex .cg. est .1.; ergo .bg. in .ga. cum quadrato linee .gc. est .49.; quorum radix, scilicet .7., est linea .ac.: cui si addatur .cg., que est .1., erit tota .ag. 8., quod est maius latus. Item si ex .cb., que est .7., cum sit equalis .ca., auferatur .cg., remanet .gb. .6., ut prediximus. Vel aliter: pone latus breuius radicem; eritque tunc latus longius radix et .2. Et quoniam ex multiplicatione breuioris lateris in longius prouenit .48.; ergo ex multiplicatione radice in radicem et in .2. proueniunt similiter 48. Nam ex multiplicatione radice in radicem prouenit census; et ex multiplicatione radice in .2. proueniunt due radices; ergo census et due radices equantur .48.: fac ergo ut supra diximus in his in quibus census et radices equantur numero, et habebis optatum. Item dyameter sit .10., et embadum sit .48.; quantum est ergo unumquodque latus: super quadratum dyametri adde duplum embadi, erunt .196.; cuius radix, scilicet .14., est longitudo utriusque lateris. Verbi gratia: adiaceat quadrilaterum .abgd.; cuius dyameter .ag. sit .10.: protrahatur quidem recta .ab. in punctum .e.; et sit .be. equalis .bg. Et quoniam recta .ae. diuisa est ubilibet in duo super punctum .b., erunt duo quadrata portionum .ab. et .be. cum duplo .ab. in .be. equales quadrato totius linee .ae. Sed portio .be. equa est lateri .bg.; ergo quadrata linearum .ab. et .bg. cum duplo .ab. in .bg. equantur quadrato linee .ae. Sed quadrata laterum .ab. et .bg. faciunt quadratum dyametri .ag.; et duplum .ab. in .bg. facit duplum aree, scilicet .96.; quibus iunctis cum .100. faciunt .196. pro quadrato linee .ae.; ergo .ae. est radix ipsorum, scilicet .14., ut prediximus: post hec, ut separes .ab. ex .bc., scilicet ex .bg., procedas, ut superius dictum est ubi diximus, embadum erunt .48., et duo latera coniuncta .14. Rvasus dyameter sit .10., et duo latera coniuncta sint .14.; et uolo scire embadum, nec non et unumquodque latus: multiplica igitur .14. in se, erunt .196.; de quo tolle quadratum dyametri, scilicet .100., remanet .96.; quorum dimidium, scilicet .48., est embadum: post hec per supradicta studeas latera segregare. Que inueniuntur in supradicta figura hoc ordine: quadratum dyametri .ag. equatur duobus quadratis laterum .ab. et .bg., hoc est quadratis portionum .ab. et .be. Sed quadrata portionum .ab. et .be. cum duplo .ab. in .be. equantur quadrato linee .ae.; ergo quadratum dyametri .ag. cum duplo .ab. in .be. equatur quadrato linee .ae. Quare si auferatur quadratum dyametri, scilicet .100., ex quadrato linee .ae., scilicet de .196., re-


dyameter sit .10. ut prediximus * (fol. 38 verso, lin. 22-32; pag. 64, lin. 23-33).



fol. 39 recto.

manebunt .96. pro duplo .ab. in .be., hoc est pro duplo .ab. in .bg.: ergo .ab. in .bg. facit 48., scilicet dimidium de .96. Sed .ab. in .bg. facit embadum; ergo embadum est .48., ut prediximus: cum quo predicto modo separabis latera; et erit breuius latus .6., longius uero .8. Iterum coniunxi dyametrum cum uno latere, et prouenerunt inde .16.; et aliud latus est .8. Quanta est ergo dyameter, et quantum est latus ei coniunctum. Multiplica .16. in se, erunt .256.; de quibus tolle quadratum dati lateris, scilicet .64., remanent .192.; que diuide per duplum de .16., exhibunt .6., que sunt latus coniunctum dyametro; quod latus tolle de .16., remanent .10. pro dyametro. Verbi gratia: adiaceat quadrilaterum .b.g.d.e; et sit dyameter .bd. cum latere .bg. perticarum .16.; et latus .dg. sit .8.: pone itaque latus .bg. radicem, remanet dyameter .db. 16 minus radice; que multiplica in se, habebis .256. et unum quadratum minus radicibus .32. pro quadrato dyametri .bd. Sed quadrato dyametri .bd. equantur duo quadrata laterum .bg. et .gd.; ergo quadrata laterum .bg. et .gd. equantur 256. et uni quadrato lateris .bg., detractis inde radicibus .32.: restaura ergo ipsas radices et erunt quadrata linearum .bg. et .gd. cum radicibus .32. equales .256. et uni quadrato lateris .bg.: comuniter auferatur quadratum lateris .bg., remanebit quadratum lateris .gd. cum radicibus .32. equale .256.: comuniter auferatur quadratum linee .gd., scilicet .64., remanebunt radices 32. equales .192. Ecce raduximus (sic) hanc questionem ad unam ex sex regulis supradictis, ad eam uidelicet in qua radices equantur numero. Quare diuide .192. per .32. exhibunt .6. pro radice, hoc est pro latere .bg.; quibus extractis de .16., remanent .10. pro dyametro .bd., ut predixi. Et si dyameter addat .4. super latus breuius; et longius latus sit .8., quanta est ergo dyameter. Multiplica .8. in se, erunt .64.; quibus adde multiplicationem quaternarij in se, erunt .80.: et dupla ipsa .4., erunt .8.; in quibus diuide .80., erunt .10. pro quantitate dyametri; de quibus tolle .4., que dyameter addit super latus breuius, remanebunt .6. pro ipso latere. Producitur enim hec questio ad unam ex sex regulis supradictis hoc modo: primo quidem manifestum est | quod duo quadrata, breuioris uidelicet et longioris lateris equantur quadrato dyametri. Quare pone dyametrum radicem, quam in se multiplica, facit quadratum dyametri. Item pro latere breuiori pone radicem dyametri minus .4.; que multiplica in se, ueniet quadratum dyametri et .16. minus .8. radicibus dyametri pro quadrato lateris breuioris; cum quibus adde quadratum lateris longioris, habebis quadratum dyametri et 80. minus .8. radicibus dyametri, que equantur quadrato dyametri. Restaura ergo ipsas radices ab utraque parte, remanebit quadratum dyametri et .80., que equantur quadrato dyametri et .8. radicibus: tolle ergo ab utraque parte quadratum dyametri, remanent 80., que equantur .8. radicibus dyametri. Quare diuisis 80 per 8 uenient .10. pro dyametro, ut predixi. Et Si ex multiplicatione longioris lateris in area proueniet 384.; et breuius latus sit .6.; et uis scire quanta sit area. Quia ex multiplicatione breuioris lateris in longius prouenit area; et ex multiplicatione aree in latus longius prouenit .384.; ergo ex multiplicatione breuioris lateris in quadratum longioris idem prouenit. Quare si diuiserimus 384. per .6., scilicet per breuius latus, prouenient .64. pro quadrato longioris. Quorum radix, scilicet .8., est latus longius. Et Si proponatur, embadum esse .48.; et diuiso latere maiore per minus proueniat $\frac{1}{3}$ 1.; et uis scire unum quodque latus, pone breuius latus .3 propter $\frac{1}{3}$., quod denominatur ab ipso; et multiplica .3. per $\frac{1}{3}$ 1., erunt .4., quod pone pro maiori

* latus .6. pro dyametro. * (fol. 39 recto, lin. 12-16; pag. 65, lin. 3-8).



fol. 39 verso.

latere. Ergo in qua proportione est .3. ad .4., in eadem est breuius latus ad maius: multiplica itaque .3 per 4., erunt .12.; in quibus diuide 48., uenient .4.; de quibus accipe radicem, que est .2.; et multiplica in eam posita .3 et 4, et habebis .6. pro breuiori latere, et .8. pro maiori. uel aliter: multiplica 3 per 48, et diuide per 4, exhibunt .36.; quorum radix est breuius latus. Item multiplica .4 per 48, et diuide per .3., exhibunt .64., quorum radix est latus longius. Et si latus minus diuidatur per maius, et proueniet $\frac{3}{4}$.; pone pro maiori latere .4. propter $\frac{3}{4}$., que denominantur ab ipso; et accipe $\frac{3}{4}$. de .4., erunt .3.; que pone pro minore, et fac ut supra, et habebis .6. pro minori latere, et .8. pro maiori.

fol. 40 recto.

ITEM latus breuius cum dyametro sit .16.; et latus maius addat .2. super latus minus; et uis scire quantum sit dyameter et unum quodque latus. Quoniam maius latus excidit minus latus in .2.; Ergo si addiderimus maius latus cum dyametro, uenient .18.: multiplica itaque .18. in se, et .16. in se; et aggrega multiplicationes eorum, erunt .580.; de quibus tolle quadratum duorum predictorum, remanent .576.; quorum radix, scilicet .24., est summa duorum laterum et dyametri: de quibus tolle dyametrum et latus breuius, scilicet .16., remanebunt .8., que sunt latus | maius; de quo tolle .2., remanent .6. pro latere breuiori uel .18., scilicet maius latus; et dyametrum tolle de .24. QVe si ad computationem algebre reducere uis, pone latus breuius rem, remanebit dyameter .16., excepta re: multiplica ergo rem in re, proueniet census; quem aggregabis cum quadrato maioris lateris; quod quadratum inuenies sic: quia maius latus excidit minus in .2.; pones ipsum maius latus rem et duas dragmas; que multiplica in se, egredientur census et .4. radices et .4. dragme pro quadrato longioris lateris: que adde cum quadrato breuioris, scilicet cum censu, erunt duo census, scilicet duo quadrata breuioris lateris et .4. radices et .4. dragme, que equantur quadrato dyametri, scilicet multiplicationi de 16., excepta re in se. Que multiplicatio est 256 et census, exceptis triginta duabus radicibus. Restaura ergo radices, remanebunt 256 et census, que equantur duobus censibus et 36 radicibus et .4. dragmis: tolle itaque ab utraque parte censum et .4. dragmas, remanebunt census et radices 36, que equantur 252.: media ergo radices et censum, secundum quod superius diximus, ubi census et radices equantur numero. Et si maius latus cum dyametro sit 18.; et maius excedat minus in .2.; tunc minus latus cum dyametro esset .16.; cum quibus operaberis ut supra. Rursus duo latera cum embado surgunt in 62.; et maius latus addit super minus .2.; quantum est igitur unumquodque latus: modus inueniendi hoc erit ut minuas .2. ex 62., et remanebunt .60. Duo igitur adiunge medietati laterum, et prouenient .4.; ipsum itaque adiunge .60., et prouenient .64.: horum ergo radicem, que est .8., assume; ipsum namque est latus longius: quod si uis breuius, minue .2. ex .8., remanebunt 6, quod est latus breuius. Exempli causa: pone latus minus rem, erit tunc latus maius res et due dragme. Ex multiplicatione quidem breuioris lateris in longius prouenit embadum. Quare multiplica rem, scilicet minus latus, in rem et in duas dragmas, et habebis censum et duas radices pro embado: quibus si addantur duo latera, scilicet 2 radices et .2 dragme, erunt census et 4 radices et 2 dragme, que equantur dragmis .62.: tolle ergo ab utraque parte dragmas .2., et remanent census et 4 radices, que equantur .60 et cetera.

Et si multiplicatio maioris lateris in dyametrum sit 80., et latus breuius .6., multiplica 80 in se et 6 in se, erunt .6400 et 36: accipe ergo quadratum medietatis de

.36., scilicet .324.; et adde cum .6400., erunt .6724.; super quorum radicem, que est .82., adde medietatem de 36., erunt .100.; quorum radix, scilicet .10., est dyameter; in quo diuide 80., uenient .8., que sunt latus longius : uel de .80 deme .18., remanent .64., quorum radix est latus longius. Quod si hec ad computationem algebre reducere uis; quia ex multiplicatione longioris lateris in dyametrum proueniunt 80; ergo ex multiplicatione quadratorum ipsorum prouenit quadratum de 80., scilicet .6400. Sed quadratus dyametri equatur duobus quadratis, longioris uidelicet et breuioris lateris; et est quadratum breuioris lateris .36. Ergo ex multiplicatione quadrati maioris lateris in se et in 36 proueniunt 6400. Quare pone quadratum maioris lateris rem, que in se multiplicata et in .36. facit censum et 36 radices, que equantur sex milibus et quadringentis et cetera. Similiter secundum hanc regulam facies si ex multiplicatione breuioris lateris in dyametrum proueniet 60; et maius latus sit .8.; tunc census et 64. radices equabuntur 3600. Item latus breuius cum area faciunt 54.; et latus maius addit super minus .2. Quantum est ergo quodque latus. Quia ex multiplicatione breuioris lateris in longius prouenit embadum; si ponamus breuius latus rem, est latus longius res et duo; que si multiplicauerimus per rem, scilicet per breuius latus, egredientur census et due radices pro area : quibus si addamus breuius latus, scilicet radicem, erunt census et tres radices, que equantur 54.: multiplica ergo $\frac{1}{2}$ 1., scilicet medietatem radicem in se, erunt $\frac{1}{4}$ 2.; que adde cum 54, erunt $\frac{1}{4}$ 56; de quorum radice, scilicet de $\frac{1}{2}$ 7, tolle $\frac{1}{2}$ 1., remanent .6., quod est breuius latus; maius ergo erit .8.: et si longius latus surgat in 56 cum embado. et minus latus sit .2. minus maiore; pone maius latus rem, erit minus latus res, exceptis duobus: multiplica ergo maius latus per minus, ueniet census minus duabus radicibus; cui superadde radicem, scilicet latus longius, erit census, una radice excepta, que equantur .56. Restaura ergo radicem, et oppone eam, remanebit census, qui equatur uni radici et 56: accipe quidem medietatem radicis; et multiplica eam in se, erit $\frac{1}{4}$; quod adde super 56, erunt $\frac{1}{4}$ 56; super quorum radicem, scilicet $\frac{1}{2}$ 7., adde medietatem radicis, erunt .8., quod est latus longius. Si autem ex aggregatione 4 laterum cum area parte altera longioris proueniant 76; et maius latus addat super minus .2.; tunc pone latus breuius rem, et latus longius rem et duo: multiplica ergo rem in re et duo, erit census et due radices, que equantur embado; cum quibus adde duas radices pro duobus breuioribus lateribus, et duas alias pro duobus lateribus longioribus et .4., in quibus maiora latera superhabundant minora, erunt census et sex radices et 4. dragme, que equantur 76.: tolle ergo .4. ab utraque parte, remanebit census et sex radices, que equantur .72.: pone itaque quadratum medietatis radicem super 72, erunt 81.; de quorum radice, scilicet de .9., tolle medietatem radicem, remanebunt .6. pro breuiori latere. Si uero ex area diminuatur latus breuius, et remaneant .42.; et latus maius addat super minus .2.; pone ergo latus minus rem, quam multiplica per rem et duo, scilicet per latus longius, egredietur census et due radices, que equantur areg; de quibus tolle unam radicem, scilicet breuius latus, remanet census et radix, que equantur 42. : pone ergo super 42 quadratum medie radicis, scilicet $\frac{1}{4}$, erunt $\frac{1}{4}$ 42; de quorum radice, scilicet de $\frac{1}{2}$ 6, tolle $\frac{1}{2}$, remanebunt .6., quod est latus breuius. Et si ex area tollatur maius latus, et remanent autem .40.; et maius sit duo plus minore. tunc erit manifestum : quod si minus latus tollatur ex


fol. 40 verso.

fol. 41 recto.

area, remanebunt duo plus ex eo quod remanet, cum ex area tollitur maius latus; ergo dempto minore latere ex area, remanent 42: fac ergo ut supra, et habebis propositum, si deus uoluerit.

Vel aliter: pone maius latus rem, et multiplica eam per latus breuius, scilicet per rem, exceptis duobus, erit census, minus duabus radicibus, que equantur aree: deme ergo inde unam radicem, scilicet latus maius, remanebit census, exceptis tribus radicibus, que equantur quadraginta. Restaura ergo radices, et oppone eas, et habebis censum, qui equatur tribus radicibus et .40. et cetera. ITEM diminutis .4. lateribus ex embado, remanent .20.; et maius latus addit super minus .2. Quantum est ergo quodque latus: pone latus breuius rem, et maius rem et duo. Quare .4. latera erunt .4. res et 4 dragme. Ex multiplicatione quidem rei in rem et duo proueniunt census et due res, que equantur embado. De quibus tolle 4 latera, scilicet 4 res et 4 dragmas, remanebit census minus duabus rebus et 4 dragmis, que equantur 20. Restaura ergo duas, scilicet res, scilicet .2. radices, et 4 dragmas, ueniet census, qui equatur duabus radicibus et 24 dragmis. Media siquidem radices, erit .1.; cuius quadratum adde super .24., erunt .25.; super cuius radicem adde ipsum .1., erunt .6, quod est breuius latus et cetera. ITEM si maius latus et minus addantur cum dyametro, et sint sicut medietas aree; et area sit .48.; et uis scire quantum sit dyameter, nec non et quodque latus. Accipe ergo dimidium aree, scilicet .24., que sunt summa duorum laterum et dyametri; et multiplica ea in se, erunt 576.: de quibus tolle duplum embadji, remanent 480; dimidium quorum diuide per 24., scilicet per summam coniunctionis duorum laterum cum dyametro, exhibunt .10. pro dyametro. Vel aliter: duplica embadum, erunt 96.; que diuide per 24., uenient .4.; que extrahe de .24., remanent .20.; quorum dimidium habeas pro dyametro; quibus extractis de 24., remanent .14. pro quantitate duorum laterum. Ex hoc ergo talis oritur questio. Aggregatio duorum laterum est 14., et area est .48. : fac ergo ut superius dictum est: et habebis propositum. Nam si unde ista procedant noscere uis; adiaceat quedam recta .ab. .24. ulnarum, in qua continetur summa coniunctionis duorum laterum et dyametri; et sit .ac. equalis maiori lateri dati quadrilateri parte altera longioris, et .cd. minori; remanebit ergo .bd. equalis dyametro. Constituatur siquidem super rectam .ab.]

• maiori lateri rectam .ab. •
(fol. 41 recto, lin. 34-35 e margine laterale ostendo ad inferiore; pag. 68, lin. 28 e 29).




fol. 41 verso.

tetragonum .ae.; et protrahatur dyametrum .fb.; et per puncta .cd. protrahantur recte .cpig. et .dkmh. equidistantes ut libet rectorum .af. et .be.; et per puncta quidem .ik. protrahantur recte .lim. et .nko. Quoniam tetragonum est .ae., tetragona sunt que describuntur circa dyametrum ipsius; ergo tetragonum est .kdbc. et .knfh. Rursus quia

tetragonum est quadrilaterum *.nh.*, tetragona quidem sunt *pimk.* et *ilfg.*; et est latus tetragoni *do.* recta *db.* Quare *do.* tetragonum equale est quadrato dyametri; et tetragonum quidem *.pm.* est latus; recta *.pk.*, que est equalis recte *.cd.*, et *.cd.* est equalis minori lateri. Ergo tetragonum *.pm.* equale est tetragono minoris lateris. Similiter ostendetur, tetragonum *.lg.* equale esse quadrato maioris lateris propter rectas *fg.* et *li.*, que sunt equales recte *.ac.*; et *ac.* iacet equalis maiori lateri dati parte altera longioris. Et quoniam tetragonum est *.pm.*, equalis est recta *.kp.* recte *.pi.*; ergo *.pi.* est equalis minori lateri, et *.il.* est equalis maiori. ergo supplementum *.ni.* est equale aree dati quadrilateri; et supplementum *.ih.*, ut euclides ostendit, est equale suplemento *.ni.* Ergo suplementa *.ni.* et *.ih.* dupla sunt embado dati parte altera longioris; que suplementa sunt 96.: si tollantur ex area tetragoni *.ae.*, scilicet ex 576, remanebunt tetragona *.lg.* et *.pm.*, et gnomon *.rst.* 480. Sed tetragona *.lg.* et *.pm.* equalia sunt tetragono *.do.*, scilicet dyametri; ergo *do.* tetragonum cum gnomone *.rst.* sunt 480. Sed ex *do.* tetragono et gnomone *.rst.* dimidium est superficies *.ao.*; ergo superficies *.ao.* est 240., que constat ex ductu *.ab.* in *.bo.*: ergo si 240. diuiserimus per *.ab.*, scilicet per 24., uenient 10. pro linea *.ob.*, scilicet pro linea *.bd.*, que est equalis dyametro; ergo dyameter est 10. Vel secundum aliam supradictam regulam cum de quadrato linee *.ab.*, scilicet de 24. uicibus 24. tollitur duplum embadi, scilicet suplementa *.ni.* et *.ih.*; et embadum est duplum quantitatis linee *.ab.*; ergo duplum embadi est quadruplum de 24.; ergo si ex 24. uicibus 24. tollatur quadruplum de 24., remanebunt 20. uicibus 24. pro area tetragonorum *.lg.* et *.pm.*, et gnomoni *.rst.*; ex quibus superficies *.ao.* dimidium continet, ut ostensum est. Quare superficies *.ao.* constat ex 10. uicibus 24.: ergo cum *.ab.* sit 24., sequitur necessario, *.bo.* esse 10.; que oportebat ostendere. Item aggregatio duorum laterum cum dyametro est 24.; et maius latus addit supra minus 2. Quantum est ergo quodque latus: duplica itaque quadratum de 24., scilicet 576, erunt 1152.; super que adde quadratum superhabundantie, in qua maius latus superhabundat minus, scilicet duorum, erunt 1156.; de quorum radice, scilicet de 34., tolle 24. predicta, remanent 10., que sunt dyameter; a quibus usque in 24. desunt 14., que sunt duo latera: de quibus 14. tolle 2., remanent 12.; quorum medietas, scilicet 6., est breuius latus. Ad cuius regule demonstrationem adiaceat tetragonum *abcd.* habens in singulis lateribus quantitatem duorum laterum et dyametri; et sit *be.* equalis maiori lateri, et *ef.* minorj. Remanebit *fc.* equalis dyametro: et protrahatur dyameter *ac.*; et per punctum *f.* protrahatur linea *fgh.* equidistans utrique linearum *ba.* et *cd.*; et per punctum *g.* protrahatur recta *igk.*; et erit recta *ig.* equalis recte *bf.*; et auferatur a recta *gi.* recta *gl.*, que sit equalis recte *fe.*; remanet ergo *li.* equalis recte *eb.*; ergo *gl.* est equalis minori lateri, et *li.* maiori: auferatur itaque ab *li.* recta *im.*, scilicet id in quo maius latus superaddit minus, remanebit *ml.* equalis *lg.*, scilicet maiori lateri: et educatur *ad.* in puncto *n.*; et sit *dn.* equalis *fc.*, scilicet dyametro; et constituatur super *an.* tetragonum *nopa.*; et quoniam tetragona sunt *bd.* et *pn.*, et sunt circa unum angulum, qui ad *a.* circa eundem dyametrum sunt; ergo si protrahatur dyameter *ac.* in punctum *o.*, ueniet ergo recta *ao.* dyameter. Protrahatur quidem recta *dc.* in *q.*, et recta *bc.* in *r.*; tetragonum ergo est *qr.* continens in se quadratum dyametri dati parte altera longioris: totum igitur tetragonum *pn.* equatur tetragono *bd.* et gnomini *stu.* De-

tetragono *do.* ... duplum quantitatis (fol. 41 verso, lin. 19-26; pag. 69, lin. 12-19).




fol. 42 recto.

monstrabo siquidem, ignomon *stu.* equale esse tetragono *bd.*, et tetragono lineae *im.*, que est superhabundantia, in qua maius latus superhabundat minus. Sunt enim supplementa *pc.* et *cn.* equalia superficiebus *bk.* et *fd.* Sed due superficies *bk.* et *fd.* equantur ignomonj *xyz.* et tetragono *fk.* Quibus superaddatur equale tetragono *qr.*, quod est equale tetragono *fk.*, erit duplum tetragoni *fk.* cum ignomone *xyz.* equale ignomoni *stu.* Restat siquidem demonstrandum, duplum tetragoni *fk.* equale esse tetragono *ih.* et *ei.*, quod describitur á recta *im.*; est enim recta *gm.* in duo equa diuisa in puncto *l.*, cui in directo adiuncta est recta *mi.*; erit itaque tetragonum, quod describitur a recta *gi.*, scilicet tetragonum *ih.* cum eo quod describitur á recta *im.*, duplum eorum, que describuntur á rectis *gl.* et *li.* Sed tetragona que describuntur á rectis *gl.* et *li.* equantur tetragono *fk.*; quare duplum tetragonj *fk.* equatur tetragono *ih.* et *ei.*, quod describitur á recta *im.*; ergo ignomon *stu.* equatur tetragono *bd.*, et quadrato superhabundantie maioris lateris, ut prediximus. Nunc ueniamus ad causam. Multiplicauimus superius *.24.* per *24.*, et habuimus quadratum *bd.*; que duplauimus, hoc est addidimus super eam equale illius; et superaddimus postea *.4.*; hoc est super quadratum *bd.* superaddimus ignomon *stu.*; et sic habuimus *.1156.* pro quadrato *pn.*, cuius latus est radix illius: ergo *po.* est *34.*; de qua extracta *pq.*, scilicet *bc.*, remanet *qo.* *10.*, cui equalis est recta *cf.*; ergo *cf.* est *10.*, ut predixi. Possumus etiam aliter ad notitiam supradictorum laterum deuenire. Videlicet ut ponas latus minus rem. Eritque latus longius res et duo; quibus extractis de *.24.*, remanent pro dyametro *.22.*, exceptis duabus rebus. multiplica rem in se, erit census et rem. et duo in se, erit census et *4.* res et *iii.*^{or} dragme: quibus in unum coniunctis, erunt duo census et *.4.* res et *.4.* dragme, que equantur quadrato dyametri, scilicet multiplicationi de *22*, exceptis duabus rebus in se; que multiplicatio est *4* census et *484*, exceptis *.88.* radicibus. Restaura ergo radices, et oppone duos census et *4* dragmas, et inuenies, *92* radices equari duobus censibus et *490*. Redige ergo hec ad censum unum, et erit census et *240*, que equantur *46* radicibus et cetera. Vel pone latus longius rem, eritque latus breuius res minus duo; que extrahe de *24.*, remanent *.26.*, exceptis duabus rebus: et operare de inde ut supra; et inuenies, census et *336* equari *50* radicibus. Si autem dyameter addiderit super latus maius *.2.*, et maius super minus totidem; et uis scire dyametrum et quodque latus. Semper cum superhabundantie laterum erunt equales, multiplicabis ipsam superhabundantiam per *5.*, et habebis dyametrum; et ipsam per *.4.*, et habebis longius latus; et ipsam per *3.*, et habebis breuius. Verbi gratia: superhabundantia quidem laterum est *.2.*; quibus multiplicatis per *.5.* et per *.4.* et per *.3.*, egrediuntur *10.* pro dyametro, et *8* pro latere longiori et *6* pro breuiori: et hec contingunt propter quadrilaterum parte altera longius; cuius latus longius est *.4.*, breuius *.3.*, dyameter quoque *.5.*: horum quidem laterum superhabundantia est unum. Quare sicut *.4.* erit ad quam uolueris superhabundantiam, ita hec tria latera erunt ad latera illius parte altera longioris, de quo superhabundantia aliqua data fuerit. Verbi gratia: si superhabundantia erit *.3.*; quia *3* tripla sunt de uno, ideo tripla erunt latera ex lateribus predictis, scilicet dyameter erit *.15.*; latus quoque maius *.12.*, minus autem *.9.* Vnde si proponatur, dyametrum esse *.20.*; et uis scire superhabundantiam laterum, diuide *.20.* per *.5.*, exhibunt *.4.*, que sunt superhabundantia laterum: quam multiplica per

4, et per .3., erunt .16. et 12, que sunt latera. Item latus longius sit .20. ; diuide ergo ipsum per .4., quia quaternarius est similis lateribus longioribus et 3 breuioribus et 5 dyametris. Diuisis ergo .20 per .4., ueniunt .5. pro superhabundantia; quam multiplica per .3. et per .5., ueniunt .15. pro latere breuiori et 25 pro dyametro. Rursus latus breuius sit .18.: diuide ergo ipsum per .3., exhibunt .6. pro superhabundantia laterum; quam multiplica per 4. et per 5., ueniunt 24 pro latere longiori, et 30 pro dyametro. Nam si superhabundantie inequales fuerint ut in quadrato, in quo proponitur, dyametrum addere .1. super latus maius, et maius supra minus .7.; tunc operabimur per algebram: ponemus siquidem latus breuius rem, eritque latus longius res et 7; et dyameter erit res et .8.: multiplica itaque rem in rem, facit censum. Et rem, et .7. in se, facit censum et 14 res et 49 dragmas; quibus insimul iunctis, erunt duo census et 14 res et .49, que equantur quadrato dyametri, scilicet multiplicationi unius rei et 8 in se; que multiplicatio est census et 16 res et 64. : tolle ergo ab utraque parte censum et 14 res et .49., remanebit census, qui equatur duabus radicibus et 15. Quare media radices, ueniet .1.; quod multiplica in se, erit .1.; quod adde cum .15., erunt .16.: super quorum radicem, scilicet super .4., adde medietatem radicem, erunt .5, que sunt minus latus: super que adde .7., erunt 12, que sunt maius latus: super que adde .1., erunt .13, que sunt dyameter. ITEM maius latus addit super minus .7. ; et dyameter est .13.; quantum est ergo quoque latus: quadratum itaque superhabundantie ex quadrato dyametri abice, scilicet 49 de 169., remanebunt .120.; cuius dimidium, scilicet 60., est area. Exempli causa: adiaceat recta .ab. equalis duobus lateribus; et sit .bg. equalis minori lateri, remanet .ga. equalis maiori; et sit .ac. 7., in quo maius latus .ag. superhabundat minus .bg. ; ergo .gc. equalis est recte .gb. Constituatur itaque super rectam .ab. tetragonum .ad., et expleatur figura; erit quidem latus tetragoni .gk. recta .gb., hoc est .gi.; latus quoque tetragoni .hf. est recta .hi. uel .if., que sunt equales recte .ag.: supplementum ergo .ai. est equale quadrilatero dato, quia constat ex rectis .ag. et .gi., que sunt equales duobus lateribus dati quadrilateri. Et supplementum .id. est equale supplemento .ai.; ergo supplementa .ai. et .id. dupla sunt aree dati quadrilateri; ergo duplum aree cum tetragonis .hf. et .gk. est equale tetragono .ad. Sed duo tetragona .hf. et .gk. sunt equalia quadrato dyametri; ergo supplementa .ai. et .id. cum quadrato dyametri dati parte altera longioris equalia sunt tetragono .ad. Sed tetragonum .ad. cum eo quod á recta .ac. describitur duptum est tetragonis, que describuntur á rectis .ag. et .gb. Sed ea que describuntur á rectis .ag. et .gb. equalia sunt tetragono dyametri. Ergo duplum tetragoni dyametri equale est tetragono .ad., et ei quod á recta .ac. describitur. Sed semel tetragonum dyametri equale est tetragonis .hf. et .gk.; remanet ergo tetragonum dyametri equale supplementis .ai. et .id., et tetragono quod á recta .ac. Quare extraximus tetragonum, quod est á recta .ac., scilicet .49., ex quadrato dyametri, et remanserunt nobis .120. pro supplementis .ai. et .id.: quorum dimidium, scilicet .60., est area .ai. quadrilateri, quod est equale dati quadrilateri. ergo area dati quadrilateri est .60. | ut predixi. Sed ut habeas latera, dices: aream est 60; et maius latus addit .7. super minus ; fac ergo ut supra docuimus. Aliter pone latus minus rem ; eritque latus maius res et 7. : multiplica ergo rem in re, et rem et 7 in se; et adde ea, et erunt duo census et 14 radices et 49 dragmas; que oppone quadrato dyametri, et habebis quod queris.

fol. 43 recto.

* dupla sunt ... dyametri equale *
(fol. 43 recto, lin. 23-30; pag. 71, lin. 28-34).



fol. 43 verso.

ITEM est pars altera longior, cuius dyiameter est .20.; et id quod addit dyiameter super latus maius non est equale ei quod addit maius super minus. Quantum est ergo quodque latus. Inuenias quidem aliquod quadrilaterum, cuius latera et dyiameter sit rationabilia; et augmentum ipsius non sit equale. Sitque supradictum quadrilaterum, cui latus minus est .5.; maius quoque est .12.; dyiameter quidem est .13.; que .13 habeas pro antecedente, cum ponatur dyiameter esse .20. Quare multiplicabis 20 per 12, et 20 per 5; et diuide utramque multiplicationem per 13, et habebis maius latus $\frac{6}{13}$ 18., minus quoque $\frac{9}{13}$ 7. Et si maius latus fuerit .20.; et uis inuenire minus latus seu dyiameter; tunc multiplicabis .20 per 5, et 20 per 13; et diuides utramque multiplicationem per 12; et habebis minus latus $\frac{4}{3}$ 8.; dyiameter quoque $\frac{2}{3}$ 21. Rursus minus latus sit .20.; tunc multiplicabis .20 per 12, et 20 per 13, et diuides utramque multiplicationem per 5; uel quintam de .20., scilicet .4., multiplica per 12 et per 13; et inuenies, maius latus esse 48., et dyiameter .52. Sed ut in similibus sanius procedere ualeamus, quedam adiaceant demonstranda. Videlicet ut super quemlibet datum numerum doceamus addere quadratum numerum, et proueniat numerus quadratus. Esto datus numerus .a., oportet super numerum .a. quadratum numerum addere, et earum summa fiat quadrata, hoc est quod habeat radicem. Inuenias quidem duos numeros inequales, qui insimul multiplicati faciant numerum .a. : sintque .bg. .gd. ; et diuidatur .bd. in duo equalia super punctum .e.; et quoniam numerus .bd. diuisus in duo equalia super punctum .e. et inequalia super punctum .g.; erit multiplicatio .dg. in .gb. cum quadrato numeri .ge. equalis quadrato .de. Sed multiplicatio .dg. in .gb. numerum .a. facit; ergo numerus .a. cum quadrato numeri .ge. equatur quadrato numeri .de.; quod oportebat facere. Si autem unum ex lateribus quadrilateri continentibus angulum rectum datum fuerit; et uis aliud latus, nec non et dyiameter in numeris inuenire; et sit datum latus .13., multiplica itaque 13. in se, erunt .169., que sint linea .ab.; et inueniantur duo numeri, qui insimul multiplicati faciant numerum .ab. Sintque .ab., et unitas .bg. Nam ducta unitate in quo uis numero, idem prouenit numerus; ergo multiplicatio .bg. in .ba. numerum facit, scilicet .169.; diuidaturque numerus .ag. in duo equalia super punctum .d., eritque .gd. dimidium ex .ag., scilicet .85., que est dyiameter; remanebit .bd. 84., quod est aliud latus. Et quoniam infinitos duos inequales numeros tamen cum fractionibus inuenire possimus, quorum superficies contineret numerum .ab. Infinita quidem latera et dyometri inueniri possunt conuenientia dato lateri. Verum si proponatur, dyiameter esse 34; et uis latera inuenire. Duplica quidem 34, et egrediatur inde numerus .ef., scilicet .68.; et diuidatur .ef. in duo equalia super punctum .g., eritque .gf. 34.; et sumatur super numerum .ef. punctus .d., et sit proportio .fd. ad .de. sicut aliquis quadratus numerus ad aliquem quadratum numerum. Sit itaque .fd. 4., remanebit .de. 64; et quoniam .fd. et .de. habent proportionem quadratorum ex .fd. in .de., egrediatur quadratus numerus, scilicet .256., quorum radix, scilicet .16., erit unum latus; reliquum erit .dg., quod est .30.; dyiameter autem .gf., scilicet .34. Item si dictum fuerit: augmentum dyometri super latus longius est equale augmento longioris super breuius; et multiplicatio augmenti in dyiameter faciat .20. Supradicta ratione diuide .20 per 5, egrediuntur .4., quorum radix, scilicet .2., est augmentum; multiplica ergo augmentum in .5. et in .4 et in .3, et habebis dyiameter .10.; latus quoque maius .8., minus uero .6.

* Videlicet ut super ... et proueniat * (fol. 43 verso, lin. 19 e 20; pag. 72, lin. 14-15).

a

* quadratum numerum ... radicem. Inuenias * (fol. 43 verso, lin. 20, 21 e 22; pag. 72, lin. 16 e 17).

b — c — d — g

* facit, scilicet .169.; ... punctum .d., eritque * (fol. 43 verso, lin. 33; pag. 72, lin. 28 e 29.)

a — d — b — g

fol. 44 recto.

* punctum .g. ... et sit proportio * (fol. 44 recto, lin. 5 e 6; pag. 52, lin. 34-35).

e — g — d — f

Et si proponatur: est quadrilaterum longius altera parte, cuius dyametri proportio ad ipsius longitudinem est sicut proportio longitudinis eius ad eius latitudinem, etiam dyameter est 10. In hac autem diuidende sunt .10. secundum mediam et extremam proportionem; et quod medie proportioni ceciderit, erit minus latus; ipsumque per .10. multiplicandum est; et ipsius multiplicationis radix erit latus longius: verbi gratia: adiacet trigonum orthogonium .*abg.*, scilicet dimidium quadrilateri parte altera longioris, cuius dyameter est .*ag.*, latus longius .*ab.*, breuius quoque .*bg.*; et protrahatur super .*ag.* cathetus .*bd.*; et sit sicut .*ga.* ad .*ab.*, ita .*ab.* ad .*bg.* Et quoniam recta .*bd.* cathetus est super rectam .*ag.*, trigona .*bdg.* et .*bda.* sibi inuicem similia sunt, et toti trigono .*abg.* Quare est sicut .*ga.* ad .*ab.*, ita .*ba.* ad .*ad.* Sed sicut .*ga.* ad .*ab.*, ita .*ab.* est ad .*bg.*; ergo recta .*ab.* ad rectas .*bg.* et .*ad.* eandem habet proportionem. Quare recta .*ad.* recte .*bg.* est equalis. Item quia trigona .*abg.* et .*bdg.* sibi inuicem similia sunt, est sicut *ag.* ad .*gb.*, ita *bg.* ad *gd.*; nam .*bg.* equalis est recte .*ad.*: est ergo sicut .*ag.* ad .*ad.*, ita .*ad.* est ad .*dg.* Ergo .*ag.*, scilicet .10., diuisa est secundum mediam et extremam proportionem; et est media, scilicet maior pars eius .*ad.*, cuius minus latus quesiti parte altera longioris, scilicet .*gb.*, iacet equalis. Nam ut inuenias quantitatem eius, secundum Euclidis regulam, dimidium de .10., scilicet .5, in se multiplicca; et quod prouenerit adde cum quadrato linee .*ag.*, scilicet cum .100., erunt .125.; de cuius radice abice .5., scilicet dimidium linee .*ag.*; et sic habebis pro minori latere, scilicet pro linea .*gb.*, radicem de .125. minus .5. Nam ut habeamus maius latus .*ab.* Quoniam est sicut .*ga.* ad .*ab.*, ita .*ab.* ad .*bg.*; erit quidem superficies .*bg.* in .*ga.* equalis quadrato linee .*ab.* Quare multiplica .*ag.* in .*gb.*, scilicet 10., in radice de .125. minus .5, et egredietur radix de 12500 minus .50. pro latere .*ab.* Procedunt multe et diuerse questiones ex lateribus etiam et ex dyametro, seu ex area supradictorum duorum quadrilaterorum, quarum solutiones, per ea que dicta sunt, poteris inuenire.

Incipit pars secunda tertie differentie.


RELIQVI quidem quadrilateri in III^{or} partes diuiduntur: in prima quorum sunt rumbi, qui omnia III^{or} latera sibi inuicem equalia habent, sed angulos minime rectos habent. In secunda quidem sunt rumbi, idest qui tantum habent latera opposita sibi inuicem equalia et equidistantia, nec non et angulos oppositos equales habent. In tertia sunt campi, qui duo latera habent equidistantia, sed non equalia: qui diuiduntur in III^{or} genera, secundum quod inferius demonstrabimus. In quarta uero sunt diuersilateri campi, qui nullam equidistantiam in eorum lateribus habent.

Incipit de rumbo.

SIT Rumbus .*a.b.c.d.* habens in singulis lateribus perticas 13.; cumque hunc mensurare uolumus, oportet nos habere notitiam unius dyametrorum. Esto itaque dyameter eius breuius .*bd.* perticarum .10. Erit itaque rumbus .*a.b.c.d.* ab ipso dyametro in duo trigona equalia diuisus, quorum unumquodque est equicrurium. Nam duo latera, que sunt .*ab.* et .*ad.*, duobus lateribus .*cb.* et .*cd.* equantur; et comunis eorum est .*bd.*


Quare angulus, qui sub .*bad.*, angulo, qui sub .*bcd.* est equalis; et totum trigonum .*abd.* toti trigono .*cbd.* equatur. Ergo si aream huius rumbi habere uolumus, duplicabimus aream trigoni .*abd.* uel .*bcd.*; et sic habebimus propositum. Nam area trigoni .*abd.* colligitur ex ducto catheto .*ae.* in dimidium basis .*bd.*, ut in trigonis de-

* ita .*ab.* ad .*bg.* ... Nam ut inuenias * (fol. 44 recto, lin. 23-31; pag. 73, lin. 8-16).



fol. 44 verso.

* duplum aree linee .ae. * (fol. 44 verso, lin. 24-33; pag. 74, lin. 1-11).




fol. 45 recto.

monstratum est. Quare si multiplicauerimus cathetum .ae. in totam .bd., ueniet duplum aree trigoni .abd., hoc est area rumbi .abcd.: cadit itaque cathetus .ae. in medio .bd., cum equicrurium sit trigonum .abd. Quare si notitiam eius habere uis, extrahe quadratum linee .eb. ex quadrato linee .ab., scilicet .25 de 169, remanebunt 144.; quorum radix, scilicet .12., est cathetus .ae.: propter eadem ergo et cathetus .ce. est similiter .12.; et est .c.e. recta in directo recte .ea. Cum anguli .aed. et .dec. sint recti. Quare dyameter est recta .ac., et est .24. Ergo area rumbi .abcd. colligitur ex multiplicatione dimidij dyametri .ac. in toto dyametro .bd.; que multiplicatio est .120.: similiter si data fuerit dyameter .ac. 24 perticarum, inuenimus siquidem per ipsum supradicto modo dyametrum .bd. Quia equicruria sunt trigona .bac. et .dac., et sunt sibi inuicem equalia. Quare si ex potentia lateris .ba. extraxerimus potentiam linee .ae., scilicet .144 de 169, remanebunt .25. pro potentia catheti .be.; ergo .be. est .5. Quare tota dyameter .bd. est .10. Et quoniam si multiplicauerimus cathetum .be. per dimidium basis | .ac., egredietur nobis area trigoni .abc. Quare si multiplicauerimus cathetum .be., scilicet dimidium dyametri .bd., in totum dyametrum .ac., reddetur nobis area totius rumbi .abcd. Nam multiplicatio .be. in .ac., scilicet .5. in .24., facit .120., quod est area rumbi .abcd. Ergo area omnium rumborum colligitur ex multiplicatione unius dyametri in dimidio alterius; et hec est regula uniuersalis in ipsis.

NAM si proponatur quod maior dyameter sit 24., minor quoque .10.; et uis scire latera rumbi. Quadrata medietatis dyametrorum, scilicet linearum .ae. et .eb. in unum coniunge; quorum radicem, scilicet .13., habeas pro uno quoque latere. Possumus quidem multas questiones ex dyametris et ex area, etiam et ex lateribus rumbi proponere; que omnes reduci possunt ad questiones illius parte altera longiores, cuius latus longius est medietas longioris dyametri rumbi: breuius quoque est medietas breuioris. Quod quadrilaterum dimidium rumbi aree continere probabimus: protrahatur itaque, ut in hac alia cernitur figura, .af. equalis et equidistans linee .eb.; et copuletur .fb. Dico quidem, quadrilaterum .ef. dimidium esse rumbi .abcd.; et sunt latera eius equalia medietatis dyametrorum .ac. et .bd. Nam .ae. dimidium continet ex .ac., et .be. ex .bd.: est enim trigonum .abd. dimidium rumbi .abcd. Sed trigonum .abd. equale est quadrilatero .ef.; constat enim utrumque ex ductu .ae. in .eb.; ergo quadrilaterum .ef. dimidium est rumbi .abcd., ut predixi. Nam qualiter questiones rumbi ad quadrilaterum perducantur, quedam de multis uolumus proponere. Si dictum tibi fuerit: aggregaui duos dyametros, et fuit .34.; et rumbi area est .120. Quantum est ergo queque dyameter. Cum itaque dyametri sint .34.; dimidium ipsarum, scilicet .ae. et .eb., sunt .17.; et area quadrilateri .ef. est .60.: ergo perduxisti hanc questionem ad unam ex questionibus parte altera longioris; ad eam uidelicet, in qua proponitur aream esse .60., et aggregationem laterum .17.: ex quadrato quidem medietatis .17, scilicet ex $\frac{1}{4}$ 72, tolle 60, remanet $\frac{1}{4}$ 12.; quorum radicem tolle ex medietate .17., remanebunt 5. pro linea .be.: reliquum quod est usque in .17., est linea .ae.; ergo duplum eorum, scilicet .24. et .10., sunt dyametri. Item aggregatio dyametrorum sunt .24.; et maius addit super minus .14. Quantum est ergo area: tolle .14 et 34., remanebunt .20.; quorum dimidium, scilicet .10., est dyameter breuior. Reliquum, scilicet .24., est longior; multiplica quidem dimidium unius dyametrorum per alium, et habebis aream.

* aggregaui duos scilicet .24. * (fol. 45 recto, lin. 20 e 21-30; pag. 74, lin. 32, 33-42).




Rursus aggregaui duos dyametros cum area rumbi, et prouenerunt .154.; et maior dyameter addit super minorem .14. Quoniam duo dyametri rumbi equantur .11. or lateribus quadrilateri .*ef.*: pone latus breuius rem; eritque latus longius res et 7. : multiplica ergo rem in re et in .7., proueniet census et .7. radices, que sunt area | quadrilateri .*ef.* Et quoniam quadrilaterum .*ef.* dimidium continet rumbi. Duplica ergo censum et 7 radices, erunt duo census et .14 res, que equantur rumbi: super que adde .4 res et 14., scilicet quatuor latera, erunt duo census et 18. radices et .14., que equantur .154.: tolle ergo ab utraque parte .14.; et redige ea ad censum unum, ueniet census et 9 radices, que equantur .70.: media ergo radices, erunt $\frac{1}{2}$ 4.; que multiplica in se, erunt $\frac{1}{4}$ 20.; que adde cum .70, erunt $\frac{1}{4}$ 90; de quorum radice abice $\frac{1}{2}$ 4., remanebunt .5. pro .*be.*; quorum duplum, scilicet .10., est dyameter .*bd.*: quibus additis .14., erunt .24. pro dyametro longiori; a quibus dyametris usque in .154. remanet .120. pro area. Adhuc aggregaui dyametrum breuiorem, et latus rumbi, et fuerunt .23.; et dyameter maior addit super minorem .14. Quantum est ergo latus, nec non et queque dyameter. Quoniam dyameter maior addit .14 super minorem; ergo medietas dyametri longioris addit .7. super medietatem breuioris, scilicet latus .*ae.* super latus .*eb.* Ergo .*be.* cum .*ae.* addit .7. super dyametrum .*bd.* Sed .*bd.* cum latere .*ab.* sunt 23; ergo .*be.* et .*ea.* cum .*ab.* sunt .30. Vnde talis est hec questio. Aggregaui duo latera quadrilateri cum dyametro ipsius, et fuit .30.; et maius latus addit super minus .7: fac ergo ut supra dictum est, et cetera. Item multiplicasti unam quamque dyametrum in se, et aggregasti eas: et quod prouenerit fuit .676.; et area est .120. Queque igitur dyameter quanta est. Accipe itaque quartum de .676.; quia quadrata linearum .*ae.* et .*eb.* quarta pars sunt ex quadratis dyametrorum; cum ipsarum latera sint dimidium ipsorum, exhibunt .169., quorum radix, scilicet 13., est dyameter quadrilateri .*ef.*, scilicet latus rumbi. Et quoniam ostensum est superius, quod quadratum dyametri parte altera longioris addit super duplum embadi quadratum superhabundantig laterum ipsorum. Iccirco si extraxerimus embadum rumbi .*abcd.*, quod est duplum aree quadrilateri .*ef.*, ex quadrato dyametri ipsius, scilicet .120 ex .169, remanebunt .49., quorum radix, scilicet .7., est superhabundantia laterum: ergo area quadrilateri est .60., et maius latus addit super minus .7.; quantum est ergo quodque latus, et cetera. Item multiplicaui maiorem dyametrum rumbi per minorem, et prouenit 240.; et maior dyameter addit super minorem .14.; quanta est ergo queque dyameter: ex multiplicatione quidem medietatis unius dyametri in totam aliam prouenit embadum rumbi; ergo .240., scilicet multiplicatio unius dyametri in aliam sunt dupla ex area rumbi; ergo area rumbi est .120., que est duplum aree quadrilateri .*ef.* Ergo area quadrilateri .*ef.* est .60. Vnde talis oritur questio. Est quadrilaterum parte altera longius, cuius area est .60.; et maius latus addit super minus | 7., scilicet dimidium de .14., in quibus maior dyameter superhabundat minorem, et cetera.

Rursus aggregaui dyametros, et quod prouenit fuit .34.; et ex multiplicatione unius dyametri per aliam prouenerunt .240. Quanta est ergo queque dyameter. Ad hec quidem ostendenda, adiaceat recta .*ab.* 34. perticarum; et sit diuisa in duo equa, et totidem inequalia super puncta .*g.d.*; et sit .*ad.* equalis dyametro breuiori; remanet ergo .*db.* equalis maiori. Ex multiplicatione quidem .*ad.* in .*db.* cum quadrato linee .*dg.* egreditur quadratum linee .*gb.*, scilicet de .17., quod est .289.: ex quibus si extraxeris

fol. 45 verso.

* radice abice ... Item multiplicasti unamquamque > (fol. 45 verso, lin. 7-17 e 18; pag. 75, lin. 10-20).




fol. 46 recto.

* equa; et totidem ... equalis dyametro > (fol. 46 recto, lin. 5; pag. 75, lin. 40-41).

a dg b

multiplicationem ex *ad.* in *db.*, remanebunt .49. pro quadrato *dg.*; ergo *dg.* est .7.; quibus additis cum *bg.*, erit tota *bd.*, scilicet maior dyameter .24.; remanet *da.* 10., que est minor dyameter. Iterum diuisi maiorem dyameterum per minorem, et egredietur ex diuisione $\frac{2}{3} 2.$, et area rumbi est .120.; quanta est ergo queque dyameter. Quoniam est sicut totum ad totum, ita quelibet pars est ad eandem partem. Erit itaque sicut maior dyameter est ad minorem, ita medietas maioris ad medietatem minoris; et medietas maioris est maius latus quadrilateri *ef.*, scilicet linea *ae.*; et medietas minoris est linea *eb.*, scilicet minus latus. Nam omnes numeri, qui habent unam et eandem proportionem, si diuidantur maiores per minores, semper ueniet idem ex diuisione. Ergo si diuiserimus maius latus quadrilateri *ef.* per minus, prouenient similiter $\frac{2}{3} 2.$; ergo talis est questio: area quadrilateri est .60., scilicet dimidium aree rumbi; et diuisi maius latus per minus, et prouenerunt $\frac{2}{3} 2.$; et multiplica ita .1. per $\frac{2}{3} 2.$; que multiplica per .60., erunt .144., quorum radix est .12.; que diuide per numeros proportionis, scilicet per .1., et per $\frac{2}{3} 2.$, egredientur 12 et 5., que sunt latera quadrilateri, scilicet dimidium dyametrorum; ergo maior dyameter est .24., et minor est .10. Nam si unde hec procedant noscere uis, adiaceat unitas *a.*; et $\frac{2}{3} 2.$ sit *b.*; multiplicentur *a.* per *b.*, et proueniat *g.*; et sit minus latus quadrilateri *d.*, maius quoque *e.*; et area sit *f.*; et quoniam ex diuisione maioris lateris per minus prouenit $\frac{2}{3} 2.$; est sicut .1. ad $\frac{2}{3} 2.$, ita minus latus est ad maius, hoc est sicut *a.* ad *b.*, ita *d.* ad *e.* Quare ductus *a.* in *e.* est sicut ductus *b.* in *d.* Sit ergo multiplicatio ex *a.* in *e.*, uel ex *b.* in *d.* numerus *h.*; et *h.* multiplicetur in se, proueniat .1.: et multiplicetur quidem *d.* in *f.*, et proueniat *k.*: dico, numerum *k* equalem esse numero *i.* Multiplicasti quidem *a.* in *b.*, et uenit *g.*; et *d.* in *e.*, et uenit *f.*; et *g.* in *f.*, fecit *k.*: ergo numerus *k.* factus est ex multiplicatione *a.* in *b.* ducta in *d.* et producta in *e.* Item multiplicasti *a.* in *e.*, et prouenit *h.*; et *b.* in *d.*, et prouenit similiter *h.*; et ex *h.* in *h.* factus est .1.: ergo .1. factus est ex multiplicatione *a.* in *e.* ducta in *b.* et producta in *d.* Sed multiplicatio *a.* in *b.* ducta in *d.* et producta in *e.* equatur multiplicationi *a.* in *e.* ducta in *b.* et producta in *d.*; ergo *k.* equalis est .1., ut prediximus. Multiplicauimus quidem superius *a.* in *b.*, et prouenit $\frac{2}{3} 2.$; que multiplicauimus per aream, scilicet *g.* per *f.*, et habuimus numerum *k.*, hoc est numerum *i.*, qui fuit .144.; de quibus accepimus radicem, que fuit *h.*; quia ex multiplicatione *h.* in se prouenit .1.; ergo *h.* est .12. Et quoniam ex *a.* in *e.* prouenit *h.*, scilicet .12.; et *a.* est .1. Ideo diuisimus .12 per 1., scilicet *h* per *a*, prouenit .12., quod est *e.*, scilicet maius latus. Item ex *b.* in *d.* prouenit *h.*, scilicet .12.; et *b* est $\frac{2}{3} 2.$ Quare diuisimus .12, scilicet *h*, per *b*, scilicet per $\frac{2}{3} 2.$; et habuimus *d.*, scilicet minus latus, quod fuit .5. Nam si area, scilicet *f.*, esset .100, tunc *k*, scilicet .1., esset .240., cuius radix est *h.* Sed 240. non habet radicem; vnde cum non possumus diuidere *h.* per *a.* et per *b.*, accipiemus quadratos eorum, et in ipsis diuidemus numerum .1. Vel aliter accipiemus proportionem in sanis numeris, quam habet unitas *a.* ad *b.*, eruntque .5. et 12. Sit ergo *a.* 5., et *b.* 12., et *g.* .60. Quare *k.* uel 1 erit .6000.; que diuidemus per quadrata numerorum *a* et *b.*, scilicet per 25, et per 144., egredietur per maiore latere radix ducentorum quadraginta; minus uero erit radix de $\frac{2}{3} 41.$ Vel aliter: pone latus minus rem, eritque latus maius due res et due quinte rei: multiplica ergo rem in duabus rebus et duabus quintis, erunt


* semper ueniet . . . ita minus *
(fol. 46 recto, lin. 18-27; pag. 76, lin. 9-19).



* sicut ductus . . . numerus *h.* et *h.* *
(fol. 46 recto, lin. 29; pag. 76, lin. 19 e 20).

$$\frac{.1.}{a} \quad \frac{\frac{2}{3} 2.}{b} \quad \frac{g.}{g.}$$

* *h.* equalem esse . . . et producta *
(fol. 46 recto, lin. 31-35; pag. 76, lin. 22-25).




fol. 46 verso.

duo census et due quinte census, que equantur aree date. Sit ergo area data .100.; que diuide per $\frac{2}{3}$ 2., proueniet $\frac{2}{3}$ 41; quorum radix est .d., scilicet latus minus. Et quoniam est sicut .a. ad .b., ita .d. ad .e.; erit itaque sicut quadratus numeri .a. ad quadratum numeri .b., ita quadratus quantitatis .d. ad quadratum quantitatis .e. Quare multiplica quadratum numeri .b. per quadratum quantitatis .d., scilicet .144 per $\frac{2}{3}$ 41.; et multiplicationis summam diuide per quadratum numeri .a., scilicet per 25, egredientur .250., quorum radix est latus maius.

Incipit de rumboidis differentia secunda.

RUMBONES quidem est figura paralilograma habens tantum latera opposita, et angulos ut diximus equales. Cumque hanc metiri uolumus, protrahemus in ea dyametrum, per quam figura diuisa erit in duo trigona equalia. Quare si cathetum unius per totam basem, scilicet per dyametrum ipsius multiplicauerimus, reddet aream totius rumboidis. Ad cuius rei euidenciam sit rumboides .abcd. habens in singulis lateribus .ab et .cd. perticas .30., que sibi inuicem opposita et equidistantia sunt. Reliqua uero duo latera .ac. et .bd. similiter sunt equalia et equidistantia, continentia in uno quoque latere perticas .13.; et sit dyameter .bc. perticarum .37., á qua rumboides .abcd. in duo equalia trigona diuisus est, que sunt .abc. et .dbc.; utrumque ipsorum est ampligonium propter potentiam dyametri .bc., que est maior duabus potentijs laterum .ba. et .ac., uel .bd. et .dc. Supra basem quidem .bc. protrahatur cathetus á puncto .a. in trigono .abc; sitque .ae.; et multiplicabis cathetum .ae. per basem .cb., et habebis aream totius rumboidis |


ae., et multiplicabis cathetum
(fol. 46 verso, lin. ultima, margine inferiore; pag. 77, lin. 20).




abcd.; vel inuenies cathetum .df. in trigono .bcd. super basem .bc.; et multiplicabis ipsum cathetum .df. per basem .bc., et habebis similiter embadum rumboidis .abcd. Verbi gratia: Rumboides .abcd. est duplum trigono .bcd., cuius trigoni area colligitur ex multiplicatione catheti df in dimidium basis .bc.: quare multiplicatio catheti df. per totam basem .bc. facit duplum aree trigoni .bcd.; ergo facit aream totius rumboidis, qui est duplus trigoni .bcd. Nam utramque cathetum .ae. et .df. inuenies esse perticas $\frac{22}{27} 9.$ Quibus $\frac{22}{27} 9.$ multiplicabis per dyametrum .bc., scilicet per 37, addunt perticas 360 pro area totius rumboidis .abcd. Similiter si extra trigonum .bcd. cathetum .bg. protraxeris supra basem .cg.; et multiplicauerimus ipsum cathetum .bg. per basem trigoni, scilicet per lineam .cd., habebis embadum totius rumboidis .abcd. Item multiplicato catheto .ch. per basem .ab., reddet eiusdem rumboidis embadum. Reperitur autem utraque cathetus per regulam, quam superius in trigono ampligonio demonstraui. Verbi gratia: extractis potentijs laterum .ca et .ab, uel .bd et .dc., scilicet 169 et 900. de potentia lateris .bc., scilicet ex 1369., remanent 300;

fol. 47 recto.

* remanent 300; . . . siquidem huius * (fol. 47 recto, lin. 45-49; pag. 77, lin. 43 — pag. 78, lin. 4-5).




* catheti .be. in basem * (fol. 47 recto, lin. ult. margine inferiore; pag. 78, lin. 19-20).



fol. 47 verso.

* catheti in . . . de 169. extraxeris * (fol. 47 verso, lin. 10 & 11 — 16 & 17; pag. 78, lin. 31-36).



cuius dimidium si diuisum fuerit per basem *.cd.*, scilicet per 30, reddit .5. pro quantitate *.dg.* uel *.ah.*; cuius potentia, scilicet .25., extracta ex potentia *.bd.*, scilicet de .169., remanet .144.; cuius radix, scilicet .12., est cathetus *bg.* Quo multiplicato per basem *.cd.*, scilicet 12 per 30, reddunt perticas .360 pro embado dicti rumboidis, ut superius inuenimus. Inuestigatur siquidem huius rumboidis area per duos alios cathetos, qui sunt *.di.* et *.ak.*, qui reperiuntur per dyametrum *.ad.* et per latera rumboidis. Quia protracto ipso dyametro resoluitur ipse rumboides in duobus trigonis oxigonijs, ut in hac alia figura depingitur, quorum unum est trigonum *.acd.*, aliud *.abd.*; et est cathetus *id.*, uel *.ak.* perticarum .12.: et notandum quia ab *.a.* in *.i.*, ubicumque cathetum protraxerit infra rumboidem inter *k* et *d.*, super lineam *kd.* cadet. Nam casus catheti illius poteris inuenire per ea que in trigonis oxigonijs diximus, uel cum lensa quemadmodum in triangulis docuimus. EST enim quandoque rumboides, qui per breuiorem dyametrum resoluitur in duobus trigonis orthogonijs, ut rumboides *.bcde.*; cuius *.bc* et *.de.* latera sunt perticarum 35.; reliqua uero duo latera *.bd* et *.ce.* perticarum .37.; dyameter quoque *.be.* breuior sit perticarum 12. Dico quidem, rumboidem *.bcde.* diuisum esse in duo trigona orthogonia propter potentiam lineae *.ec.*, que equatur potentijs linearum *cb* et *be.* Quare rectus est angulus qui sub *.cbe.* Similiter reperitur rectus qui sub *.bed.* Et est equale trigonum *.cbe.* trigono *.bed.* Et quoniam ex multiplicatione catheti *.be.* in basem *.ed.* dimidium colligitur area trigonj *.bed.* Si multiplicauerimus itaque *.be.* dyametrum in *.ed.* latus, habebimus perticas .420. pro embado totius rumboidis *.bcde.*: similiter fit rumboides, qui per unamquamque dyametrum diuiditur in duobus trigonis ampligonijs.

Incipit de figuris que habent capita abscisa de quibus 1111.^{or} sunt genera in differentia prima.


PRIMUM genus tertie differentie camporum quadrilaterorum, qui habent duo latera equidistantia et inequalia, est figura, que eque caput abscisa dicitur, cuius reliqua duo latera equalia sibi inuicem sunt, ut quadrilaterum *.abcd.*, cuius latus *.ab.* est pertice .8.; et est equidistans lateri *.cd.*, quod latus est pertice 18; quodlibet reliquorum *.ac.* et *.bd.* sit pertice .13. In hac aut figura latus *.ab.* capitis abscissio, et latus *.cd.* abscissio basis appellatur. Cuius figure embadum colligitur ex multiplicatione catheti in dimidio laterum *.ab.* et *.cd.*; et cathetus ducitur a capite in basim. Vnde si a puncto *.a.*, uel a puncto *.b* cathetum super basim *.cd.* erigere uolueris; abscissio capitis, scilicet .8., ex abscissione basis deme, scilicet de .18., remanent 10; cuius dimidium, scilicet .5., erit casus *.ce.* uel *.df.*: a puncto enim *.a.* cathetus cadit super *.e.*; a puncto uero *.d.* cadit super *.f.* Quare si potentiam *.ce.* ex potentia *.ae.*, uel potentiam *.df.* ex potentia *.bd.*, scilicet .25 de 169 extraxeris, remanebunt .144.; cuius radix, que est .12., est perpendicularis *.ae.* uel *.bf.*: quibus .12. multiplicatis in dimidium laterum *.ab.* et *.cd.*, scilicet in dimidium de .26., hoc est in .13, reddent .156. pro embado ipsius quadrilateri *.abcd.* Verbi gratia: protractis cathetis *.ae.* et *.bf.* efficitur quadrilaterum parte altera longius *.aefb.*; cuius area colligitur ex multiplicatione catheti *.ae.* in *.ef.*, equalis est lineae *.ab.*; ergo *.ef.* est pertice .8. In quibus multiplicatis perticis .12. catheti *.ae.* reddunt perticas .96. pro embado quadrilateri *.aefb.*: quo quadrilatero extracto ex quadrilatero *.abcd.*, remanent duo trigona orthogonia et equalia, que sunt *.aec.* et *.bfd.*:

multiplicatio enim catheti *ae.* in dimidium *ec.* reddit aream trigoni *aec.* Quare multiplicatio lineae *ae.* in totam *ec.* reddit embadum duorum trigonorum *aec.* et *bfd.*, que multiplicatio est .60.; qua addita cum 96., scilicet cum embado quadrilateri *aefb.*, reddit .156., ut prediximus pro area quadrilateri *abcd.* Nam si dyametrum *da.* uel *cb.* inuenire uolueris, potentiam lineae *de.* uel *cf.*, scilicet .169. cum potentia catheti *ae.* uel *bf.*, scilicet cum .144. adde, erunt 313.; cuius radix est longitudo dyametri *da.* uel *bc.* Et si punctus in quo se intersecant dyametri habere uis, adde caput cum base, erunt .26.; que in se multiplica, erunt 676. Item caput *ab.* in se multiplica, erunt .64.; et basis in se, erunt 324.: multiplica ergo .64. per quadratum unius dyametrorum, scilicet per 313, et diuide | summam per 676.; uel quartum de 64, scilicet .16, multiplica per 313, et diuide per quartum de 676., hoc est per 169., exhibunt $\frac{8}{13} \frac{8}{13}$ 29.; quorum radix est linea *ag.* uel *bg.* Similiter multiplica quartum de 324., scilicet 81. per 313; et diuide summam per quartum de 676., scilicet per 169., et habebis quadratum lineae *gc.* uel *gd.* Et nota, quia ideo accepimus quadrata predictarum linearum, quia 313, scilicet quadratum unius dyametrorum non habet radicem. Nam si dyameter rationalis esset, multiplicauissemus eum per 8 et per 18, et diuisissemus summam eorum per 26; et sic haberemus abscissiones dyametrorum; que omnia uolumus geometricè demonstrare. Quoniam recta *ab.* equidistans est lineae *cd.* Simile est ergo trigonum *agb.* trigono *dgc.*; et est angulus *abg.* angulo *gcd.* equalis; et angulus *bag.* angulo *gdc.* Quare est sicut *ab.* ad *bg.*, ita *dc.* ad *cg.*; et permutatim est sicut *ab.* ad *cd.*, ita *bg.* ad *gc.* Similiter est iterum sicut *ab.* ad *cd.*, ita *ag.* ad *gd.* Est enim *ab* ex *cd* $\frac{4}{5}$; quare *bg.* ex *gc.*, uel *ag.* ex *gd.* sunt similiter $\frac{4}{5}$. Et quoniam que disiuncte proportionales sunt, et coniuncte proportionales erunt: est ergo sicut *ab.* ad se et ad *cd.*, hoc sicut 8 est ad 26, uel 4 ad 13., qui minimi sunt eandem proportionem habentes, ita *bg.* est ad totam *bc.*, et *ag.* ad totam *ad.*; ergo *bg.* est ex *bc* $\frac{4}{13}$, et *ag.* ex *ad.* similiter est $\frac{4}{13}$. Quare si ratiocinata ex dyametro *bc.* acciperemus $\frac{4}{13}$, haberemus lineam *bg.* uel *ag.* Reliquum uero *gc.* uel *gd.* esset $\frac{9}{13}$. ex toto dyametro. Sed quia quadratum dyametri, scilicet de 313., radicem non habet, accepimus quadrata de 4. et de 13, scilicet 16 et 169; et multiplicauimus 16 per 313, et diuisimus per 169.; quia cum est sicut *ab.* ad se et ad *cd.*, ita *bg.* ad *bc.*; erit itaque sicut quadratum lineae *ab.* ad quadratum summe iunctionis linearum *ab.* et *cd.*, scilicet sicut 64. est ad 676, uel sicut quartum de 64. est ad quartum de 676., scilicet 16. ad 169, ita quadratum lineae *bg.* est ad quadratum dyametri *bc.*, scilicet ad 313.; et in eadem proportione est quadratum lineae *gc.* ad quadratum lineae *ad.* Quare recta *ag.* equalis est recte *bg.*; habent enim eandem proportionem ad equalia: et quoniam cum de equalibus equalia tolluntur, que remanent sibi inuicem equalia sunt. Equalis est ergo recta *gc.* recte *gd.*; et habent proportionem ad totum dyametrum, scilicet ad radicem de 313., sicut *cd.* habet ad se et ad *ab.* rectam. Que proportio est sicut 9. ad 13. Quare proportio quadrati lineae *gc.* uel *gd.* est ad 313., scilicet ad quadratum dyametri, sicut quadratum de 9. est ad quadratum de 13, scilicet sicut 81. est ad 169. Quare multiplicauimus superius 81 per 313, et diuisimus per 169, et habuimus quadratum lineae *gc.* uel *gd.*; que oportebat ostendere.


fol. 48 recto.

NAM si linea *ca* et *db.* in partes *ab.* protrahantur, donec ad punctum *h.* con-

fol. 48 verso.
 * ut in hac *ab.* equidistans *
 (fol. 48 verso, lin. 1-8 e 9; pag.
 80, lin. 1-8.)



* acutum angulum est equidi-
 stans * (fol. 48 verso, lin. ult.,
 margine inferiore interno ad ester-
 no; pag. 80, lin. 34 e 35).



fol. 49 recto.

currant |, ut in hac alia figura, in qua quadrilaterum *abcd* transmutatur in trigono *hcd.*; et uolueris scire quantitatem linee *ah.* uel *bh.* Dimidium capitis ex dimidio abscissionis basis extrahe, scilicet *.4.* de *.9.*; super reliquum uero, scilicet super *.5.*, diuide multiplicationem dimidij abscissionis capitis in lineam *.ca.*, scilicet de *.4.* in *13.*, exhibunt $\frac{2}{5}$ *10.* pro quantitate linee *ah.* uel *bh.*: et si multiplicaueris eadem *4* per cathetum *.ae.*, scilicet per *12*; et diuiseris per *5.*, exhibunt $\frac{2}{5}$ *9* pro catheto trigoni *hab.*, scilicet pro linea *ih.*: qua protracta usque in punctum *k.*, erit tota linea *hk.* cathetus trigonj *hcd.*: et quoniam in trigono *hcd.* protracta est quedam recta *ab* equidistans basi *cd.*, erit trigonum *hai.* scilicet trigono *hcd.*, hoc est quod habent equales angulos adinuicem, scilicet angulus *hab.* angulo *hcd.*, scilicet exterior interiori equalis est; et angulus *hba.* angulo qui ad *.d.* similiter equalis est: comunis autem angulus, qui sub *ahb.* Similia uero trigona circa equales angulos habent latera proportionalia, ut in geometria declaratur. Quare sicut latus *ha.* est ad *ab.*, ita *hc* est ad *cd.*; et sicut *hb* est ad *ba.*, ita *hd.* est ad *dc.*: permutatim ergo sicut *ha.* est ad *hc.*, ita *hb.* est ad *hd.*, et *ab.* ad *cd.* Rursus sicut *ab.*, scilicet basis trigoni *hab.* est ad basem *cd.*, ita latus *ha.* est ad latus *hc.*, et *hb.* ad *hd.*, nec non et cathetus *ih.* ad cathetum *hk.*; ergo que pars est *ab.* ex *cd.*, scilicet *.8.* de *18.*, eadem pars erit *ha.*, scilicet $\frac{2}{5}$ *10.* ex *ac.*, scilicet de $\frac{2}{5}$ *23.*; et *hb* ex *hd.*, et cathetus *ih.* ex catheto *hk.* Nam *.8* de *18* est $\frac{4}{9}$; quare *ha.* ex *hc.* et *hb.* ex *hd.*, nec nou et *ih* ex *hk.* sunt quatuor none. In hac etiam figura est trigonum *cea.* simile trigono *aih.*, habent enim angulos equales. Angulus siquidem *hia.* angulo *aec.*; quia uterque ipsorum rectus est; et angulum qui ad *.c.* angulo *iah.*; quia equidistans est linea *ab.* linee *cd.* Reliquum ergo qui sub *ahi.* reliquo qui sub *cae* est equalis, propter tres angulos cuiuslibet trigonj, qui sunt duobus rectis equales. Est enim sicut *ce.*, scilicet *.5.*, ad *ea.*, scilicet ad *.12.*, ita *ai.*, scilicet *.4.*, est ad *ih.* Quare multiplicauimus superius *4* per *12.*; et diuisimus per *5.*, et habuimus $\frac{2}{5}$ *9* pro catheto *hi.* Item sicut *ec.* est ad *ca.*, scilicet *.5.* ad *.13.*, ita *ia.*, scilicet *.4* est ad *ah.* Quare multiplicauimus superius *4.* per *13.*; et diuisimus per *5.*, et habuimus $\frac{2}{5}$ *10* pro linea *ha.*: per has enim proportiones inuestigantur altitudines: et longitudines: et profunditates rerum, ut in suo loco demonstrabimus. **SECUN-
DVM** uero genus huius tertie differentie est figura, que semicaput abscisa dicitur, cuius duo latera equidistantia sunt, sed non equalia. Reliqua uero duo inequalia, quorum unum eleuatur supra basem secundum rectum angulum, faciens similiter rectum angulum cum capite absciosionis (*sic*); reliquum uero latus eleuatur ab alia parte basis secundum acutum angulum, ut quadrilaterum *abcd.*, cuius latus *ad.*, scilicet caput, est equidistans | basi *bc.*, cuius longitudo est pertice *.18.*; basis *bc.* perticarum *30.*; cathetus *ab.* *16.*; latus quoque *dc.* *20.* Ad habendam ergo aream totius quadrilateri adde *18* cum *30.*, scilicet caput cum base, erunt *.48.*; quorum medietas, scilicet *.24.*, multiplica per lineam *ab.*, scilicet per *.16.*: ideo quia ipse erigitur orthogonaliter, erunt pertice *484* in embado quadrilateri *abcd.* Verbi gratia: super rectam *bc.* a puncto *d.* cathetus *de.* protrahatur; erit quidem quadrilaterum *abcd.* in duo diuisum, scilicet in quadrilaterum *abcd.* parte altera longius, et in trigono *dec.* ortogonium; et est *be.* equalis *ad.*, et *ad.* est *18.*, et *be.* est similiter *18.*; et *de.* cathetus catheto *ab.* est equalis: est enim uterque illorum *16.*; area ergo quadrilateri *abcd.* est *.288.*, que colligitur

ex multiplicatione *de.* in *eb.*, hoc est de 16. in 18.: area quidem trigonj *dec.* colligitur ex multiplicatione catheti *de.* in dimidium *ec.*, scilicet 16. in 6. faciunt 96.; quibus additis cum 288., scilicet cum embado quadrilateri *abcd.*, reddunt 384. pro embado quadrilateri *abcd.*, ut predixi.


Et si dyametrum *ac.* habere uis; quia orthogonium est trigonum *abc.*, adde potentias linearum *ab.* et *bc.*, scilicet 259 cum 900., erunt 1156.; cuius radix, scilicet 34., est longitudo dyametri *ac.* Item ut habeas dyametrum *bd.*, adde potentiam catheti *de.* cum potentia basis *eb.*, scilicet 256. cum 324., erunt 580.; quorum radix, que est surda, est longitudo dyametri *bd.* Quare dicemus, dyametrum *bd.* radicem esse de 580.; uel quadratum dyametri *bd.* esse 580. Sed ut sciamus intersecationem dyametrorum, faciemus ut supra, uidelicet addemus capud cum base, scilicet 18. cum 30, erunt 48.: est ergo sicut 18 ad 48., ita *af.* est ad totum dyametrum *ac.* Nam 18. ad 48. est sicut 3 ad 8. Quare est sicut 3. ad 8., ita *af.* est ad *ac.* Quare multiplicabis 3 per 34, et diuidemus per 8., hoc est 3 per 17; et diuidemus per 4., exhibunt $\frac{3}{4}$ 12. pro linea *af.* Reliquum quod est usque in 34., scilicet $\frac{1}{4}$ 21., est linea *fc.* Similiter quia simile est *afd.* trigono *bfc.*, erit sicut *af.* ad *ac.*, hoc est sicut 3 est ad 8., ita *df.* est ad *db.*; ergo *df.* ex *db.* est $\frac{3}{8}$; remanet *fb.* $\frac{5}{8}$ ex *db.* Sed quia surda est linea *db.*, accipiemus proportionem earum in quadratis ipsorum. Est ergo quadratum de 3. ad quadratum de 8, hoc est sicut 9. est ad 64., ita ad quadratum dyametri *bd.*, scilicet ad 580. est quadratum. linee *df.*: quare multiplicabimus 9. per 580., et diuidemus summam per 64.; uel multiplicabimus 9. per quartum de 580., scilicet per 145., et diuidemus summam per quartum de 64., scilicet per 16.; quia semper debemus imitari modum euitationis. Quem in libro abbaci docuimus, scilicet accipere minimos numeros eandem proportionem habentes in multiplicationibus et diuisionibus: Est enim 580 ad 64., sicut quarta de 580. ad quartam de 64, exhibunt $\frac{9}{16}$ 81. pro quadrato linee *df.* Rursus quia linea *fb.* est $\frac{5}{8}$ ex dyametro *bd.*; multiplicabis quadratum de 5, scilicet 25 per 145, et diuidemus summam per 16., exhibunt $\frac{9}{16}$ 226 pro quadrato linee *fb.*

NAM si in partes *a* et *d.* recte *ba.* et *cd.* protracte fuerint. donec se tetigerint in punctum *g.*, ut in hac alia figura ostenditur; et uolueris scire quantitatem linee *ag.*; multiplica quidem *ed.* per *da.*, scilicet 16 per 18, et diuide per *ce.*, scilicet per 12., exhibunt 24. Est enim simile trigonum *dec.* trigono *gad.*; quare est sicut *ce.* ad *ed.*, ita *da.* ad *ag.*: per equale enim erit sicut *ec.* est ad *cd.*, ita *ad.* est ad *dg.* Quare multiplicato *cd.*, scilicet 20., per *da.*, scilicet per 18; et diuiso per *ec.*, reddit 30 pro quantitate *dg.*, ut suprascripta figura ostenditur.


TERTIUM uero genus ex hac tertia differentia est figura, que diuersecaput abscisa dicitur. cuius caput et basis equidistantia et inequalia sunt. Reliqua uero latera eleuantur supra basem secundum acutum angulum; et sunt inequalia, ut quadrilaterum *abcd.*, cuius caput *ab.* est perticarum 10.; et est equidistans basi *cd.*, que est perticarum 24.; latus quoque *ac.* est 13.; latus uero *bd.* 15.: huius enim figure embadum colligitur ex multiplicatione catheti, qui deducitur a capite in basem in dimidium capitis et basis. Nam si ipsam cathetum a puncto *a.*, uel a puncto *b.* supra basem *cd.* protrahere uolueris, oportet primum inuenire casus ipsorum cathetorum; quorum inueniendj modus est, ut extrahas caput a base, scilicet 10. de 24, remanent 14.: de

fol. 49 verso.

* quia linea *da.* scilicet *
(fol. 49 verso, lin. 1-8; pag. 81,
ln. 25-33).




latus uero 14. de inde s (fol. 49 verso, lin. 15-19; pag. 81, lin. 39-43 — pag. 82, lin. 1).



fol. 50 recto.

dato super pro longitudine s (fol. 50 recto, lin. 10-17 e 18; pag. 82, lin. 24-32).



inde extrahe potentiam lateris $.ac.$, scilicet $.169.$, ex potentia lateris $.bd.$, scilicet de 225 , remanent $.56.$; que diuide per $.14.$ suprascripta, exhibunt $.4.$; que adde cum $.14.$, erunt $.18.$; cuius dimidium, scilicet $.9.$, est casus longior $.de.$ á parte lateris $.bd.$: á quibus $.9.$ usque in $.14.$ desunt $.5.$, que sunt casus breuior $.fc.$ á latere $.ac.$, ut in trigonis acutiangulis diximus. Extracta quidem potentia minoris casus, scilicet ex $.cf.$, que est $.25.$, ex potentia lateris $.ac.$, scilicet ex $.169.$, remanent $.144.$; cuius radix, scilicet $.12.$, est cathetus $.af.$ Similiter extracta potentia $.ed.$ ex potentia $.bd.$, remanebit potentia $.be.$ $.144.$; quare $.be.$ est $.12.$, sicut $.af.$: addictio quidem capitis et basis, scilicet $.10.$ et $.24.$, faciunt $.34.$; quorum dimidio, scilicet $.17.$, multiplicato per cathetum $.af.$, uel $.be.$, scilicet per $.12.$, reddunt $.204.$ pro embado quadrilateri $.abcd.$

Quadratum quoque dyametri $.cb.$ colliges si quadratum linee $.ce.$ cum quadrato catheti $.eb.$ coadunaueris, et est $.369.$, quorum radix est dyameter $.cb.$ Nam si ubi intersecat cathetum $.af.$ scire desideras, hoc dupliciter facere potueris: primum quidem quia equidistans est linee $.ab$ linee $.cf.$, est sicut $.ab.$ ad se et ad $.cf.$, ita $.ag.$ est ad $.af.$; ergo $.ag.$ est $\frac{2}{3}$ ex $.af.$, scilicet $.8.$, remanet $.gf.$ $.4.$ Sunt enim similia trigona $.agb.$ et $.cgf.$ Similiter et $.bg.$ est $\frac{2}{3}$ ex $.bc.$ Similiter quadratum eius est $\frac{4}{9}$ ex quadrato ipsius dyametri. Quare multiplica $.4.$ per 369 , et diuide per $9.$; uel nonam de 369 multiplica per $.4.$, erunt $.164.$ pro quadrato linee $.bg.$; et quia $.bg.$ est $\frac{2}{3}$ ex $.bc.$, remanet $.gc.$ $\frac{1}{3}$ ex $.bc.$; quare quadratus eius est $\frac{1}{9}$ de 369 , scilicet $.41.$ Aliter quia similia sunt trigona $.ceb.$ et $.cfg.$, est sicut $.cf.$ ad $.ce.$, ita $.fg.$ ad $.eb.$, scilicet tertia pars. ergo $.fg.$ est $.4.$ ut predixi. Similiter propter eandem et $.cg.$ est $\frac{1}{3}$ ex $.cb.$, et cetera.


Possumus enim, secundum ea que dicta sunt in hac parte, etiam et in trigonis reperire dyametrum $.da.$; et scire ubi intersecat cathetum $.be.$, nec non ubi se secat cum dyametro $.bc.$, etiam si ab angulis $.cd.$, uel ab aliquo puncto dato super rectam $.cd.$, uel intus, uel extra figuram protraheretur linea super datas partes laterum $.db.$ uel $.ca.$; et emitteretur extra figuram pariter cum linea $.ab.$, donec insimul coniungerentur, possumus scire punctum coniunctionis ipsarum, nec non et quantitatem linearum protractarum. Nam si latera $.ca.$ et $.db.$ extra educere uolueris, donec ad punctum $.h.$ concurrant caput, scilicet 10 ex base, scilicet de $.24$ extrahe reliquum, scilicet per $14.$ diuide multiplicationem capitis $.ab.$ in latus $.ac.$, scilicet de $.10.$ in $.13$, exhibunt $\frac{2}{7}$ pro linea $.ah.$ Similiter si diuiseris multiplicationem $.ab.$ in $.bd.$, scilicet de $.10.$ in $.15.$ per $14.$, uenient $\frac{5}{7}$ $10.$ pro longitudine linee $.bh.$ Quartum uero genus est figura, que caput abscisa declinans dicitur, cuius caput et basis sunt inequalia et equidistantia. Ex reliquis duobus lateribus unum supra basem eleuatur secundum acutum angulum. Reliquum super eandem basem facit angulum amplum, ut in quadrilatero $.abcd.$ subscripto, cuius caput $.ad.$ est pertice $.12.$; basis uero $.bc.$ pertice $.16.$; latus quoque $.ab.$ pertice $.15.$; latus quoque $.dc.$ pertice $.13.$: hec etiam figura colligitur ex multiplicatione catheti in dimidium capitis et basis ipsius. Nam á puncto $.a.$ supra basem $.bc.$ cathetus cadit infra quadrilaterum $.abcd.$; á puncto uero $.d.$ cathetus cadet extra. Quare ut inueniamus quantitatem catheti interioris uel exterioris, oportet ut inueniatur primum casus ipsius. Cuius inueniendi modus est ut extrahatur caput á base, scilicet $.12.$ de $.16.$, remanent $.4.$; quorum potentia, scilicet 16 , addatur cum potentia lateris $.cd.$, scilicet cum $.169.$, erunt $185.$; que extrahantur ex potentia $.ab.$, scilicet de $.225.$, remanent

.40.; quorum dimidium, scilicet 20, diuidenda sunt per suprascripta .4., exhibunt .5. pro exteriori casu .ce., ut in trigono ampligonio demonstrauius: quibus .5. additis cum base .cb., scilicet cum .16., reddunt .21. pro tota linea .eb.; ex qua extractis .12., que sunt quantitas capitis, remanent .9. pro quantitate casus .fb. interioris. Quare extracta potentia ex .fb., scilicet .81., ex potentia lateris .ba., scilicet ex .225.; uel extracta potentia .ce., scilicet .25., ex potentia .cd., scilicet ex 169, remanebunt .144.; quorum radix, scilicet .12., est cathetus .af. uel .de.: quibus scilicet 12 multiplicatis per dimidium capitis et basis, scilicet per 14., reddunt perticas .168. pro area totius quadrilateri .abcd. In similibus quoque figuris, que capita declinantia nuncupantur, duo catheti que producuntur ab angulis capitis in basem, quandoque una cadit interius, et alia exterius, ut in suprascripta figura. Quandoque una cadit interius super angulum basis, qui oppositus est ei angulo, á quo cathetus producitur: et alia cadit exterius; quandoque utreque cadunt exterius, ut in his subscriptis figuris ostenditur; quarum figurarum catheti inueniuntur, secundum quod superius demonstrauius. QVADRATVM quidem ex .be. est .441., et .ed. est .144.; quibus in unum coniunctis faciunt 585. pro quadrato dyametri .bd. Item quadrato linee .cf., scilicet .49., addito cum quadrato catheti .fa., scilicet cum .144., egredientur .193. pro quadrato dyametri .ac. Sectionem uero dyametrorum per ea que superius dicta sunt habere potes. Verum si in partes .ad. latera .ba. et .cd. in puncto .k. protraxerimus, erit quidem .ka. ad .kb., et .kb. et .kd. ad .kc., sicut .ad. est ad .bc., hoc est $\frac{4}{15}$. Quare .ab. ex .kb., et .dc. ex .kc. sunt quarta pars. ergo .ka. est triplum ex .ab., et .kd. ex .dc. Quare .ka. est .45., et .kd. est .29. Si QVADRILATERI latera nequaquam equidistantia fuerint, ut in quadrilatero .abcd., cuius latus .ab. est pertice .13.; latus quoque .bc. sit pertice .15.; latus quoque .dc. pertice .17.; latus quoque .da. pertice .16.; quod quadrilaterum mensurati (sic) potest, si habeatur notitia unius dyametrorum, á quo ipsum quadrilaterum diuiditur in duo trigona, quorum area in unum coniuncta reddit aream totius quadrilateri. Verbi gratia: sit dyameter .ac. pertice .14., eritque area trigonj .abc. pertice .84.; trigonj .acd. pertice $\frac{1}{3}$ 104.; quibus areis in unum coniunctis reddunt $\frac{4}{3}$ 188. pro embado totius quadrilateri .abcd.: et est hic modus uniuersalis in omnibus quadrilateribus. Vel aliter á puncto .a. protrahatur recta .ae. equidistans lateri .bc.; et secundum ea que dicta sunt in precedenti parte accipiat area quadrilateri .abce., cui superaddatur triangulus .ade., et habebitur area totius quadrilateri .abcd. Preterea est figura, que barbata dicitur, similiter diuersa habens latera, in qua una ex dyametris cadit interius, altera uero exterius, ut in quadrilatero .defg., cuius dyameter .eg. cadit interius á puncto .f. in puncto .d., cadit linea .fd. extra quadrilaterum .d.e.f.g.: huius itaque figure aream habebis, si aream trigonj .deg. cum area trigonj .feg. coadunaueris; uel si ex area trigonj .def. dempseris aream trianguli .d.g.f.

Incipit pars tertia in dimensione camporum plura latera quam quatuor habentium.

Modvs itaque metiendi multilateras figuras est, ut diuidas ipsas in trigonos, et areas omnium trigonorum in unum colligas, et sic habebis aream cuiuslibet multilaterę figure. Et notandum quia multilatera figura, que constat ex quinque lateribus, soluitur ad minus in tria trigona. Que uero constant ex sex lateribus in quatuor; et sic semper omnis multilatera figura soluitur in duo trigona minus laterum ipsius. et quamuis

cum .16. reddunt ... nel extra-
eta * (fol. 50 recto, lin. 33-35,
e margine inferiore interno ed e-
sterno; pag. 83, lin. 3-5).




fol. 50 verso.


* producentur et alia exteriús *
(fol. 50 verso, lin. 5 e 6; pag. 83,
lin. 9 e 10).



* .ac. Sectionem13.; latus *
(fol. 50 verso, lin. 13-18; pag. 83,
lin. 17-23).




* quadrilateri. Verbi area totius *
(fol. 50 verso, lin. 22-27; pag.
83, lin. 26-31).



fol. 51 recto.

per resolutionem ipsarum in trigona multilatera figure mensurare possint, tamen quandoque subtilius in quibusdam procedere possumus, scilicet cum figura fuerit pentagona, hoc est ex quinque lateribus; et poteris ex ea facere duo petia, quorum unum erit trigonum, et alterum fit quadrilaterum, in quo latera ipsius erunt equidistantia, ut in pentagono *abcde.*, ex quo absciso trigono *abe.*, remanet quadrilaterum *ebcd.* caput abscisum, cuius *be.* latus equidistans est lateri *cd.*; tunc colliges aream trigoni *abe.*, et addes eam cum area quadrilateri *bcde.*, et habebis aream pentagoni *abcde.* Similiter cum possibile fuerit de exagono, scilicet ex figura que habent sex latera, facies duo quadrilatera, quorum unumquodque habeat duo latera equidistantia. Vel faciat inde unum quadrilaterum, quod habeat duo latera sibi inuicem equidistantia, et duo trigona; et sic studeas in reliquis figuris multilateribus operari. Verum si figura multilatera fuerit equilatera et equiangulara, quam metiri desideras, aliter quam dictum sit, poteris ad ipsius embadum peruenire, cum in ipsa cadat circulus contingens medium unius cuiusque laterum ipsius. Multiplicabis itaque semidyametrum ipsius circuli per dimidium laterum ipsius figure, et habebis embadum ipsius. Ad cuius rei euidenciam adiaceat pentagonum equilaterum et equiangularum *abcde.* In quo uolumus describere circulum contingentem laterum ipsius, quod sic fit: diuidam angulos *eab.* et *abc.* in duo equa á duobus (*sic*) lineis *af* et *fb.*, et protraham lineas *fc.* *fd.* *fe.*, et signabo puncta *g.h.i.k.l.* in medio laterum ipsius, et copulabo lineas *fg.* *fh.* *fi.* *fk.* *fl.*; quas demonstrabo esse sibi inuicem equales. Quoniam equiangularum est pentagonum *abcde.*, erit angulus *fab.* equalis angulo *fba.*; cum sint dimidium angulorum pentagoni. Quare trigonum *fab.* est equicrurium habens latera equales angulos subtendentia sibi inuicem equalia. Quare equalis est recta *fa.* recte *fb.* et *fg.*, que est cathetus super lineam *ab.*, cum cadat in medio ipsius: est enim *la.*, cum sit medietas recte *ae.*, equalis recte *ag.*; comuniter adiaceat recta *fa.*, erunt due recte *ga.* et *af.* equales duobus rectis *fa* et *al.*; et angulus qui sub *gaf.* equalis est angulo qui sub *fal.*; quare et basis *fl.* equalis est basi *fg.*; et angulus *afl.* equalis est *afg.* angulo *agf.*; rectus qui sub *agf.*, et qui sub *alf.* erit rectus: quare recta *fl.* cathetus est |


* basis *fl.* cathetus est * (fol. 51 recto, lin. 34-35, e margine inferiore interno ad esterno; pag. 84, lin. 27-28).




super rectam *.ae.*; et quia *.al.* equalis est recte *.el.*, si comuniter adiaceat recta *.fl.*, erunt duo recte *.fl.* et *.la.* equales duabus rectis *.fl.* et *.le.*; et anguli qui ad *.l.* sunt equales; cum rectus sit uterque eorum: quare recta *.fe.* equalis est recte *.fa.*; et trigonum *.afl.* equale est trigono *.lfe.*; et totum trigonum *.bfa.* est equale toti trigono *.afe.* Similiter ostendetur, quamlibet rectarum *.fh.* *.fi.* *.fk.* equalem esse cui-libet rectarum *.fg.* *.fl.* Quare centro *.f.* spatio unius rectarum *.fg.* *.fh.* describetur cir-culus *.ghikl.*, et erit pentagonum *.abcde.* diuisum in quinque trigona equalia, que sunt *.fab.* *.fbc.* *.fcd.* *.fde.* *.fea.*; et catheti cadentes in ipso sibi inuicem sunt equales, qui sunt *.fg.* *.fh.* *.fi.* *.fk.* *.fl.*; et quia ex ductu *.fg.* in dimidium *.ab.* prouenit area tri-gonj *.fab.*; si multiplicauerimus semidyametrum circuli cadentis in pentagono, scilicet *.fg.*, in quincuplum medietatis *.ab.*, hoc in medietate laterum pentagonj *.abcde.*, prouenit quincuplum aree trigonj *.fab.*, hoc erit area pentagonj *.abcde.*, ut predi-ximus. Similiter ueniet in omnj figura equilatera et equiangula, in qua cadit circulus. Ex hoc enim manifestum est, quod multiplicatio semidyametrj circuli in plus medietate linee circumferentis facit plus embado ipsius circuli. Possumus autem pentagonum equilaterum et equiangulum alio modo metirj, cum cadat in circulo contingente omnes angulos ipsius. Multiplicetur quidem medietas, idest dodrans et quarta ipsius dyame-trj, per medietatem, idest destunce et tertiam corde anguli penthagonicj, et habe-bis embadam ipsius: ad cuius rei euidenciam sit pentagonum *.abgde.* descriptum in circulo *.abgde.*, cuius dyiameter sit *.az.*, et centrum eius sit *.c.*; et copuletur recta *.be.*, que est corda anguli penthagonicj *.bae.*; et accipiatur *.ci.* medietas semidyametrj *.cz.*, et erit tota *.ai.* medietas et quarta totius dyametri *.az.*; et sit sicut *.ai.* ad *.ac.*, ita *.te.* ad *.tk.*: est enim *.ac.* ex *.ai.* due tertie: similiter et *.tk.* est due tertie ex *.te.*, hoc est ex *.tb.*; equalis quidem est *.bt.* ex *.te.*; quare *.tk.* est tertia pars totius corde *.be.*; quare *.bk.* est medietas et tertia corde *.be.* Dico quidem quod ex multiplica-tione *.ai.* in *.bk.* prouenit embadam penthagonj *.abgde.*; quod sic probatur: quia est sicut *.ia.* ad *.ac.*, ita *.te.* ad *.tk.*; erit multiplicatio *.ca.* in *.te.*, hoc est in *.tb.*, equalis multiplicationj *.ia.* in *.tk.* Sed ex multiplicatione *.ca.* in *.bt.* prouenit duplum trigonj *.cba.*; ergo ex ductu *.ai.* in *.tk.* prouenit duplum trigonj *.cba.*: et quia *.tk.* dupla est ex *.ek.*; si multiplicauerimus *.ia.* in *.ek.*, proueniet equale trigono *.cba.*, quod est quinta pars totius penthagonj *.abgde.* Quare si multiplicauerimus *.ai.* in *.bk.*, scilicet quincuplum ex *.ke.*, proueniet utique quincuplum aree trigonj *.cba.*: sed quincuplum trigonj *.cba.* est equale penthagono *.abgde.*; ergo ex ductu *.ai.* in *.bk.* prouenit em-badam penthagonj *.abgde.*, ut predixi. Et notandum, quod si dyiameter circuli fuerit ratiocinatus, tunc latus penthagonicum cadens in ipso erit linea minor, scilicet radix recisi quarti, uel abscisionis quartę; que abscisio constat ex numero minus radice: quorum duorum nominum maius nomen potest super minus, eo quod ab incommen-surabilj sibi longitudine et corda anguli penthagonicj erit linea maior, scilicet radix binomij quartj; quod constat ex numero et radice, cuius nomen maius potest plus minore, eo quod ab incommensurabilj sibi longitudine sunt corundem nominum latus penthagonicum et corda angulj penthagonicj: ut si latus penthagonicum *.ab.* fuerit radix de *.40.* minus radice de *.320.*; et corda *.be.* erit radix de *.40.*, et radice de *.320.*; et hoc est cum dyiameter *.az.* ponimus esse *.8.*, ut in suo demonstrabitur loco.

fol. 51 verso.

« anguli qui . . . ab. prouenit » (fol. 51 verso, lin. 3-10; pag. 85, lin. 2-9).




« sit *.c.* et . . . *.tb.* equalis » (fol. 51 verso, lin. 23-30; pag. 85, lin. 20-24).



fol. 52 recto.

Si uero *zed.* indicabo (fol. 52 recto. lin. 14-20; pag. 86, lin. 1-7).



Si uero campus rectilineus non fuerit, ut quadrilaterum *abcdez.*, cuius duo latera *az.* et *cd.* sunt rectilinea, reliqua uero *abc.* et *dez.* sunt curua; qualiter ipsum etiam et similia mensurari debeas, indicabo. Ex *a.* quidem in *c.* et ex *z.* in *d.* recte protrahantur *ac.* et *dz.*; deinde quadrilateri *acdz.* rectilinei aream, secundum ea que dicta sunt, colligere studeas; super quam aream uentris *zed.* superadde; ex quo toto diminuas aream uentris *abc.*, et habebis aream quesiti campi. Nam qualiter habeatur area uentris *zed.* indicabo: super dimidium arcus *zed.* punctum fige *e.*, et copulabis rectas *ez.* *ed.*, et erit trigonum *ezd.* rectilineum, et remanebunt ex toto uentre *zed.* uentres *zge.* et *ead.*; in unoquoque quorum, si eodem modo trigona rectilinea ordinaueris, remanebunt uentres *iii*^{or}, quos solueris eos in triangulos rectilineos; et hoc eodem modo si semper fiet in reliquis uentribus, ueniet aliquando quod ex toto uentre *zed.* non remanebit aliquid sensibile: unde si aream omnium trigonorum contentorum infra uentrem *zed.* coniunxerit, habebis siquidem aream uentris *zed.* Similiter si eodem modo processeris in uentre *abc.*, habebis utique aream ipsius.


Incipit pars quarta in dimensione circularum et eorum partium.

Cum itaque campum rotundum, idest circulum, mensurare desideras, ipsius dyametrij notitiam habeas; quem in $\frac{4}{7} 3$ multiplica, uel in .22 extende; et quod ex multiplicatione prouenerit per 7 partire, et habebis quantitatem linee circumferentis, et continentis ipsum circulum. Cum dimidium dyametrij per dimidium circumferentis lineę duxeris, nimirum area ipsius circuli inde proueniet: uel ex quadrato sui dyametrij undecim quartas decimas accipe; et habebis similiter circuli embadum. Vel si secundum pisanum modum mensurare desideras, dyametrum in se multiplica; et quod prouenerit diuide per 7, et habebis panora embadi ipsius circuli. Et ut hec omnia apertius declarentur; adiaceat circulus *abgd.*, in quo sumantur duo puncta *b.d.*; et copuletur recta *bd.*, et diuidatur in duo equa super *e.* punctum, a quo protrahatur recta *ag.*, faciens rectos angulos cum recta *bd.*; et erit utique recta *ag.* dyameter circuli, in cuius dimidio est centrum ipsius circuli, quod sit *z.*; et ponamus, dyametrum *ag.* esse .14 perticarum; que si multiplicauerimus per $\frac{4}{7} 3.$, prouenient pertice .44. pro linea circumferente *abgd.*; que uocatur periferia: uel 14. per 22 multiplica; et quod prouenerit diuide per 7, et uenient similiter 44 pro curua *abgd.*; cuius dimidium, scilicet .22., si per dimidium dyametrij multiplicauerimus, prouenient 154 pro embado circuli *abgd.* Vel si de quadrato dyametrij, quod est 196., acceperis $\frac{14}{11}$, scilicet multiplicabis 196 per 11, et diuides per 14.; uel quartam decimam partem de 196., que est .14., extende per .11., et prouenient similiter 154 pro embado ipsius. Similiter si dyametrum in se multiplicauerimus, erunt 196; quibus diuisis per 7, uenient panora 28 pro embado circuli *abgd.*, quibus equantur pertice 154. superius inuente; cum unumquodque panorum contineat perticas $\frac{1}{2} 5.$

Et si per notitiam circumferentis lineę dyametrum circuli habere desideras, ipsam in $\frac{4}{7} 3$ diuide, hoc est septuplum eius diuide per 22. Verbi gratia: sit linea circumferens 44.; quorum septuplum si diuiserimus per 22; uel si uigeximamsecundam partem de 44 multiplicauerimus per .7., nimirum .14. pro eius dyametro prouenient: et si embadum circuli ex linea circumferente tantum habere desideras, quadratum medietatis ipsius per 7 multiplica; et quod proueniet diuide per 22. Verbi gratia: medietas curue *abgd.* est 22, quorum quadratum est .484.; quod per 7 multiplicatum facient 3388.; quibus per

fol. 52 verso.


bd. et erit prouenient similiter (fol. 52 verso, lin. 6-13; pag. 86, lin. 26-34).



22 diuisis, ueniunt 154., ut superius inuenimus: uel si 484 diuiserimus per 22, ueniunt .22; quibus multiplicatis per 7 faciunt similiter 154. Et si dyiameter circuli fuerit .10., erit utique circumferens linea $\frac{2}{7}$ 31., que proueniunt ex multiplicatione .10. in $\frac{4}{7}$ 3. Quare si dimidium dyametri, scilicet .5., multiplicauerimus per dimidium circumferentis lineę, scilicet per $\frac{5}{7}$ 15, ueniunt $\frac{4}{7}$ 78. Vel si quadratum dyametri, scilicet 100., multiplicauerimus per 11, et summam diuiserimus per 14.; uel si .11. multiplicauerimus per dimidium de 100, et summam diuiserimus per dimidium de 14, scilicet per 7, proueniunt utique $\frac{4}{7}$ 78 pro area suprascripti circuli. Vel si 100 diuiserimus per 7, proueniunt panora $\frac{2}{7}$ 14., que equantur perticis $\frac{4}{7}$ 78 suprascriptis. Et si $\frac{2}{7}$ unius panori in usitatas partes reducere uis, scilicet in soldos et denarios, multiplica 2, que sunt super uirgam, per soldos unius panori, erunt soldi 33; quos diuide per 7, ueniunt soldi 4 et denarii $\frac{4}{7}$ 8 mensurę. Ergo pro embado suprascripti circuli habetur stariorum unum et panora duo | et soldi m^{or} et denarii $\frac{4}{7}$ 8; et sic studeas facere in similibus. Verum si nosse uis unde habeatur quod ex multiplicatione semidyametri circumferentię dimidium embadum circuli proueniat, reiterabo circulum .*abgd.*, cuius centrum sit .*e.*; et describam in ipso rectilineum aliquod, et quotcumque uoluerit laterum; et sit quadrilaterum .*abgd.*, quod resoluaui a centro .*e.* in quatuor trigona, uidelicet secundum numerum laterum ipsius, que sint .*eab. ebg. egd. eda.*; et est equicrurium unumquodque ipsorum; cum lineę .*ea. eb. eg. ed.* sibi inuicem sint equales; sunt enim a centro ad periferiam ductę: quare si in ipsis trigonis catheti producantur a centro .*e.*, cadet unusquisque super dimidium basis sui trigoni. Quare ponamus super dimidium ipsorum trigonorum puncta basium .*z.i.t.k.*, per que puncta producantur a centro .*e.* ad periferiam rectę .*el. em. en. eo.*; et copulentur .*al. lb. bm. mg. gn. nd. do. oa.*, et erunt quatuor trigona super bases *ab. bg. gd. da.* constituta: et quoniam recta .*ez.* cathetus est super rectam .*ab.*; si multiplicauerimus *ez.* in dimidium *ab.*, proueniunt utique embadum trigonij .*eab.* Similiter quia .*lz.* cathetus est trigonij .*lab.*, proueniet utique ex .*zl.* in dimidium *ab.* embadum trigonij .*lab.* Quare si multiplicauerimus totam .*el.*, scilicet semidyametrum circuli, in dimidium *ab.*, proueniet utique embadum quadrilateri .*ealb.* Simili quoque modo si multiplicauerimus .*em.*, scilicet .*el.*, in dimidium lineę .*bg.*, proueniet embadum quadrilateri .*ebmg.* Eodemque modo si multiplicauerimus .*en.* in dimidium .*gd.*, et .*eo.* in dimidium .*da.*, proueniet embada quadrilaterorum .*egnd.* et .*edoa.*; hoc est si multiplicauerimus .*el.*, scilicet semidyametrum in dimidium laterum quadrilaterij .*abgd.*, proueniet embadum multilaterę figurę cadentis in circulo. Sed embadum ipsius multilaterę figurę, que est .*albmgnndo.*, est minor embado circuli. Ergo ex multiplicatione semidyametri circuli in dimidium rectorum .*ab. bg. gd. da.* proueniet minus embado circuli. Sed dimidium linearum .*abgd.* minus est medietate circumferentię .*abgd.* Ergo ex multiplicatione semidyametri circuli in minus dimidio circumferentię ipsius circuli facit minus embado circuli: demonstraui itaque in preterita parte in dimensione multilaterum figurarum continentium circulum, quod ex multiplicatione semidyametri circuli in plus medietate circumferentię ipsius prouenit plus embado circuli. Quare concluditur, quod ex multiplicatione semidyametri circuli in dimidium lineę circumferentis prouenit embadum ipsius. Sed querendum rursus est unde procedat inuentio embadij circuli per

fol. 53 recto.

rectilineum aliquod et copulenter * (fol. 53 recto, lin. 4-10 e 11; pag. 87, lin. 16-23).



fol. 53 verso.

adsumptionem undecim quartarum decimarum quadrati sui dyametrij. Quoniam embadum alicuius circuli ad embadum alterius est sicut quadratum dyametrij unius ad quadratum dyametrij alterius, ut Euclides in secundo theoremate duodecimj sui libri demonstravit. Erit permutatim sicut quadratum dyametrij alicuius circuli ad embadum ipsius, ita omnia quadrata dyametrorum omnium circulorum erunt ad embada ipsorum circulorum. Quare cum inuenta fuit proportio quadrati dyametri unius circuli ad suum embadum, tunc fuit inuenta proportio quadrati dyametrij unius cuiuslibet circuli ad suum embadum. fuit enim quadratum dyametrij suprascripti circuli 196., et embadum ipsius 154, quorum proportio est sicut 14 ad 11. in minimis numeris. Quare erit sicut 14 ad quadratum dyametrij cuiusuis circuli, ita 11. erit ad embadum ipsius. Vnde cum multiplicauerimus 11. per quadratum dyametrij cuius uis circuli; et summam diuiderimus per 14., proueniet embadum ipsius circuli; quod oportebat ostendere. Similiter si perticas 154 redigemus in panora, uenient panora 28. Ergo erit sicut 196 ad panora 28., ita quadratum dyametrij cuius uis circuli erit ad panora continentia embadum ipsius. Sed 196 ad 28. sunt sicut 7 ad 1.; quare erunt sicut 7. ad 1., ita quadratum dyametrij cuius uis circuli erit ad panora embadi ipsius. Quare si ex quadrato dyametrij cuius uis circuli septimam acceperimus, nimirum panora, que sunt in embado ipsius circuli, prouenient, ut superius demonstrauius. Et notandum, quia que proportio est unius quantitatis ad aliam, eadem erit cuius uis multiplicis unius ad idem multiplex alterius. Quare que proportio est dyametri antecedentis circuli ad dyametrum consequentis, eadem erit lineae circumferentis antecedentis circuli ad lineam circumferentis consequentis. Et eadem erit proportio medietatis lineae circumferentis antecedentis circuli ad medietatem lineae circumferentis consequentis. Quare erit sicut quadratum dyametrij antecedentis circuli ad quadratum dyametrij consequentis, ita quadratum semicircumferentiae antecedentis ad quadratum semicircumferentiae consequentis: et quia est sicut quadratum dyametrij antecedentis circuli ad quadratum dyametrij consequentis, ita embadum ad embadum: erit utique sicut quadratum semicircumferentiae antecedentis circuli ad quadratum semicircumferentiae consequentis, ita embadum antecedentis circuli ad embadum consequentis: permutatim ergo erit sicut quadratum semicircumferentiae antecedentis circuli ad suum embadum, ita quadratum semicircumferentiae consequentis erit ad suum embadum; fuit medietas lineae circumferentis supradicti circuli 22, cuius quadratum est 484; et embadum eius fuit 154.; quorum proportio in minimis numeris est sicut 22. ad 7; ergo sicut 22 est ad 7, ita quadratum semicircumferentiae lineae cuius uis circuli erit ad suum embadum. Quare cum multiplicentur 7 per quadratum semicircumferentiae lineae alicuius circuli; et summa diuiditur per 22, prouenit utique embadum ipsius circuli. OSTENDENDVM est etiam quomodo inuentum fuit, lineam circumferentem omnis circuli esse triplam et septimam sui dyametrij ab ARCHIMENIDE phylosopho; et fuit illa inuentio pulcra et subtilis ualde: quam etiam reiterabo non cum suis numeris, quibus ipse usus fuit demonstrare; cum possibile sit cum paruis numeris ea que ipse cum magnis ostendit plenissime demonstrare. Adiaceat quidem circulus .*abgd.*, cuius dyameter sit linea .*ag.*; et centrum eius sit .*c.*; et protraham lineam . contingentem circulum super punctum .*a.* Quare dyameter .*ag.* cathetus est super rectam .: deinde super rectam .*ac.*; et in ipso puncto .*c.* protraham angulum .*ace.*, qui

fol. 54 recto.

sit tertia pars recti; quare angulus *.aec.* erit $\frac{2}{3}$ unius anguli recti, cum angulus *.eac.* sit rectus. Sunt enim omnis trigonj tres anguli duobus rectis equales: et iaceat *.az.* equalis recte *.ae.*; et copuletur recta *.cz.*, et erit trigonum *.caz.* equale trigono *.cae.*; et angulus *.cza.* equalis est angulo *.cea.*: est enim unus quisque eorum $\frac{2}{3}$ angulj recti. Similiter cum angulus *.ecz.* duplus sit angulo *.eca.*, erit similiter angulus *.ecz.* $\frac{2}{3}$ angulj recti: equiangulum ergo est et equilaterum trigonum *.cez.*; quare recta *.ez.* erit latus

id est circa circulum .abgd.

exagonj equilaterj et equiangulj continentis circulum *.abgd.* Quibus ita per ordinem peractis, ponam *.ce.* esse 30; quare *.ae.* erit 15; et quia orthogonium est trigonum *.cae.*, si ex quadrato lateris *.ce.* tollatur quadratum lateris *.ae.*, scilicet .225 de 900, remanebunt 675 pro quadrato lateris *.ca.*; ergo latus *.ca.* est radix de 675: quam si subtiliter ceperemus, inueniemus, ipsam esse secundum propinquitatem perticarum .26. minus unceis $\frac{1}{13}$ 2. Constat enim pertica ex unceis .108. : deinde diuidatur angulus *.eca.* in duo dimidia á linea *.cf.*, que diuidet arcum *.ab.* super punctum *.y.* Et cum habeatur ex demonstrationibus EUCLIDIS, equales angulos á centro super equales periferias consistere; equalis est ergo periferia *.ay.* periferie *.by.*: fuit itaque *.ae.* semilatus exagonicj. Quare et *.af.* erit se-

id est circa circulum .abgd.

milatus dodecagonj continentis circulum *.abgd.* Et quia angulus *.eca.* in duo equa diuisus est á linea *.cf.*, proportionaliter erit sicut *.ec.* ad *.ca.* ita *.ef.* ad *.fa.*, ut EUCLIDES in sexto declarauit libro: quare erit sicut coniunctum ex *.ec.* et *.ca.* ad *.ea.*, hoc est sicut 56 minus unceis $\frac{1}{13}$ 2 est ad *.ea.*, ita coniunctum ex *.ef.* *.fa.*, quod est .15., ad lineam *.fa.*: permutatim ergo erit sicut coniunctum ex *.ec.* et *.ca.* ad *.ea.*, hoc sicut 56 minus unceis $\frac{1}{13}$ 2 sunt ad 15., ita *.ca.* erit ad *.af.* Quare ponam *.ea.* esse 56 minus $\frac{1}{13}$ 2, et *.af.* erit 15. Quare | si coniunxerimus quadrata linearum *.ca.* et *.af.*, habebimus pro quadrato linee *.cf.* 3359 minus unceis $\frac{2}{9}$ 16; quorum radix, que est 58, minus unceis $\frac{4}{9}$ 4, est latus *.cf.* Deinde diuidam angulum *.fc.* in duo equa á linea *.ch.*; et erit *ah* semilatus figure equilaterę habentis latera .24., et descripta circa circulum *.abgd.*: et quia angulus *.fca.* diuisus est in duo equa á linea *ch.*, erit proportio coniuncti ex *fc.* et *ca.* ad *.ca.* sicut *fa.* ad *.ah.*: permutatim ergo erit sicut coniunctum ex *fc.* et *.ca.* ad *.fa.*, hoc est sicut 114 minus unceis $\frac{7}{9}$ 6 ad .15., ita *.ca.* ad *.ah.*: quare ponam *.ca.* esse .144 minus unceis $\frac{7}{9}$ 6, et *ah.* erit 15; quare si ex coniunctione quadratorum ipsorum radicem acceperimus, habebimus 115 minus unceis $\frac{16}{9}$ 8. pro linea *.ch.* Rursus diuidam angulum *.hca.* in duo equa cum linea *.ci.*; et erit *.ai.* semilatus equilaterę figure habentis latera .48, et descriptę circa circulum *.abgd.*, cuius *.ai.* proportio ad *ac* erit sicut .15. ad coniunctum ex *ac* et *ch.*, hoc est ad 229, minus unceis $\frac{44}{72}$ 15, secundum maximam propinquitatem. Non enim possumus uere procedere quando oportet inuenire radices numerorum surdorum, eorum uidelicet qui radicem non habent in numeris. Ponam ergo *.ca.* esse 229 minus unceis $\frac{44}{72}$ 15; et *ai* ponam esse .15.; et diuidam iterum angulum *.ica.* in duo equa á linea *.ck.*, et erit *.ak.* semilatus figure descriptę circa circulum *.abgd.*, habentis latera .96. continentia ipsum circulum. Ad dam iterum quadrata linearum *ca* et *ai*; et habebo quadratum lateris *.ci.*, cuius radix est 229, et uncie $\frac{4}{9}$ 7 aliquantulum minus; sed proportio *.ca.* ad *.ak.* est sicut proportio coniuncti ex *ic* et *ca.* ad *ai.*; ergo proportio *.ca.* ad *ak.* est quasi $\frac{4}{9}$ 438 ad 13. Sed proportio *.ca.* ad *.ak.* est sicut proportio dyametrij *.ga.* ad duplum


linee supra
dyametrum

fol. 54 verso.


recte ad rectam *ad.*, hoc est sicut 56 minus unceis $\frac{1}{18} 2$. ad 15., ita *gd.* ad *dl.*: et quia angulus *agd.* in duo equa diuisus est a linea *gm.*, equalis est angulus *agm.* angulo *dgm.*, et angulus *gdl.* equalis est angulo *gma.*: est enim uterque eorum rectus, cum sit in semicirculo *gdma.*; reliquus ergo angulus, qui sub *gld.*, reliquo, qui sub *gam.* est equalis; equiangulum ergo est trigonum *gdl.* trigono *gma.*: quare est sicut recta *gd.* ad *dl.*, ita recta *gm.* ad *ma.*: quare ponam *gm.* esse 56 minus unceis $\frac{1}{18} 2$; et *ma.* recta erit 15; et est recta *am.* latus dodecagoni, cum periferia *am.* dimidium sit periferie *amd.* Rursus diuidam angulum *agm.* in duo equa cum linea *gno.*; et copulabo rectam *ao.*, et inueniam radicem coniunctam ex quadratis linearum *gm. ma.*, que est 58 minus unceis $\frac{1}{3} 4$ pro latere *ag.*; et erit sicut coniunctum ex *ag.* et *gm.* ad lineam *ma.*, hoc est sicut 114 minus unceis $\frac{2}{3} 6$. ad 15., ita *gm.* ad *mn.* Sed sicut *gm.* ad *mn.*, ita *go.* ad *oa.*; sunt enim trigona *gmn.* et *goa.* similia et orthogonia: est ergo sicut 114. minus unceis $\frac{2}{3} 6$. ad 15., ita *go.* ad *oa.*: quare ponam *go.* esse 114 minus $\frac{2}{3} 6$ uncie, et *oa.* 15; et accipiam iterum radicem ex quadratis linearum *go.* et *oa.*, et habebis pro linea *ga.* 115 minus unceis $\frac{16}{28} 8$; et linea *oa.* est latus figure descripte intra circulum *abgd.*, habentis latera .24.: dididam rursus angulum *ago.* in duo media a linea *gq.*; et copulabo *qa.*, et erit sicut *ag* et *go* ad *oa.*, ita *go.* ad *op.* Sed sicut *go.* ad *op.*, ita *gq.* ad *qa.*; erit ergo sicut 229, minus unceis $\frac{44}{72} 15$, ad 15., ita *gq.* ad *qa.*: quare ponam *gq.* esse 229 minus unceis $\frac{44}{72} 15$, et *qa.* 15; et coniungam quadrata eorum; et coniuncto radicem inueniam, et habebis .229, et parum minus de unceis $\frac{1}{2} 37$.; et est *aq.* latus figure habentis latera 48. Diuidam iterum angulum *agg.* in duo equa a linea *grs.*; et copulabo *sa.*, que erit latus figure habentis latera .96. cadentis intra circulum *abgd.*; et quia angulus *agq.* diuisus est in duo equa cum linea *gs.*, erit proportio *gq.* ad *qr.* sicut *ag.* et *gq.* ad *qa.*, hoc est sicut $\frac{4}{5} 458$ ad 15., ita *gq.* ad *qr.* Sed sicut *gq.* ad *qr.*, ita *gs.* ad *sa.*, cum trigona *gqr.* et *gsa.* sint similia: quare erit sicut $\frac{4}{5} 458$ ad 15., ita *gs.* ad *sa.*: coniungam iterum quadrata linearum *gs.* et *sa.*, et coniuncto radicem inueniam, et habebis $\frac{1}{9} 458$ pro dyametro *ga.*: multiplicabo ergo rectam *sa.* per .96, erunt 1440 pro summa omnium laterum figure descripte intra circulum *abgd.*: quare est sicut 1440 ad $\frac{1}{9} 458$., ita omnia latera predicte figure in circulo *abgd.* descripte sunt ad dyametrum circuli *ga.* Inuenimus per inuestigationem lateris exterioris figure, quod proportio omnium laterum ipsius ad dyametrum circuli est sicut 1440 ad $\frac{1}{9} 458$; et linea circumferens est minus omnium laterum figure continentis circulum; et est plus omnium laterum figure descripte intra circulum; erit proportio circuli ad suum dyametrum, sicut 1440 ad $\frac{1}{9} 458$, cum sint in medio inter $\frac{1}{9} 458$ et $\frac{1}{3} 458$. Sed proportio de 1440 ad $\frac{1}{9} 458$ est sicut triplum unius numerorum ad triplum alterius, hoc est sicut 4320 ad 1375; quorum proportio in minimis numeris est sicut 864 ad 275; sed proportio de 864 ad 275, minus $\frac{1}{11}$, est sicut $\frac{1}{7} 3$ ad 1; et quia parua est differentia inter proportionem, quam habet circulus ad suum dyametrum, et proportionem, quam habent $\frac{1}{7} 3$ ad 1.; ideo posuerunt sapientes antiqui, circulum esse triplum et septimam sui dyametri; et hoc uolui ostendere.

SI autem campum semicircularem metiri desideras, embadum ipsius circuli per unum ex demonstratis modis quere; et dimidium eius habeas pro embado ipsius semicirculi.


c Quare si acceperimus quod est .576. s (fol. 55 verso , lin. 31-35; pag. 92, lin. 2-7).



e pañora embadi uni recto sunt s (fol. 56 recto, lin. 4-11; pag. 92, lin. 10-17).



(fol. 56 verso.




Ad cuius rei euidentiam esto semicirculus .*abg.*, cuius dyameter .*ag.* sit .24.; et expleatur circulus .*abgd.*; et erit supplementum .*adg.* similiter semicirculus. Quare si acceperimus dimidium embadij circuli .*abgd.*, habebimus utique embadum dati semicirculi .*abg.* Vel dimidium dyametri, scilicet 12, in $\frac{1}{7} 3$ multiplica, et habebis $\frac{5}{7} 37$ pro arcu .*abg.*: cumque dimidium dyametri per dimidium arcus .*abg.* multiplicaueris; uel si quartam partem dyametri in toto arcu .*abg.* duxeris, uenient $\frac{4}{7} 226$ pro embado semicirculi .*abg.*: uel si ex quadrato dyametri, quod est .576. | undecim uigeximas octauas acceperis; uel si ex quadrato ipsius dyametri uigeximam optauam acceperis, et eam per 11 multiplicaueris, ad eundem embadum peruenies : et si ex quadrato dyametri quartam decimam partem acceperis , habebis pañora embadij suprascripti , que sunt $\frac{4}{7} 41$. Et si ad notitiam arcus .*abg.*, qui est semilinea circumferentia circuli aliter uenire desideras, á centro .*e.* super dyametrum .*ag.* lineam .*eb.* orthogonaliter erigas, que erit semidyametri circuli .*abgd.*; et copulabis rectas .*ab.* .*bg.*, et erit angulus, qui sub .*abg.* rectus; cum sit in semicirculo .*abg.*: uel quia .*be* equalis est rectis *ea.* et *eg.*, erit utrumque trigonum .*aeb.* et *beg.* equicurium : quare anguli, qui sub *eba.* et *eab.* et *ebg.* et *bge.* sibi inuicem sunt equales; et est unusquisque eorum dimidium anguli recti; quare duo anguli, qui sub .*abe.* et .*ebg.* uni recto sunt equales; rectus est ergo angulus, qui sub .*abg.*: et quia due recte .*ae.* et .*eb.* duabus rectis .*be.* et .*eg.* sunt equales; et anguli, qui sub .*aeb.* et *beg.* sunt recti, equales erant sibi inuicem recte .*ab.* et .*bg.*; quare quadratum dyametri .*ag.* est duplum quadrato unius cuiusque linearum *gb.* et *ba.*, nec non et unum quodque quadratorum linearum .*gb.* et .*ba.* unicuique quadratorum linearum .*ae.* et .*be.*: et iterum .*be* et .*eg.* est duplum; quare est sicut .*ag.* ad .*gb.*, ita *gb.* ad *be.*, uel ad .*eg.*: quare si multiplicauerimus .*ag.* in .*be.*, scilicet .24. per 12, habebimus .288. pro quadrato uniuscuiusque linearum .*ab.* et *bg.* : uel si quadrati dyametri .*ag.* dimidium acceperimus; aut duplicauerimus quadratum semidyametri .*ge.* uel .*ea.*, habebimus similiter .288 pro quadrato unius cuiusque linearum *gb.* et *ba.*; et est .*ge.* arcus medietatis semicirculi .*abg.*: deinde si diuiserimus cordam *bg.* super punctum .*c.* in duo equa; et per puncta .*c.* .*e.* protraxerimus lineam .*df.*, erit *df.* dyameter circuli .*abgd.*; et faciet angulos rectos super punctum .*c.* cum corda .*bg.*, nec non et diuidet arcum .*bfg.* in duo equa. Quare si á puncto .*f.* protraxerimus lineas .*fb.* et .*fg.*, erit unaqueque ipsarum corda quartę partis semicirculi .*gba.*: ad quarum notitiam ueniemus sic : quia angulus, qui sub *bce.*, est rectus; si quadratum linee .*bc.*, quod est 72, scilicet quartam partem quadrati corde .*bg.* extraxerimus ex quadrato linee .*be.* subtendentis angulum rectum, qui sub *bce.*, remanebunt .72. pro quadrato linee .*ce.*: quare tota .*dc.* est 12, et radix de 72.; et uocatur binomia, cum non possit exprimi ipsa in numeris. Vnde si extraxerimus .*ec.* ex .*ef.*, remanebunt .12 minus radice de .72. pro linea .*cf.* : et uocatur ipsa linea .*cf.* abscisio, uel recisum, aut apotamj, cum constet ex numero minus radice : deinde accipiemus quadrata linearum .*fc.* et *cb.* , et habebis quadratum corde .*bf.* uel *fg.* : nam qualiter accipiamus quadratum | abscisionis .*cf.*, uolo presentialiter demonstrare: pones nomina ipsius , scilicet 12 et 72 , ut in margine cernitur ; et multiplicabis 12 per 12, erunt 144; et radicem de 72 per radicem de 72, erunt 72; quibus iunctis insimul, erunt .216.; de quibus extrahes duplum de 12 multiplicatum in radicem de 72,

uenient 24 radices de 72; et sic habentur pro quadrato lineę .*cf.* 216, minus 24 radicibus de 72, que sunt una radix de 41472. Vel quia linea .*ef.* diuisa ut libet super punctum .*e.*, erunt duo quadrata linearum .*ef.* et .*ec.* equalia quadrato .*cf.*, et duplo rectiangule superficię .*ec.* in .*ef.* Nam quadrata linearum .*ef.* et .*ec.* sunt 216; de quibus si auferamus duplum multiplicationis .*ef.* in .*ec.*, scilicet 24. in radicem de 72., prouenient utique 216 minus radice de 41472; et uocatur recisum primum, ut in suo demonstrabitur loco: cui quadrato si addiderimus quadratum lineę .*bc.*, hoc est 72, habebimus 288 minus radice de 41472 pro quadrato corde .*bf.*; quod uocatur recisum quartum, cuius radix est illa linea, que dicitur minor. Nam si secundum propinquitatem notitiam lineę .*bf.* habere uis, radicem de 41472, que est parum minus de $\frac{2}{3}$ 203, de 288 extrahe, remanebunt parum plus de $\frac{1}{3}$ 84 pro quadrato unius cuiusque *iii.*^{or} cordarum .*gf.* .*fb.* .*bh.* .*ha.*: uel aliter quadrato lineę .*ce.* radicem inuenias, que est parum minus de $\frac{1}{3}$ 8; et ipsam extrahe ex linea .*ef.*, scilicet ex 12., remanebunt parum plus de $\frac{1}{2}$ 3 pro linea .*cf.*; quorum quadratum, quod est parum plus de $\frac{1}{3}$ 12, si addiderimus cum quadrato lineę .*bc.*, habebimus similiter parum plus ex $\frac{1}{3}$ 84 pro quadrato unius cuiusque suprascriptarum *iii.*^{or} cordarum: quod si multiplicauerimus per quadratum quaternarij, scilicet per 16., habebimus 1350 pro quadrato summe ipsarum *iii.*^{or} cordarum, quorum radix est circa $\frac{3}{4}$ 36. Sed arcus .*abg.* est $\frac{5}{7}$ 37. Vnde adhuc sumus aliquantulum longe a notitia ipsius per inuentionem quatuor cordarum. Quare diuidam iterum unam ex *iii.*^{or} predictis cordis in duo equa; et sit corda .*ah.* diuisa super punctum .*I.*; et protraham per puncta .*i.e.* dyametrum .*kl.*, que diuidit arcus .*akh.* in duo equa super punctum .*k.*; et protraham cordam .*ak.*, erit latus figure cadentis in circulo .*abgd.* habentis latera 16: et ueniam ad notitiam eius secundum id quod demonstratum est, uidelicet ex quadrato lineę .*ae.*, hoc est ex 144., auferam quadratum lineę .*ai.*, quod est circa $\frac{1}{11}$ 22., scilicet quarta pars quadrati lineę .*ah.*, remanebunt $\frac{10}{11}$ 121 pro quadrato lineę .*ei.*: quare ipsa linea est circa $\frac{1}{11}$ 11.; que si auferamus ex linea .*ek.*, remanebit .*ak.* circa $\frac{10}{11}$ unius pertice; cuius quadrato, quod est circa $\frac{9}{11}$, si addiderimus cum quadrato lineę .*ai.*, habebimus $\frac{10}{11}$ 21 pro quadrato corde .*ak.*, que est corda octaue partis arcus .*abg.*: quare si multiplicauerimus $\frac{10}{11}$ 21 per quadratum octonarij, scilicet per 64, habebimus circa 1402. pro quadrato octo equalium cordarum cadentium in semicirculo *abg.*, quorum radix est minus de $\frac{1}{2}$ 37. Sed arcus .*abg.* est plus, uidelicet $\frac{5}{7}$ 37. Quare si eodem modo si inueniemus cordam semiarcus .*ak.*, erimus propius longitudine arcui .*abg.*; et sic semper diuidendo arcus ueniemus ad notitiam corde, cuius differentia ad suum arcum erit quasi insensibilis; et sic poteris ad notitiam cuius uis arcus circuli denenire. Et ut hoc liquidius deprehendatur, adiaceat circulus .*abcd.*, cuius dyameter .*ac.* sit 10; et in eo data sit corda nota .*bd.*, que sit .*s.*; et uolumus arcum .*bad* per notitiam ipsius corde inuenire: primum quidem ostendam inuenire per notitiam corde longitudinem utriusque sagiptę; et per notitiam sagiptę inuenire etiam longitudinem corde; et est ista demonstratio super hoc; quia linea .*ac.* diuisa est in duo equalia super punctum .*f.*, et in duo inequalia super punctum .*e.*; erit utique multiplicatio .*ae.* in .*ec.* cum quadrato lineę .*ef.* equalis quadrato lineę .*fa.* Sed .*fa.* equalis est .*fb.*, cum utraque ipsarum producantur á centro .*f.*, et terminentur in periferia circuli; quare multiplicatio .*ae.* in .*ec.* cum quadrato

lineę .*ef.* equatur quadrato lineę .*fb.* Sed quadratum lineę .*fb.* equale est duobus quadratis linearum .*be.* et .*ef.*; ergo multiplicatio .*ae.* in .*ec.* cum quadrato lineę .*ef.* equalis est duobus quadratis linearum .*be.* et .*ef.*; quare si comuniter auferantur quadrata lineę .*ef.*, remanebit multiplicatio .*ae.* in .*ec.* equalis quadrato lineę .*be.*; quare si extraxerimus quadratum lineę .*be.* ex quadrato lineę .*bf.*, scilicet .16 de 25., remanebunt .9 pro quadrato lineę .*ef.*; quare .*ef.* est .3.; quibus additis cum .*cf.*, erunt 8. pro sagitta .*ce.*; similiter extracta .*fe.* ex .*af.*, remanebunt .2. pro linea .*ae.*; est enim multiplicatio .*ae.* in .*ec.*, scilicet de .2 in .8., equalis quadrato lineę .*be.* Vnde recte .*ae.* et .*eb.* et .*ec.* continue proportionales sunt: est enim ut .*ae.* ad .*eb.*, ita .*be.* ad .*ec.* inuenta est; ergo notitia sagittarum .*ae.* et .*ec.* per notitiam cordę .*bd.* Sed sint .*ae.* et .*ec.* sagitte note; quare .*ae.* sit .2, et .*ec.* 8; et uolumus inuenire cordam .*bd.*; quia multiplicatio .*ae.* in .*ec.* equatur quadrato lineę .*be.*; si multiplicauerimus *ae* in *ec.*, scilicet .2 per 8, habebimus .16 pro quadrato lineę .*be.*; quorum radice, scilicet .4., duplicata, habebimus .8. pro corda .*bd.* Sed sit corda *bd* nota, nec non et sagitta .*ea.*, et ignotus dyameter .*ac.*, multiplicabis dimidium cordę *bd.* in se, erunt .16.; que diuide per sagittam .*ae.*, scilicet per 2., uenient 8 pro sagitta .*ec.*; quare dyameter .*ac.* erit 10.; similiter si diuiserimus quadratum lineę .*be.* per sagittam .*ec.*, proueniet sagitta .*ae.* Notandum quia in semicirculo *abc.* recta .*be.* uocatur sinus rectus utriusque arcus .*ab.* et .*bc.*; et recta .*ae.* uocatur sinus uersus arcus .*ab.*; et recta .*ec.* uocatur sinus uersus arcus *bc.*, ut in arte Astrologię reperitur: his itaque demonstratis redeamus ad causam: | protrahamus cordas duorum arcuum .*ba.* et .*ad.*, que sunt recte .*ba* et .*ad.*; quarum notitiam habebimus, si coniunxerimus quadrata linearum .*ae* et .*ed.*, uel .*ae.* et .*eb.*, erit quadratum unius cuiusque linearum .*ab.* et .*ad.* radix de .20: quare si dimidiauerimus cordam .*ad.* in puncto .*g.*; et per puncta .*gf* duxerimus dyametrum .*hi.*, inueniemus per ea que dicta sunt notitiam sagittarum .*ig.* et .*gh.*; cumque quadrata linearum .*ag.* et .*gi.* coniunxerimus, habebimus quadratum cordę .*ai.*, que est corda arcus .*ai.*, que est quarta pars totius arcus *bad.*; cumque frequenter sic fecerimus, poterimus secundum propinquitatem totius arcus *bad.* notitiam habere; cumque ipsum ex linea circumferente, scilicet ex .*adbg.* periferia scilicet de $\frac{5}{7}$ 31 extraxerimus, remanebit arcus .*b.c.d.* notus.


EST enim alius modus reperiendi cordas semiarcium, ex quibus arcubus corde sunt note; et quem THOLOMEVS posuit in almagesto. Sit quidem in circulo *abgd.* dyameter .*bd.* notus, nec non et corda .*ad.* nota; uolo inuenire cordam medietatis arcus .*ad.*; protraham cordam .*ab.*, et erit nota, cum corda .*ad.* sit nota; cum angulus *dab* sit rectus. Quare quadratum dyametrij .*bd.* equatur quadratis duarum cordarum .*da* et .*ab.*; et adiaceat recta .*be.* equalis recte .*ba.*; et diuidam angulum, qui sub .*abe.* in duo media á linea .*bz.*; et copubabo rectas .*zd.* et .*ze.* et .*za.*; et á puncto .*z.* super dyametrum .*bd.* protraham cathetum *zi.*; equalis est recta .*ab.* recte .*be.*; si comuniter adiaceat recta .*bz.*, erunt due recte .*ab.* et *bz* duabus rectis .*zb.* et .*be.* equales; et angulus qui sub .*abz.* angulo qui sub .*zbe.* est equalis; quare basis .*az.* basi .*ze.* est equalis. Sed recta .*az.* recte .*zd.* est equalis, cum equales sint sibi inuicem periferie .*az.* et .*zd.*; quia equales angulj super equales periferias consistunt, siue ad centrum, siue ad periferiam fuerint anguli constitutj; sunt enim anguli qui ad .*b.* sibi inuicem

enim multiplicatio . . . Sed sit corda * (fol. 57 recto, lin. 22-28; pag. 94, lin. 7-14).



fol. 57 verso.

abgd. dyameter . . . be. equales * (fol. 57 verso, lin. 13-20; pag. 94, lin. 32-39).



equales, et consistunt super periferias $.az. zd.$; quare recta $.ze.$ equalis est recte $.zd.$; equicrurium est ergo trigonum $.zed.$; quare punctus $.i.$, qui sunt casus catheti $.zi.$, cadit in medio $.ed.$: et quia orthogonium est trigonum $.bzd.$, cum sit in semicirculo; et in eo super basem ab angulo recto protracta est cathetus, utique trigonum $.bzd.$ in duo trigona diuisum sibi inuicem similiter; habent enim unumquodque ipsorum trigonorum unum angulum rectum, et unum comunem cum toto trigono $.bzd.$, ut EVCLIDES in octauo theoremate sexti libri ostendit. Quare erit sicut $.bd.$ ad $.dz.$, ita $.zd.$ ad $.di.$ Quare multiplicatio $.di.$ in $.bd.$ equatur quadrato lineę $.zd.$; est enim $.id.$ nota, cum sit dimidium ex $.ed.$, que est nota propter $.be.$, que est equalis corde $.bd.$ note. Quare si auferatur corda $.ba.$, | hoc est $.be.$, ex dyametro $.bd.$, remanebit $.ed.$ nota; quare dimidium eius $.id.$ erit notum. Vnde si multiplicauerimus $.di$ notam in $.bd.$ notam, proueniet quadratum corde $.zd.$ notum; quare recta $.zd.$ erit nota, ut prediximus: que etiam ostendantur cum numeris. Sit dyameter $.bd.$ 10; et corda $.da.$ sit .8.; quare corda $.ab$ erit .6.; cui cum equalis sit recta $.be.$, erit $.be.$ similiter .6.; quibus extractis ex dyametro $.bd.$, remanebunt .4. pro recta $.ed.$; quarum dimidium, scilicet 2, erit recta $.id.$: ex multiplicatione quidem $.id.$ in $.bd.$ ueniunt .20, que equantur quadrato corde $.zd.$; quare corda $.zd.$ est radix de .20.; quod oportebat ostendere. Similiter si extraxerimus quadratum lineę $.zd.$ ex quadrato dyametro dyametri $.bd.$, remanebunt .80 pro quadrato corde $.bz.$; quorum radix, que est 9 minus $\frac{1}{8}$, si extraxerimus ex dyametro $.bd.$, remanebit $\frac{1}{18}$ 1; cuius dimidium si multiplicauerimus in dyametro $.bd.$; uel si multiplicauerimus $\frac{1}{18}$ 1 per dimidium dyametri, scilicet per 5, uenient $\frac{5}{18}$ 5 pro quadrato corde semiarctus $.dz.$ Et secundum hunc modum possumus inuenire cordas medietatum quorumlibet datorum arcuum.

fol. 58 recto.

Sed hec talis inuestigatio non est operanda ab agrj mensoribus, qui secundum uulgarem modum procedere uolunt. Nam cum uulgariter longitudinem alicuius arcus habere desiderant, habeant aliquam mensuram lineam, que sit unius pedis, que possit curuari et extendi; et cum ipsa studeant metiri arcus, quos metiri desiderant; uel habeant funem unius perticę uel plurium; et cum ipsa studeant circiter mensurare arcus portionum circularum figendo sepe arundines per girum circuli, ut ipsa funis non deuiet á circumferentia circuli; et sic poterit habere mensuram omnium arcuum circularum.

Sed ut ipsi, qui secundum geometricam scientiam operarj desiderant leuius quam dictum sit, per notas cordas arcus ipsarum reperiri ualeant, sequentes tabulas composui, in quibus ordinate arcus 66 notos proposui; et ante unum quemque suam cordam in perticis et pedibus et unceis et punctis describi feci. Est enim pertica sex peduum; et pes est decem et octo unciarum; et uncia uiginti punctorum; uel pertica est unciarum .108. et punctorum 2160.; et suprascripte corde .66. intelliguntur esse protracte in semicirculo uno, cuius dyameter est 42 perticarum; et quia quelibet corda, que in circulo protracta est, est corda duorum arcuum equalium; si ipsa corda fuerit dyameter, | uel inequalium, si non fuerit dyameter; ideo duos arcus ante ipsas cordas ordinaui, ut in sequentibus tabulis ostenditur :


fol. 58 uerso.

Arcus pertice	Arcus pertice	Corde pertice	Ar pedes	Cuu vncie	M puncta	Arcus pertice	Arcus pertice	Corde pertice	Ar pedes	CV vncie	VM puncta
1	131	0	5	17	17	34	98	30	2	6	17
2	130	1	5	17	13	35	97	31	0	8	5
3	129	2	5	17	4+	36	96	31	4	8	7
4	128	3	5	17	2	37	95	32	2	5	13
5	127	4	4	12	10	38	94	33	0	1	9
6	126	5	5	16	7+	39	93	34	3	13	0
7	125	6	5	14	5	40	92	35	1	4	15
8	124	7	5	12	9	41	91	35	4	12	10
9	123	8	5	8	16	42	90	36	2	0	0
10	122	9	5	7	8	43	89	36	5	3	3
11	121	10	5	4	2	44	88	37	2	4	6
12	120	11	4	17	18	45	87	37	5	3	2
13	119	12	4	13	6	46	86	38	1	17	15
14	118	13	4	7	16	47	85	38	4	12	13
15	117	14	4	1	0	48	84	38	1	4	0
16	116	15	3	11	18	49	83	39	3	11	15
17	115	16	3	3	12	50	82	39	5	17	2
18	114	17	2	12	8	51	81	40	2	2	1
19	113	18	2	0	15	52	80	40	4	2	10
20	112	19	1	8	12	53	79	40	0	0	11
21	111	20	0	13	18	54	78	40	1	14	5
22	110	21	0	0	0	55	77	41	3	7	8
23	109	21	5	2	16	56	76	41	4	16	2
24	108	22	4	4	5	57	75	41	0	4	12
25	107	23	3	4	8	58	74	41	1	8	1
26	106	24	2	3	2	59	73	41	2	9	0
27	105	25	1	0	6	60	72	41	3	7	14
28	104	25	5	16	2	61	71	41	4	9+	2
29	103	26	4	8	0	62	70	41	4	15	10
30	102	27	3	0	3	63	69	41	5	6	9
31	101	28	1	9	7	64	68	41	5	12	17
32	100	28	5	16	4	65	67	41	5	6	14
33	99	29	4	3	9	66	66	42	0	0	0

CVM per has tabulas, qualiter arcus circulatorum inueniri debeant, demonstrare proposuerim, ut ipsa doctrina melius habeatur ostendendum est: quod si in circulo duo arcus inequales fuerint, erit proportio maioris arcus ad suam cordam maior proportionem minoris arcus ad suam; quod patet, et etiam ad oculum deprehendi potest in tabulis suprascriptis: proportio quidem arcus semicirculj ad suam cordam, scilicet ad dyametrum circulj, est sicut .66 ad 42; et hec est sicut .44 ad .7; et proportio arcus septē (sic) partis circulj ad suam cordam est sicut 22 ad 21: maior quippe est proportio de 11 ad .7 quam de 22 ad 21. Similiter in omnibus arcibus suprascriptarum tabularum inuenies, proportionem maioris arcus ad suam cordam superhabundare proportionem minoris arcus ad suam cordam. Sed ut hoc geometricè demonstretur, adiaceat circulus *abgd.*; et in ipso sint duo arcus inequales *ab.* et *bg.*; et sit arcus *bg.* maior; et protrahatur corda arcui *abg.*, que sit recta *ag.*; et diuidatur angulus, qui sub rectis *abg.* in duo equa á linea *bd.*, que secat cordam *ag.* super punctum *e.*; et copulentur recte *ad.* *gd.*; et quia angulus, qui sub rectis *abg.* diuisus est in duo equa á linea *bd.*, equalis est angulus, qui sub *abd.* angulo *dbg.*; quare equalis est arcus *ad.* arcui *dg.*; cum habeatur in tertio EVCLIDIS, equales angulos super equas periferias consistere, cum ad centrum uel ad periferiam sint constituti; quare equalis est recta *ad.* recte *dg.* Communis adiaceat recta *db.* Erunt quidem due recte *ad.* et *db.* duabus rectis *bd.* et *dg.* equales. Sed basis *ba* minor est base *bg.*; quare angulus, qui sub *gdb* rectis maior est angulo, qui sub *bda.*; uel quia maior est periferia *gb.* periferia *ba.*, maior est angulus, qui fit á rectis *gd.* et *db.* angulo, qui fit á rectis *bd.* et *da.*; quia est sicut periferia *gb.* ad periferiam *ba.*, ita angulus qui sub rectis *gdb.* ad angulum qui sub rectis *bda.* Et quoniam equalis est recta *ad.* recte *dg.*, si á puncto *d.* cathetus ducatur super lineam *ag.*, in medio ipsius cadet. Cadet ergo inter *eg.* puncta, scilicet super lineam *eg.*; quia maior *ge.* recte *ae.*, cum sit sicut recta *gb.* ad rectam *ba.*, ita *ge.* ad *ea.*: cadat quidem cathetus super punctum *h.* á puncto *d.*; et quia rectus est angulus, qui sub *dhe.*, maior est recta *de.* quam *dh.*, et maior est recta *da.* quam *de.*: iaceant utreque rectarum *di.* et *df.* equales rectę *de.*; et centro *d.* spatio rectarum *di.* et *de.* circinetur arcus *ief.*; maior est enim sector *die.* trigono rectilineo *dhe.*, et sector *dif.* minor est trigono *dea.*; quare proportio sectoris *die.* ad sectorem *def.* maior est proportione trigonj *dh+e.* ad trigonum *dea.* Sed proportio sectoris *die.* ad sectorem *def.* est sicut proportio angulj *ide.* ad angulum rectilineum *edf.*; ergo proportio angulj *ide.* ad angulum *idf.* maior est proportione trianguli *dhe.* ad trigonum rectilineum *dae.* Sed proportio trigonj *hde.* ad trigonum *ade.* est sicut recta *he.* ad *ea.*, cum ambo trigona sint sub eadem altitudine, que est ex *d.* in *h.* Nam cathetus *dh.* perpendicularis est trigonis *hde.* et *ade.*; ergo proportio angulj *ide.* ad angulum *eda.* est maior proportione recte *he.* ad rectam *ea.*: et si composuerimus, erit proportio angulj *ida.* ad angulum *eda.* maior proportione *ah.* recte ad rectam *ae.* Sed angulus *gdi.* equalis est angulo *adh.*; et recta *gh.* equalis est recte *ah.*; quare proportio angulj *gdi.* ad angulum *eda.* maior est proportione recte *gh.* ad rectam *ae.* Sed proportio angulj *ide.* ad angulum *ade.* inuenta est maior proportione *he.* recte ad rectam *ea.* Quare proportio totius angulj *gde.* ad angulum *eda.* maior est proportione recte

fol. 59 recto.

" ad sectorem ergo proportio "
 (fol. 59 recto, lin. 34, 35, e margi-
 ne inferiore; pag. 97, lin. 32 e 33).




fol. 59 verso.

.ge. ad rectam *.ea.* Sed proportio anguli *.gde.* ad angulum *.ade.* est sicut proportio arcus *.gb.* ad arcum *.ba.*; et proportio *.ge.* ad *.ea.* est sicut proportio corde *.gb.* ad cordam *.ba.* Ergo proportio arcus *.gb.* ad arcum *.ba.* est maior proportione corde *.gb.* ad cordam *.ba.*: permutatim ergo erit proportio arcus *.gb.* ad cordam *.gb.* maior proportione arcus *.ba.* ad cordam *.ba.*; quod oportebat ostendere. His itaque intellectis, si per cordam datam alicuius circuli; cuius dyiameter sit nota, arcum ipsius corde inuenire desideras; ipsam cordam per dyiameter tabularum, scilicet per 42, multiplica, et quod prouenerit, diuide per dyiameter circuli dati, et quod prouenerit, erit corda tabularum similis date corde: accipe arcum eius in tabulis, et multiplica eum per dyiameter dati circuli, et quod prouenerit, diuide per dyiameter tabularum, et habebis arcum quesite corde. Ad cuius rei euidenciam esto circulus *.abg.*, cuius dyiameter *.bg.* sit perticarum .10.; et in ipso data sit corda *.ab.* 5 perticarum; et uis habere notitiam ex arcu *.abe.*; multiplica *.ab.* cordam per 42, et diuides per dyiameter *.bg.*, prouenient .21. pro corda tabularum similis corde *.ab.*: quam quere in tabulis, et accipe arcum, qui est indirecto ipsius; et qui est minor semicirculo, cum queras notitiam ex arcu *.aeb.*, qui est etiam minor semicirculo; et est minor arcus corde ipsius perticarum .22.; quas si multiplicaueris per 10, scilicet per dyiameter *bg.*; et summam diuiseris per 42, prouenient $\frac{5}{24}$ 5 pro arcu *.aeb.*: et si uolueris habere notitiam maioris arcus *.hdg.a.*, inuenias maiorem arcum in tabulis, qui est in directo corde inuente; et inuenies, ipsum esse .110 perticarum: multiplicabis eas similiter per 10, et diuides per 42, et uenient pertice $\frac{4}{24}$ 26 pro | arcu *.bdg.a.* Item sit corda *.ab.* perticarum .8., et pedum .3., et unciarum $\frac{2}{7}$ 16.; et dyiameter *.bg.* sit .10., ut diximus: multiplica ergo perticas .8., et pedes .3., et uncias $\frac{2}{7}$ 16 per 42; et summam diuides per 10., uenient 36, et pedes .2., que sunt corda tabularum similes corde date *.ba.*; quare arcum eius minorem, si minorem uis scire, uel maiorem; si de maiori, scilicet ex arcu *.bdga.* notitiam uis habere; et est minor arcus ipsius corde .42; que multiplica per 10, scilicet per dyiameter *.bg.*; et quod prouenerit, diuide per dyiameter tabularum, qui est 42., et prouenient 10 pro arcu *.aeb.*: et si maiorem arcum corde perticarum 36, et pedum 2., que est .90, multiplica per .10.; et summam diuiserimus per 42, uenient $\frac{2}{7}$ 21 pro arcu maioris semicirculi *.bdg.* Rursus adiaceat circulus alter *.abgd.*, cuius dyiameter *.ag.* sit .12; et uis corda *.ad.* sit perticarum .6, et unius pedis; et queritur notitia ex arcu *.afd.*, qui est minor semicirculo; multiplica itaque 6, et pedem unum per 42, erunt pertice 259; quas diuide per 12, scilicet per *.ag.*, uenient pertice .21, et pedes .3, et uncie .9. pro corda tabularum similis corde *.ad.*; que corda non inuenitur in tabulis, sed cadit inter cordam arcus perticarum 22, et cordam arcus perticarum 23., scilicet inter 21 et 21, et pedes .5., et uncias 2, et puncta .16. Vnde ut habeamus arcum inuente corde, uolumus per figuram geometricam demonstrare. Adiaceat semicirculus *.ezik.*, cuius dyiameter *.ek.* sit perticarum .42, scilicet dyiameter tabularum; et ex ipso accipiatur arcus *.ez.* et *.et.*, quorum *.ez.* sit .22, et *.et.* sit .23; et protrahantur corde *.ez.* et *.et.*, erit corda *.ez.* perticarum .21; et corda *.et.* perticarum 21, et pedum .5., et unciarum .2., et punctorum .16., ut superius in tabulis continetur; inter quas cordas cadit corda inuenta, cuius arcum querimus in tabulis. Vnde scimus, ipsum arcum cadere inter arcum *.ez.*, et arcum *.et.*: cadat itaque in puncto *.i.*; et protrahatur corda *.ei.*, que erit perticarum .21, et pedum 3, et


fol. 60 recto.

tabularum similes... .6 et unius
(fol. 60 recto, lin. 3 e 4-11; pag.
98, lin. 23-31).




unciarum .9., ut superius inuentum est. Et ex his omnibus uolumus inuenire quantitatem arcus .ei. Sed nos scimus ex premissis, quod proportio arcus .ez. ad cordam .ez. est minor proportione arcus .ei. ad cordam .ei.: sed si ponamus proportiones arcus .ei. ad cordam .ei. eam quam habet arcus .ez. ad cordam .ez., erit arcus .ei. perticarum .22, et pedum .3, et unciarum .12., que proueniunt ex diuisa multiplicatione corde .ez. in cordam .ei. per arcum .ez. Sed proportio arcus .ei. ad cordam .ei. est maior proportione arcus .ez. ad cordam .ez.; ergo arcus .ei. est plus inuentarum perticarum 22, et pedum 3, et unciarum 12. Item si ponamus arcum .ei. ad cordam .ei. in proportione arcus .et. ad cordam .et., erit arcus .ei. perticarum .22, et pedum .4, et unciarum .4., et punctorum 13. Sed proportio arcus *ei* ad cordam *ei* est minor proportione arcus .et. ad cordam .et.; ergo arcus .ei. est minor perticarum 22, et pedum 4, et unciarum 4, et punctorum .13.: et superius inuentum est, arcum .ei. esse plus perticarum 22, et pedum .3, et unciarum .12. Vnde si dimidiauerimus differentiam que est á perticis 22, et pedibus .3, et unceis .12 usque in perticas 22, et pedes .4., et uncias 4, et puncta .13.; et illam medietatem que prouenit addemus super perticas 22, et pedes 3, et uncias .12, habebimus secundum propinquitatem quantitatem arcus .ei. Vel aliter agregemus arcus .ez. et .et., erit .45.; et agregemus cordas .ez. et .et., erunt pertice .42., et pedes .5, et uncie .2., et puncta .16.; in quibus diuidamus multiplicationem de .45. in cordam .ei., scilicet in perticas .21, et pedes 3, et uncias .9., et habebimus perticas .22, et pedes .4., et unciam .1., et puncta .6. pro arcu .ei. Vel aliter abscindamus ex cordis .ei. et .et. quantitatem corde .ez.; et remaneat ex corda .ei. quantitas .oi., que est pedum $\frac{1}{2}$ 3; et ex corda .et. remaneat quantitas .nt., que est pedum .5., et unciarum .2., et punctorum .16.: et ponamus arcum .zi. ad arcum .zt., scilicet ad perticam unam, sicut .oi. ad .nt., hoc est multiplicabimus arcum .tz., qui est unius pertice, scilicet .2160 punctorum per .oi., scilicet per puncta .1260., et diuidemus sumam per .nt., scilicet per puncta 1856., habebimus pro arcu .zi. pedes .4., et uncia una (sic), et puncta .6.: quibus additis cum arcu .ez., qui est perticarum .22., habebimus perticas 22, pedes .4., et unciam .1., et puncta .6. pro arcu .ezi., qui est similis arcui quesito *ad*. superioris figure. Quare si multiplicauerimus ipsum per sextam dyametrij .ag., scilicet per 2., et diuiserimus per sextam dyametrij tabularum, scilicet per .7., uenient pertice 6, et pedes .2, et uncie .15, et puncta .15 pro arcu .ad. ET si arcum .abd., qui est maior semicirculo, per cordam .ad habere uis, extrahes cordam .ei. ex corda .et., remanebunt puncta .596.; que multiplica per arcum .tz., scilicet per puncta .2160.; et quod peruenit, diuide per .nt., scilicet per .1856., extrahes puncta .596, que sunt pes .1., et uncie .16, et puncta .14. pro arcu .ti.; que si addideris arcum maiorem tabularum, cuius corda est linea .et.; et ipse arcus est .109. perticarum, habebimus perticas .109, et pedem .1., et uncias .16., et puncta .14. pro arcu tabularum : que si multiplicauerimus per 12, et diuides per 42.; aut si multiplicaueris ipsum per sextam de .12., et diuiseris summam per sextam de .42, habebis perticas .31, et pedem .1., et uncias .7., et puncta $\frac{6}{7}$ 6 pro arcu .abd. ET si per arcum .afd notum cordam .ad. ignotam habere uis, multiplica arcum .afd. per dyametrum tabularum, et sumam diuide per dyametrum .ag., et habebis perticas .22, et pedes .4., et unciam .1., et puncta .6. pro arcu suprascripto .ezi., qui est arcus cadens in tabulis inter arcum .ez., et arcum .ezt. Vnde ut inueniamus cordam ipsius

ad cordam .et. . . . punctorum 13. » (fol. 60 recto, lin. 35, e margine inferiore; pag. 99, lin. 8 e 9).



fol. 60 verso.

et diuiseris6. pro arcu » (fol. 60 verso, lin. 30-33; pag. 100, lin. 38-42).




fol. 61 recto.

.ei., que erit similis corde | *ad.* dati circuli *.abgd.* ex inuento arcu *.ezi.*; et extrahes arcum *.ez.*, remanebunt pedes *.4.*, et uncie *.1.*, et puncta *.6.*, que sunt in summa puncta 1466.; que multiplica per differentiam, que est inter cordam *.ez.*, et cordam *.et.*, que sunt note ex tabulis; et est illa differentia linea *.nt.*, que est punctorum 1856; et diuides summam per puncta unius pertice, scilicet per arcum *.ti.z.*, exhibunt pedes $\frac{1}{2}$ 3. pro linea *.oi.*; quibus superadde lineam *.eo.*, que est equalis corde *.ez.*, habebis perticas 22, et pedes $\frac{1}{2}$ 3. pro corda *.ei.*, que est similis corde tue *.ad.*: quare multiplicabis eam per sextam de 12, et diuides eam per sextam de 42., exhibunt pertice *.6.*, et pes unus pro corda *.ad.*; et sic secundum ea que diximus, cum dyametri circulorum erunt noti, poterimus per datas cordas notas in ipsis arcus eorum ignotos reperire, et cetera.

CVM itaque arcus per cordas: et cordas per arcus, per ea que diximus, inuenire scueris; et uolueris aream alicuius sectoris circuli inuenire, arcum eius inuenire studeas, et dimidium ipsius per semidyametrum circuli multiplica; et quod prouenerit, erit area ipsius sectionis. Verbi gratia: sit sector *.abgd.* contentus sub rectis *ab.* et *ad.* et arcu *.bgd.*, quoniam sector est figura *.abgd.*, erit unaqueque rectarum *ab.* et *ad.* semidyameter circuli; quare punctus *a.* est centrum circuli, de quo recisus est sector *.abgd.*: compleatur itaque circulus, de quo recisus est sector *.abgd.*, qui sit circulus *.gbed.*; et sint arcus *.be.* et *.ez.* equales arcui *.bgd.*; et compleantur recte *ae.* et *az.*, erit itaque unus quisque sectorum *abe.* et *aez.* equalis sectori *.abgd.*: quare est sicut arcus *.db.* ad arcum *.be.*, ita sector *.abgd.* ad sectorem *abe.*: similiter et sector *aez.* equalis est sectori *.adb.*; quare est sicut arcus *db.* ad arcum *.ez.*, ita sector *.abgd.* ad sectorem *aez.*; tres itaque sectores *.abgd.* et *abe.* et *aez.* sibi inuicem sunt equales.

Duo enim illorum reliquo sunt dupli. Quare sector *.adbe.* duplus est sectori *aez.*; et arcus *.dbe.* duplus est arcui *.ez.*; quare est sicut arcus *.dbe.* ad arcum *.ez.*, ita sector *.adbe.* ad sectorem *aez.* Vnde si totum circulum diuiserimus in sectores, inueniemus quod proportio unius eorum ad totum circulum est sicut arcus ipsius ad totam lineam circumferentem circuli; sed proportio arcus cuiuscumque sectoris ad totam lineam circumferentem est sicut dimidium arcus ipsius ad dimidium lineę circumferentis. Nam proportio numeri facti ex semidyametro circuli in semiarcum sectoris est ad numerum factum ex semidyametro in dimidium lineę circumferentis, sicut semiarcus sectoris ad dimidium lineę circumferentis. Sed ex facto á semidyametro, et in medietatem lineę circumferentis lineę prouenit embadum circuli. Ergo est sicut multiplicatio semidyametri circuli in dimidium arcus sectoris ad embadum circuli, ita sector | est ad embadum circuli; ergo areę sectorum omnium colliguntur ex multiplicationis (*sic*) semidyametri suorum circulorum in dimidium arcus ipsorum; et hoc uolui demonstrare. Et ut hoc in numeris declarecat; sit quelibet rectarum *ab.* et *ad.* perticarum *.5.*; et arcus *.bgd.* sit perticarum *.8.*; erit ergo dyameter tota perticarum *.10.*; multiplicabis itaque semidyametrum *ad.* per dimidium arcus *.bgd.*, scilicet *.5* per *4*, uenient *20* pro area sectoris *.abgd.*: et si aream sectoris *.abez.* habere uis, multiplicabis semidyametrum *ae.* in dimidium arcus *.bez.*, uenient *40.* pro area sectoris *.abez.* Et si aream tantum alicuius sectoris minoris semicirculo habere uis, ut aream sectoris *.abg.*, cuius corda *.ag.* sit perticarum *16*; et sagitta *.bd.* sit perticarum *4*; dyametrum circuli, unde ipsa sectio est, inuenire studeas hoc modo: protrahes lineam *.bd.* in directo usque ad pun-

" sector *.abgd.* cuiuscumque "
(fol. 61 recto, lin. 21-28; pag.
400, lin. 20-27).




fol. 61 verso.


ctum .e.; et sit proportio recte .de. ad rectam .da. sicut .da. ad .db.; quare .ed. erit .16, scilicet duplum linee .da.; cum .da. sit duplum linee .db. Vel aliter multiplicetur .ad. in .dg., scilicet .8 per 8., erunt 64; que diuidantur per rectam .bd., scilicet per .4., uenient .16 pro linea .de., ut diximus; erit ergo tota dyameter .be. 20.; et sumatur centrum circuli punctus .f.; et copulentur .fa. .fg., et erit sector .fabg. : quare si multiplicauerimus .fb. in dimidium arcus .abg., scilicet in arcu .bg., ueniet area sectoris .fabg.; de qua si astulerimus aream trigoni rectilinei .fag., que colligitur ex .fd. in .dg., remanebit utique area sectionis contente sub .ag. recta, et arcu .abd. Et si aream relique portionis circuli, que continetur sub recta .ag., et arcu .aeg., habere desideras, semidyametrum, scilicet .fe., in medietatem arcus .aeg. multiplica, et prouenienti sume aream trigoni .fag. superadde, et habebis embadum sectionis .aeg.; et sic studeas operari in similibus.

Et si occurreret tibi metiendi campum habentem figuram sectoris, uidelicet quod sit composita ex triangulo, et circuli portione, ut campum .abgd., qui componitur ex triangulo .abd., et sectione circuli .bgd., que cognoscitur, sectorem non esse si linee .ab. et .ad. inequales sibi inuicem sint; uel si protracta recta infra figuram, ut linea .ag. inequalis fuerit uni rectarum .ab. et .ad.; cuius embadum habebis, si areas sectionis .bgd., et trianguli .abd. in unum coniunxeris. Item si uolueris mensurare campum habentem figuram piscis. Videlicet que sit composita ex duabus circuli sectionibus, ut figuram .ezit., que componitur ex duabus sectionibus circuli, que sunt .ezi. et .eti., accipies siquidem embadum unius cuiusque sectionis; et quod ex ipsa coniunctione prouenit, erit embadum figure .e.z.i.t. Rvsvs |


^a ex ipsa Rvsvs » (fol. 61 verso, lin. 35, e margine inferiore; pag. 101. lin. 22).




^a 16; et sagitta aream trigoni » (fol. 61 verso, lin. 10-18; pag. 100, lin. 42 — pag. 101, lin. 1-7).



^a quod sit mensurare campum » (fol. 61 verso, lin. 26-31; pag. 101, lin. 13-19).



^a ut figuram Rvsvs » (fol. 61 verso, lin. 33-35; pag. 101, lin. 20-22).



fol. 62 recta.

est campus, cui figura elana, uel obliqua dicitur, que circundatur ab una tantum linea minime circulum faciente, cuius duo dyametri .ag. et .bd. se se secundum rectum angulum secantes sibi inuicem sunt inequales: hanc itaque poteris mensurare, si eam in figuris rectilineis soluere procuraueris; ex quibus prima, et maior erit quadrilaterum rectilineum contentum sub rectis .ba. et .bg. et .da. et .dg., et remanebunt ex ipsa figura pectora quatuor, quorum unum continetur sub recta .ab., et curua .aeb. Aliud namque est contentum a recta .bg., et curua .bzg. Tertium uero est sub recta .gd., et curua .gid. Quartum quidem continetur sub rectis .da. et curua .dta.; in quibus quatuor pectoribus si protraxerimus triangulos .eab. et .zbg. et .igd. et .tad. rectilineos, non remanebit ex tota figura nisi parum quod continetur sub pectoribus .s.: et si in quolibet ipsorum


protrahatur triangulus; et in residuis pectoribus illud idem operari studueris, resoluetur tota figura elana suprascripta dicta in figuris rectilineis; et non remanebit ex ea aliquid sensibile; quarum rectilinearum figurarum omnium, si embada in unum reduxerimus, nimirum embadam totius figure incontanter habebimus. Aliter dyametros $.ag.$ et $.bd.$ in unum coniunge, et ipsorum dimidium per $\frac{4}{7} 3$ multiplica; et quod prouenerit erit quantitas curue linee $.abgd.$; cuius dimidium, si per dimidium medietatis duorum dyametrorum multiplicaueris, embadam suprascripte figure prouenerit. Et ut hec in numeris habeantur, sit dyameter $.bd.$ 16., et dyameter $.ag.$ 12; quibus insimul iunctis faciunt 28.; quorum dimidium si per $\frac{4}{7} 3$ diuideris, uenient 44. pro curua linea $.abgd.$; cuius dimidium, scilicet 22., si per medietatem medietatis dyametrorum, scilicet per 7., multiplicaueris, reddent 154 pro embado ipsius.

Si in circulo trigonum describatur, cuius tres anguli periferiam cinguli contingant, possibile est per notitiam ipsius trigoni laterum dyametrum inuenire.

Ad cuius rei euidenciam adiaceat trigonum $.abg.$ descriptum in circulo $abdg.$, cuius tres anguli contingunt cingulum in punctis $.abg.$: a puncto quidem $.a.$ protrahatur dyameter $.ad.$ secans latus trigonj $.bg.$ super punctum $.e.$ Dico per notitiam laterum trigoni $.abg.$ esse possibile quantitatem dyametri $.ad.$ inuenire. Adiaceant quidem primum duo latera trigonj $.ab.$ et $.ag.$ sibi inuicem equalia; et compleantur recte $.bd.$ et $.dg.$; et erit unumquodque trigonorum $.abd.$ et $.agd.$ orthogonium, cum unumquodque ipsorum sit in semicirculo: et quia latus $.ab.$ est equale lateri $.ag.$, equalis erit latus $.bd.$ lateri $.dg.$; quare periferia $.bd.$ periferie $.dg.$ est equalis. Super equales ergo periferias equales anguli consistunt; quare angulus, qui sub $.bad.$ angulo qui sub $.dag.$ est equalis; quare basis $.be.$ basi $.eg.$ est equalis. Ergo dyameter $.ad.$ secat rectam $.eg.$ in duo equalia; quare ad rectos angulos ipsa secare necesse est, ut EVCLIDES in tertio suo libro demonstrat; orthogonia quidem sunt, et equalia trigona $.aeb.$ et $.aeg.$, et similia, cum anguli unius equales sint angulis alterius; et quia trigonum $.adb.$ habet angulum $.bad.$ comunem cum trigono $.abe.$; et angulus $.aeb.$ angulo $.abd.$ est equalis, cum unusquisque ipsorum sit rectus: reliquus uero qui sub $.adb.$ reliquo qui sub $.abe.$ est equalis; equiangula ergo sunt trigona $.abd.$ et $.aeb.$ Similiter ostendetur, trigonum $.agd.$ equiangulum esse cum trigono $.aeg.$ Quatuor ergo trigona $.aeb.$ $.aeg.$ $.abd.$ $.agd.$ sibi inuicem sunt similia. Similia enim trigona circa equales angulos habent latera proportionalia. Quare est sicut $.da.$ subtendens angulum rectum, qui sub $.abd.$ ad $.ab.$ continentem ipsum, ita $.ab.$, uel $.ag.$, qui subtendens subtendentes angulos rectos ad rectam $.ae.$; quare multiplicatio $.ad.$ in cathetum $.ae.$ equatur unicuique quadratorum linearum $.ab.$ et $.ag.$, uel multiplicationi ex $.ab.$ in $.ag.$


Quare si multiplicauerimus $.ab.$ in $.ag.$, uel acceperimus quadratum linee $.ab.$, uel linee $.ag.$, et summam diuiderimus per cathetum $.ae.$, proueniet quantitas dyametri $.ad.$; et est nota cathetus $.ae.$, cum sint nota latera trigoni $.abg.$; quare et dyameter $.ad.$ erit nota. Que ut demonstrantur in numeris, sit quelibet rectorum $.ab.$ et $.ag.$ perticarum 10, et recta $.bg.$ sit 12. Quare cathetus $.ae.$ erit 8: ex ductu quidem $.ab.$ in $.ag.$, uel ex quadrato linee $.ab.$ uel $.ag.$ proueniunt 100; quibus diuisis per $.ae.$, scilicet per 8., uenient $\frac{1}{8} 12$ pro dyametro $.ad.$; uel aliter quia due recte $.ad.$ et $.bg.$ se se inuicem secant in circulo $abdg.$, erit multiplicatio $.ae.$ in $.ed.$ sicut multipli-

• periferias equales qui sub $.dag.$ » (fol. 62 recto, lin. 34, 35, e margine inferiore; pag. 102, lin. 21-22).



fol. 62 verso.


• EVCLIDES equales angulos » (fol. 62 verso, lin. 2 e 3-10; pag. 102, lin. 24-31).



catio *.be.* in *.eg.*: quare si multiplicauerimus *.be.* in *.eg.*, et diuiderimus per *.ae.*, scilicet 36 per 8, uenient $\frac{1}{2} 4$ pro linea *.ed.* Quare tota *.ad.* dyameter erit $\frac{1}{2} 12$, ut prediximus. Sed sit unaqueque rectarum *.ab* et *.ag.* cum dyametro *.ad.* nota; et recta *.bg.* sit ignota; quoniam orthogonium est trigonum *.abd.*; et ab angulo ipsius recto super basem *.ad.* ad rectos angulos protracta est recta *.be.*, erunt trigona *.abe.* et *.bed.* sibi inuicem similia, nec non et toti trigono *.abd.*; quare est sicut *.da.* ad *.ab.*, ita *.ab.* ad *.ae.*; quare si diuiderimus quadratum lineę *.ab.*, quod est 100, per dyametrum *.ad.*, uenient .8. pro catheto *.ae.*; quorum quadratum si auferatur ex quadrato lateris *.ab.*, remanebunt 36 pro quadrato lineę *.be.*; uel si multiplicauerimus *.ae.* per *.ed.*, hoc est .8. per $\frac{1}{2} 4$, uenient similiter 36 pro quadrato lineę *.be.*; ergo *.be.* est .6., et tota *.bg.* est .12.: uel aliter quia trigonum *.aeb.* est simile trigono *.adb.*, erit sicut *.ad.* ad *.db.*, ita *.ab.* ad *.be.*; habent enim latera circa equales angulos proportionalia: est quidem angulus, qui sub *.abe.*, equalis angulo qui sub *.adb.*; quare si multiplicauerimus *.db.* in *.ba.*, hoc est $\frac{1}{2} 7$. in .10; et diuiderimus per *.ad.*, uenient .6. pro linea *.be.*, que est medietas lineę *.bg.* SED non sint equales rectę *.ab.* et *.ag.*; sit minor earum *.ab.* in hac alia cernitur figura: et protrahatur in trigono *.abg.* cathetus *.az.*; et quia in sectione *.bdga.* sunt duo anguli, quorum unus est qui sub *.bga.*, et alter qui sub *.bda.*, erunt ipsi anguli sibi inuicem equales; et angulus qui sub *.azg.* angulo qui sub *.abd.* est equalis, cum sit uterque eorum rectus; reliquus sub *.zag.* reliquo qui sub *.bad.* est equalis: equiangularia enim sunt trigona *.azg.* et *.abd.* Similiter ostendetur, trigonum *.azb.* esse simile trigono *.agd.*: sunt enim in sectione contenta a recta *.ga.*, et arcu *.abdg.* anguli qui sub *.abg.* et *.adg.* Quare ipsi anguli sibi inuicem sunt equales; et anguli *.azb.* et *.agd.* sunt recti; quare reliquus qui sub *.zab.* reliquo qui sub *.gad.* est equalis. Simile est ergo trigonum *.azb.* trigono *.agd.*; et quia similia sunt trigona *.abd.* et *.azg.*, erit sicut *.da.* ad *.ab.*, ita *.ga.* ad *.az.* Quare si multiplicauerimus *.ab.* in *.ag.*, et diuiderimus per *.az.*, proueniet dyameter *.ad.* Exemplum in numeris: sit *.ab.* 13., et *.ag.* 15, et *bg.* sit 14.; quare *.bz.* erit .5., et *zg.* erit .9., et *az.* erit .12. Ex *ab* quidem in *.ag.* ueniunt .195.; quibus diuisis per *.az.*, scilicet per 12, proueniunt $\frac{1}{4} 16$ pro dyametro *.ad.* Sed sit nota dyameter *.ad.* cum unaquaque rectarum *.ab.* et *.ag.*, recta nero *.bg.* que est corda arcus *.bag.*, sit ignota; quia similia sunt trigona *.adg.* et *.azb.*, circa equales angulos habent latera proportionalia; quare est sicut *.ad.* ad *.dg.*, ita *.ab.* ad *.bz.*; quare multiplicatio *.ab.* in *.dg.* equa est multiplicationi *.ad.* in *.bz.* Rursus quia similia sunt trigona *.abd.* et *.azg.*, erit sicut *.ad.* ad *.db.*, ita *.ag.* ad *.gz.*; quare multiplicatio *.ag.* in *.db.* equatur multiplicationi *.ad.* in *.zg.* Sed multiplicatio *.ab.* in *.gd.* fuit equa multiplicationi *.ad.* in *.bz.*; ergo multiplicatio *.ab.* in *.gd.* cum multiplicatione *.ag.* in *.bd.* equatur duabus multiplicationibus, que sunt ex *.ad.* in *.bz.*, et ex *.ad.* in *.zg.*; que due multiplicationes equantur facto ex *.ad.* in *.bg.*; ergo multiplicatio *.ab.* in *dg.* cum *.ag.* in *.db.* equatur facto ex *.ad.* in *.bg.*; ergo si multiplicationem ex *.ab.* in *.dg.* coniunxerimus cum facto ex *.ag.* in *.bd.*, et summam diuiderimus per *.ad.*, ueniet nota corda *.bg.*, ut prediximus. Que demonstrantur in numeris: ex quadrato quidem dyametri *.ad.* auferatur quadrata (sic) linearum *ab* et *ag.*, et remanebunt nota quadrata linearum *bd.* et *dg.*, cum orthogonia sint trigona *.abd.* et *.agd.*; et erit *.bd.* $\frac{3}{4} 9$; et recta *.gd.* erit $\frac{1}{4} 6$. Vnde si mul-


fol. 63 recto.

* arcus *.bag.* ... si multiplicationem * (fol. 63 recto, lin. 20-29; pag. 103, lin. 30-39).




fol. 63 verso.

ag; et hoc ... duabus multiplicationibus * (fol. 63 verso, lin. 6-13 et 14; pag. 104, lin. 7-14).




accipiatur angulus ... cum facto ex * (fol. 63 verso, lin. 25-32; pag. 104, lin. 24-31).



fol. 64 recto.

pro quadrato ... in ipso * (fol. 64 recto, lin. 3 et 4-10; pag. 104, lin. 37-44).



tiplicauerimus $\frac{1}{4}$ 6. per .13., hoc est $gd.$ per $.ab.$, et $\frac{3}{4}$ 9 per 15, hoc est $.bd$ per $ag.$, habebimus $\frac{1}{2}$ 227; quibus diuisis per dyametrum $.ad.$, hoc est per $\frac{1}{4}$ 16, reddunt .14. | pro corda $.bg.$; et quibus diuisis per $\frac{1}{4}$ 16, scilicet per dyametrum $.ad.$, uenient 14 pro corda $.bg.$; et hoc est ualde utile in reperiendo corda cuilibet arcui agregato ex duabus arcibus, quorum corde sint note. Fuerunt quidem note corde arcuum $.ba.$ et $.ag.$, scilicet recte $.ab.$ et $.ag.$; per quarum notitiam inuenimus cordam $.bg.$ arcui $.abg.$, qui fuit agregatus ex arcu $.ba.$ et $.ag.$; et hoc demonstrauit THOLOMEVS in compositione tabule arcuum, et cordarum in almagesti per alium modum. DEMONSTRAUIT quidem THOLOMEVS per consimilem figuram, quod omnis quadrilateri qualitercumque cadentis in circulo, si duo dyametri protrahantur in ipso, multiplicatio unius dyametri in alium equatur duabus multiplicationibus oppositorum laterum; quod sic probatur. In circulo quidem $.abcd.$ sit quadrilaterum $.abcd.$; et in ipso sint dyametri ipsius quadrilateri $.ac.$ et $.bd$ se inuicem secantes super punctum $.e.$ Dico quod multiplicatio $.ac.$ in $.bd.$ equatur duabus multiplicationibus, que fiunt ex $ab.$ in $.cd.$, et ex $ad.$ in $.bc.$ Anguli quidem $.bae.$ et $.ead.$ aut sunt equales, aut inaequales: sint prius equales; et ostendetur, trigonum $.aed.$ simile esse trigono $.abc.$, cum anguli qui sub $.adb.$ et $.acb.$ sint sibi inuicem equales. Sunt enim in eadem sectione reliquus qui sub $.aed.$ reliquo qui sub $.abc.$ similiter est equalis; quare est sicut $.ac$ ad $.cb.$, ita $.ad.$ ad $.de.$: erit ergo multiplicatio $.ad.$ in $.cb.$ equalis $.ac.$ in $.de.$

Similiter ostendetur, trigonum $.aeb.$ simile esse trigono $.adc.$; quare erit sicut $.ac.$ ad $.cd.$, ita $.ab.$ ad $.be.$: multiplicatio ergo $.ac.$ in $.eb.$ est equalis multiplicationi $.ab.$ in $.cd.$; ergo multiplicatio $.ad.$ in $.bc.$ cum $.ab.$ in $.cd.$ equatur multiplicationi $.ac.$ in $.bd.$, ut predixi. SED sit angulus $.bae.$ maior angulo $.ead.$; et iaceat angulus $.bai.$ equalis angulo $.ead.$; comunis accipiatur angulus $.iae.$, erit angulus $.bae.$ equalis angulo $.iad.$; quare ostendetur, trigonum $.iad.$ simile esse trigono $.abc.$; et trigonum $.aib.$ simile esse trigono $.adc.$, et prouenient de inceptis que diximus superius; et ostendetur, multiplicatio dyametri $.ac.$ in dyametrum $.bd.$ equari duabus multiplicationibus oppositorum laterum. Vnde si una ex ipsis cordis fuerit ignota, per notitiam reliquorum poteris ipsam inuenire. Verbi gratia: sit ignotus unus ex dyametris, reliquus uero cum lateribus quadrilateri sit notus.

Multiplicabo quidem $.ab.$ in $.cd.$; et addam id quod prouenerit cum facto ex $.ad.$ in $.bc.$; et summam que prouenerit diuidam per dyametrum notum. Et si fuerit ignotum latus $.ab.$, ex multiplicatione $.ac.$ in $.bd.$ extraham factum ex $.ad.$ in $.bc.$; residuumque diuidam per $.cd.$, et ueniet $.ab.$; et sic intelligas in reliquis. |


Si in circulo, cuius dyameter sit 8, latus trigoni equilateri cadentis in circulo inuenire desideras, ex quadrato totius dyametri quartam partem remoue, uel quadratum semidyametri triplica, et habebis .48. pro quadrato unius cuiusque laterum trigoni cadentis in ipso circulo: quod si in dimidium sui catheti multiplicaueris, scilicet per .3, uenient tres radices de .48., hoc est una radix de .432. pro embado ipsius trigoni, quod est perticarum .20., et pedum .4., et unciarum $\frac{3}{4}$ 12. Vnde habetur quod proportio aree unius cuiusque trigoni cadentis in ipso circulo ad quadratum sui dyametri est sicut .20, et pedes .4, et uncie $\frac{3}{4}$ 12 ad 64.: quare si multiplicauerimus ea per quadratum, cuius uolueris dyametri, et diuiserimus per 64, habebimus aream trigonis (sic) cadentis in ipso circulo. Et quia trigonum cadens in circulo est medietas exagoni cadentis in

ipso circulo, erit proportio aree exagoni ad quadratum dyametri sui circuli sicut .41, et pedes 3, et uncie $\frac{1}{2}$ 7 ad 64.; quibus multiplicatis per quadratum dyametri cuius uis circuli, si summa diuidatur per 64, ueniet utique embadum exagoni cadentis in ipso circulo. Et si in circulo *abgd.* eius dyameter *bd.* sit .8.; et uis latus penthagonicum, seu decagonicum cadens in ipso circulo reperire, super dyametrum *b.d.* á centro *e.* cathetus erigatur *ea.*; et diuidatur *ed.* in duo equa super punctum *z.*; et copuletur recta *az.*; et iaceat recta *z.* equalis recte *az.*, et copuletur recta *ai.* Dico quidem quod recta *ai.* latus est penthagonicum: et recta *ie.* latus est decagonicum; quod sic probatur: quia linea *ed.* diuisa est in duo equa super *z.*; et indirecto ipsius adiuncta est linea *ei.*, erit multiplicatio *ei.* in *id.* cum quadrato linee *ez.* est equalis quadrato linee *zi.* Sed *zi.* recta iacet equalis recte *az.*; ergo factum ex *ie.* in *di.* cum quadrato linee *ez.* equatur quadrato linee *az.* Sed quadrato linee *az.* equantur quadrata linearum *ae.* et *ez.*; ergo factum ex *ie.* in *id.* cum quadrato linee *ze.* equatur duobus quadratis linearum *ae.* et *ez.*; comuniter auferatur quadratum linee *ez.*, remanebit multiplicatio *ei.* in *id.* equalis quadrato semidyametri *ae.*, hoc est quadrato semidyametri *de.*, cum *de.* sit equalis linee *ae.*; ergo linea *di.* diuisa est media, et extrema proportione.

Est enim ut *id.* ad *de.*, ita *de.* ad *ei.*; et est latus exagonicum linea *de.*: cum itaque lateri exagonici adiungatur recta, que cum tota diuisa sit secundum mediam, et extremam proportionem in puncto coniunctionis ipsarum, ipsa recta, que coniungitur lateri exagonico, est latus decagonicum, ut EVCLIDES in tertio decimo libro demonstrat. Quare recta *ei.* est latus decagonicum. Et quia, ut idem EVCLIDES in eodem libro ostendit, latus penthagonicum posse super latus exagonicum et decagonicum, erit siquidem recta *ai.* latus penthagonicum, cum possit equale quadratorum linearum *ae.* et *ei.*, scilicet quadratis lateris exagonici, et decagonici, quod *ai.* latus. Monstrabo cum numeris, esse lineam minorem, scilicet radicem abscisionis quartę.

Verbi gratia: dyameter *bd.* est .8.; quare utraque rectarum *ae.* et *ed.* est .4.; quorum dimidium, scilicet *ze.*, est .2. Vnde si adiunxerimus quadrata linearum *ae.* et *ez.*, habebimus .20. pro quadrato uniuscuiusque linearum *az.* *zi.*; ergo recta *ei.* constat ex radice minus numero: est enim ipsa radix de .20. duobus inde demtis: quam si in se multiplicauerimus, uenient 24., minus iii.^{or} radicibus de .20.; que iii.^{or} radices sunt una radix sexdecupli de 20., scilicet de .320.; que si addiderimus cum quadrato linee *ae.*, scilicet cum .16., habebuntur .40, minus radice de 320. pro quadrato linee *ai.*; quorum radix est linea *ai.*: et quia ipsa est radix numeri, minus radice, dicimus, ipsam esse lineam minorem, cum differentia, que est inter quadratum de 40, scilicet inter .1600. et .320. non sit quadratus numerus, cuius recisi radix secundum propinquitatem sic accipitur: radix de 320., que est circa 18, minus nona, extrahitur de .40., remanent $\frac{1}{9}$ 22., quorum radix, que est .4., et pedes 4, et uncie 3, et puncta .17., secundum maximam propinquitatem est linea *ai.*, scilicet latus penthagonicum cadens in circulo suprascripto. Ex hoc enim facile possunt haberi omnia latera penthagonica quorumlibet circulorum; quia est sicut 4, et pedes 2., et uncie .3, et puncta 17 ad 8., ita erit latus penthagonicum cuius uis circuli ad suum dyametrum. Vnde si multiplicauerimus dyametrum cuiuslibet circuli per 4, et pedes 2, et uncias 3, et puncta 17,


* Linee *ez.* linea *de.* s (fol. 64 recto, lin. 23-31; pag. 405, lin. 40-48).




xⁱ tertij xⁱ

fol. 64 verso.

* Monstrabo cum radix numeri s (fol. 64 verso, lin. 4, 5-13; pag. 405, lin. 25-34).



zeb. est in . . . binomio; idcirco
(fol. 64 verso, lin. 28-35; pag.
106, lin. 4-11).



fol. 65 recto.

et diuiserimus per 8., habebimus latus dècagonicum ipsius circuli. Si vero cordam anguli penthagonici *be.* in penthagono *abcde.*, circa quod penthagonum sit circulus *abgde.* descriptus, inuenire desideras. Dyametrum ipsius circuli *bz.* protrahe, que sit *s.*; et copulabis *ze.*, que erit latus decagonicum: et quia angulus *zeb.* est in semicirculo *zeb.*; ideo est rectus. Quare si ex quadrato dyametri *bz.*, quod est *64.*, auferatur quadratum lateris decagonici *ze.*, quod inuenimus esse superius *24.*, minus radice de 320.; quorum radix dicitur linea maior, cum sit radix binomij quarti, remanebunt 40, et radix de 320., que est longitudo corde *be.* Vnde potest haberi, quod quorumcumque nominum fuerit quadratum penthagonici, eorundem nominum erit corda anguli penthagonici. Sed latus penthagonicum est radix recisi quarti, scilicet numeri, minus radice; et quadratum corde est binomium quartum; et quia minus est reciso suo binomio; idcirco radix quarti recisi dicitur linea minor: et radix quarti binomij dicitur maior.

Aliter protrahatur dyameter *ati.* secans cordam *be.* super punctum *t.*; et copulabo rectam *ib.*, et erit trigonum *iba.* orthogonium; et est diuisum á catheto *bt.* in duo trigona sibi inuicem similia et toti; quare est sicut *ia.* ad *ab.*, ita *ab.* ad *at.*: quare si diuiserimus quadratum lineæ *ab.*, quod est *40.*, minus radice de *320.*, per dyametrum *ai.*, scilicet per *s.*, habebuntur *5.*, minus radice de *5.* pro linea *at.*: quibus extractis ex tota *ai.*, remanebunt *3.*, et radix de *5.* pro linea *ti.*: unde si multiplicauerimus *ti.* in *ta.*, et quadruplicauerimus illud quod prouenerit, habebuntur similiter *40.*, et radix de *320.* pro quadrato lineæ *be.*: est enim radix de 320. 18 minus $\frac{1}{2}$; quibus additis cum *40.*, faciunt 58, minus nona, pro quadrato lineæ *be.*, quorum radix est *7.*, et pedes *3.*, et uncie *11.*, et puncta *14.* Per quam etiam cordam poteris habere notitiam similium cordarum cadentium in quolibet circulo, si ipsam per dyametrum ipsius circuli duxeris, et summam diuiseris per *8.* Et ut habeamus embadum suprascripti penthagoni, multiplicabimus $\frac{3}{4}$ dyametri, scilicet *6.* per $\frac{5}{8}$ corde *be.*; uel $\frac{5}{8}$ de *6.*, que sunt *5.*, multiplica per totam cordam *be.*, et uenient circa perticas *38.*, et denarios $\frac{1}{2}$ *1.* mensuræ pro embado penthagoni *abgde.*: per quod etiam possumus habere notitiam embadorum omnium penthagonorum cadentium in quibuslibet circulis: si multiplicauerimus perticas *38.*, et denarios $\frac{1}{2}$ *1.* per quadrata dyametrorum ipsorum circulorum, et diuiserimus per quadratum prepositi circuli, scilicet per *64.*; quia et EVCLIDES in principio duodecimi libri ostendit similia rectilinea in circulis ad se inuicem sunt sicuti ad dyametrorum tetragona: permutatim ergo est sicut quadratum dyametri unius circuli ad multilaterum cadens in ipsum, ita quadratum alterius circuli ad simile multilaterum cadens in ipsum: possumus etiam aliter habere notitiam corde *be.*; et habebitur ex ea que probantur in quarto decimo libro EVCLIDIS, quod corda anguli penthagonici cum latere penthagonico possunt quincuplum tetragoni semidyametri circuli: quare si acceperimus quincuplum quadrati medietatis dyametri, habebimus *80.*; de quibus si extraxerimus quadratum lateris penthagonici, scilicet *40.*, minus radice de 320, remanebunt *40.*, et radix de 320. pro quadrato corde *be.*, ut prediximus: uel si multiplicauerimus dyametrum per $\frac{5}{81}$, habebimus *40.* pro maiori nomine: et si ex quadrato quadrati dyametri acceperimus $\frac{5}{64}$, hoc est de 4096, habebimus 320; quorum radix est minus nomen; et sic poteris facere in alijs circulis.

Embadum quidem trigoni equilateri et equianguli cadentis in circulo, cuius dya-

meter est .8.; inuenimus esse superius perticas quadratas .20, et pedes .4., et uncias $\frac{3}{4}$ 12. Embadum quidem tetragonj est 32, scilicet dimidium de 64., scilicet ex tetragono | dyametri. Pentagoni uero $\frac{1}{24}$ 38. Exagoni quoque .41, et pedes .3, et uncie $\frac{1}{2}$ 7. Octagoni embadum quidem est perticarum 45, et pedis .1, et uncie $\frac{1}{2}$ 9, que habentur ex multiplicatione dupli dyametri in medietatem lateris tetragonj, scilicet ex 16 in radice de .8. Embadum quoque decagonj est perticarum 47, et unciarum $\frac{1}{2}$ 2, que habentur ex multiplicatione quincuplacionis quarte partis dyametri in latus pentagonicum, scilicet ex .10., in perticas .4, et pedes .4., et uncias .3, et puncta .17. Embadum namque dodecagonj est .48 perticarum, que proueniunt ex multiplicatione medietatis dyametri in medietate omnium laterum exagoni cadentis in ipso circulo. Cvmque omnium harum notitiam habueris: poteris embadum similium figurarum cadentium in alijs circulis de facili habere: si in memor non fueris ex predictis. Explicatis itaque que ad circulorum demonstrationes pertinent; nunc ad diminutionem camporum, qui in ascensione montium iacent, accedamus.


Incipit pars quinta in dimensione camporum qui in montibus iacent.

Cvm itaque campum aliquem qui sit in ascensione, siue in decliuis montium metiri desideras, latera superficiiei iacentis in plano sub ipso diligenter inquiras, per que embadum ipsius plane superficiiei habere studeas.


Nam ipsum erit embadum quarti campi. Non enim mensurantur montes secundum superficies apparentes in eis; cum domus, et edificia, arbores, nec non et semina non secundum rectum angulum super ipsas superficies eleuentur. Vnde queruntur embada ipsorum planorum, super que apparentes superficies montium iacent: et super que plana predicta omnia secundum rectum angulum eleuantur. Nam qualiter per latera decliuarum superficiierum habeas notitiam laterum planarum superficiierum existentium sub ipsis, uolo presentialiter demonstrare. Adiaceat quidem linea .ab. pro latere alicuius decliuis superficiiei iacentis in monte; et sit linea .bg. latus plani existentis sub latere .ab.; et cadat super .bg. perpendiculariter recta .ag. faciens angulum qui ad .g. rectum: oportet quidem per notitiam apparentis lateris .ab. occultum latus .bg., nec non et notitiam perpendicularis .ag. uerissime reperire. Quod dupliciter fit. Primus enim modus: et quo sapientes agrimensores utuntur: ut in puncto .a. caput metientis pertice ponas, extendens eam uersus .b. super lineam .ab., et caput pertice, quod est super .a. immobiliter tene: aliud uero sursum erige donec ipsa pertica iaceat equidistanter linee .gb.; quod scitur per quoddam instrumentum, quod uocatur archipendulum, ut inferius demonstrabo: et tunc per inferius caput pertice lapillum cadere relinquant super lineam .ab.; et ubi lapillus ceciderit, ibi cum eadem pertica incipias eodem ordine cum pertica mensurare; et sic facies donec expleueris mensurando totam lineam .ab.

Verbi gratia: sit pertica primo posita .ae., que equidistet lateri .gb.; et per .e. punctum cadat lapillus super punctum .c.; super quem punctum ponat iterum caput pertice, tenendo eam cum archipendulo equidistantem cum linea .gb., que sit .cf.; et a puncto .f. cadat lapillus super punctum .h., et a puncto .h. uersus .b.; et ponas iterum perticam equidistantem linee .bg., que sit .hi.; et per .i. cadat lapillus super punctum .b. Nam quotiens pertica sit posita cadens super lineam .ab., totiens pertica

fol. 65 verso.
c dyametri. Pentagoni ... medietate omnium ... (fol. 65 verso, lin. 1-8; pag. 107, lin. 3-10).




v montes secundum ... per notitiam ... (fol. 65 verso, lin. 18-27; pag. 107, lin. 19-28).



fol. 66 recto.


una erit in latere $.gb.$ Verbi gratia : quia pertica $.ae.$ equidistat lateri $.gb.$, erit angulus $.eag.$ rectus, cum sit rectus angulus, qui ad $.g.$; et quia $.ec.$ est casus lapilli, si emiserimus lineam per $.c.$ á puncto $.e.$ super lineam $.gb.$, que sit linea $.ek.$, erit recta $.ek.$ cathetus super rectam $.gb.$; quare recta $.ek.$ equidistans est: et equalis recte $.ag.$; quare $.gk.$ equalis est longitudini pertice $.ae.$ Similiter si per $.h.$ protracterimus lineam $.fl.$, inuenies, eisdem dispositis, lineam $.kl.$ equari pertice $.ef.$ Rursus si per casum lapilli cadentis ab $.i.$ in $.b.$ punctum protracterimus lineam $.ib.$, erit ipsa equidistans, et equalis linee $.hl.$; quare et $.lb.$ equalis est $.hi.$, scilicet pertice; ergo quotiens pertica accepta fuit equidistans linee $.gb.$ super lineam $.ab.$, totiens unius pertice longitudo erit linea $.gb.$, ut prediximus. Est enim archipendulus istrumentum ligneum habens formam trianguli equicrurij; et ab uno angulorum pendit filum cum plumbo: cumque posueris basem ipsius archipendulj super perticam, et ab angulo superiori plumbum cum filo ceciderit super dimidium basis ipsius: tunc pertica stabit equidistans illi plano, quod mensurare uolueris; quod potueris ad oculum deprehendere in subiecta figura, in qua ponitur pro pertica linea $.po.$, super quam erectus est archipendulus $.abg.$; et á puncto $.a.$ cadit filum cum plumbo $.ad.$ per punctum $.e.$, qui est in medio $.bg.$ Er si in antecedente figura apprensus latus $.ab.$ recte descenderit, non oportebit ponere perticam cum archipendulo nisi semel; quia cum posueris perticam $.ae.$ equidistantem lateri $.gb.$; et super casum $.ec.$ erexeris arundinem equalem linee $.ec.$, erit triangulus $.aec.$ similis triangulo $.abg.$; quia cum in equidistantibus $.ae.$ et $.bg.$ recta incidit $.ab.$, erit angulus $.aec.$ equalis angulo $.abg.$; similiter quia in equidistantibus $.ag.$ et $.ec.$ recta incidit $.ab.$, erit angulus $.gab.$ equalis angulo $.eca.$; quare reliquus qui sub $.aec.$ reliquo | qui sub $.agb.$ remanet equalis: quare proportionaliter erit sicut $.ac.$ ad totam $.ab.$, ita pertica $.ae.$ ad totam $.gb.$ Vnde si multiplicauerimus $.ab.$ in $.ae.$, et diuiserimus per $.ac.$, proueniet utique linea $.gb.$; hoc est si feceris perticam equalem linee $.ac.$, et cum ipsa mensurabis totam lineam $.ab.$, habebis similiter lineam $.gb.$; quia quot equales linee $.ac.$ sunt in linea $.ab.$, tot equales pertice $.ae.$ sunt in latere $.gb.$; similiter quot equales linee $.ac.$ sunt in linea $.ab.$, tot equales linee $.ec.$ sunt in altitudine $.ag.$ Vnde si multiplicauerimus $.ab.$ per $.ec.$, et diuiserimus per $.ac.$, proueniet utique altitudo catheti $.ag.$; et hec inuestigatio catheti est multum utilis in reperiendis altitudinibus pyramidum.

pendit filum ... perticam cum
(fol. 66 recto, lin. 22-29; pag.
108, lin. 41-48).



fol. 66 verso.

SAPIENTES uero ... igitur $.ab.$
per a (fol. 66 verso, lin. 10-17;
pag. 108, lin. 32-39).




SAPIENTES uero antiqui ordinabant cum arundinibus triangulum similem in hunc modum. Descripta itaque figura suprascripta $.agb.$, cuius latus $.ab.$ iaceat in apparentia montis, per quod uolebant habere longitudinem plani $.bg.$, nec non et altitudinem $.ag.$; erigebant itaque super radicem montis arundinem $.bc.$ orthogonaliter cuiuscumque magnitudinis, super quam ponebant aliam arundinem facientem angulum $.c.$ rectum, cuius caput alter iacebat super lineam $.ab.$; que arundo sit linea $.ce.$; et sic triangulus $.cbe.$ erat similis triangulo $.abg.$; quare erat sicut $.be.$ ad $.ba.$, ita $.ec.$ ad $.bg.$; multiplicabant igitur $.ab.$ per $.ce.$, et diuidebant per $.be.$; et sic habebant notitiam lateris $.bg.$ Similiter quia erat sicut $.be.$ ad $.ba.$, ita $.cb.$ ad $.ag.$; multiplicabant $.ab.$ per $.bc.$, et diuidebant per $.be.$; et sic habebant altitudinem $.ag.$ Er si campus in monte positus habuerit formam superficiei alicuius portionum colupne, ita quod apprensus superficies sit gibbosa, ut superficies $.abde.$, cuius latera $.ab.$ et $.de.$ sint arcus

circulj; reliqua uero latera *.ad.* et *.be.* sint recta; et sit latus *.be.* in uertice montis; latus quoque *.ad.* sit inuersus radicem. Intelligam primum latera plani existentis sub ipsa superficie *.agd.* et *.gz.*, nec non et altitudines *.bg.* et *.ez.* cadentes orthogonaliter super planum *.adzg.*, et in puncta *.g.* et *.z.*; quare anguli *.agb.* et *.dze.* sunt recti: mensurabo siquidem super arcus *.ba.* et *.ed.* cum pertica et archipendulo, prohibiendo lapillos super ipsos arcus, incipiendo á punctis *.be.*, que sunt in eminentia campi, et descendendo usque ad puncta *.ad.*; et sic habebó quantitates *.ag.* et *.dz.*: et quia latus *.ad.* est rectus, nec non et in plano superficiei *.gad.*, mensurabo ipsum sicuti mensurantur latera planorum.

Deinde mensurabo latus *.be.* si fuerit equidistans et equale lateri *.gz.*; quod cognoscitur si catheti *.bg.* et *.ez.* fuerint equales; et sic habebó notitiam lateris *.gz.*. Nam qualiter cognoscatur utrum catheti *.bg.* et *.ez.* sibi inuicem sint equales uel non, in subscripta figura demonstrabitur: uel poterit ad oculum | deprehendi, si puncta *.be.* fuerint in eodem plano: si autem aliquis eorum fuerit altior, erit linea *.be.* in puncto *.e.* ascendens, uel descendens. Esto *.e.* punctus altior puncto *.b.*; quare super latus *.eb.* mensurabo cum pertica et archipendulo ordine suprascripto; et sic habebó notitiam lateris *.zg.*: et si planum *.adzg.* fuerit orthogonium, multiplicabo *.ga.* in *.ad.*, et habebó aream quadrilateri *.az.*, quod erit area apparentis gibosę superficiei: et si planum *.az.* orthogonium non fuerit: studebo inuenire dyametrum *.gd.*, cuius notitiam habebó, si super arcum *.bd.* mensurabo cum pertica et archipendulo: deinde aream trigonorum *.gad.* et *.dzg.* in unum coniungam, et habebó quesitum.


Er si gibositas campi fuerit declinans ad utramque partem, ut arcus *.cfh.*, cuius altior pars sit punctus *.f.* Intelligam rursus latus plani *.ca.* orthogonaliter coniungi cum altitudine *.af.*: et si arcus *.fe.* equalis fuerit arcui *.fh.*, duplum lineę *.ca.* erit corda arcus *.cfh.*, scilicet longitudo lateris totius plani cadentis sub arcu *.cfh.*, dum tamen arcus *.cfh.* non sit maior semicirculo: quia si esset maior semicirculo, tunc dyameter circuli esset longitudo superficiei apparentis. Sed sit arcus *.fh.* minor arcu *.fc.*; et intelligam lineam *.hi.* coniungi orthogonaliter cum linea *.fi.*; et intelligam, lineam *.cak.* equidistantem esse lineę *.ih.*, et equalem *.ak.* lineę *.ih.*: quare si protrahatur *.hk.*, erit equalis et equidistans lineę *.ia.* et *.hk.*; quare angulus qui ad *.k.* est rectus; quare tota linea *.ck.* erit latus plani cadentis sub arcu *.cfh.*; et *.hk.* est altitudo, que est ab *.a.* in *.i.*: his itaque intellectis mensurabo cum pertica et archipendulo *.abf.* in *.c.*, et ab *.f.* in *.h.*, et habebó longitudinem lateris *.ck.*: uel aliter erigam arundinem super punctum *.c.* orthogonaliter, que sit *.cb.*; et aptabo cum ipsa aliam arundinem tantę magnitudinis, que cum fecerit in *.b.* punctum angulum rectum, aliud latus tangat arcum *.fc.*; que arundo sit linea *.bg.*. Inuestigabo igitur quam subtilius potero longitudes arundinum *.cb.* et *.bg.*, et coniungam quadrata earum: et coniuncto radicem inueniam, que erit longitudo cordę *.cg.*; quam diuida (sic) in duo equa super punctum *.d.*; et á puncto *.d.* intelligam, cathetum *.de.* eleuatum esse super eandem *.cg.*: quare *.e.* punctus diuidet arcum *.cg.* in duo media. Et quia ut in undecimo habetur libro, esse omnem triangulum in superficie una; si rectam *.de.* protraham á parte *.e.* per superficiem *.bcg.*, cadet super unum ex lateribus *.cb.* et *.bg.*, uel in angulum *.b.* contemptum ab ipsis. Quando *.cb.* et *.bg.* fuerint equales, tunc cadet

* *.agb.* et *.dze.* ... lateri *.gz.* * (fol. 66 verso, lin. 27-32; pag. 109, lin. 4-10).



fol. 67 recto.

* arcu *.fc.* ... his itaque * (fol. 67 recto, lin. 17-21; pag. 109, lin. 27-32).



fol. 67 verso.

super punctum $.b.$, et si una ipsarum fuerit maior, tunc cadet super maiorem ipsarum. Esto siquidem | maior $.cb.$ quam $.bg.$; et protrahatur in intellectu linea $.de.$ donec concurrat cum linea $.cb.$ in puncto $.l.$; erunt siquidem trigona $.cbg.$ et $.edl.$ orthogonia et similia, cum habeant angulum $.lcd.$ comunem: quare erit sicut $.bc.$ ad $.bg.$, ita $.cd.$ ad $.dl.$: quare multiplicabo $.bg.$ per $.cd.$, et diuidam per $.bc.$, et habebō notam $.dl.$ Item est sicut $.bc.$ ad $.cg.$, ita $.cd.$ ad $.el.$: quare multiplicabo $.cg.$ per $.cd.$, et diuidam per $.bc.$, et habebō quantitatem lineę $.cl.$; quam accipiam subtiliter, et ibo; et accipiam arundinem rectam, que cadat ab $.l.$ in $.e.$, cuius longitudinem tollam ex inuenta $.ld.$, et remanebit sagitta $.ed.$ nota: quare si multiplicauero $.cd.$ in $.dg.$, et diuidam per $.de.$; et quod prouenerit addam cum $.ed.$, habebō dyametrum circuli, cuius est arcus $.cfh.$: cumque per inuentum dyametrum cordam dupli arcus $.gf.$ inueneris per ea que in tabulis diximus; et ipsius cordę dimidium acceperis, habebis sane notitiam lineę $.gam.$: cui si addideris longitudinem arundinis $.bg.$, habebis notitiam totius lineę $.bm.$, hoc est lineę $.ce.$ Similiter si per eundem dyametrum inueneris cordam dupli arcus $.fh.$, dimidium eius erit linea $.hi.$, que est equalis lineę $.ak.$; et sic habebis notitiam totius rectę $.ck.$, scilicet longitudinem plani existentis sub gibosa superficie. Cumque latera planorum, super que apparentes superficies montium eleuantur, inuenire sciueris, poteris eorum embada per ipsa latera subtiliter inuenire: cum ipsa plana sunt ex tribus lateribus, uel ex m^o , uel ex pluribus: uel rotunda: uel ex aliqua parte circuli: uel quod etiam habeat formam obliquam deuiantiam a uera rotunditate. Cumque formam ipsius plani habueris per ea que in hac tertia distinctione dicta sunt, embadam ipsius inuenire poteris: quare huic distinctioni finem imponens, ad quartam distinctionem accedamus, in qua docebimus diuidere campos cuiuscumque sint formę.


*Explicit distinctio tertia, incipit quarta de diuisione camporum
inter consortes.*

QUARTAM siquidem distinctionem in partes quatuor diuidimus: in prima quarum triangulos: in secunda quadrilateros: in tertia multilateres: in quarta circulos, et eorum portiones diuidere docebimus.

Incipit pars prima de diuisione triangulorum.

CUM itaque triangulum aliquem in duas equas partes ab uno angulorum diuidere uis, ab ipso angulo super dimidium lateris subtendentis ipsi lineam protrahe; et habebis optatum. Verbi gratia: uolumus trigonum $.abg.$ a puncto $.a.$ in duo equa diuidere: diuidatur siquidem latus $.bg.$ in duo equa super punctum $.d.$; et copuletur recta $.ad.$; dico siquidem, trigonum $.abg.$ in duo equa trigona esse diuisum: sunt enim trigona $.abd.$ et $.adg.$ sibi inuicem | equalia, cum sint super equales bases, et sub eadem altitudine, que est ductio catheti ab $.a.$ in lineam $.bg.$: sunt enim trigona sibi inuicem sub eadem altitudine existentia, sicut bases in principio sexti libri habentur: quare est sicut $.bd.$ ad $.dg.$, ita trigonum $.abd.$ ad trigonum $.adg.$: est enim basis $.bd.$ equalis basi $.dg.$; quare trigona $.abd.$ et $.adg.$ sibi inuicem sunt equalia, ut prediximus; uel si protraxerimus cathetum ab $.a.$ super lineam $.bg.$, erunt utique cathetus ipse utriusque trigoni $.abd.$ et $.adg.$; cuius catheti dimidium si multiplicauerimus in basem $.bd.$ et $.dg.$, equabitur multiplicationi dimidij eiusdem catheti in basem $.bg.$ Nam ex multi-

in duo equa ... sibi inuicem
(fol. 67 verso, lin. 33-35, e margine inferiore; pag. 110, lin. 33-36).




fol. 68 recto.

plicatione dimidij catheti ipsius in bases *.bd.* et *.dg.*, proueniunt embada trigonorum *.abd.* et *.adg.* Quare probatur, trigonum *.abd.* equalem esse trigono *.adg.*

TRIGONA unum angulum uni angulo equalem habentia proportionem habent compositam ex lateribus angulos continentibus equales. Ad cuius rei euidenciam sint trigona *.abg.* et *.gez.* equales habentia angulos, qui ad *.g.* Dico quidem, trigona *.abg.* et *.gez.* proportionem habere compositam ex his proportionibus, que sunt laterum continentium angulos equales, ex ea uidelicet quam habet latus *.bg.* ad latus *.ge.*, et ex ea quam habet latus *.ag.* ad latus *.gz.*; quod sic probatur: recta *.ae.* copuletur; et eiciatur inter trigona *.abg.* et *.gez.* trigonus *.age.*; erit ergo proportio trigoni *.abg.* ad trigonum *.gez.* composita ex duabus proportionibus, scilicet ex ea quam habet trigonum *.abg.* ad trigonum *.age.*, et ex proportione *.age.* trigoni ad trigonum *.gez.* Sed proportio trigoni *.abg.* ad trigonum *.age.* est sicut basis *.bg.* ad basem *.ge.*, cum sint sub altitudine una; nec non et proportio trigoni *.eag.* ad trigonum *.egz.* est sicut latus *.ag.* ad latus *.gz.*; ergo proportio trigoni *.abg.* ad trigonum *.gez.* componitur ex proportionibus laterum *.bg.* ad *.ge.*, et *.ag.* ad *.gz.* continentium angulos equales; quod oportebat ostendere. Componitur etiam proportio trigoni *.abg.* ad trigonum *.gez.* ex proportionibus *.bg.* ad *.gz.*, et *.ag.* ad *.ge.*, cum latera *.ag.* et *.bg.* sint antecedentia, et latera *.ge.* et *.gz.* sint consequentia: et quia ut diximus in tractatu angulorum, proportionem compositam cadere ex facto antecedentium ad factum ex consequentibus, erit utique proportio trigoni *.abg.* ad trigonum *.gez.*, sicut factum ex *.bg.* in *.ag.* ad factum ex *.eg.* in *.gz.*: quare si equalis fuerit multiplicatio lateris *.eg.* in latus *.gz.* multiplicationi laterum *.bg.* in *.ga.*, equale erit trigonum *.egz.* trigono *.abg.*; et si minor minor, et si maior maior; et hoc uoluj demonstrare.


Et si á trigono recta protracta fuerit secans duo latera trigoni, que cum ipsis | duobus lateribus faciant trigonum habentem angulum unum comunem cum ipso trigono, erit proportio unius trigoni ad alium, sicut facta ex lateribus continentibus ipsum angulum. Ad cuius rei euidenciam. Esto trigonum *.abc.*; et in ipso protracta fuerit linea *.de.* secans latera *.ca.* et *.cb.* super puncta *.ed.* Dico, trigonum *.abc.* proportionem habere ad trigonum *.dec.*, sicut factum ex *.ac.* in *.cb.* ad factum ex *.dc.* in *.ce.*; quod sic probatur: super latus *.ac.* applicabo trigonum *.acf.* equale trigono *.dec.*; et quia trigona *.abc.* et *.afc.* sub una sunt altitudine, est sicut *.bc.* ad *.fc.*, ita trigonum *.abc.* ad trigonum *.afc.* Sed proportio *.ac.* ad *.fc.* est sicut factum ex *.ac.* in *.cb.* ad factum ex *.ac.* in *.cf.*; ergo proportio trigoni *.abc.* ad trigonum *.afc.* est sicut factum ex *.ac.* in *.bc.* ad factum ex *.ac.* in *.cf.* Et quia trigonum *.dec.* equale est trigono *.acf.*, est proportio trigoni *.acb.* ad trigonum *.dce.* sicut factum ex *.acb.* in *.acf.*: et quia trigona *.acf.* et *.dce.* sibi inuicem sunt equalia, et habent unum angulum comunem; quare circa ipsum angulum comunia patiuntur latera; hoc est quod sunt mutue proportionis, ut in quinto decimo theoremate sexti libri EVCLIDIS habetur: ergo est sicut *.ac.* ad *.dc.*, ita *.ce.* ad *.cf.*; quare factum ex *.dc.* in *.ce.* equatur facto ex *.ac.* in *.cf.*; ergo proportio trigoni *.abc.* ad trigonum *.dec.* est sicut factum ex *.ac.* in *.cb.* ad factum ex *.dc.* in *.ce.*; quod oportebat ostendere. Et si in aliquo laterum sit punctus datus, á quo lineam rectam protrahere uis diidentem triangulum in duo equa, ut in trigono *.bgd.*, in quo datus sit punctus *.a.* super latus *.gd.*; et sit primus

* ergo proportio ... trigoni *.abg.* * (fol. 68 recto, lin. 19-26; pag. 111, lin. 9-16).




fol. 68 verso.


* Sed proportio ... EVCLIDIS habetur * (fol. 68 verso, lin. 9-15; pag. 111, lin. 32-38).



* ex *.ac.* in *.cf.* ... una uel * (fol. 68 verso, lin. 17-23; pag. 111, lin. 40 — pag. 112, lin. 1-3).



in duo equa *abg.* diuisum
(fol. 68 verso, lin. 28-35; pag.
412, lin. 7-14).



fol. 69 recto.


punctus *a.* super dimidium *gd.*; copulabo siquidem *a.* cum *b.*, et erit trigonum *bgd.* in duo trigona equalia diuisum á linea *ba.*, que sunt *bga.* et *bad.* super equas bases, et sub altitudine una; uel quia factum ex *bd.* in *dg.* duplum est facti ex *bd.* in *da.*, duplus est triangulus *bgd.* triangulo *bad.*, cum habeant unum angulum comune. Sed non sit datus punctus super dimidium alicuius laterum, ut in hoc alio trigono *abg.*, in quo datus sit punctus *d.*, qui sit propius puncto *b.* Diuidam latus *bg.* in duo equa super *e.*, et copulabo rectas *ad.* et *ae.*; et per punctum *e.* protraham lineam *ez.* equidistantem linee *ad.*, et copulabo rectam *dz.* Dico quidem, trigonum *abg.* in duo equa diuisum esse á linea *dz.*; quod sic probatur: in equidistantes quidem *ad.* et *ez.*; et super basem *ad.* sunt trigona *ade.* et *adz.* sibi inuicem equalia: comuniter addatur ei trigonum *abd.*, erunt duo trigona *abd.* et *adz.*, hoc est quadrilaterum *abdz.* equalia duobus trigonis *abd.* et *ade.*, hoc est trigono *abe.* Sed trigonum *abe.* dimidium est trigoni *abg.*; quare et quadrilaterum *abdz.* dimidium est trigonj *abg.*; reliquum uero, scilicet trigonum *zdg.*, est alia medietas trigonj *abg.*: diuisum est ergo trigonum *abg.* á puncto *d.* per lineam *dz.* in duas partes equales, ut oportebat facere. Er si secundum numerum punctum *z.* inuenire desideras; scias quia que pars est *ed.* ex *dg.*, eadem est *az.* ex *ag.*, cum in trigono *adg.* protracta sit *ez.* equidistans lateri *ad.*: quare multiplicabis *ed.* per *ga.*; et quod prouenerit diuides per *gd.*; et quod exierit, erit *az.* Verbi gratia: sit latus *ab.* 13, et *bg.* 14., et *ga.* 15.; quare *ge.*, uel *eb.* est 7.: et sit *de.* duarum perticarum; quare *gd.* erunt 9.; si multiplicauerimus ergo *ed.* in *ga.*, scilicet 2. per 15., uenient 30; quibus diuisis per *gd.*, uenient $\frac{1}{3}$ 3 pro linea *az.*; quibus extractis ex *ag.*, remanent $\frac{2}{3}$ 11 pro linea *gz.*; quare si multiplicauerimus eam per *gd.*, qui est 9., uenient 105, scilicet dimidium multiplicationis *bg.* in *ga.*: quare probatur, trigonum *zgd.* dimidium esse trigoni *abg.*, cum utrique eorum comunis sit angulus qui ad *g.*: est enim proportio trigoni *abg.* ad trigonum *zdg.* composita ex duabus proportionibus laterum continentium angulum comunem: hoc est ex ea quam habet *bg.* ad *gd.*, et ex ea quam habet *ag.* ad *gz.*: quare est sicut factum ex antecedentibus *bg.* in *ga.* ad factum ex consequentibus *dg.* in *gz.*: ita trigonum *abg.* ad trigonum *zdg.* Sed factum ex *bg.* in *ga.* duplum est facti ex *dg.* in *gz.* Duplum est ergo trigonum *abg.* trigono *zdg.* Vnde si multiplicauerimus *ag.* per dimidium *gb.*, scilicet 15. per 7., et summam diuiserimus per *gd.*, scilicet per 9., uenient utique $\frac{2}{3}$ 11 pro linea *gz.*, ut superius inuenimus.

Preparatoria in diuidendis trigonis per datum punctum infra triangulum.

Si á duobus angulis trigoni super dimidium laterum subtendentium ipsos due recte protrahantur, se se proportionabiliter secabunt, ita quod quelibet portio, que est inter angulum et sectionem sui residui est dupla: et si á reliquo angulo super reliquum latus per punctum sectionis recta trahatur: diuidet utique ipsum latus in duo equa. In trigono quidem *abg.* ab angulis *abg.* et *bag.* super dimidium laterum *ag.* et *bg.* recte protrahantur *ae.* et *bz.* se inuicem secantes super punctum *d.* Dico quod proportio *ad.* ad *de.* est sicut proportio *bd.* ad *dz.*; et quelibet ipsarum sui residui est dupla; quod sic probatur: a puncto quidem *a.* equidistantem recte *bg.* ducam rectam *ai.*; et protraham rectam *bz.* donec concurrat cum *ai.* in puncto *i.*,

et erunt trigona *.azi.* et *.gzb.* sibi inuicem similia; quare est sicut recta *.az.* ad *.zg.*, ita *.iz.* ad *.zb.*, et *.ia.* ad *.bg.* equalis est enim *.az.* ex *.zg.*; equales ergo erunt *.zi.* ex *.zb.*, et *.ia.* ex *.bg.* Rursus quia similia sunt trigona *.adi.* et *.bde.*, est sicut *.ia.* ad *.be.*, ita *.ad.* ad *.de.*, et *.id.* ad *.db.* Sed *.ia.* recte equalis est recta *.bg.*; quare est sicut *.bg.* ad *.be.*, ita recta *.ad.* ad *.de.*, et *.id.* ad *.db.*: dupla est enim *.bg.* ex *.be.*; quare dupla est *.ad.* ex *.de.*, et *.id.* ex *.db.*: et quoniam equalis est *.iz.* ex *.zb.*, comuniter si adiungatur

est *.ad.* si adiungatur » (fol. 69 recto, lin. ultima, e margine inferiore; pag. 113, lin. 5-6).




recta *.zd.*, erit tota recta *.id.* equalis duabus *.bz.* et *.zd.* Sed *.id.* ostensa est dupla ex *.db.*; quare due recte *.bz.* et *.zd.* duple sunt recte *.bd.*: comuniter si auferatur recta *.db.*, remanebit recta *.bd.* equalis duplo recte *.dz.*; quare *.bd.* ex *.dz.* est dupla: ostensa est enim rectam *.ad.* duplam esse ex *.de.*; ergo est sicut *.ad.* ad *.de.*, ita *.bd.* ad *.dz.*; quod oportebat ostendere. Et si ab angulo *.g.* per punctum *.d.* transeat linea *.gt.* Dico quod latus *.ab.* diuisum est in duo equa super punctum *.t.*: protraham quidem rectam *.gt.* extra triangulum *.abg.*, donec concurrat super punctum *.k.* lineae *.ik.*, et erunt trigona *.adk.* et et (sic) *.edg.* sibi inuicem similia; quare est sicut *.ad.* ad *.de.*, ita *.ak.* ad *.ge.*: sed *.ad.* ex *.de.* est dupla; quare recta *.ak.* est dupla recte *.ge.*, cui etiam dupla est recta *.bg.*, cum equalis sit *.be.* ex *.eg.*: que uero eidem dupla sunt, et sibi inuicem sunt equalia; quare equalis est recta *.ak.* recte *.bg.* Rursus quia similia sunt trigona *.atk.* et *.btg.*, est sicut *.ak.* ad *.bg.*, ita *.at.* ad *.tb.*; est enim *.ak.* equalis recte *.bg.*, et *.at.* quidem equalis est recte *.tb.*: diuisum est ergo latus *.ab.* in duo equa a linea *.gt.*; quod oportebat ostendere.

fol. 69 verso.

Et quia in trigono *.abg.* ab angulis *.abg.* et *.agb.* due recte concurrunt super dimidium laterum subtendentium ipsos, que sunt recte *.bz.* et *.gt.* se inuicem secantes super punctum *.d.*, erit proportio sectionum ipsarum, una uidelicet est sicut *.bd.* ad *.dz.*, ita *.gd.* ad *.dt.* Dico Rursus quod si a reliquo angulo super dimidium lateris subtendentis ipsum recta trahatur, transibit per punctum sectionum reliquarum duarum linearum a reliquis angulis descendentiis super dimidium reliquarum basium. Verbi gratia: describatur rursus trigonum *.abg.*; et super dimidium basium ipsius signentur puncta *.t.ez.*; et copulentur recte *.ae.* et *.bz.* sese inuicem secantes super punctum *.d.* Dico siquidem si a puncto *.g.* in punctum *.t.* recta trahatur, per punctum *.d.* transibit: quod si ita non est, transibit recta ex *.g.* in *.t.* super lineam *.bz.* inter puncta *.bd.*, uel inter puncta *.dz.*: transeat primum super rectam *.bd.* per punctum *.f.*; et quoniam due recte *.bz.* et *.gt.* ab angulis *.abg.* et *.bga.* descendunt super dimidium laterum *.ab.* et *.ag.* sese inuicem secantes super punctum *.f.*, erit *.bf.* dupla ex *.fz.*: sed *.ad.* ex *.dz.* est dupla; ergo est sicut *.bf.* ad *.fz.*, ita *.bd.* ad *.dz.*: permutatim ergo est sicut *.bf.* minor ad *.bd.* maiorem, ita *.bd.* maior ad *.dz.* minorem; quod est inconuen-


Et quia in trigono angulis descendentiis » (fol. 69 verso, lin. 16-21; pag. 113, lin. 21-26).



fol. 70 recto.

niens; non enim recta protracta ex .g. in .t. transiet per .bz. inter puncta .bd. Similiter ostendetur, ipsam transire non posse inter puncta .dz.; per punctum enim .d. transiet ut dictum est. Ex hoc ergo manifestum est, quod infra trigona non est punctus preter unum, per quem ab angulis transeant recte diidentes latera trigonj in duo equa. Quare si per punctum ipsum rectam transire uolumus, que diuidat triangulum in duas equas partes, erit utique unaqueque ex descendantibus rectis ab angulis super dimidium laterum ipsius, per quam trianguli in equas portiones diidentur. Verbi gratia: in trigono suprascripto .abg. datus sit punctus .d., per quem transeant protracte ab angulis recte .ae. et .bz. et .gt. diidentes latera ipsius trigonj in portiones equales; quelibet enim ipsarum diuidit trigonum .abg. in duo equa: sunt enim trigona .aeb. et .aeg. super equas bases, que sunt .be. et .eg., et sub una altitudine, que est ex .a. in .bg. perpendicularis ducta; quare equale est trigonum .aeb. trigono .aeg., propter eadem et trigona .bzd. et .bza. sibi inuicem sunt equalia; nec non et trigona .gat. et .gtb. sibi inuicem equantur. Sectum est ergo trigonum .abg. in duas medietates ab una quaque linearum .ae. et .bz. et .gt. transeunte per datum punctum .d. Similiter si datus punctus cadat super lineam .ae. inter .ad. uel .de., diuidetur etiam in duo equa trigonum .abg. á linea .ae. transeunte per punctum datum infra triangulum: quod idem intellige si punctus datus fuerit in protractu alicuius duarum linearum .bz. et .gt. Et si punctus datus non ceciderit in lineis descendantibus ab angulis super dimidium laterum ipsius: tunc si ab angulis transire fecerimus rectas per ipsum punctum uenientes usque ad latera trigonj, erunt sectiones unius cuiusque lateris sibi inuicem inequales; ex quibus due sectiones maiores medietate ipsorum laterum erunt circa unum ex angulis trigonj, et due minores circa alium, et una maior, et altera maior reliquum angulum continebunt. Verbi gratia: in trigono quidem .dez. protrahantur recte .da. eb. zg. diidentes latera ipsius per equalia in punctis .a.b.g., et sese inuicem secantes super punctum .i. Et sit punctus datus aliquis infra triangulum .dez., qui non sit in lineis .da. eb. zg., quem oportebit esse infra unum ex sex trigonis continentibus totum triangulum .dez.: que trigona sunt .dib. et .dig. et .die. et .aie. et .aiz. et .zib.: sit primum datus punctus .f. infra triangulum .dib.; cumque duxerimus lineam ex .d. in .f.; et fecerimus eam penetrare super latus .ez., nimirum inter puncta .az. ueniet; et hoc fiet, quia punctus .f. est infra triangulum .daz.: ueniet ergo super punctum .k.; quare .zk. est minus medietate sui lateris .ez. et .ek. est plus. Item ab angulo .z. per punctum .f. rectam fecerimus penetrare cadet utique inter .dg. super rectam .de. cum punctus .f. sit infra triangulum .gzd.; quare ponamus ipsam cadere super punctum .c., erit ergo .ec. plus medietate lateris .de. et .cd. minus. Ergo circa angulum .e. sunt due sectiones maiores, que sunt .ke. et .ec. Rursus si ab angulo .dez. protraxerimus per .f. punctum, rectam cadentem super latus .zd., nimirum inter .db. cadet, cum punctus .f. sit infra triangulum .deb.: cadat ergo recta ducta ab .e. per .f. super punctum .h.; quare .zh. erit plus, et .hd. erit minus medietate lateris .zd.: quare et circa angulum .edz. sunt due sectiones minores medietate laterum, que sunt .cd. et .dh.; et angulus quidem .dze. remanet contentus ab inequalibus sectionibus, scilicet ab una maiore, et ab altera minori medietate suorum laterum; quarum maior est sectio .hz., minor est sectio .zk. Similiter si datus

ueniet; et hoc ... ergo .ec. plus > (fol. 70 recto, lin. 31-35, e margine inferiore; pag. 114, lin. 31-39).




fol. 70 verso.

punctus *f.* fuerit infra quodlibet ex quinque trigonis residuis, inuenies hec eadem euenire.

Et si fuerit punctus aliquis datus infra trigonum, qui non sit in lineis descendentibus ab angulis super dimidium laterum ipsius; et uolueris ipsum diuidere in duo equa cum linea transeunte per ipsum punctum; studebis per ea que dicta sunt inuenire angulum contentum ab inequalibus sectionibus; quia circa ipsum que sequentur operanda erunt. Verbi gratia: Esto trigonum *abg.*, in quo datus sit punctus *d.*, qui non sit in aliqua rectarum descendentium ab angulis super dimidias bases ipsius; et uolumus diuidere triangulum *abg.* in duas medietates cum linea transeunte per punctum *d.* Deprehendantur primum ad oculum super latera casus linearum descendentium ab angulis per punctum *d.*, ut habeatur notitia anguli contenti ab inequalibus sectionibus, qui sit angulus, qui ad *g.*, et uni laterum continentium ipsum super reliquum latus á puncto *d.* equidistans trahatur, que sit recta *de.*; et applicetur ei superficies equalis medietati superficiem *bg.* in *ag.*, que sit superficies *de.* in *gz.* hoc est dimidium multiplicationis *bg.* in *ag.*, diuidatur per *de.*, et proueniet *gz.* Deinde linee *gz.* applicabis paralilogramum deficiens figura tetragona, quod sit equale superficiem *ge.* in *gz.*; et hoc est quod diuidatur *gz.* in duas partes, quarum una multiplicata per aliam faciat equale multiplicationi *ge.* in *gz.*: quod aliter fieri non poterit nisi quadratum medietatis linee *gz.* superhabundet superficiem *ge.* in *gz.*; uel sit equale eius: fiat siquidem *zi.* in *ig.* sicut *ge.* in *gz.*; et copuletur recta *id.*, et emictatur in punctum *t.* Dico quidem trigonum *abg.* in duo equa diuisum esse á linea *it.* transeunte per punctum *d.*; quod sic probatur: quoniam multiplicatio *zg.* in *eg.* equalis est multiplicationi *zi.* in *ig.*, erunt sicut *zg.* ad *zi.*, ita *ig.* ad *eg.*; quare erit sicut *zg.* ad aliam partem sui, scilicet ad *ig.*, ita *ig.* erit ad aliam partem sui, scilicet ad *ie.*: sed sicut *gi.* ad *ie.*, ita *gt.* ad *de.*; ergo est sicut *zg.* ad *ig.*, ita *gt.* ad *de.*: quare multiplicatio *ig.* in *gt.* equalis est multiplicationi *zg.* in *de.*; sed multiplicatio *zg.* in *de.* est medietas multiplicationis *ag.* in *gb.*; ergo et *ig.* in *gt.* est medietas multiplicationis *ag.* in *bg.*; quare trigonum *itg.* dimidium est trigoni *abg.*, ut prediximus. Et ut hec cum numeris ostendamus: sit latus *ab.* 13., et *ag.* 15., et *bg.* 14; et protrahatur in ipso cathetus *ac.*, que erit 12. Casus *bc.* erit 5., et *cg.* erit 9; et sit punctus *d.* inter cathetum *ac.*, et latus *ag.*; et sit elongatus á linea *cg.* secundum quantitatem catheti *dk.*, que sit 3.; et protrahatur linea *ed.* in puncto *l.*; et sit *dl.* octaua et sexta decima pars unius: et quia linea *dl.* equidistans est linee *ck.*, et *dk.* recte *lc.*, erit *lc.* equalis *dk.* et *dl.* recte *kc.*; ergo *lc.* est 3., et *kc.* est $\frac{5}{16}$; remanebunt pro *al.* nouem: et quia in trigono *acg.* protracta est linea *le.* equidistans linee *cg.*, erunt sicut *al.* ad *ac.*, ita *le.* ad *cg.*; quare *le.* erunt $\frac{9}{4}$ 6; de quibus si auferatur *ld.*, scilicet $\frac{8}{16}$, remanebunt $\frac{9}{16}$ 6: in quem numerum si diuiserimus factum ex *ag.* in dimidium *bg.*, scilicet 105., uenient 16 pro linea *gz.* Item quia est sicut *al.* ad *ac.*, ita *ae.* ad *ag.*; erit ergo *ae.* $\frac{4}{1}$ 11, remanebunt pro *eg.* $\frac{5}{4}$ 3, scilicet quarta pars linee *ga.*: in quibus si multiplicauerimus lineam *gz.*, uenient 60: diuidenda est ergo linea *gz.*, scilicet 16. in duas partes; quarum una multiplicata per aliam faciet 60. Et ut hoc fiat, extrahe 60. ex quadrato medietatis linee *gz.*, remanebunt 4; quorum radix, scilicet 2, addenda est super medietatem linee

* contenti ab sicut *ge.* in *gz.* (fol. 70 verso, lin. 19 e 20-28; pag. 115, lin. 11-20).




fol. 71 recto.

.gz.; et sic habebuntur .10. pro linea .gi., remanebunt pro linea .iz. 6.: deinde si per .gi. diuiderimus .105., uenient predicta $\frac{1}{2}$ 10 pro linea .gt. Demonstrabo aliter lineam .gt. esse $\frac{1}{2}$ 10: protraham á puncto .i. cathetum .imn. super lineam .gb.; et erit linea .in. equidistans linee .ac.; quare erit sicut .gi. ad .ga., hoc est sicut 10. ad .15., ita .in. ad .ac.; quare .in. erit .8.; et quia paralilogramum est .mk. quadrilaterum, erit linea .mn. equalis linee .dk.; quare .mn. est .3., remanet .im. 5.

Rursus quia recta .in. equidistans est recte .ac., erit sicut .gi. ad .ga., ita .gn. ad .gc.; quare .gn. est .6.; remanent ergo .3. pro linea .nc.; cui cum sit equalis recta .ml. erunt et recta .ml. similiter .3.; de qua si extrahatur .dl., scilicet $\frac{3}{16}$, remanebunt pro linea .md. $\frac{15}{16}$ 2: et quia trigona .imd. et .dkt. orthogonia sunt, et sibi inuicem similia, erit sicut .im. ad .md., hoc est sicut .5. ad $\frac{15}{16}$ 2, ita .dk., scilicet .3., ad lineam .kt.: quare si multiplicauerimus $\frac{15}{16}$ 2 per 3., et quod prouenerit diuiderimus per .5., ueniet $\frac{11}{16}$ 1 pro linea .kt.; de qua si extraxerimus .kc., scilicet $\frac{3}{16}$, remanebit $\frac{1}{2}$ 1 pro linea .ct.; cui si addiderimus lineam .cg., que est .9., habebunt utique $\frac{1}{2}$ 10 pro linea .gt., ut prediximus. Ostendam rursus per numerum, si in eodem trigono protraxerimus lineas .ao. et .bp. transeutes per .d. punctum, portionem .gp. minorem esse medietate sui lateris, et .go. maiorem. Quoniam trigono .aog. protracta est recta .de. equidistans recte .og., erit sicut .ae. ad .ag., ita .de. ad .og.; ergo est sicut .3. ad .4., ita .de., scilicet $\frac{9}{16}$ 6. ad .og.; quare si multiplicauerimus .4. per $\frac{9}{16}$ 6., et summam diuiderimus per .3., uenient $\frac{5}{4}$ 8 pro linea .go. Rursus quia in trigono .pbg. protracta est recta .de. equidistans recte .bg., erit sicut .bg. ad .de., ita .gp. ad .pe.: unde erunt sicut superhabundantia .bg. super .de., ita .ge. ad .ep.; ergo est sicut $\frac{7}{16}$ 7 ad $\frac{9}{16}$ 6, hoc est sicut .119. est ad .105., uel sicut .17. ad .15., ita .ge., scilicet $\frac{3}{4}$ 3 ad .ep.; quare si multiplicauerimus .15 per $\frac{3}{4}$ 3; et diuiderimus per .17., uenient $\frac{11}{16}$ 3 pro linea .ep.; quare tota .gp. erunt minus $\frac{1}{2}$ 7., que sunt medietas totius linee .ga. Et notandum, quod semper per subtendentem angulum contentum ab inequalibus sectionibus potest transire linea diuidens triangulum in duo equa; et aliquando poterit linea transiens per datum punctum subtendenti angulo contento á maioribus sectionibus, que etiam diuidet triangulum in duo equa; et nunquam transibit recta per datum punctum, qui diuidat triangulum in duas equas partes, que subtendat angulum contentum á minoribus sectionibus.

fol. 71 verso.

ad .ep.; quare ... minoribus sectionibus. » (fol. 71 verso, lin. 7-14; pag. 116, lin. 23-31).




Diuisum est ergo trigonum .abg. in duas equas partes á linea .it. transeunte per punctum datum .t., et est una ipsarum portionum quadrilaterum .abti.; et alia est trigonum .itg.; quod oportebat facere.

Demonstratio quomodo diuiditur trigonum in duo equa per lineam egredientem á puncto dato extra ipsum.

Si trigonum .abg. per lineam egredientem á puncto dato .d. extra ipsum in duas equas partes diuidere uis, lineam .ad. secans latus .bg. super .e. protrahe; siquidem si recta .be. equalis est recte .eg., factum utique erit propositum; quia .abe. et .aeg. super equas bases sunt, et sub eadem altitudine; unde trigonum .abe. trigono .aeg. iacet equale. Sed non sit .be. equalis recte .eg., erit utique una earum maior; sitque recta .be. maior; á puncto quidem .d. recta protrahatur .zd. equidistans recte .be.; et


perducatur recta .ab. in .z.. Et quia recta .be. maior est medietate lateris .bg., rectian-
 gula superficies .ab. in .be. est plus medietate rectiangularis superficies .ab. in .bg.;
 multo plus superficies .ab. in .zd. est plus medietate superficies .ab. in .bg., cum maior
 sit .zd. quam .be. Adiaceat siquidem superficies .ib. in .zd. equalis dimidio superficies,
 que fit ex .ab. in .bg.; et quoniam maior est superficies .ab. in .be. superficies .ib. in
 .zd.; erit proportio .zd. ad .be. minor proportione .ba. ad .bi. Sed proportio .zd. ad
 .be. equalis est proportioni .za. ad .ab. Disiunctim quidem erit proportio .zb. ad .ba.
 minor proportione .ai. ad .ib.; quare superficies .zb. in .bi. minor est superficies .ba.
 in .ai. : adiungatur quidem recte .bi. parallogramum superhabundans figura tetragona
 equale superficies .zb. in .bi.; hoc est quod recte .bi. adiungatur quedam linea, que
 multiplicata in se et in .bi. faciat equale multiplicationi .zb. in .bi.; quod paralilo-
 gramum sit superficies, que sit .ti.; et copuletur recta .tkd.; et quia superficies .zb.
 in .bi. equa est superficies .bt. in .ti., proportionaliter erit ut .zb. ad .bt., ita .ti. ad
 .ib.; coniunctim ergo sicut .zt. ad .bt., ita .bt. ad .bi. Sed sicut .zt. ad .bt., ita .zd.
 ad .bk.; ergo sicut .zd. ad .bk., ita .bt. ad .bi.; quare superficies .kb. in .bt. equa est
 superficies .zd. in .bi. Sed superficies .zd. in .bi. equalis est dimidio superficies .ab. in
 .bg.; quare trigonum .tbk. dimidium est trigonj .abg. Diuisum est ergo trigonum .abg.
 á linea egrediente á puncto .d., que est recta .dkt. in duas medietates, quarum una
 est trigonum .tbk., et alia est quadrilaterum .tkga.; quod oportebat facere. Que etiam
 operabor cum numeris. Sit latus .ab. 13., et .ag. 15., et .bg. 14., et .dz. $\frac{2}{5}$ 10, et .bz.
 $\frac{3}{7}$ 4.; et diuidam dimidium superficies .ab. in .bg., scilicet 91. per .zd., hoc est per $\frac{2}{5}$ 10.;
 et uenient $\frac{3}{4}$ 8 pro linea .bi.: et multiplicabo .zb. in .bi., scilicet $\frac{5}{7}$ 1., per $\frac{3}{4}$ 8., uenient
 $\frac{4}{5}$ 12; quibus superaddam quadratum dimidij linee .bi., scilicet multiplicationem de
 $\frac{3}{8}$ 4 in se; que multiplicatio est $\frac{44}{88}$ 19, erunt $\frac{44}{88}$ 31.; quorum radix, que est $\frac{5}{8}$ 5, est linea
 .ti.; cui si addatur .ib., que est $\frac{3}{8}$ 4, habebuntur .10. pro linea .tb.; et quia est sicut
 .zt. ad .bt., ita .zd. ad .bk.; multiplicabo .zd. in .bt., scilicet $\frac{2}{5}$ 10, per 10., erunt .104.;
 que diuidam per $\frac{3}{7}$ 11., hoc est per lineam .zt., et uenient $\frac{1}{10}$ 9 pro linea .bk.; uel 91,
 que sunt medietas superficies .ab. in .bg.; diuidam per .bt., hoc est per .10., exhibunt
 similiter $\frac{1}{10}$ 9 pro linea .bk.; et sic erit trigonum .btk. dimidium trigoni .abg., ut
 oportet. Et si unum ex lateribus trigoni extra trigonum protractum fuerit; et in ipso
 protractu punctus ille ceciderit, á quo recta egredi oporteat, que diuidat triangulum
 in duo equa; ut si in trigono .abg. extra trigonum educatur latus .ab. super punctum
 .z.; et sit .z. punctus datus á quo recta egredi oporteat diuidens triangulum .abg. in
 duo equa, eodem supradicto modo á puncto .z. producam rectam .ze. equidistantem
 recte .bg.; et educam latus .ag. in punctum .e.; et ponam superficiem .ze. in .gi. equa-
 lem dimidio superficies .ag. in .gb.; et applicabo recte .gi. parallogramum, cui su-
 perhabundet tetragonum equale eius, quod sit ex .eg. in .gi.; sitque .gt. in .ti.; et
 copulabo .tlz. Dico diuisum esse trigonum .abg. in duo equa á linea .tz. egrediente á
 puncto .z., et est una ipsarum partium trigonum .tgl., et alia est quadrilaterum
 .tabl. Quod sic probatur: Quoniam superficies .gt. in .ti. equa est superficies .eg. in
 .gi., est sicut .eg. ad .gt., ita .ti. ad .ig.; coniunctim ergo sicut tota .et. ad .tg., ita
 tota .tg. ad .ig. Sed sicut .et. ad .tg., ita .ez. ad .gl.; per equale ergo erit sicut .ze.
 ad .lg., ita recta .gt. | ad rectam .ig.; quare superficies .lg. in .gt. equa est superficies

* superficies .ab. . . . linea que . . .
 (fol. 71 verso, lin. 27-35; pag. 117,
 lin. 2-10).



fol. 72 recto.

* .ig., coniunctam . . . ita recta .gt. . . .
 (fol. 72 recto, lin. 34 e 35, e
 margine inferiore; pag. 117, lin.
 41-43).




fol. 72 verso.

.ze. in .ig. Sed superficies .ze. in .ig. est medietas superficiei .ag. in .bg.; quare et superficies .tg. in .lg. est medietas superficiei .ag. in .bg.; duplum ergo est superficies .ag. in .gb. superficiei .tg. in .gl. Duplum ergo est trigonum .abg. trigono .tgl.; quare trigonum .tgl. est medietas trigonij .abg., ut oportet. Que etiam demonstrantur in numeris.

Sit rursus latus .ab. 13., et latus .ag. 13.; basis quoque .bg. 14.; et sit .bz. quarta pars ex .ab.; quare et .eg. erit $\frac{2}{3}$ 3., scilicet quarta ex .ag.; quare .ze. addit quartam partem super .bg.; et sic erit .ze. perticarum $\frac{1}{3}$ 17.: in quibus si diuiserimus dimidium facti ex .ab. in .bg., scilicet .105., uenient. 6. pro linea .gi.; cui si applicauerimus superficiem .gt. in .ti. equalem eius que sit ex .eg. in .gi., erit utique superficies .gt. in .ti. $\frac{1}{3}$ 22: et ut habeamus notitiam quantitatis lineę .ti., diuidam .ig. super punctum .h. in duo equa, et erit .ih. 3.: et quia linea .ig. diuisa est in duo equa super punctum .h.; et ei indirecto adiuncta est linea .it., erit multiplicatio .it. in .gt. cum quadrato lineę .ih., quod est .9., equalis quadrato lineę .th.; quare .th. est radix de $\frac{1}{3}$ 31; cui si addatur .hg., que est .3., erit tota .tg. radix de $\frac{1}{3}$ 31 et 3.; quare binomium est .tg.: et quia, ut demonstratum est, equale est factum ex .lg. in .gt. ei quod est ex .ze. in .ig., quod est .105., diuidenda sunt .105. per lineam .gt., scilicet per binomium, cuius nomina sunt radix de $\frac{1}{3}$ 31 et 3. Quam diuisionem, qualiter fiat, indicabo; quia binomium est linea .tg., erit utique recisum ipsius binomij linea .ti., que est radix de $\frac{1}{3}$ 31, minus .3.; cum .hi., que est .3.; auferatur ex .th., que est radix de $\frac{1}{3}$ 31.; et quia ex .tg. binomio in .ti. reciso prouenit ratiocinatum, scilicet $\frac{1}{3}$ 22; si diuiserimus $\frac{1}{3}$ 22 per binomium .gt., ueniet utique recisum .ti.; ergo quotiens $\frac{1}{3}$ 22 sunt in .105., totiens equale .ti. recisi ueniet ex diuisione de .105. in .tg. binomio; unde diuidenda sunt .105. per $\frac{1}{3}$ 22., hoc est 210 per 45., uenient $\frac{2}{3}$ 4.; in quibus si multiplicauerimus recisum .ti., habebimus quantitatem lineę .gl.; que multiplicatio sic fit; ex multiplicatione quidem de $\frac{2}{3}$ 4 in lineam .ti., scilicet in radicem de $\frac{1}{3}$ 31., uenient quatuor radices, et due tertie de $\frac{1}{3}$ 31, que sunt una radix de 686., que prouenit ex multiplicatione quadrati de $\frac{2}{3}$ 4. in $\frac{1}{3}$ 31.; de qua radice tollenda est multiplicatio de $\frac{2}{3}$ 4. in lineam .ih., que est .14.; et sic habebitur pro linea .gl. radix de 686., minus .14., que secundum propinquitatem sunt parum minus de $\frac{1}{3}$ 12, nec non et binomium .gt. secundum propinquitatem est $\frac{11}{3}$ 8: quibus multiplicatis per $\frac{1}{3}$ 12, scilicet .tg. in .gl., uenient circa .105, ut oportet. Et sic est procedendum, cum uolumus diuidere aliquem numerum inratiocinatum per aliquod binomium. Et notandum, quod si .105. oporteret diuidere per recisum .it., eadem uia esset tenenda; et egrederetur ex ipsa diuisione binomium, cuius nomina | essent radix de 686, et 14; et sic studeas operari in similibus. Sed protrahantur duo latera trigoni extra trigonum continentia unum ex angulis trigoni; et punctus datus cadat infra lineas continentis angulum exteriorem, qui est equalis angulo interiori; et uolumus ab ipso puncto rectam protrahere diuidentem triangulum in duo equa. Vt si trigoni .abg. duo latera .ab. et .bg. producantur in punctis .de.; et infra angulum .ebd. datus sit punctus .i. á quo egrediatur recta diuidens triangulum .abg. in duo equa, copulabo primum .ib., et ducam lineam .ib. in punto .z. cadens super lineam .ag. Si ergo .az. equalis est .zg., diuisum est trigonum .abg. in duo equa, á linea .iz. Sed si inequales sunt, erit maior una earum, que sit .az.; educam siquidem .za. extra trigonum .abg. super punctum .t.; et a puncto .i. ducam lineam .it. equidistantem lineę

fol. 73 recto.

protrahantur duo si inequales s (fol. 73 recto, lin. 1, 2-9 e 10; pag. 118; lin. 34-42).




ba.; et quia maior est *za.* medietate lateris *ag.*, erit maior superficies *ab.* in *az.* medietate superficiei *ba.* in *ag.* Vnde adiaceat *lt.* in *ak.* equalis medietati superficiei *ba.* in *ag.*; et accipiatur superficies *al.* in *kl.* equalis superficiei *ta.* in *ak.*, et copuletur recta *li.*; et ostendetur per ea, que supra dicta sunt, trigonum *abg.* diuisum esse in duo equa á linea *il.*; et una sectio earum trigonum est *lac.*, et alia est quadrilaterum *lcbg.*

Et si per equidistantem uni laterum trigoni trigonum aliquod diuidere uis, qualiter hoc fieri debeat in sequenti trigono *abg.* demonstrabitur, quod in duas equales partes per equidistantem basi *bg.* diuidi oporteat. Latus quidem *ba.* emictatur extra trigonum in puncto *d.*; et sit *ad.* equalis medietati lateris *ba.*; et linearum quidem *ba.* et *ad.* summatur media proportionalis *ae.*, hoc est quod sit sicut *ba.* ad *ea.*, ita *ea.* ad *ad.*; et per punctum *e.* basi *bg.* equidistans ducatur recta *ez.* Dico si quidem, trigonum *abg.* diuisum esse in duas equas partes á linea *ez.*, quarum una est trigonum *aez.*, alterum est quadrilaterum *ebgz.*; quod sic probatur: trigona *aez.* et *abg.* sibi inuicem sunt similia, cum anguli *aez.* et *aze.* duobus angulis *abg.* et *agb.* sint equales, exteriores uidelicet interioribus; et angulus *bag.* est comunis utrique. Similia uero trigona ad se inuicem in dupla proportione sunt homologorum laterum, id est similibus; quare est sicut *ba.* ad *ad.*, ita trigonum *abg.* ad trigonum *aez.*: est enim *ba.* ex *ad.* dupla; quare trigonum *abg.* trigoni *aez.* est duplum: ergo medietas trigoni *abg.* est trigonum *aez.*, vel aliter; quoniam quando tres recte sunt proportionales in proportione continua, est sicut prima ad tertiam, ita spatium, quod á prima ei, quod est a secunda simile, et similiter descriptum. Vnde, ut dictum est, sicut *ba.* prima est ad *ad.* tertiam, ita quod ab *ab.* ei quod ab *ae.* duplum, id est quod ab *ab.* ei quod ab *ae.*; duplum ergo est trigonum *abg.* trigono *aez.*, ut | predixi. Aliter quia est sicut *ba.* ad *ae.*, ita *ae.* ad *ad.*, erit factum ex *ba.* in *ad.* equale ei quod á recta *ae.* tetragonum: quare tetragonum recte *ab.* duplum est tetragono, quod á recta *ae.*; et quia equidistans est *bg.* ex *ez.*, proportionaliter est sicut *ba.* ad *ae.*, ita *ga.* ad *az.*; quare est sicut tetragonum, quod á recta *ba.* ad tetragonum, quod a recta *ae.*, ita tetragonum, quod á recta *ga.* ei quod á recta *az.*; duplum est tetragonum recte *ba.* tetragono recte *ae.* Quare duplum erit tetragonum recte *ga.* eius quod est á recta *az.*; quare factum ex *ba.* in *ag.* duplum est factum ex *ea.* in *az.*; quare trigonum *abg.* duplum est trigono *aez.* Quod si secundum numerum facere uis, sit latus *ab.* 10.; latus quoque *ag.* 12.; latus uero *bg.* 14.: multiplicabo quidem *ab.* in dimidium sui, scilicet 10., per 5., erunt 50., quorum radix est *ae.*: et ducam rursus *ga.* in dimidium sui, et habebuntur 72; quorum radix est linea *az.*: et protraham lineam *ez.*, et erit trigonum *aez.* medietas trigoni *abg.*, cum sint circa unum angulum; et fiat multiplicatio *ea.* in *az.* medietas ex *ba.* in *ag.*: multiplicatio quidem ex *ea.* in *az.*, scilicet ex radice de 50., in radicem de 72., facit radicem de 3600., scilicet 60., que sunt dimidium ex *ba.* in *ag.*, scilicet de 120.: et si uis habere notitiam recte *ez.*, multiplicabis *bg.* in dimidium sui, et uenient 98. pro quadrato linee *ez.*; et sic studeas facere in similibus.

Incipit de diuisione trigonorum in tres partes.


SI TRIGONVM *abg.* in tres equas partes diuidere uis super unum ex lateribus suis,

vel aliter trigono *aez.*, ut s (fol. 73 recto, lin. 32-35, e margine inferiore; pag. 119, lin. 20-24).




fol. 73 verso.


ba. in *ad.* quod est á rec-| ta s (fol. 73 verso, lin. 2-7 e 8; pag. 119, lin. 25-31).



Si TRIGONVM ... si uero .gz. non ...
 (fol. 73 verso, lin. 20-27; pag. 119,
 lin. 43 — pag. 120, lin. 6).




pars totius trigoni ... equale trigono ...
 (fol. 73 verso, lin. 33-35, e margine
 inferiore; pag. 120, lin. 11-14).




fol. 74 recto.

seccionem .bd.izg. quod sic ...
 (fol. 74 recto, lin. 4 e 5-11; pag. 120,
 lin. 17-24).



oportebat interdupla ex .cd. ...
 (fol. 74 recto, lin. 19-25; pag. 120,
 lin. 30-36).




ut dicamus super latus .bg., ipsum .bg. in tres partes equas diuide, que sunt .bd. de. .eg.; et copulentur recte .ad. et .ae. Dico quidem trigonum .abg. diuisum esse in tres partes equales, que sunt trigona .abd. et .ade. et .aeg.: sunt enim super equas bases, et sub altitudine una; quare sibi inuicem equalia esse necesse est. Et si super datum punctum .z. ex trigono .bgd. tertiam partem uolueris, copulabo .bz.; et si .gz. fuerit tertia pars ex .gd., utique trigonum .bgz. erit tertia pars trigonij .bgd.; si uero .gz. non fuerit tertia pars ex .gd., erit tunc plus uel minus. Esto primum minus; quare accipiam ex .gd. tertiam partem, que sit .ga.; et copulabo rectam .ai. equidistans .zb.; et copulabo, rectam .iz., que auferit a trigono .bgd. quadrilaterum .ibgz.; quod demonstrabo tertiam esse ex toto trigono .bgd.; uerbi gratia: quia recta .ga. est tertia pars totius .gd., erit trigonum .bga. tertia pars totius trigoni .bgd. Et quia trigona .bza. et .bzi. sunt inter equidistantes .bz. et .ai.; et super eandem basim .bz. equalia sibi inuicem sunt, comuniter addatur trigonum .bgz., erit quadrilaterum .ibgz. equale trigono | .bga., tertia ergo pars est quadrilaterum .ibgz. trigoni .bgd.: residuum uero, scilicet trigonum .izb., diuidetur in duas partes equales per qualem uolueris ex modis supradictis. Rvrsvs adiaceat trigonum .abg. in tres equas partes diuisum, que sint trigona .abd. et .ade. et .aeg.; quare sectiones .bd. de. eg. sibi inuicem sunt equales; in superiori quidem figura posuimus punctum .z. inter .bd.; quod idem esset si posuissemus ipsum inter .eg., cum eodem modo esset operandum. Nunc uero ponamus punctum .z. inter .de. super latus .bg.; a quo uolumus lineam producere abscidentem tertiam partem trianguli .abg.: primum quidem copuletur .az.; et per punctum .d., uel per punctum .e. equidistans trahatur lineę .az., que sit linea .ei.; et copuletur .zi. Dico quidem, quod recta .zi. abscidit a trigono .abg. tertiam partem, que est trigonum .izg.; quod sic probatur: quia trigona .azi. et .aze. inter duas equidistantes sunt; et super eandem basim sibi inuicem sunt equalia; comuniter si addatur trigonum .ade., erit trapezion .adzi. equale triangulo .ade. Sed triangulus .ade. est tertia pars trigoni .abg.; quare et quadrilaterum .adzi. est similiter tertia pars trigonij .abg.; est et trigonum .abd. alia tertia pars trigonij .abg.; remanet pro reliqua tertia parte trigonum .izg., quod abscisum est a trigono .abg. per rectam .iz.; quod oportebat facere. ADIACEAT iterum trigonum .abg., quod oporteat inter tres consortes diuidere; quorum unus quisque uelit in sua portione habere unum ex lateribus triangulij .abg. Latus quidem .bg. diuidam in duo equa super punctum .d.; et copulabo rectam .ad., et componam .de. tertiam partem lineę .ad.; et copulabo rectas .bc. et .cg. Dico quidem, trigonum .abg. diuisum esse in tres equas partes, quarum unaquęque est super unum ex lateribus trianguli .abg.; que partes sunt trigona .abc. et .acg. et .bcg.; quod sic probatur: quia recta .dc. est tertia pars rectę .da. Erit .ac. dupla ex .cd.; quare trigonum .abc. est duplum trigoni .bcd.; propter eadem ergo et trigonum .acg. duplum est trigonij .gcd. Rursus quia equalis est recta .bd. rectę .dg. equalia sunt trigona .cbd. et .cdg. sibi inuicem; quare totum .cbg. trigonum duplum est uniuscuiusque trigonorum .cbd. et .cdg.; et que eidem sunt dupla, sibi inuicem sunt equalia; quare trigona .acb. et .acg. et .bcg. sibi inuicem sunt equalia. Diuisum est ergo trigonum .abg. etc.

Demonstratio qualiter á trigono abscidatur pars data per lineam protractam per punctum datum infra triangulum.

ADIACEAT siquidem trigonum *abg.*, et in ipso datus sit punctus fortuitu *d.*, per quem transire uolo rectam abscidentem datam partem, ut dicamus tertiam á triangulo *abg.*: protraham quidem per punctum *d.* lineam *ae.*, et considerabo utrum sectio *be.* uel *eg.* | sit tertia pars lateris *bg.*; quia si *be.* est tertia pars ex recta *bg.*, tunc trigonum *abe.* erit tertia pars trigoni *abg.* Si autem neutra eorum est tertia pars lateris *bg.*, considerato que dixi super unam quamque linearum egredientium á reliquis angulis: et uenientium super reliqua latera per punctum *d.*: quod si non inuenero aliquam ex sectionibus laterum esse tertiam sui lateris, protraham á puncto *d.* lineam *dz.* equidistantem lineæ *ge.*, et ponam superficiem *dz.* in *zi.* equalem tertie parti superficiæ *ag.* in *bg.*, et aplicabo lineæ *gi.* superficiem equiangulam, cui deficiat figura tetragona equalem superficiæ *gz.* in *zi.*, que sit superficies *it.* in *tg.*; et copulabo rectam *td.*, et perducam eam in *k.* Dico quidem quod á triangulo *abg.* abscisa est tertia pars, scilicet triangulum *tkg.* á linea *tk.* transeunte per punctum *d.*; quod sic probatur: quia factum ex *gi.* in *gz.* equatur facto ex *it.* in *tg.*, erit sicut *gi.* ad *it.*, ita *tg.* ad *gz.*: permutatim ergo est sicut *ig.* ad *gt.*, ita *gt.* ad *zt.* Sed sicut *gt.* ad *zt.*, ita *kg.* ad *dz.*; ergo sicut *kg.* ad *dz.*, ita *gi.* ad *tg.*; quare factum ex *tg.* in *gk.* equale est facto ex *dz.* in *zi.* Sed factum ex *dz.* in *gi.* est tertia pars facti ex *ag.* in *gb.*; quare et superficies *tg.* in *gk.* est tertia pars superficiæ *ag.* in *gb.*; quare trigonum *tkg.* est tertia pars trigoni *agb.*, ut dictum est.

fol. 74 verso.


equatur facto . . . quare trigonum
(fol. 74 verso, lin. 12-16 e 17; pag. 121, lin. 16-21).



Demonstratio qualiter abscidatur pars data á dato triangulo per lineam egredientem á puncto dato extra triangulum.


ESTO trigonum *abg.*, et extra ipsum datus sit punctus *d.*; oportet ut á triangulo *abg.* abscidatur pars data, ut dicamus tertiam per lineam egredientem á puncto *d.*; copulabo primum rectam *ad.* secantem latus *bg.* super punctum *c.*; et si *bc.* uel *cg.* est tertia pars lineæ *bg.*, nimirum abscisa est tertia pars trigoni *abg.* per lineam *ad.* ascendentem á puncto *d.*: quod si ita non est, protraham latera *ab.* et *ag.* extra triangulum *abg.* in punctis *ez.*, et per punctum *d.* lateri *bg.* equidistantem protraham lineam *ez.*, et ponam superficiem *de.* in *gi.* equalem tertie parti superficiæ *ag.* in *gb.*, et applicabo recte *gi.* paralilogramum, cui superhabundet figura tetragona equale ei quod fit ex *eg.* in *gi.*: sitque superficies *ik.* in *kg.*; et per punctum *k.* ducam rectam *kmd.* Dico, triangulum *kmg.* esse tertiam ex triangulo *abg.*; quod sic probatur: quoniam equalis est superficies *eg.* in *gi.* superficiæ *gk.* in *ki.*, est sicut *eg.* ad *gk.*, ita *ki.* ad *ig.*: coniunctim ergo est sicut *ek.* ad *gk.*, ita *gk.* ad *ki.* Sed sicut *ek.* ad *kg.*, ita *de.* ad *gm.*; ergo est sicut *ed.* ad *gm.*, ita *gk.* ad *gi.*: superficies ergo *gk.* in *gm.* equalis est superficiæ *de.* in *gi.* Sed superficies *de.* in *gi.* est tertia pars superficiæ *ag.* in *gb.*; quare et superficies *gk.* in *gm.* est tertia pars superficiæ *ag.* in *gb.*; et quia est sicut superficies *kg.* in *gm.* ad superficiem *ag.* in *gb.*, ita trigonum *kmg.* ad trigonum *agb.*: est ergo | trigonum *kmg.* tertia pars trigoni *abg.*, ut predixi. Similiter eodemque modo possemus abscidere á quolibet triangulo partem quamlibet datam per lineam egredientem á puncto dato inprotractu lateris ipsius extra ipsum, uel infra protractionem duorum laterum continentium ex la-

equidistantem protraham . . . ad
.gm. (fol. 74 verso, lin. 24 e 25-31;
pag. 121, lin. 29-36).




fol. 75 recto.

egredien[tem] á ... puncta data s (fol. 75 recto, lin. 2 e 3-11; pag. 121, lin. 42 — pag. 122, lin. 1-7).




partis ipsius ... inuicem similia (fol. 75 recto, lin. 43, 44-25; pag. 122, lin. 9-20).



fol. 75 verso.

quoque sunt ... paralilogramorum; omnes s (fol. 75 verso, lin. 1-8; pag. 122, lin. 30-37).



teribus trigonj. Rvrsvs si infra trigonum .*abg.* duo puncta data fuerint .*de.*; et uolumus triangulum .*abg.* in tres equas partes diuidere per rectas transeuntes per puncta .*de.*, abscidemus primum á trigono .*abg.* triangulum .*zig.* per lineam .*zi.* transeuntem per punctum .*d.* continentem duas tertias trigonj .*abg.*, remanebit quadrilaterum .*zabi.* pro tertia parte trianguli .*abg.*; de inde triangulum .*izg.* diuidemus in duo media á linea .*tk.* transeunte per punctum .*e.*; et erit una portio earum quadrilaterum .*tzik.*, et alia erit trigonum .*tkg.*; eodemque modo procedas, si puncta data fuerint extra triangulum. Et si triangulum .*abg.* per equidistantes rectas basi .*bg.* diuidere uolumus, protraham latus .*ba.* secundum quantitatem tertię partis ipsius in puncto .*d.*; et iaceat in directo ipsius recta .*de.* equalis recte .*da.*, et erit tota .*ae.* quantitas duarum tertiarum lineę .*ba.*; et ponam lineam .*az.* mediam inter .*ba.* et .*ad.*; rursus inter .*ba.* et .*ae.* in proportione media ponam rectam .*ai.*; et per puncta .*zi.* protraham rectas .*zt.* .*ik.* equidistantes basi .*bg.* Dico, trigonum .*abg.* diuisum esse in tres partes equales, quarum una est trigonum .*azt.*, altera quadrilaterum .*zikt.*, tertia erit quadrilaterum .*ibgk.*; quod sic probatur: quia est sicut .*ba.* ad .*az.*, ita .*az.* ad .*ad.*; erit sicut .*ba.* ad .*ad.*, ita trigonum .*abg.* ad trigonum .*azt.*, cum ipsa trigona sibi inuicem sint similia: est enim .*ba.* ex .*ad.* tripla; quare et trigonum .*abg.* triplum est trigoni .*azt.*. Ergo trigonum .*azt.* tertia pars est trigoni .*abg.* Rursus quia est sicut .*ba.* ad .*ia.*, ita .*ai.* ad .*ae.* erit sicut .*ba.* ad .*ae.*, ita trigonum, quod ab .*ea.* ei quod ab .*ai.* simile; et similiter descripta sunt enim trigona .*aik.* et .*abg.* sibi inuicem similia super latera .*ai.* et .*ab.* descripta; quare est sicut .*ea.* ad .*ab.*, hoc est sicut .2. est ad 3., ita trigonum .*aik.* est ad trigonum .*abg.*; due ergo tertie trigoni .*abg.* est trigonum .*aik.*; de quo si auferatur trigonum .*azt.*, quod est tertia pars trigoni .*abg.*, remanebit quadrilaterum .*zikt.* tertia pars trigonj .*abg.*; residuum uero simile quadrilaterum .*ibgk.* erit alia tertia pars: diuisum est ergo trigonum .*abg.* in tres partes equales; quod oportebat facere. Et sic per demonstratos modos omnia genera trigonorum possunt diuidi in quatuor partes uel plures. Vnde ad diuisionem quadrilaterum ueniamus.


Incipit de diuisione quadrilaterorum.

GENERA quidem quadrilaterorum sunt tria, paralilogramina uidelicet, et caput ascisa: atque diuersilatera: paralilogramina | quoque sunt, quorum latera et anguli oppositi sibi inuicem equantur: quorum speties sunt quatuor: in prima quarum sunt tetragona, que omnia latera equalia et angulos rectos habent; in secunda uero sunt parte altera longiora, que tantum duo latera habent sibi inuicem opposita equalia, et omnes angulos rectos habent: in tertia quoque sunt rumbi, qui ex quatuor lateribus equalibus constant, sed angulos habent inequales. In quarta sunt rumboides, quorum tantum duo latera sibi inuicem opposita, nec non et angulos oppositos equalia habent: et quia unus est modus diuidendj has quatuor speties paralilogramorum; omnes figuras eorum sub eisdem notulis terminare disposui, ut que in una earum dixerimus, idem in reliquis de ea esse uideatur. Adiaceat quidem tetragonum: et parte altera longius: rumbus: et rumboides .*abcd.*, quorum unumquodque in duo equa diuidi oporteat; quoniam paralilogramina sunt quadrilatera .*abcd.*, dyametri ipsorum ipsos per equalia secant; quare si protraxerimus dyametrum .*ac.*, uel .*bd.*, ut in prima cernitur figura, erunt utique in duas equalia partes ab unoquoque dyametrorum ipsorum diuisa. Verbi


gratia : si protraxerimus dyametrum *.ac.*, erit itaque trigonum *.abc.* equale trigono *.acd.*; quia latus *.ad.* equale est lateri *.bc.*, et latus *.ab.* equale est lateri *.dc.*: basis quoque *.ac.* est utrique triangulo comunis. Et si super aliquod laterum divisionem incipere uis, ipsum latus in duo equa secabis, et per punctum sectionis super latus sibi oppositum reliquis lateribus rectam equidistantem protrahe, ut in secunda patet figura, in qua super dimidium lateris *.bc.* signatus est punctus *.e.*, et ab ipso protracta est recta *.ef.* equidistans rectis *.ba.* et *.cd.*; et sic totum quadrilaterum *.ac.* diuisum est in duo equa paralilogramina, que sunt *.ae.* et *.fc.* : sunt enim super equas bases *.be.* et *.ec.*, et in eisdem equidistantibus *.ad.* et *.bc.* Similiter si protraxerimus lineam *.gk.* equidistantem rectis *.ad.* et *.bc.*, et diuidentem latera super dimidium laterum *.ab.* *.cd.*, erit utique diuisum unumquoque suprascriptorum paralilograminorum in duo equa á linea *.gk.*, ut in tertia figura ostenditur: sunt enim paralilogramina *.gd.* et *.bk.* sibi inuicem equalia, cum sint super equas bases *.cg.* *.gb.* eisdem equidistantibus *.cd.* et *.ab.* Et si super aliquod laterum punctus datus fuerit, ut in quarta figura, in qua datus est punctus *.h.* cadens inter puncta *.be.*, signabis in oppositum eius punctum *.i.* cadens inter *.fd.*; et iaceat *.fi.* equalis recte *.eh.*, et copuletur recta *.hi.* Dico quidem, diuisum esse unumquodque quatuor quadrilaterorum in duo equa á linea *.ih.*; quod sic probatur: quoniam in equidistantibus *.ad.* et *.bc.* recte incidunt *.fe.* et *.ih.*, erit angulus *.ifk.* angulo *.keh.* equalis, nec non et angulus *.fik.* angulo *.khe.*, et anguli qui ad *.k.* sibi inuicem sunt equales, et basis *.fi.* basi *.eh.* est equalis: equale ergo est trigonum *.fki.* trigono *.khe.*: comuniter si adiungatur pentagonum *.kfabh.*, erit quadrilaterum *.iabh.* equale quadrilatero *.abef.*, quod est medietas totius quadrilateri *.ac.* Vel aliter quia paralilogramina sunt *.ae.* et *.fc.* et *.ic.* in eisdem equidistantibus *.ad.* et *.bc.* habent latera sibi opposita equalia; quare equale est latus *.af.* lateri *.be.* et *.fd.* ex *.ec.* Sed *.fd.* est dimidium ex *.ad.*; quare *.fd.* equale est recte *.af.*; ergo et *.af.* equalis est recte *.ec.*, et *.fi.* equalis est recte *.he.*: tota ergo *.ai.* toti *.ch.* est equalis, et recta *.di.* recte *.bh.* est equalis, et latus *.hi.* est comune: totum ergo quadrilaterum *.iabh.* quadrilatero *.ihcd.*, ut diximus, est equale. Similiter si datus punctus caderet inter *.ec.*; quantum distaret ab *.e.* uersus *.c.*, tantum acciperes ex recta *.fa.*; incipiendo ab *.f.*; et sic secundum hoc potes diuidere omnia paralilogramina á dato puncto super quodlibet laterum.

Et si paralilogramum aliquod in duo equa per lineam protractam á puncto dato infra ipsum secare desideras, ut paralilogramum *.ag.*, infra quod datus sit punctus *.c.*, per quem uolumus lineam transire diuidentem paralilogramum *.ag.* in duo equa super dimidium dyametrij *.bd.*; ponas punctum *.f.*, et copulabis *.cf.*, et protrahes eam in utramque partem in puncta *.ez.* Dico, diuisum esse paralilogramum *.ag.* in duas equas sectiones, quarum una est quadrilaterum *.eabz.*, et alia quadrilaterum *.edgz.*; quod sic probatur: quoniam in equidistantibus *.ad.* et *.bg.* due recte *.ez.* et *.db.* incidunt, erit angulus *.fde.* equalis angulo *.fbz.*, et angulus *.fed.* angulo *.fzb.*, nec non et anguli qui ad *.f.* sibi inuicem sunt equales; equiangula ergo sunt trigona *.fed.* et *.fzb.*: et quoniam equalis est recta *.fb.* recte *.fd.*, equalis erit et recta *.de.* recte *.bz.*, et trigonum *.dfe.* trigono *.bfz.* erit equale; comune accipiatur quadrilaterum *.dfzg.*, erit quadrilaterum *.ezgd.* equale trigono *.bgd.*; sed trigonum *.bgd.* est medietas paralilogramij *.ag.*;


* dixerimus, idem ... *.ab.* equale * (fol. 75 verso, lin. 10-17; pag. 122, lin. 38 — pag. 123, lin. 1 e 2).




* paralilogramina ... super equas * (fol. 75 verso, lin. 24-29; pag. 123, lin. 8-13).




* punctus datus ... recte incidunt * (fol. 75 verso, lin. 31-35 e margine laterale esterno; pag. 123, lin. 14-18).



* Et si ... quoniam equalis * (fol. 76 recto, lin. 15-24; pag. 123, lin. 32-41).




dato extra punctus .e. (fol. 76 recto, lin. ultima e margine inferiore; pag. 124, lin. 6 e 7).




fol. 76 v.


eius que ... et unum quodque (fol. 76 verso, lin. 8-15; pag. 124, lin. 15-23).



abscisum parallelogramum est parallelogrami (fol. 76 verso, lin. 22-29 e 30; pag. 124, lin. 29-36).



fc., ut in ... operabitur (fol. 76 verso, lin. ultima, e margine inferiore; pag. 124, lin. 41 e 42).



fol. 77 recto.

quare quadrilaterum $.ezgd.$ est medietas parallelogrami $.ag.$, ut predixi: hoc eodem modo diuiduntur omnia parallelogramina erecta protracta á puncto dato super unum ex lateribus ipsius: uerbi gratia; ut si datus punctus esset $.e.$, diuideret quidem rectam $.db.$ in duo equa super punctum $.f.$; et per ipsum punctum protraheretur linea $.ez.$, que diuideret parallelogramum $.ag.$ in duo equa, ut probatum est. Et si parallelogramum aliquod in duo equa secare uis per lineam egredientem a puncto dato extra ipsum, ut parallelogramum $.ac.$, extra quod datus sit punctus $.e.$, protraham rursus dyametrum $.bd.$, et diuidam ipsum super punctum $.g.$, et copulabo rectam $.eg.$, et protraham eam in puncto $.f.$: diuisum est parallelogramum $.ac.$ in duo equa per lineam egredientem á puncto dato $.e.$; quod probatur per superscriptam figuram; et est una medietatum ipsius quadrilaterum $.fabk.$, et alia est quadrilaterum $.fkcd.$, ut in ipsa figura patet.

Incipit de diuisione parallelogramorum in plures partes.

ADIACEANT quidem superscripte quatuor speties parallelogramorum $.abcd.$; et uolumus aliquod ipsorum in tres equales partes diuidere super duo data latera eius, que sint $.ad.$ et $.bc.$; diuidamque latus $.ad.$ in tres equales partes, que sint $.ae.$ $.ef.$ $.fd.$, et per puncta $.ef.$ protraham rectas $.eg.$ $.fh.$ equidistantes lateribus $.ab.$ et $.dc.$ Dico quod quale uis ex superscriptis quatuor parallelogramis diuisum esse in tres equas sectiones á rectis $.eg.$ et $.fh.$; quod sic probatur. Quoniam equidistantes sunt recte $.ad.$ et $.bc.$, et cum eis copulate sunt recte equidistantes $.ab.$ et $.eg.$ et $.fh.$ et $.dc.$, erunt inter se equales; quare parallelogramina sunt quadrilatera $.ag.$ $.eh.$ $.fc.$, et habent bases equales sibi inuicem, que sunt $.bg.$ et $.gh.$ et $.hc.$: est enim quelibet earum tertia pars lateris $.bc.$; quare et unum quodque ipsorum parallelogramorum tertia pars est totius $.ac.$ parallelogrami, ut in prima patet figura. Et si super aliquem punctum datum super uno laterum rectam protrahere uis, que abscidat á parallelogramo dato tertiam partem; et datum punctum ponamus esse super latus $.ad.$; diuiso quidem primo latere $.ad.$ super puncta $.ef.$ ordine suprascripto, uidelicet quod quelibet sectionum $.ag.$ $.eh.$ $.fc.$ sit tertia pars totius $.ad.$, et datus punctus fuerit $.e.$; protraham rectam $.eg.$, et erit á parallelogramo $.ac.$ abscisum parallelogramum $.ag.$ á linea protracta á puncto $.e.$, quod est tertia pars ipsius. Similiter si punctus datus fuerit $.f.$, erit parallelogramum $.fc.$ tertia pars parallelogrami $.ac.$: si punctus datus non fuerit super $.e.$, aut super $.f.$, erit itaque inter $.ae.$, aut inter $.ef.$, aut inter $.fd.$: sit primum inter $.ae.$ punctus datus $.i.$; et uolo á parallelogramo $.ac.$ auferre tertiam partem eius á linea protracta á puncto $.i.$; signabo primum punctum $.f.$ super tertiam partem lateris $.ad.$, et ab ipso puncto $.f.$ protraham $.fk.$ equidistantem lateribus $.ab.$ et $.dc.$; et sic erit parallelogramum $.fc.$ tertia pars ex parallelogramo $.ac.$; quare parallelogramum $.ah.$ duplum est parallelogrami $.fc.$: unde oportet ipsum parallelogramum $.ha.$ diuidere in duo equa per lineam protractam á puncto $.i.$; unde quantum distat $.i.$ ab $.a.$, tantum distare faciam $.k.$ ab $.h.$: et copulabo $.ik.$, et erit quadrilaterum $.iabk.$ medietas parallelogrami $.ah.$: secta est ergo tertia pars parallelogrami $.ac.$ per rectam $.ik.$, et est diuisum inter equas partes, que sunt quadrilatera $.iabk.$ et $.ikhf.$, et parallelogramum $.fc.$, ut in secunda patet figura. Et si datus punctus $.i.$ fuerit inter $.fd.$, operabitur idem in aduersam partem, uidelicet á parallelogramo $.ac.$ abscidam parallelogramum $.ag.$, quod sit tertia eius; deinde parallelogramum

.ec. diuidam in duo equa per lineam protractam á puncto *i.*, que sit linea *il.*, que abscidit á paralilogramo *.ac.* tertiam partem eius, scilicet quadrilaterum *.ilcd.*, ut in tertia patet figura. Er si punctus *i.* erit inter *.ef.*, abscidam á paralilogramo *.ac.* paralilogramum *.fc.*, et residuum diuidam in duo equa per lineam protractam á puncto *i.*, que sit recta *.im.*; et abscidatur per lineam *.im.* quadrilaterum *.iabm.* á paralilogramo *.ac.*, quod est tertia pars eius; relique due partes erunt quadrilaterum *.imhf.*, et paralilogramum *.fc.*, ut in quarta figura, scilicet in rumboide *.abcd.*, demonstratur. Eodem modo potest omnem paralilogramum diuidi in quatuor uel plures partes equales. Verbi gratia: si uis paralilogramum aliquod diuidere in quatuor partes equales, diuide primo ipsum in duo equa: aut per dyametrum ipsius: aut per rectam equidistantem duobus lateribus eius; deinde unamquamque ipsarum duarum portionum in duo equa secabis; et erit totum paralilogramum in .iiii.^{or} partes diuisum.


De diuisione paralilogramorum in partes inequales.

Esto paralilogramum *.abgd.*, quod in equaliter inter tres consortes diuidere uolumus, ita quod primus habeat medietatem, secundus tertiam, tertius sextam. Diuidam primum paralilogramum *.ag.* in duo paralilogramina equalia, que sunt *.az.* et *.eg.*; deinde ab uno ipsorum secabo tertiam partem, que sit paralilogramum *.ig.*, hoc est quod recta *.id.* sit tertia pars ex *.ed.* Dico, paralilogramum *.ag.* diuisum esse in tres portiones predictas, quarum medietas est paralilogramum *.az.*, et eius sexta est paralilogramum *.ig.*, et reliquum, scilicet paralilogramum *.et.*, est tertia pars totius *.ag.* Quoniam *.id.* est tertia ex *.ed.*, erit *.id.* sexta pars ex tota *.ad.*; quare paralilogramum *.ig.* sextam partem esse dico ex toto paralilogramo *.ag.*: possumus quidem qualemcumque partem uolumus accipere ex predictis á linea producta á puncto dato extra, uel intus, uel super unum ex lateribus paralilogrami per ea que dicta sunt.


Incipit de diuisione quatuor figurarum caput abscisarum, que duo tantum latera habent equidistantia.

CAPVT abscisarum species sunt quatuor, prima quarum dicitur semicaput abscisa, altera eque caput abscisa, tertia diuerse caput abscisa, quarta caput abscisa declinans; et quia omnium harum diuidendj modus est unus, ipsas omnes per ordinem ponere disposui eisdem litteris, siue notulis denotatis; ut que dicta super aliquam ipsarum inueniantur, super unam quamque reliquarum esse dicta cognoscas. ADIACEANT ergo .iiii.^{or} speties caput abscisarum *.abgd.* habentia latera *.ad.* et *.bg.* equidistantia; et uolumus quamlibet ipsarum diuidere per rectam equidistantem basibus earum, que sunt recte *.bg.*; et quia ex equidistantibus *.ad.* et *.bg.* minor est *.ad.* quam *.bg.*, si protraxerimus rectas *.ba.* et *.gd.*, in partes *.ad.* concurrent: concurrant enim ad punctum *.e.*; et sit quadratus recte *.ze.* medietas quadratorum rectarum *.eb.* et *.ae.*; et per punctum *.z.* protraham *.zi.* rectam equidistantem basi *.bg.* Dico, trapeziem *.abgd.* in duo equa diuisum esse á linea *.zi.* equidistante recte *.bg.*; quod sic probatur. Quoniam quadrata linearum *.eb.* et *.ae.* dupla sunt quadrato lineę *.ez.* Dupla erunt et trigona *.ebg.* et *.ead.* trigono *.ezi.*, cum sint sibi inuicem similia. Sed si de trigono *.ebg.* relinquamus trigono *.ezi.*, qui est equalis sibi idem, remanebunt quadrilaterum *.zbg.*, et trigonum *.ead.* equalia trigono *.ezi.*: comuniter si auferatur trigonum *.ead.*, remanebit quadrilaterum *.zg.* equale quadrilatero *.ai.*: diuisum est ergo quadrilaterum *.abgd.* in duo equa á linea *.zi.*; quod oportebat facere. Quod etiam ostendamus cum

* et residuum plures partes » (fol. 77 recto, lin. 5, 6-10; pag. 125, lin. 4-8).




* secabo tertiam qualemcumque partem » (fol. 77 recto, lin. 19-24; pag. 125, lin. 16-21).



fol. 77 verso,

* dupla sunt ad .12., ita » (fol. 77 verso, lin. 6-15; pag. 125, lin. 39— pag. 126, lin. 3).




numeris: sit latus *.ab.* 12., et *.bg.* 12, et *.ad.* sit .3; latus quoque *.gd.* 15 perticas contineat: et quia in trigono *.ebg.* protracta est protracta est (*sic*) recta *.da.* equidistans basi *.bg.*, erit sicut *.ad.* ad *.bg.*, hoc est sicut .3 est ad .12., ita *.ea.* ad *.eb.*; quare erit sicut .3. ad .9., ita *.ea.* ad *.ab.*; ergo *.ea.* est .4., scilicet tertia pars ex *.ab.*; tota ergo *.eb.* est .16.: additis ergo quadratis linearum *.eb.* et *.ea.* in unum, scilicet 256. et .16.; erunt .272.; quorum medietas, scilicet 136., est quadratum lineę *.ez.*; et quia est sicut *.ez.* ad *.eb.*, ita *.zi.* ad *.bg.*; erit itaque sicut quadratum lineę *.ez.* ad quadratum lineę *.eb.*, hoc est sicut 136 est ad 256, quorum proportio in minimis est sicut .17 ad 32., ita quadratum lineę *.zi.* ad quadratum lineę *.bg.*: quare si multiplicauerimus .17 per 144, et diuiserimus per .32., uenient $\frac{1}{2}$ 76. pro quadrato lineę *.zi.*: et quia orthogonium est trigonum *.ebg.*, orthogonium erit et trigonum *.ezi.*, nec non et trigonum *.ead.*: quare si multiplicauerimus dimidium ex *.ez.* in *.zi.*, habebimus utique embadum trianguli *.ezi.*, quod est .51., quod prouenit ex radice multiplicationis quartę partis de .136. in quadratum lineę *.zi.*, hoc est in $\frac{1}{2}$ 76; que multiplicatio est radix de 2601.; de quo embado si astulerimus trigonum *.ead.*, quod est .6., remanebunt .45. pro embado quadrilaterj *.azid.*; que .45 sunt dimidium totius quadrilaterj semicaputascisi *.abgd.*: quia si multiplicauerimus dimidium ex *.ab.* in coniunctum ex *.ad.* et *.bg.*, scilicet .6 per .15., utique duplum de .45, scilicet .90 prouenient: quare probatur, quadrilaterum *.ai.* dimidium esse ex toto quadrilatero *.abgd.*: vel aliter extracta *.ez.* ex *.eb.*, scilicet radice de .136 de .16. pro linea *.zb.*, remanebunt .16, minus radice de .136.; cuius dimidium, quod est .8., minus radice de 34., si multiplicauerimus per coniunctum | ex *.zi.* et *.bg.*, scilicet per 12, et radice de $\frac{1}{2}$ 76., habebimus similiter .45. pro embado quadrilateri *.zg.* Nam qualiter ipsa multiplicatio fieri debeat, ut habeatur modus multiplicandi binomia per recisa, ostendere procuramus. Pones primum nomina predictorum, ut in margine cernitur, et multiplicabis integra per integra, scilicet .12 per 8, erunt integra .96.; quibus adde multiplicationem de 8 per radicem de $\frac{1}{2}$ 76, prouenient .96, et vna radix facti ex multiplicatione de 64. in $\frac{1}{2}$ 76, scilicet de 4896.; de quibus extrahe multiplicationem de 12 in radicem de 34, scilicet unam radicem de 4896, remanebunt 96 tantum; de quibus extrahe multiplicationem radicis de 34. in radicem de $\frac{1}{2}$ 76, scilicet 51., remanebunt 45, ut predixi, pro embado quadrilateri *.zg.*

fol. 78 recto.

integra radix addita
 $12 \frac{1}{2} 76$
 radix dim.
 34 8

* Copulabo rectas . . . quadrilaterum *.abgd.* (fol. 78 recto, lin. 45-21; pag. 126, lin. 35-40).




Et si super latus *.ad.* aliquod ex supradictis caput abscisis in duo equa diuidere uis, latera *.ad.* et *.bg.* equidistantia in duo equa diuidas super puncta *.tk.*, et copulabis rectam *.tk.*, ut in secunda patet figura. Dico siquidem, quadrilaterum *.abgd.* diuisum esse in duo equa á linea *.tk.*; quod sic probatur.

Copulabo rectas *.tb.* et *.tg.*, et erunt trigona *.tkb.* et *.tkg.* sibi inuicem equalia, cum sint sub una altitudine: et habeant bases equales. Rursus quia trigona *.bat.* et *.gtd.* sunt sub altitudine una, est sicut *.at.* ad *.td.*, ita trigonum *.bat.* ad trigonum *.gtd.*: est enim *.at.* equalis recte *.td.*; quare trigonum *.bat.* equale est trigono *.gtd.* Demonstratum est ergo et trigonum *.tkb.* equale trigono *.tkg.*; quare quadrilaterum *.ak.* equale est quadrilatero *.tg.* Diuisum est ergo quadrilaterum *.abgd.* in duo equa á linea *.tk.*; et est manifestum ex his que diximus, quod in omni quadrilatero habente duo latera equidistantia, si recta aliqua proportionaliter secauerit ipsa latera equidistantia, in eadem proportione secabit ipsam figuram. Fuit enim, ut diximus, sicut *.at.*


ad *.td.*, ita *.bk.* ad *.kg.*: quare fuit sicut *.at.* ad *.td.*, ita quadrilaterum *.ak.* ad quadrilaterum *.tg.* Er si quadrilaterum duorum laterum equidistantium in duo equa diuidere uis per lineam protractam á dato puncto super minus latus equidistantium, ut quadrilaterum *.abgd.*, quod diuisum est in duo equa á linea *.tk.*; et in ipso super latus *.ad.* datus sit punctus *.a.*, accipiam super latus *.kg.* rectam *.kl.* equalem recte *.ta.*; et erit *.bl.* dimidium laterum *.ab.* et *.bg.*, et copulabo rectam *.al.* Dico, quadrilaterum *.abgd.* diuisum esse in duo equa á linea *.al.* Quod sic probatur. Quoniam equidistans est recta *.at.* recte *.kl.*; et in eis incidit recta *.al.*, erunt anguli *.tam.* et *.mlk.* sibi inuicem equales; propter eadem ergo et angulus *.atm.* angulo *.mkl.* est equalis, nec non et anguli qui ad *.m.* sibi inuicem equantur, cum sint á uertice; et basis *.at.* basi *.kl.* est equalis; quare trigonum *.amt.* equale est trigono *.lmk.*; quibus si addatur in comune quadrilaterum *.mabk.*, erit trigonum *.abl.* equale quadrilatero *.abkt.*; quod dimidium totius *.ag.*, ut in tertia patet figura. Simili quoque modo si datus punctus super latus *.ad.* fuerit *.d.*, accipiam equalem recte *.td.* rectam *.kn.*, et erit tota *.gn.* dimidium laterum *.ad.* et *.bg.*; et copulabo rectam *.dn.*, que diuidet quadrilaterum *.abgd.* in duo equa, ut in hac quarta figura cernitur: quod probabitur per ea que dicta sunt in precedenti figura. Et hoc quoque habetur, quod si punctus datus super lineam *.bg.* erit inter puncta *.n.l.*, casus lineæ diuidentis ipsam figuram cadet super latus *.ad.* Sed si punctus fuerit datus inter *.bn.*, uel inter *.lg.*; qualiter linea ab ipso producatu diuidens totum quadrilaterum in duo equa demonstrabimus. Reiterato quidem quadrilatero *.abgd.* duorum laterum equidistantium; et in eo protracta recta *.dn.* diuidens quadrilaterum *.abgd.* in duo equa. Datus punctus super lineam *.bg.* sit *.b.*; copulabo quidem rectam *.db.*, et ponam ei equidistantem lineam *.nc.*, et copulabo rectam *.bc.* Dico, quadrilaterum *.abgd.* diuisum esse in duo equa á linea *.bc.*, que protracta est á puncto dato *.b.*; quod sic probatur: trigona quidem *.ncb.* et *.ncd.* sibi inuicem sunt equalia, cum sint inter equidistantes *.bd.* et *.nc.*, et super eandem basim *.nc.*; quibus si addatur in comune trigonum *.cng.*, erit trigonum *.cgb.* equale trigono *.dgn.* Sed trigonum *.dgn.* est medietas quadrilateri *.abgd.*; quare trigonum *.cgb.* est medietas quadrilateri *.abgd.* Et sciendum, quod si punctus datus fuerit inter puncta *.bn.*; et super lineam *.bn.* linea protracta ab ipso dato puncto secabit lineam *.gd.* inter puncta *.cd.*; que sectio inuenietur si datus punctus inter *.bn.* copulabitur cum puncto *.d.*; et ipsi linee equidistans trahatur á puncto *.n.* Simili quoque modo operandum est, si punctus datus super lineam *.bg.* fuerit inter *.lg.* Verbi gratia: Adiaceat rursus quadrilaterum *.abgd.* diuisum in duo equa á linea *.al.*, et sit *.g.* punctus datus; copulabo supradicto ordine rectam *.ga.*, et ei protraham equidistantem rectam *.lf.*, et copulabo *.gf.*, que diuidet quadrilaterum *.abgd.* in duo equa, et egreditur á puncto dato *.g.* Quod probatur ordine et modo supradicto. Iam ostensum est quomodo in duo equa quadrilatera duorum equidistantium laterum diuidi debeant á linea protracta ab omni dato puncto super lineas equidistantes ipsius; nunc uero ostendamus quomodo diuidantur á linea egrediente á dato puncto super reliqua latera. |

ADIACEAT RVRSVS quadrilaterum *.abgd.* diuisum in duo equa á linea *.zi.* equidistante basi *.bg.*, et protraatur etiam in eo linea *.gf.* inuencta in suprascripta figura, et sit punctus datus super lineam *.ab.* in quacumque uis parte ipsius; eritque inter *.bz.*,


recta *.at.* *.mkl.* est (fol. 78 recto, lin. 34 e 35, e margine laterale esterno ed inferiore; pag. 127, lin. 8 e 9).




et basis quadrilaterum (fol. 78 verso, lin. 2-7 e 8; pag. 127, lin. 10-16).



inter *.lg.* . . . á linea *.bc.* (fol. 78 verso, lin. 12-17; pag. 127, lin. 19-25).




puncta *.cd.* quomodo in duo (fol. 78 verso, lin. 25-32; pag. 127, lin. 31-37).




fol. 78 verso.


* *abgd.* in duo ... copulabo lineam * (fol. 79 recto, lin. 6-10 e 41; pag. 128, lin. 2-6).




* copulabo rectam ... ei equidistans erit * (fol. 59 recto, lin. 12-18 e 19; pag. 128, lin. 7-14).



* liquide patebat ... dimidium quadrilateri * (fol. 79 recto, lin. 24-25 e 26; pag. 128, lin. 13-20).



* enim *bg.* ... *ae.* equidistans * (fol. 79 recto, lin. 34, 35, e margine inferiore e laterale esterno; pag. 128, lin. 28-30).



fol. 79 verso.


uel inter *zf.*, siue inter *fa.*, uel erit unus ex ipsis; unde si datus punctus fuerit *b.*, diuidetur utique quadrilaterum *abgd.* in duo equa á linea *bc.*: similiter si datus punctus fuerit *z.*, recta quidem *zi.* diuidit quadrilaterum *abgd.*, ut dictum est. Et si *f.* fuerit punctus datus, nimirum recta *fg.* secabit quadrilaterum *abgd.* in duo equa, ut ostensum est: et si *a.* fuerit, secabitur á recta *al.* in duo equa secundum ea que premisimus. Sed sit datus punctus *h.* inter *b.z.* puncta, copulabo lineam *hi.*; et per punctum *z.* protraham rectam *ze.* equidistantem recte *ih.*, et copulabo rectam *hc.* Dico, quadrilaterum *abgd.* sectum esse in duo equa á linea *hc.* protracta á puncto *h.*; quod sic probatur. Quoniam inter equidistantes *hi.* et *zc.*, et super basim *hi.* sunt trigona *hic.* et *hiz.*, ipsa trigona sibi inuicem sunt equalia; quare si addiderimus unicuique eorum in comune quadrilaterum *igbh.*, erit quadrilaterum *cgbh.* equale quadrilatero *izbg.*, quod est dimidium totius quadrilateri *abgd.*, ut ostensum est. Et si á puncto *p.* posito inter *zf.* recta sit protrahenda, copulabitur recta *pi.*, et ei equidistans erit recta *zq.*; et copulabitur recta *pq.*, que diuidit quadrilaterum *abgd.* in duo equa; quod probatione non indiget, cum per ea que dicta sunt liquide patefiat: et si punctus datus fuerit inter *a.* et *f.*, sit *r.*, copulabo rectam *rg.*, et ei equidistantem ponam rectam *fs.*, et copulabo rectam *rs.*, que diuidet quadrilaterum *abgd.* in duo equa: uerbi gratia: trigona *fsg.* et *sfr.* sibi inuicem equalia sunt; quibus addito in comune trigono *sbf.*, erit trigonum *rbs.* equale trigono *fbg.* Sed trigonum *fbg.* est dimidium quadrilateri *abgd.*; quare et trigonum *rbs.* erit dimidium eiusdem quadrilateri. Simili quoque modo operandum est, si punctus datus fuerit super latus *dg.*

DEMONSTRABO rursus alio modo qualiter quadrilatera duorum laterum equidistantium diuidi debeant ab angulis ipsius. Sit quadrilaterum *abgd.* caputascisum, cuius *ad.* et *bg.* latera sint equidistantia, et minus eorum sit *ad.*; et protraham in eo dyametros *ag.* et *bd.* sese inuicem secantes super punctum *m.*; et quia latera *ad.* et *bg.* sunt equidistantia, similia erunt trigona *amd.* et *bmg.*: quare est sicut *bg.* ad *ad.*, ita *bm.* ad *md.*, et *gm.* ad *ma.*: maior enim *bg.* quam *ad.*; maior ergo et *bm.* quam *md.*, et *gm.* quam *ma.*: diuidantur ergo dyametri *ag.* et *db.* in duo equa super puncta *e.z.* et per punctum *e.* equidistans dyametro *bd.* trahatur recta *ec.*, et copuletur recta *bc.* Dico, quadrilaterum *abcd.* diuisum esse ab angulo *b.* á linea *bc.*; quod sic probatur: copulabo rectas *be.* et *ed.*; et quia punctus *e.* est in medio dyametri *ag.*, erunt trigona *ade.* et *deg.* sibi inuicem equalia, nec non et trigonum *abe.* trigono *bge.* est equale; quare quadrilaterum *edab.* dimidium totius quadrilateri *abgd.* continet: et quia trigona *bdc.* et *bde.* sunt inter equidistantes *bd.* et *ec.* et super basim *bd.*, erunt sibi inuicem equalia: quibus addito in comune trigono *abd.*, erit quadrilaterum *abcd.* equale quadrilatero *abed.* Sed quadrilaterum *abed.* dimidium est quadrilateri *abgd.*; quare et quadrilaterum *abgd.* dimidium est quadrilateri *abgd.* Similiter si protraxerimus lineam *zf.* equidistantem dyametro *ag.*, et copulauerimus rectam *gf.*, erit quadrilaterum *abgd.* diuisum in duo equa á linea *gf.* protracta ab angulo *g.* Deinde ut diuisio proueniat á reliquis angulis, accipiam rectas *bl.* et *gn.* equales dimidio laterum *ad.* et *bg.*; uel lineas *ce.* et *fz.* producam, et cadent necessario super puncta *ln.*; quia superius protracta fuit *ne.* equidistans dyametro *bd.*

et *lf.* equidistans dyametro *ag.*; et protraham rectas *al.* et *dn.*, et uenient proposita, ut superius demonstratum. Demonstratum est ergo quomodo quadrilatera duorum laterum equidistantium diuidantur á puncto dato super quodlibet latus ipsius; nunc dicamus qualiter diuidi debeant á dato puncto extra figuram.

ADIACEAT rursus quadrilaterum *abgd.* duorum laterum equidistantium diuisum in duo equa ab angulis ipsius á lineis *al.* et *dn.* et *gf.* et *bc.*; quibus rectis ab utraque parte in infinitum protractis in puncta *e.z.i.t. k.h.o.p.*, demonstrabitur punctum extra quadrilaterum *abgd.* aliquem dari non posse nisi super unam ex ipsis .iiii.^{or} lineis, uel inter duas earum per ordinem; quare si datus fuerit punctus super aliquam ipsarum, erit siquidem ipsa recta protracta á dato puncto diuidens quadrilaterum *abgd.* in duo equa: ut si datus punctus fuerit *e.*, egredietur ab ipso linea *eal.*, que diuidit quadrilaterum *abgd.* in duo equa; quod idem intelligas in reliquis. Sed si datus punctus *q.* cadens inter lineas *ea.* et *zd.* super latus *ad.*; et uolo ut á puncto *q.* egrediatur recta diuidens quadrilaterum *abgd.* in duo equa; quoniam equidistantia sunt latera *ad.* et *bg.*, producam rectam *qm.*, et ducam eam in puncto *v.* Dico, quadrilaterum *abgd.* diuisum esse in duo equa á linea *rs.*, que egreditur á puncto *q.* dato; quod sic probatur: quoniam recte *ad.* et *nl.* sibi inuicem equidistantes sunt; et in eis recta incidit *rs.*, erit angulus qui sub *ars.* equalis |

* egrediatur recta *ars.* equalis *
(fol. 79 verso, lin. 30, 31-35, e margine laterale esterno ed inferiore; pag. 129, lin. 14-18).




angulo qui sub *rsl.*, nec non et angulus *sla.* angulo *lar.* est equalis, et recte *am.* et *ml.* sibi inuicem sunt equales; cum recte *ad.* et *nl.* sibi inuicem equales esse demonstrate sint; quia cum in equalibus et equidistantibus rectis recte sese inuicem secant, per equalia se secare in geometria monstratur: unde equalis est recta *nm.* recte *md.*, et *am.* recte *ml.*, ut predixi: quare trigona *arm.* et *msl.* sibi inuicem equalia et equiangula atque equilatera sunt; quibus si in comune addatur quadrilaterum *absm.*, erit quadrilaterum *absr.* equale triangulo *abl.*, scilicet dimidio quadrilateri *abgd.* Sectum est ergo quadrilaterum *abgd.* in duo equa á linea *rs.*, que egreditur á puncto *q.* Similiter si datus esset punctus sub linea *nl.* inter rectas *nh.* et *lk.*, eodemque modo esset operandum, uidelicet copularetur ille punctus cum *m.*, et produceretur

fol. 80 recto.

ipsa recta super latus *.ad.* Verbi gratia: ut si punctus fuerit *.v.*; diuideretur utique quadrilaterum *.abgd.* in duo equa á linea *.rs.* egrediente á puncto *.v.* dato. Et si inter lineas *.nh.* et *.ob.* datus fuerit punctus *.x.*, ut in hac alia cernitur figura; habeantur duo fila, quorum unum extendatur super dyametrum *.ab.*, et sit fixum super punctum *.d.*; et aliud extendatur ab *.n.* in *.c.*, et sit fissum (*sic*) super punctum *.n.*; et erunt tunc fila sibi inuicem equidistantia: et moueatur filum primum ex *.b.* uersus *.n.* secans lineam *.bn.*; et aliud moueatur ex *.c.* uersus *.d.* secans lineam *.cd.*; et sint semper in motione sua sibi inuicem equidistantia: et hoc fiat donec sectiones linearum *.bn.* et *.cd.* respiciant secundum rectitudinem datum punctum *.x.*; et tunc faciant transire rectam protractam á puncto *.x.* per sectiones illas; et proueniet quesitum. Verbi gratia. Cadat filum primum super rectam *.dy.*, secundum super rectam *.rn.*; et sint sibi inuicem equidistantia: et puncta *.ry.* respiciant se secundum rectitudinem cum puncto *.x.*; et protrahatur recta *.xyr.* Dico, rectam *.ry.* secare quadrilaterum *.abgd.* in duo equa; quod sic probatur. Quoniam fila *.nr.* et *.dy.* sunt equidistantia; et in eis sunt trigona *.ncd.* et *.nry.*, super basim *.nr.* sibi inuicem ipsa trigona sunt equalia: comuniter si addatur trigonum *.rgn.*, erit trigonum *.rgy.* equale trigono *.dgn.*: sed trigonum *.dgn.* dimidium est quadrilateri *.abgd.*; ergo et trigonum *.rgy.* dimidium est eiusdem quadrilateri. Eodemque modo operandum est si punctus erit datus inter lineam *.dz.*, et lineam *.ci.*: ut si ille punctus esset *.q.*; et respiceret secundum rectitudinem puncta *.ry.* inter equidistantia fila *.dy.* et *.nr.*; quare si per punctum descendit recta transiens per puncta *.ry.*, diuidetur quadrilaterum *.abgd.* in duo equa, ut ostensum est. Eademque uia operandum est si punctus caderet inter lineas |

et lineam *.ci.* ... inter lineas • (fol. 80 recto, lin. 32-35, e margine laterale esterno ed inferiore; pag. 130, lin. 19-22).



fol. 80 verso.

.gl. et *.lk.*, uel inter lineas *.fp.* et *.ae.*, hoc est quod poneretur filum super *.ga.*, et figeretur super punctum *.a.*, et aliud super *.lf.*, et figeretur super punctum *.l.*, et mouerentur fila equidistanter secantia rectas *.af.* et *.gl.*, donec sectiones aspicerent punctum datum in rectitudine una. VERVM si punctus datus fuerit extra lineam *.bf.*, et inter lineas *.fp.* et *.ob.*; qualiter operandum sit, in hac alia demonstratur figura, in qua protracte sint recte *.oi.* et *.pt.* diuidentes ab angulis *.b.* et *.g.* quadrilaterum *.abgd.*; et punctus datus sit *.z.* cadens inter rectas *.fp.* et *.ob.*, á quo uolumus protrahere lineam diuidentem quadrilaterum *.abgd.* in duo equa. Estendam primum filum ex *.c.* in *.f.*, et sit


fixum super *f.*; et aliud filum extendatur super latus *gb.*, et sit fixum super punctum *g.*; deinde moueantur fila equidistanter secantia rectas *bf.* et *cg.*, donec sectiones respiciant punctum *z.* datum. Verbi gratia: cadat filum, quod fixum fuit super *g.*, super lineam *gq.*, reliquum uero super lineam *fx.*; et sint puncta *x.q.z.* in rectitudine una; et recte *gq.* et *fx.* sint equidistantes: et copuletur recta *zqx.* Dico quidem, quadrilaterum *abgd.* in duo equa diuisum esse á linea *qx.*, que protracta est á puncto *z.* dato; quod sic probatur. Quoniam equidistantes sunt recte *gq.* et *xf.*, erunt trigona *qgx.* et *qgf.* sibi inuicem equalia: quibus si addatur in comune trigonum *qbg.*, erit quadrilaterum *qbgx.* equale trigono *fbg.*, scilicet dimidio quadrilateri *abgd.* Eodemque modo operabimur si punctus datus fuerit extra lineam *cg.*, et inter rectas *ci.* et *gt.* Demonstratum ergo est quomodo diuidatur quadrilaterum duorum laterum equidistantium á linea egrediente ab omni puncto extra figuram.

De diuisione eiusdem generis, qua quadrilaterorum per rectam transeuntem per punctum datum infra ipsum.


SIT quadrilaterum caput abscisum *abgd.*, cuius latera *ad.* et *bg.* sint equidistantia; et minus eorum sit *ad.* Et iaceat diuisum in duo equa á qualibet rectarum *al.* *dn.* *gf.* *bc.*, ut supra: sit primus punctus datus *e.* cadens infra triangulum *amd.*: copulabo siquidem rectam *em.*, et protraham eam in utramque partem in puncta *ih.* Dico, quadrilaterum *abgd.* diuisum esse in duo equa á linea *hi.*; quod sic probatur: trigona *hma.* et *mil.* sibi inuicem sunt equalia; quibus si addatur in comune quadrilaterum *abim.*, erit quadrilaterum *abih.* equale triangulo *abl.*, quod continet dimidium quadrilateri *abgd.* Simili quoque modo, si punctus datus ceciderit infra triangulum *nml.*, erit operandum, videlicet copulabimus ipsum punctum cum puncto *m.*, et producemus ipsam lineam in utramque partem, et habebimus optatum. Et si datus punctus fuerit super aliquam ex predictis rectis *al.* *dn.* *gf.* *bc.*; ipsa namque erit recta transiens per ipsum punctum diuidens quadrilaterum *abgd.* in duo equa. Sed si punctus datus fuerit infra quadrilaterum *abnm.* et *dmlg.*, oportebit nos operari cum filis, videlicet ponam primum unum filum super puncta *db.*, et figam eum super punctum *d.*, et adhuc extendam aliud filum ex *n.* in *c.* figens ipsum super *n.*, et ducam ipsa fila equidistanter secando rectas *bn.* et *cd.*, donec sectiones sese respiciant per punctum datum, si possibile fuerit: et si hoc impossibile inuenietur, extendam rursus fila ex *a.* in *g.*, et ex *f.* in *l.*, et figam ea super puncta *al.*, et ducam ipsa equidistanter secando lineas *fa.* et *gl.*, donec sectiones respiciant se per punctum datum: quod etiam si fuerit impossibile, extendam rursus fila ab *c.* in *g.* et ab *f.* in *c.*, et figam ea super puncta *gf.*, et ducam ea equidistanter secando rectas *bf.* et *cg.*, donec sectiones respiciant se per punctum datum; quod sine dubio erit possibile: et tunc protrahatur recta per sectiones illas, et habebitur propositum: quod probabitur per ea que supra disimus (*sic*). Nunc satis dictum est de diuisione caput abscisarum in duas partes equales: modo qualiter diuidi debeant per inequalia in data proportione ostendere procuramus.

ADIACEAT rursus quadrilaterum *abgd.*, quod diuidi oporteat per rectam equidistantem basi sue in data proportione *ez.* ad *zi.* Latera quidem *ba.* et *gd.* á punctis *a.* et *d.* protrahantur: donec concurrant in *t.*; et ponam quadratum lineæ *tl.* ad qua-

"inter rectas ... copuletur recta" (fol. 80 verso, lin. 8-14; pag. 130, lin. 29 — pag. 131, lin. 5).




"eorum sit ... ipsum punctum" (fol. 80 verso, lin. 25-32 e 33; pag. 131, lin. 16-26).




fol. 81 recto.

que supra ... trigona .*tlm.* et » (fol. 81 recto, lin. 13-27; pag. 131, lin. 38 — pag. 132, lin. 9).



fol. 81 verso.

disiunctim et ... est enim » (fol. 81 verso, lin. 4-16; pag. 132, lin. 19-31).



quadratum linee ... ita trigonum » (fol. 81 verso, lin. 18, 19-29; pag. 132, lin. 33-43).



dratum linee .*at.* sicut .*zi.* ad .*ez.*; et sit quadratum linee .*ht.* ad quadratum linearum .*bt.* et .*tl.*, sicut .*ez.* ad .*ei.*; et per puncta .*lh.* equidistantes utrique rectarum .*hg.* et .*ad.* protraham rectas .*lm.* et .*hk.* Dico, quadrilaterum .*ag.* diuisum esse in proportione data numeri .*ez.* ad numerum .*zi.* á linea .*hk.*; quod sic probatur. Quoniam trigona .*tlm.* et .*tad.* similia sunt, erit sicut quadratum linee .*tl.* ad quadratum linee .*ta.*, ita trigonum .*tlm.* ad trigonum .*tad.*: est enim sicut .*zi.* numerus ad numerum .*ez.*, ita quadratum linee .*tl.* ad quadratum linee .*ta.*: per equale ergo erit sicut .*zi.* ad .*ez.*, ita trigonum .*tlm.* ad trigonum .*tad.*: coniunctim ergo erit sicut .*ei.* ad .*ez.*, ita trigona .*tlm.* et .*ead.* ad trigonum .*tad.*: permutatim ergo erit sicut .*ez.* ad .*ei.*, ita trigonum .*tad.* ad trigona .*tad.* et .*tlm.*: est enim sicut .*ez.* ad .*ei.*, ita quadratum linee .*ht.* ad quadrata linearum .*bt.* et .*tl.* Sed est sicut quadratum linee .*ht.* ad quadrata linearum .*bt.* et .*tl.*, ita trigonum .*thk.* ad trigona .*tbg.* et .*tlm.*: per equale ergo erit sicut .*ez.* ad .*ei.*, ita trigonum .*thk.* ad trigona .*tbg.* et .*tlm.* Sed trigono .*thk.* equalia sunt quadrilaterum .*ak.* et trigonum .*tad.* Similiter et trigonis .*tbg.* et .*tlm.* equalia sunt quadrilaterum .*ag.* et trigona .*tad.* et .*tlm.*: ergo est sicut .*ez.* ad .*ei.*, ita quadrilaterum .*ak.* cum trigono .*tad.* ad coniunctum ex quadrilatero .*ag.* et trigonis .*ead.* et .*tlm.* Sed sicut .*ez.* ad .*ei.*, ita fuit trigonum .*tad.* ad trigona .*tad.* et .*tlm.* Vnde proportio quadrilateri .*ak.* ad quadrilaterum .*ag.* est sicut .*ez.* ad .*ei.*: disiunctim et ergo erit sicut .*ez.* ad .*ei.*, ita quadrilaterum .*ak.* ad quadrilaterum .*hg.*, ut oportet: quod etiam ostendamus cum numeris. Sit latus .*ad.* 6. et .*ab.* 12., et .*bg.* 13., et .*dg.* 15.; et sit rectus angulus qui ad .*b.*; quare productis .*ba.* et .*gd.* in .*t.*, erit .*at.* 8., et .*td.* 10.: quare tota .*tb.* erit .20.; et sit proportio .*ez.* ad .*ei.*, sicut .4. ad .3.; erit ergo quadratum recte .*tb.* 400., et quadratum linee .*tl.* erit .48.; quia .*iz.* ex .*ze.* est $\frac{2}{3}$; unde tres quarte de .64., scilicet quadrati linee .*ta.* sunt .48.; quibus insimul iunctis erunt .448.; de quibus si acceperimus proportionem .*ez.* ad .*ei.*, scilicet quatuor septimas, uenient .256. pro quadrato linee .*th.*: ergo .*th.* est .16: et quia recta .*th.* dupla est ex .*ta.*, erit ergo .*hk.* ex .*ad.* similiter dupla; ergo .*hk.* est .12. Vnde si coniunxerimus .*kh.* cum .*ad.*, et coniunctum multiplicauerimus per dimidium catheti .*ah.*, quod est .4., uenient 72. pro area quadrilateri .*ak.*: item multiplicato dimidio ex .*bh.*, quod est .2. in coniunctum ex .*bg.* et .*hk.*, scilicet in .27., uenient .54. pro area quadrilateri .*hg.*: est enim proportio de 72 ad 54. sicut .4. ad .3., que est proportio data ex .*ez.* ad .*zi.* Aliter proutius adiaceat .*ms.* ad .*ls.* sicut proportio quadrati linee .*tb.* ad quadratum linee .*ta.*; et diuidatur .*ml.* super .*n.*, et sit .*ln.* ad .*nm.* proportio data; et accipiatur quadratum linee .*th.* ad quadratum linee .*tb.* sicut .*ns.* ad .*sm.*; et protra-hatur .*hk.* equidistans basi .*bg.*: probatur rursus, quadrilaterum .*ak.* ad quadrilaterum .*hg.* esse sicut .*ln.* ad .*nm.*; quoniam est sicut quadratum linee .*tb.* ad quadratum linee .*ta.*, ita trigonum .*tbg.* ad trigonum .*tad.*; et est proportio .*ms.* ad .*ls.* sicut quadratum linee .*tb.* ad quadratum linee .*ta.*: quare erit sicut .*ms.* ad .*ls.*, ita trigonum .*tbg.* ad trigonum .*tag.* Rursus quia est sicut .*ms.* ad .*sn.*, ita quadratum linee .*tb.* ad quadratum linee .*th.*: est enim sicut quadratum linee .*tb.* ad quadratum linee .*ht.*, ita trigonum .*tbg.* ad trigonum .*thk.*: erit etiam et sicut .*ms.* ad .*ns.*, ita trigonum .*tbg.* ad trigonum .*thk.*: conuersim ergo sicut .*sm.* ad .*nm.*; ita trigonum .*tbg.* ad quadrilaterum .*hg.*; fuit sicut .*ms.* ad .*ls.*, ita trigonum .*tbg.*


ad trigonum *.tad.* Vnde si permutauerimus, erit sicut numerus *.ms.* ad trigonum *.tbg.*, ita numerus *.ls.* ad trigonum *.tad.*, et numerus *.ns.* ad trigonum *.thk.*: ergo numeri *.ls.*, et *.ns.* ad trigonum *.tad.*, et *.thk.* sunt in una proportione; in ea uidelicet quam habet numerus *.ms.* ad superficiem *.tbg.*, in qua etiam est numerus *.nm.* ad quadrilaterum *.hg.*: quare disiunctim erit sicut *.sl.* ad *.ln.*, ita trigonum *.tad.* ad quadrilaterum *.ak.*; et erit etiam sicut *.sn.* ad *.nm.*, ita quadrilaterum *.ak.* ad quadrilaterum *.hg.*: ergo diuisum est quadrilaterum *.ag.* datum per lineam *.hk.* equidistantem basi *.bg.* in proportione etiam data numeri *.ln.* ad numerum *.nm.*; quod oportebat facere: quod etiam operemur cum numeris: est enim, ut diximus superius, quadratum linee *.tb.* 400, et linee *.ta.* 64, quorum proportio in minimis est sicut .25 ad .4: quare ponam *.ms.* 25., et *.ls.* 4., remanebit *.ml.* 21.; quibus diuisis in proportione data, scilicet in ea quam habet .4. ad .3. super punctum *.n.*, erit *.ln.* 12. et *.nm.* 9: quare si acceperimus quadratum linee *.th.* ad quadratum linee *.tb.*, sicut *.sn.* ad *.sm.*, hoc est sicut .16 ad .25., inueniemus rursus, quadratum linee *.th.* esse .256.; quare *.th.* erit .16., sicut superius inuenimus. Vel aliter quadratum linee *.ta.* auferam ex quadrato linee *.tb.*, remanent .336.; super quatuor septimas quorum, scilicet super .192, si addiderimus quadratum linee *.ta.*, erunt similiter .256. pro quadrato linee *.th.* Er si per rectam protractam super duo latera equidistantia quadrilaterum caput abscisum in data aliqua proportione diuidere uis, ipsa latera in eadem proportione diuide, et in puncta diuisionum lineam protrahe. Verbi gratia: uolumus quadrilaterum *.abgd.* super latera *.ad.* et *.bg.* equidistantia in data proportione *.ez.* ad *.zi.* secare. Ponam inter *.ad.* et *.bg.* puncta *.tk.*, et sit sicut *.ez.* ad *.zi.*, ita *.at.* ad *.td.*, et *.bk.* ad *.kg.*; et copulabo *.tk.* Dico, quadrilaterum *.ak.* ad quadrilaterum *.tg.* esse sicut *.ez.* ad *.zi.*; quod sic probatur: producam á puncto *.t.* in punctis *.bg.* rectas *.tb.* et *.tg.*, et erunt trigona *.tbk.* et *.tkg.* sub altitudine una; quare est sicut *.bk.* ad *.kg.*, ita trigonum *.tbk.* ad trigonum *.tkg.* Rursus quia trigona *.bat.* et *.gtd.* sunt sub altitudine una, cum sint inter duas equidistantes, erit sicut *.at.* ad *.td.*, hoc est *.bk.* ad *.kg.*, ita trigonum *.bat.* ad trigonum *.gtd.*: ergo sicut *.bk.* ad *.kg.*, hoc est sicut *.ez.* ad *.zi.*, ita quadrilaterum *.ak.* ad quadrilaterum *.tg.*: diuisum est ergo quadrilaterum *.abgd.* in proportione data á recta *.tk.* protracta super latera equidistantia; quod oportebat facere. Et si diuisionem in eadem proportione ab angulis *.a.* et *.d.* habere uolumus, ponemus super latus *.bg.* puncta *.nl.*; et iaceat recta *.kl.* equalis recte *.ta.*, et recta *.gn.* equalis recte *.bl.*, ut in hac alia ostenditur figura; et copulabimus rectas *.dn.* et *.al.*; et probabitur per ea que dicta sunt, trigonum *.abl.* equale esse quadrilatero *.ak.*: quare erit sicut *.ez.* ad *.zi.*, ita trigonum *.abl.* ad quadrilaterum *.algd.* Rursus quia trigona *.abl.* et *.dgn.* sunt super equas bases *.bl.* et *.gn.*; et in eisdem equidistantibus *.ad.* et *.bg.* erunt sibi inuicem equalia. Quare trigonum *.dgn.* equale est quadrilatero *.abkt.*; quare residuum, scilicet quadrilaterum *.nbad.*, equale erit quadrilatero *.tkgd.* Vnde erit sicut quadrilaterum *.abkt.* ad quadrilaterum *.tkgd.*, hoc est sicut *.ez.* ad *.zi.*, ita *.dgn.* trigonum ad quadrilaterum *.nbad.*: diuisum est ergo quadrilaterum *.abgd.* ab angulis *.a.* et *.d.* in data proportione *.ez.* ad *.zi.*; quod oportebat facere. Et si ab aliquo angulorum *.b.* et *.g.* rectam protrahere uis diuidentem quadrilaterum *.abgd.* in ea proportione quam habet *.ez.* ad *.zi.*, hoc dupliciter facere potes: ut si ab angulo *.b.* hoc

fol. 82 recto.


« diuidere uis lineam » (fol. 82 recto, lin. 13, 14 e 15; pag. 133, lin. 19 e 20).



« protrahe. Verbi hoc est .bk. » (fol. 82 recto, lin. 16-24; pag. 133, lin. 20-27).




« equidistantia quadrilatero » (fol. 82 recto, lin. 26, 27-35; pag. 133, lin. 30-33).




fol. 82 r.

potes, ut ... ponam equidistantem * (fol. 82 verso, lin. 6-12 e 13; pag. 133, lin. 43 — pag. 134, lin. 7).



sue basi ... sicut .zi. * (fol. 82 verso, lin. 20-23; pag. 134, lin. 14 e 15-27).



fol. 83 recto.

facere uolueris. Signabis punctum .n. ad quem prouenit ab angulo .d. diuisio supradicta; et ponas superficiem .bg. in .gc. equalem superfici ei .dg. in .gn.; et copulabis rectam .bc.; uel dyametro protracto ex .b. in .d. equidistantem rectam protrahe ex .n. in .c., et copulabitur .bc., ut diximus. Similiter faciamus si ab angulo .g. operari uolumus, scilicet intelligam punctum .l., ad quem prouenit diuisio supradicta, ab angulo .a.; et ponam superficiem .gb. in .bf. equalem superfici ei .ab. in .bl.; uel dyametro protracto ex .a. in .g. ponam equidistantem ex .l. in .f., et copulabo .gf., que diuidet quadrilaterum .abgd. in proportione data; quia erit sicut .ez. ad .zi., ita trigonum .fbg. ad quadrilaterum .afgd., nec non et triangulus .bgc. ad quadrilaterum .abcd. erit sicut .ez. ad .zi.; que probabuntur per ea que dicta sunt; nec non et diuidemus ipsum quadrilaterum ab omni puncto dato super aliquod laterum ipsius, et etiam ab omni puncto dato infra, uel extra.

Incipit de diuisione quadrilaterorum in plures partes.

Si uero aliquod caput ascisum in tres partes equales a rectis equidistantibus sue basi diuidere uis, ut quadrilaterum .abgd., cuius latera .ad. et .bg. sint equidistantia, reliqua uero latera .ab. et .dg. a punctis .a.d. producam, donec concurrant in puncto .e.; et adiaceat recta .zti.; et sit proportio .zi. ad .it. sicut proportio quadrati lineę .eb. ad quadratum .ae.; et diuidam .tz. in tres equas sectiones, que sint .tk. kl. lz., et ponam quadratum lineę .em. ad quadratum lineę .eb. sicut .ki. ad .zi. Rursus ponam quadratum lineę .en. ad quadratum lineę .eb. sicut .li. ad .zi., et per puncta .m.n. equidistantes basi .bg. producam rectas .mo. np.. Dico, quadrilaterum .ag. diuisum esse in tria equa, que sunt quadrilatera .ao. mp. ng.; quod sic probatur. Est enim, ut diximus, sicut quadratum lineę .be. ad quadratum lineę .ae., ita trigonum .ebg. ad trigonum .ead.; quare erit sicut .zi. ad .it., ita trigonum .ebg. ad trigonum .ead. Item quia est sicut .zi. ad .ik., ita quadratum lineę .be. ad quadratum lineę .me. Sed sicut quadratum lineę .be. ad quadratum lineę .me., ita trigonum .ebg. ad trigonum .emo.; ergo sicut .zi. ad .ik., ita trigonum .ebg. ad trigonum .emo. Erit etiam sicut .zi. ad .il., ita trigonum .ebg. ad trigonum .enp.; disiunctim erit sicut .it. ad .tk., ita trigonum .ead. ad quadrilaterum .ao.; erit etiam sicut .tk. ad .kl., ita quadrilaterum .ao. ad quadrilaterum .mp.; est enim .tk. equalis .kl.; quare et .ao. quadrilaterum quadrilatero .mp. est equale. Rursus erit sicut .kl. ad .lz., ita quadrilaterum .mp. ad quadrilaterum .ng.; est enim .kl. equalis .lz.; et .pm. quadrilaterum equale erit quadrilatero .ng.; equalia ergo sunt sibi inuicem quadrilatera .ao. mp. ng., ut prediximus; et ut hec operentur cum numeris; .ad. sit .6., et .bg. 15., et .ab. 12., et .dg. 15.; et sit rectus angulus qui ad .b.; quare tota .eb. erit .20., cuius quadratum ad quadratum lineę .ea. est sicut 25. ad .4.; ponam .zi. 25., et .ti. 4., remanet .zt. 21.; quibus in tres equas partes diuisis, erunt in una quaque partium .tk. kl. lz. 7; quare .ik. est .11.; multiplicabo ergo .11. per .400; et diuidam per .25.; uel uigesimam quintam partem quadrati lineę .eb., que est .16., extendam per .11., uenient .176. pro quadrato lineę .em. Rursus extendam .il., scilicet .18. per 16, que sunt $\frac{4}{25}$ quadrati lineę .eb., uenient .288. pro quadrato lineę .en.; ergo .am. est radix de .176., minus .8., cum .ea. sit .8.; et linea .mn. est radix de .288., minus radice de .176.; linea uero .nb. est .20, minus radice de .288.; et quia est sicut quadra-


tum lineę .ea. ad quadratum lineę .ad., hoc est sicut .16. ad .9., ita quadratum lineę .em. ad quadratum lineę .mo.: si multiplicauerimus .176 per 9, et diuiserimus per .16.; aut si $\frac{4}{16}$ de .176., que est .11., multiplicauerimus per .9., uenient utique .99. pro quadrato lineę .mo.

Rursus si $\frac{1}{16}$ de .288., scilicet ex quadrato lineę .en., que est .18, multiplicauerimus per .9., uenient .162. pro quadrato lineę .np.: quibus inuentis, si embadum quadrilaterorum .ao. et .mp. et .ng., secundum ea que docuimus, inuestigauerimus; ipsa quadrilatera sibi inuicem equalia esse reperies.


Aliter cum quadrato lineę .eb. adde duplum quadrati lineę .ea., et inuenies, tertiam partem ipsorum esse quadratum lineę .em. Similiter si duplum quadrati lineę .be. addiderimus cum quadrato lineę .ea., tertia eius quod prouenerit erit quadratum lineę .em.: uel extractis .64. de .400., scilicet quadratum lineę .ea. ex quadrato lineę .eb., remanebunt .336.; quorum tertia, scilicet .112., addita super .64., ueniunt .176. pro quadrato lineę .em.: quibus etiam additis .112., reddunt similiter .288. pro quadrato lineę .en.; quorum probatio prouenit ex his que dixi superius, cum docuimus diuidere proportionaliter quadrilatera caput abscisa. Et si latus .ab. fuerit secus uiam; et uoluerit unusquisque trium consortium, ut mos est, tertiam ipsius lateris habere. Diuidam latus .ab. in tres equas partes | super puncta .il.; et copulabo rectas .iolp.; et per punctum .m. protraham rectam .mh. equidistantem lineę .io.; et per punctum .n. equidistantem recte .lp. protraham rectam .nq.; et copulabo rectas .ih. lq.; et sic diuidetur quadrilaterum .abgd. in tres equas partes a lineis .ih. et .nq., que sunt quadrilatera .aih. et .ilqh. et .lbgq.; quod sic probatur. Quoniam quadrilaterum .amod. est tertia pars quadrilateri .abgd., si ex eo auferatur trigonum .oim., et restauretur ei trigonum .oih., erit quadrilaterum .aih. equale quadrilatero .amod.: eodemque modo probabuntur ceterę diuisiones. Et Si latera .ad. et .bg. equidistantia secauerimus in tres equas sectiones: et in eis copulauerimus rectas; diuidetur utique quadrilaterum in tres equas sectiones. Verbi gratia: adiaceat caput abscisum .abgd.; et diuidantur latera .ad. et .bg. in tria equa super puncta .ez. it.; et copulentur recte .ei. zt. Dico, quadrilaterum .abgd. sectum esse in tres equas sectiones, que sunt quadrilatera .al. et .zg.: habent enim bases et capita sibi inuicem equalia; et sunt sub altitudine una: uel quia est sicut .ae. ad .ed., ita .bi. ad .ig.; erunt ergo in eadem proportione quadrilaterum .ai. ad quadrilaterum .eg.: et si coniunxerimus, erit sicut .bi. ad .bg., ita quadrilaterum .ai. ad quadrilaterum .ag.: tertia enim pars est .bi. ex .bg., tertia quoque erit et quadrilaterum .ai. ex quadrilatero .ag. Rursus quia est sicut .ae. ad .ez., ita .bi. ad .it.; et est equalis .ae. ex .ez., et .bi. ex .it.; quare et quadrilaterum .ai. ex quadrilatero .et. est equale; tertia ergo pars est .ai. ex .ag. quadrilatero; tertia quoque erit et .et. quadrilaterum ex quadrilatero .ag.: residuum uero .zg. erit reliqua tertia pars. Et si tertiam partem quadrilateri .ag. ab aliquo angulorum .a. et .d. secare uolumus, diuidemus rectas .ei. et .zt. in duo equa super puncta .km.; et copulabimus rectas .ak. et .dm.; et perducemus eas in puncta .ln.; et erit unumquodque trigonorum .abl. et .dgn. tertia pars quadrilateri .abgd. Quod sic probatur. Quia recta .ek. equalis est recte .ki., erunt et trigona .ake. et .ikl. sibi inuicem equalia et similia, cum equidistantes sint bases .ae. et .il.: quare si in co-

fol. 83 verso.


super puncta ... modo probabuntur (fol. 83 verso, lin. 1-8; pag. 135, lin. 18-25).




super puncta ... quadrilaterum .ai. (fol. 83 verso, lin. 13-21; pag. 135, lin. 28-36).



quadrilateri .ag. ag. Similiter
(fol. 83 verso, lin. 24 e 25-33; pag.
135, lin. 38 — pag. 136, lin. 3).



equa. Et est equale » (fol. 84
recto, lin. 8-10; pag. 136, lin. 8-13).



fol. 84 verso.


mune addatur quadrilaterum .abik., erit triangulus .abl. equalis quadrilatero .eb. Sed quadrilaterum .eb. est tertia pars quadrilateri .ag.; quare trigonum .abl. est tertia pars quadrilateri .ag. Similiter ostendetur, et trigonum .dgn. equale esse quadrilatero .zg., quod est tertia pars totius .ag.: resecato quidem trigono .abl. ex quadrilatero fol. 84 recto. .abgd., remanebit quadrilatero .algd. capudascisum: quod si diuisum fuerit per quemcumque modum ex supradictis, reddet quadrilaterum .abgd. diuisum in tres equas sectiones. Similiter si auferatur trigonum .dgn. ex quadrilatero .abgd., remanebit quadrilaterum .abnd. ad diuidendum in duo equa. Et si per lineam protractam á puncto .b. tertiam ex quadrilatero .ag. abscidere uolumus, protraham primum lineam .dn. abscidentem á quadrilatero .ag. tertiam eius, que est trigonum .agn.; et protraham dyametrum .bd., et ei equidistantem ponam lineam, .ne.; et copulabo rectam .bc. Dico quod recta .bc. abscidit á quadrilatero .ag. tertiam eius, que est trigonum .cgb.: quia si super trigonum .cgn. addatur trigonum .cgn., quod est equale trigono .cnd., erit trigonum .cgb. equale trigono .dgn.; ergo trigonum .cgb. est tertia quadrilateri .ag. Aliter quia trigona .abd. et .gbd. sunt sub una altitudine: sub ea uidelicet que cadit orthogonaliter inter equidistantem .ad. et .bg.; erunt ideo ad inuicem sicut bases: quare est sicut .bg. ad .ad., ita trigonum .bgd. ad trigonum .abd.: coniunctim ergo sicut .bg. ad coniunctum ex .bgad., ita trigonum .bgd. ad quadrilaterum .ag.: adiaceat quidem recta .ge. equalis recte .ad.; erunt ergo sicut .bg. ad .be., ita trigonum .dbg. ad quadrilaterum .ag.: et abscidatur ex tota .be. recta .bz., que sit tertia ex .be.; et iaceat recta .gc. ad rectam .gd. sicut .bz. ad .bg., et copuletur recta .bc. Dico, trigonum .bgc. esse tertiam quadrilateri .ag.

Verbi gratia: trigona quidem .bgc. et .bgd. ad se inuicem sunt sicut bases; erit ergo sicut .gc. ad .gd., hoc est sicut .bz. ad .bg., ita trigonum .bgc. ad trigonum .bgd. Est enim et sicut .bg. ad .be., ita trigonum .bgd. ad quadrilaterum .ag.: erit ergo sicut .bz. ad .be., ita trigonum .bgc. ad quadrilaterum .ag.: est enim .bz. ex .be. tertia pars: quare et trigonum .bgc. erit tertia pars quadrilateri .ag., ut predixi. Quod etiam demonstramus cum numeris: sit .ad. 6., et .bg. 24.; et unaqueque rectarum .ab. et .dg. sit .15.: coniunctis quidem 24. cum .6. erunt .30.: ergo sicut .24. est ad .30., hoc est sicut .bg. ad .be., ita trigonum .bgd. ad quadrilaterum .ag.; et est sicut .10. ad .30., ita tertia pars quadrilateri .abgd. est ad quadrilaterum .ag.: quare si proportionauerimus .10. cum .24., scilicet .bz. cum .bg., uenient $\frac{5}{12}$; quibus acceptis ex tota linea .dg. uenient $\frac{1}{4}$ 6 pro linea .gc.: quare si copulauerimus rectam .bc., erit proportio trianguli .bgc. ad triangulum .bgd. sicut .bc. ad .gd. Sed .gc. ex .gd. est $\frac{5}{12}$; quare trigonum .bgc. est $\frac{5}{12}$ ex trigono .bgd.; quod trigonum est $\frac{24}{30}$, hoc est $\frac{4}{5}$ ex quadrilatero .ag. Ergo trigonum .bgc. est $\frac{5}{12}$ ex quatuor punctis ex toto quadrilatero .ag.: ergo trigonum .bgc. est tertia totius quadrilateri .ag., cum $\frac{5}{12}$ ex $\frac{4}{5}$ cuiusque rei sint tertia ipsius. Simili quoque modo si protraxerimus dyametrum .ag., erit proportio trigoni .abg. ad quadrilaterum .db., sicut .bg. ad coniunctum ex .bg. et .ad. rectis; de qua proportione si acceperimus proportionem quam habet tertia integri ad ipsam proportionem, inuenies accipere debere $\frac{5}{12}$ ex linea .ba.; que $\frac{5}{12}$ sit linea .bf.; et copulabitur recta .gf., et erit trigonum .fbg. tertia pars quadrilateri .bd. Quibus ita ostensis demonstrabimus qualiter diuidantur in duo equa residua trigonorum .cgb. et .fbg., sci-


licet quadrilatera *abcd.* et *afgd.*, cum tractabimus de diuisione quadrilaterorum diuersorum laterum. Et postquam perduximus diuisionem trium equalium portionum super tertias partes laterum, et super unumquemque angulorum poterimus, per ea que dicta sunt superius, á similibus quadrilateribus tertiam partem, uel quamcumque partem uoluerimus abscidere per lineam egredientem á puncto dato extra uel infra figuram: uel super unum ex lateribus eius; vnde qualiter proportionaliter in tres diuersas partes diuidi debeant, demonstramus.

ADIACEAT RURSUS quadrilaterum *abgd.* caput abscisum; et data proportio sit ; uolumus ergo quadrilaterum *ag.* diuidere in tres partes á lineis equidistantibus sue basi, quarum prima ad secundam sit sicut ad *zi.*, et secunda ad tertiam sicut *zi.* ad *it.* Perducantur primum recte *ba.* et *gd.* in puncto *k.*; et sit proportio quadrati lineę *bk.* ad quadratum lineę *ak.* sicut *tl.* ad *el.* Deinde ponam quadratum lineę *bk.* ad quadratum lineę *km.* sicut *tl.* ad *lz.* Post hec ponam quadratum lineę *bk.* ad quadratum lineę *kn.* sicut *tl.* ad *il.*; et per puncta *m.n.* protraham rectas *mo. np.* equidistantes basi *bg.*; et inuenies, per ea que dicta sunt superius, quadrilaterum *ao.* ad quadrilaterum *mp.* esse sicut ad *zi.*; et quadrilaterum *mp.* ad quadrilaterum *ng.* esse sicut *zi.* ad *it.* Que stiam demonstrantur cum numeris. Sint latera quadrilateri *abgd.* ut dictum est in suprascripta figura; et extrahatur *ad.* ex *bg.*, scilicet *.6.* de *.24.*, remanebunt *.18.*; et erit sicut *.18.* ad *.6.*, ita *ba.* ad *ak.*; quare *ak.* est *.5.*: tota uero *bk.* est *.20.*, cuius quadratum ad quadratum lineę *ak.* est sicut *.16.* ad *.1.* Quare ponam, lineam *tl.* esse *.16.*; et *el.* ponam *.1.*, remanebunt *.15.* pro *et.*, que iacet diuisa in proportionibus datis Quare ponamus *.4.*, et *zi.* *.5.*, et *it.* *.6.*; et erit sicut *.4.* ad *.5.*, ita ad *zi.*; et sicut *.5.* ad *.6.*, ita *zi.* ad *it.*; et hec sint proportionibus date: et quia est sicut quadratum lineę *bk.* ad quadratum lineę *mk.*, ita *tl.* ad *lz.*: fuit etiam sicut quadratum lineę *bk.* ad quadratum lineę *ak.*, ita *tl.* ad *el.*: permutatim ergo sicut *le.* ad *lz.*, ita quadratum lineę *ak.* ad quadratum lineę *mk.*: est enim *zl.* quintuplum ex *el.*: quare quadratum lineę *mk.* est quintuplum quadrati lineę *ak.*; ergo quadratum lineę *mk.* est *.125.* Similiter erit sicut *il.* ad *el.*, hoc *.10.* ad *.1.*, ita quadratum lineę *nk.* est ad quadratum lineę *ak.*; ergo quadratum lineę *nk.* est *.250.* Et quadratum lineę *np.* est similiter decuplum ex quadrato lineę *ad.*: quare quadratum lineę *np.* est *.360.* Item quia quadratum lineę *mk.* est quintuplum quadrati *ak.*, erit et *mo.* quadratum quintuplum quadrati *ad.*; ergo quadratum lineę *mo.* est *180.* Inuenies etiam, cathetum *ks.* esse *.16.*; cum de quadrato lineę *bk.* auferatur quadratum lineę *bs.*, remaneat *.256.* pro quadrato lineę *ks.*: et quia *ka.* est quarta ex *bk.*, et *fk.* erit quarta ex *ks.*; quare *kf.* est *.4.*, cuius quadratum est *.16.*; et quintuplum eius, scilicet *.80.*, est quadratum catheti *kh.*, cuius duplum est quadratum lineę *kr.*, scilicet *160.* Vnde si multiplicauerimus *kh.* dimidium in *mo.*, ueniet pro embado trianguli *kmo.* radix de *3600.*; quare trigonum *kmo.* est *60.*: de quibus si auferatur trigonum *kad.*, quod est *12.*, remanebunt *.48.* pro quadrilatero *ao.* Rursus si multiplicauerimus quartam quadrati *kr.*, scilicet *40.*, per quadratum lineę *np.*, scilicet per *360.*, uenient *.14400.*, quorum radix, scilicet *.120.*, habentur pro embado trianguli *knp.*; de quo si auferamus triangulum *kmo.*, qui est *.60.*, remanebunt *.60.* pro embado quadrilateri *mp.*

* que dicta sicut *tl.* s (fol. 84 verso, lin. 13-21; pag. 137, lin. 3-12).




* ad *el.* sicut *.18.* s (fol. 84 verso, lin. 22-29; pag. 137, lin. 12-19).




fol. 85 recto.

quod diuidere primum dyametrum » (fol. 85 recto, lin. ultima, e margine inferiore; pag. 138, lin. 11-12).




fol. 85 verso.


est ergo sic probatur » (fol. 85 verso, lin. 6-12 e 13; pag. 138, lin. 17-22).



duo equa sic probatur » (fol. 85 verso, lin. 22-28; pag. 138, lin. 29-35).



ut in quarta abcd. diuisum » (fol. 85 verso, lin. ultima, e margine inferiore; pag. 138, lin. 40-41).



fol. 86 recto.

Residuum uero quod restat ex toto quadrilatero .ag. , scilicet .72., habentur pro quadrilatero .ng. Est enim proportio de .48. ad .60. sicut .4. ad .5., hoc est sicut .ez. ad .zi.; et proportio de .60. ad .72. est sicut .5. ad .6., hoc est sicut .zi. ad .it., ut oportet. Possumus enim reducere cum equidistantibus has diuisiones á tribus punctis uilibet datis super lineam .ba.: et si diuiderimus lineam .ad. in datis quibuslibet proportionibus, et in eisdem diuiderimus latus .bg.; et in puncta ipsarum proportionum lineas copulauerimus, rederetur utique quadrilaterum .abgd. in ipsis proportionibus diuisum; que diuisiones reducemus etiam in puncta angulorum per ea que dicta sunt.

Incipit de diuisione quadrilaterorum diuersilaterum.

PRIMUM quidem demonstrare uolo quo modo diuidatur quadrilaterum diuersilaterum in duo equa ab angulo dato. Esto quadrilaterum .abcd., quod diuidere uolo in duo equa ab .a. angulo dato: protraham primum dyametrum | .bd. subtendentem angulum .bad.; et secabo ipsum á dyametro .ac. super punctum .e.; recte quidem .be. et .ed. aut sunt equales, aut non. Sint primum equales: et quoniam equalis est recta .be. recte .ed., equale erit trigonum .abe. trigono .ade., nec non et trigonum .ebc. trigono .ecd. est equale; quare totum trigonum .abc. toti trigono .acd. iacet equale. Diuisum est ergo quadrilaterum .abcd. in duo equa á dyametro .ac. egrediente ab angulo dato; quod oportebat facere. Sed non sit recta .be. equalis recte .ed. Sed iaceat .bz. equalis recte .zd.; et protraham rectam .zi. equidistantem dyametro .ac., ut in hac secunda figura cernitur; et copulabo rectam .ai. Dico iterum, quadrilaterum .abcd. Diuisum esse in duas equas portiones á linea .ai. egrediente ab angulo .a. dato, que sunt trigonum .abi., et quadrilaterum .aicd.; quod sic probatur: copulabo rectas .az. et .cz., et erunt trigona .azd. et .dzc. equalia trigonis .abz. et .bzc.; quare quadrilaterum .azcd. dimidium est quadrilateri .abcd.; et quia trigona .aci. et .acz. sunt super basim .ae.; et inter equidistantes .ac. et .zi. sibi inuicem sunt equalia; comuniter si addatur trigonum .acd., erit quadrilaterum .aicd. equale quadrilatero .azcd. Sed quadrilaterum .azcd. dimidium est quadrilateri .abcd.; ergo et quadrilaterum .aicd. dimidium est quadrilateri .abcd., ut oportet. Rvrsus si á puncto dato super unum ex lateribus quadrilaterum aliquod in duo equa diuidere uis, ut quadrilaterum .ac., quod diuidere uolo á puncto dato .e. super latus .ad. Diuidam primum quadrilaterum .ac. in duo equa ab angulo .d.; et sit recta .dt. diuidens ipsum; et copulabo .et.: recta quidem .et. aut equidistans est recte .dc., aut non. Sint primum recte .et. et .cd. equidistantes, ut in tertia ponitur figura; et copuletur recta .ec. Dico siquidem, quadrilaterum .ac. in duo equa diuisum esse á linea .ec. egrediente á puncto dato .e. Quod sic probatur. Quia equidistantes sunt recte .et. et .cd., erunt et trigona .ecd. et .tcd. sibi inuicem equalia. Sed trigonum .tcd. dimidium est quadrilateri .ac.; quare et trigonum .ecd. dimidium est quadrilateri .ac.: diuisum est ergo quadrilaterum .ac. in duo equa á dato puncto .e.; quod oportebat facere. Sed non sit equidistans recta .et. recte .dc.

Ponam rectam .dz. equidistantem recte .et.; et copulabo rectam .ez., ut in quarta figura demonstratur; et erit quadrilaterum .abcd. diuisum | in duo equa á linea .ez. Quod sic probatur. Sunt enim trigona .dze. et .dzt. sibi inuicem equalia, cum sint super eandem basim, et in eisdem equidistantibus; quibus si addatur in comune tri-


gonum $.dcz.$, erunt quadrilaterum $.ezcd.$ equale triangulo $.dct.$, scilicet dimidio totius quadrilateri $.ac.$ Et notandum, quod si dyameter $.bd.$ diuidat quadrilaterum $.ac.$ in duo equa, peruenient similiter ea que diximus in his duabus figuris. Sed si diuisio ceciderit super latus $.ab.$, ut recta $.di.$, que sit diuidens quadrilaterum $.abcd.$ in duo equa, aliter operari oportet. Diuidam quadrilaterum $.ac.$ ab angulo $.b.$ cum recta $.bk.$; et tunc si $.k.$ fuerit datus punctus super latus $.ad.$, á quo egredi oporteat recta diuidens quadrilaterum $.ac.$ in duo equa, recta erit ipsa linea $.kb.$ Sed si $.k.$ non fuerit datus punctus, erit tunc datus punctus inter $.k.$ et $.d.$, aut inter $.k.$ et $.a.$: sit primum datus punctus $.e.$ inter $.dk.$; et copuletur recta $.be.$; et per punctum $.k.$ protraham rectam $.kl.$ equidistantem recte $.eb.$, et copulabitur recta $.el.$, que diuidet quadrilaterum $.ac.$ in duo equa; et probabitur ordine supradicto.

Rursus sit datus punctus $.e.$ inter $.a.$ et $.k.$, copulabitur similiter recta $.eb.$; et per punctum $.k.$ ducatur equidistans recta $.km.$, et copulabitur recta $.em.$, que erit diuidens quadrilaterum $.ac.$ in duas sectiones equales, que sunt quadrilatera $.am.$ et $.ec.$, ut in sexta patet figura: quod etiam probabitur ordine supradicto. Ad Signabo quidem per modum superius demonstratum quomodo diuidantur diuersilatera quadrilatera á puncto dato super unum ex lateribus ipsius. Esto quadrilaterum $.abcd.$; et datus punctus sit $.e.$ cadens primum super dimidium lateris $.ab.$; et ducam á puncto $.d.$ rectam $.dz.$ equidistantem recte $.ab.$; et diuidam eam in duo equa super punctum $.i.$; et copulabo rectas $.ei.$ et $.ci.$ et $.ec.$; et ducam rectam $.it.$ equidistantem recte $.ec.$; et copulabo rectam $.et.$; et erit quadrilaterum $.ac.$ in duo equa diuisum á linea $.et.$ Quod sic probatur. Quadrilaterum itaque $.az.$ est duorum laterum equidistantium; et linea $.ei.$ secat equidistantia latera eius, que sunt $.ab.$ et $.dz.$ in duo equa; quare quadrilaterum $.ez.$ est dimidium quadrilateri $.az.$ Similiter quia bases $.zi.$ et $.id.$ sibi inuicem equales sunt, erunt trigona $.czi.$ et $.cid.$ sibi inuicem equalia; quare trigonum $.ciz.$ dimidium est trigoni $.cdz.$: fuit etiam quadrilaterum $.ez.$ dimidium quadrilateri $.az.$; ergo quadrilaterum $.ebci.$ dimidium quadrilateri est $.ac.$ Sunt enim et trigona $.eci.$ et $.ect.$ sibi inuicem equalia; quibus si addatur in comune triangulum $.ebc.$, erit quadrilaterum $.ebct.$ equale quadrilatero $.ebci.$ Sed quadrilaterum $.ebci.$ dimidium est quadrilateri $.ec.$; quare et quadrilaterum $.bt.$ dimidium est quadrilateri $.ec.$; quare quadrilaterum $.bt.$ dimidium est quadrilateri $.ac.$, ut oportet. Quibus ita explicatis poterimus diuidere in duo equa omne quadrilaterum ab omni puncto dato super aliquod ex lateribus ipsius: et si punctus datus fuerit extra uel intus, per quod linea egredi ualeat, que diuidat quadrilaterum in duo equa, poterimus hoc cum operatione filorum subtiliter operari.


Demonstratio qualiter abscidatur á quadrilatero diuersilatero quantacumque pars data ab angulo dato.

Esto rursus quadrilaterum $.abcd.$, de quo uolo ab angulo $.d.$ abscidere datam partem, que sit tertia. Subtendam quidem angulo $.d.$ dyametrum $.ac.$, et secabo ipsum cum dyametro $.db.$ super punctum $.e.$; recta quidem $.ce.$ aut tertia pars est dyametri $.ac.$, aut non. Sit primum $.ec.$ tertia pars ex $.ac.$; abscidet utique dyameter $.bd.$ tertiam partem ex quadrilatero $.ac.$, que est trigonum $.bcd.$ Quod sic probabitur. Quia trigona $.dce.$ et $.dca.$ sunt sub una altitudine, erunt adinuicem sicut bases $.ce.$ ad


* quadrilaterum $.abcd.$... et per punctum * (fol. 86 recto, lin. 8, 9-13; pag. 139, lin. 5-9).



* Rursus sit ... datus punctus * (fol. 86 recto, lin. 16-22; pag. 139, lin. 12-18).




* si addatur ... $.ebct.$ equale * (fol. 86 recto, lin. ultima, e margine inferiore; pag. 139, lin. 23 e 29).




fol. 86 verso.


* tertia. Subtendam ... ad quadrilaterum * (fol. 86 verso, lin. 11-17 e 18; pag. 139, lin. 39 — pag. 140, lin. 2).



ex quadrilatero scilicet quadrilatero (fol. 86 verso, lin. 19-26; pag. 140, lin. 3-10).




fbcd. Er si trigonum .ecd. (fol. 86 verso, lin. 28-34; pag. 140, lin. 11-17).




t. 87 r.


recte .dc. equale trigono (fol. 87 recto, lin. 1-6 e 7; pag. 140, lin. 18-23).



sectiones diuidere notis poterimus (fol. 87 recto, lin. 12-19; pag. 140, lin. 27-34).



quadrilaterum quare est (fol. 87 recto, lin. 24-30; pag. 140, lin. 37 - pag. 141, lin. 1).




.ca.; propter eadem et trigona .bce. et .abc. sunt in proportione eadem; quare est sicut .ce. ad .ac., ita trigonum .bcd. ad quadrilaterum .ac. : est enim recta .ce. ex .ac. tertia pars; quare et trigonum .bcd. ex quadrilatero .ac. est tertia pars: abscissa est ergo pars data, scilicet tertia, á quadrilatero .ac. per lineam .bd. egredientem ab angulo .d. dato; quod oportebat facere. SED non sit .ce. tertia pars ex .ac.; ponam quidem .cg. tertiam ex .ac.; et á puncto .g. dyametro .bd. equidistantem protraham rectam .gf.; et copulabo rectam .fd., que abscidet á quadrilatero .ac. quadrilaterum .fbcd.; quod demonstrabo, tertiam esse ex toto quadrilatero .ac. Quoniam .cg. tertia est ex .ca., erunt trigona .bgc. et .cgd., hoc est quadrilaterum .bcdg., tertia pars trigonorum .abc. et .acd., scilicet quadrilateri .abcd. Cui per ea que dicta sunt demonstrabitur, equale esse quadrilaterum .fbcd. Er si uolueró á quadrilatero dato partem datam á puncto dato super unum ex lateribus abscidere, ut á quadrilatero .abcd., et á puncto .e. super latus .ad. dato; et ponamus, partem datam esse tertiam. Secabo primum á quadrilatero .ac. trigonum .dcz., quod sit tertia pars quadrilateri .abcd.; et copulabo .ez.: recta quidem .ez. aut equidistans erit recte .dc., aut non. Esto primum equidistans ei, tunc copulabo .ec.; et erit trigonum .ecd. equale trigono .zcd.: quare trigonum .ecd. est tertia pars quadrilateri .ac. Sed non sit equidistans recta .ez. | recte .dc.; tunc ponam rectam .id. equidistantem recte .ez., et copulabo rectam .ei.; et erit quadrilaterum .eicd. equale trigono .zcd., quod est tertia pars quadrilateri .ac.; quod oportebat facere. Quod probabitur per trigona .zdi. et .edi., que sunt sibi inuicem equalia, cum sint super basim .di., et inter equidistantes .di. et .ez.: quibus cum additur in comune trigonum .dci., ueniet quadrilaterum .eicd. equale trigono .dcz., ut dictum est: remanebit ergo quadrilaterum .abie. due tertie totius quadrilateri .ac.: quod si in duo equa diuiserimus, erit quadrilaterum .ac. in tres equas partes diuisum. RVRVSVS adiaceat quadrilaterum .abcd., cuius latus .ab. sit in tria equa diuisum, que sint .ae. .ef. .fb.; et uolo per puncta .ef. quadrilaterum .ac. in tres equas sectiones diuidere. Abscidam primum á quadrilatero .ac. tertiam eius partem per lineam egredientem á puncto .f.; quod etiam faciam per secundum modum, uidelicet ponam .gd. equidistantem recte .ab.; et ponam .gh. tertiam ex .gd.; et copulabo rectas .fh. .ch. et .fc.; et protraham rectam .hi. equidistantem recte .fc., et copulabo rectam .fi.; et erit quadrilaterum .fbci. tertia pars quadrilateri .ac. Deinde diuidam quadrilaterum .afid. in duo equa á linea .ek.; et sic erit quadrilaterum .abcd. diuisum in tres equas portiones, que sunt quadrilatera .ak. .ei. .fc.: quibus omnibus notis poterimus permutare terminos diuisionum á quocumque puncto dato, si supradictarum demonstrationum immemor non extiteris.

Er si quadratum aliquod in duas partes secundum datam portionem, et á dato puncto uel angulo diuidere uis, qualiter hoc fieri debeat, ostendamus. Esto rursus quadrilaterum .abcd.; et data proportio sit .ez. ad .zi.: uolo quidem quadrilaterum .abcd. ab angulo dato .d. secare in proportione quam habet .ez. ad .zi.: protraham primum dyametro .ac.; et ponam .ct. ad .at. sicut .ez. ad .zi.; et protraham dyametro .db., qui transeat primum per punctum .t. Dico quod recta .bd. diuidit quadrilaterum .ac. in ea proportione quam habet .ez. ad .zi. Verbi gratia: trigona quidem .dct. et .dta. ad se inuicem sunt sicut bases .ct. ad .ta.: in qua etiam proportione sunt trigona .cbt.

et .tba.; quare est sicut .ct. ad .ta., ita trigonum .dcb. ad trigonum .abd. Sed .ct. ad .ta. est sicut .ez. ad .zi.; quare est sicut .ez. ad .zi., ita trigonum .bdc. ad trigonum .bda. Divisum est ergo quadrilaterum .ac. in duo secundum proportionem datam, et ab angulo dato; quod oportebat facere. Sed non transeat dyameter .bd. per punctum .t.; oportet ut transeat aut inter .ct., | aut inter .ta.: transeat primum inter .ct. : copulabo quidem rectas .bt. et .td.; et erit quadrilaterum .tbcd. ad quadrilaterum .tbad. sicut .ct. ad .ta., hoc est sicut .ez. ad .zi.: et ponam rectam .tk. equidistantem dyametro .bd.; et copulabo rectam .dk., et erit quadrilaterum .kbcd. equale quadrilatero .tbcd.; quod probabitur per ea que dicta sunt; quare erit sicut .ct. ad .ta., hoc est sicut .ez. ad .zi., ita quadrilaterum .kbcd. ad trigonum .dak.: factum est utique propositum. Et si secauerit dyameter .bd. inter .at., protrahetur á puncto .t. recta .tl. equidistans dyametro .bd.; et copulabitur recta .dl.; et erit rursus sicut .ct. ad .ta., hoc est sicut .ez. ad .zi., ita trigonum .dcl. ad quadrilaterum .abld.; quod probabitur per premissa. Et si hoc facere uolumus; super latus .ab. ponam .bl. ad .la. sicut .ez. ad .zi.; et producam .dm. equidistantem recte .ab.; et sit .mn. ad .nd. sicut .bl. ad .la.; et copulabo rectas .ln. et .nc. et .lc.; et ponam .no. equidistantem .lc.; et copulabo .ol.; et erit quadrilaterum .ob. ad quadrilaterum .oa. sicut .bl. ad .la., hoc est sicut .ez. ad .zi.; quod etiam probabitur per premissa: et si á puncto .l. equidistans lineę .ab. non ceciderit infra quadrilaterum .ac., protraham lineam .cp. equidistantem lineę .ab.; et ponam .cq. ad .qp. sicut .bl. ad .la.; et copulabo rectam .lq. et .dq. et .ld.; et per punctum .q. ponam rectam .qr. equidistantem lineę .dl.; et copulabo rectam .lr. ; et erit quadrilaterum .lbcq. ad quadrilaterum .alrd. sicut .bl. ad .la., hoc est sicut .ez. ad .zi.; quod probabitur per premissa.

VERVM si quadrilaterum aliquod in plures partes, et in proportiones datas diuidere uis, qualiter hoc fieri debeat, ostendamus. Adiaceat quadrilaterum .abcd.; et in ipso protrahatur recta .dg. equidistans lateri .ab. ; et proportiones date sint .ez. it. : in quibus proportionibus diuidam latus .ba. in puncta .kl., hoc est sicut .ez. ad .zi., ita .bk. ad .kl.; et sicut .zi. ad .it., ita .kl. ad .la.: in quibus etiam proportionibus diuidam rectam .dg. super puncta .m.n.; et copulabo rectas .km. ln. cm. et .cn. et .ck. et .cl.; et per punctum .m. ducam rectam .mo. equidistantem recte .kc. ; et per punctum .n. ducam rectam .np. equidistantem recte .cl.; et copulabo rectas .ko. et .lp., que diuidunt totum quadrilaterum .ac. in proportiones datas. Quod sic probatur. Quia est sicut .bk. ad .kl., ita .gm. ad .mn.; et sicut .kl. ad .la., ita .mn. ad .nd. Erit sicut .bk. ad .ka., ita .gm. ad .md. ; quare erit sicut .gm. |


^e equidistantem recte . . . sicut .gm. s (fol. 87 verso, lin. 31, 32-35, e margine inferiore; pag. 141, lin. 31-34).




^e est sicut . . . ad trigonum s (fol. 87 recto, lin. 32 e 33; pag. 141, lin. 2 e 3).

fol. 87 verso.


^e aut inter . . . Et si secauerit s (fol. 87 verso, lin. 4-7 e 8; pag. 141, lin. 5-11).




^e secauerit dyameter . . . ceciderit in fra s (fol. 87 verso, lin. 7, 8-17 e 18; pag. 141, lin. 11-19).



^e per premissa . . . per premissa s (fol. 87 verso, lin. 17-22 e 23; pag. 141; lin. 18-23).




^e datas diuidere . . . rectam mo. s (fol. 87 verso, lin. 24-30; pag. 141, lin. 24-30).




fol. 88 recto.

ad *.md.*, ita quadrilaterum *.gk.* ad quadrilaterum *.ma.*: est etiam sicut *.gm.* ad *.md.*, ita trigonum *.gcm.* ad trigonum *.cmd.*; quare coniunctim erit sicut *.gm.* ad *.md.*, ita quadrilaterum *.kbcm.* ad pentagonum *.akmcd.*: sed quadrilatero *.kbcm.* equale est quadrilaterum *.bo.*; quare est sicut quadrilaterum *.kbcm.* ad pentagonum *.akmcd.*, ita quadrilaterum *.bo.* ad quadrilaterum *.ao.* Sed sicut *.gm.* ad *.md.*, ita *.ez.* ad *.zt.* Similiter ostendetur, quadrilaterum *.lo.* ad quadrilaterum *.ld.* esse sicut *.mn.* ad *.nd.*, hoc est sicut *.zi.* ad *.it.*; ergo est sicut *.ez.* ad *.zi.*, ita quadrilaterum *.bo.* ad quadrilaterum *.kp.*; et sicut *.zi.* ad *.it.*, ita *.kp.* quadrilaterum ad quadrilaterum *.ld.* Erit ergo quadrilaterum *.ac.* diuisum in proportiones datas, ut oportebat facere. Et ut hec que necessaria sunt in diuidendis campis perfecte in hoc opere proponantur, quemdam uulgarem modum proponimus. Vt si quadrilaterum *.abgd.* super dimidium lateris *.ab.* diuidere uolumus in duo equa, ponam *.ef.* in medio inter *.ab.* et *.gd.*; et copulabo rectam *.ef.*, que diuidet quadrilaterum *.ag.* in duo equa, si equidistantia fuerint sibi inuicem latera *.ab.* et *.dg.*; que si equidistantia non fuerint, erunt utique quadrilatera *.eg.* et *.af.* inequalia: mensurabo quidem ea inuestigando embada eorum; et sit quadrilaterum *.af.* minus quadrilatero *.ge.* secundum quantitatem perticarum numeri *.h.*; et inueniam longitudinem catheti cadentis ab *.e.* super rectam *.gd.*, qui sit recta *.ei.*, numerum: diuidam siquidem *.h.* per *.ei.*, et proueniat ex diuisione quantitas *.kf.*; et copulabo rectam *.ek.*: dico siquidem, quadrilaterum *.ag.* diuisum esse in duo equa á linea *.ek.* Quod sic probatur: ponam *.lk.* equalem *.kf.*; et copulabo *.el.*; et erit embadum trigonij *.efl.* equale superficiei catheti *.ei.* in lineam *.fk.*; ergo embadum trigoni *.efl.* prouenit ex ducto *.ei.* in lineam *.kf.*: sed ex *.ei.* in *.kf.* prouenerit numerus *.h.*, in quo quadrilaterum *.ebgf.* superhabundat quadrilaterum *.af.*; quare quadrilaterum *.ebgf.* superhabundat quadrilaterum *.af.* secundum quantitatem trigonij *.elf.*: quare si auferatur trigonum *.elf.* ex quadrilatero *.bf.*, remanebit quadrilaterum *.bl.* equale quadrilatero *.af.* Sunt enim et trigona *.ekf.* et *.ekl.* sibi inuicem equalia, cum sint super equas bases, et sub eadem altitudine. Et quoniam cum equalibus equalia addantur, que proueniunt sunt equalia. Equalia erunt quadrilatera *.kb.* et *.ak.* sibi inuicem, ut prediximus. Eodemque modo diuidemus in duo equa quadrilatera similia quadrilatero sequenti *.abcd.*, | quod habet formam fulminis, cuius dyametra minime se se secare possunt: producam primum dyametrum *.db.*; et inueniam embada trigonorum *.abd.* et *.cbd.*: que si equalia inuenero, erit utique quadrilaterum *.abcd.* in duo equa diuisum á linea *.bd.*: que si in equalia fuerint, erit embadum unius eorum maius. Esto quidem maius trigoni *.cbd.* secundum quantitatem numeri *.e.*; protraham quidem á puncto *.d.* super latus *.cb.* cathetum *.dz.*; et ponam superficiem *.dz.* in *.bi.* equalem numero *.e.*; et copulabo rectam *.di.*, que diuidet quadrilaterum *.abcd.* in duas portiones equalia, que sunt trigonum *.cdi.*, et quadrilaterum *.abid.*; quod probabitur per ea que diximus in precedenti figura.

quadrilaterum perticarum » (fol. 88 recto, lin. 10-19; pag. 142, lin. 8-15).




numeri .h. af. secundum » (fol. 88 recto, lin. 20-28; pag. 142, lin. 16-24).




fol. 88 verso.

quod habet quadrilaterum » (fol. 88 verso, lin. 1-9; pag. 142, lin. 29-37).



et copulabo per punctum » (fol. 88 verso, lin. 13-20 e 21; pag. 142, lin. 29 — pag. 143, lin. 3).




Sed si geometricè operari uolumus, copulabo rectam *.ac.*, ut in hac alia cernitur figura; et diuidam eam super punctum *.e.* in duo equa, et copulabo rectam *.be.* Recta uero *.be.* aut transibit per punctum *.d.*, aut non: transeat primum per punctum *.d.* Dico, quadrilaterum *.abcd.* diuisum esse in duo equa á linea *.db.*; quod sic probatur: trigona quidem *.abe.* et *.ebc.* sibi inuicem sunt equalia, nec non et trigonum *.aed.* equale est trigono *.ced.* Vnde si ab equalibus equalia auferamus, que remanebunt,

erunt equalia; ergo extracto trigono .aed. ex trigono .aeb., et trigonum .ced. ex trigono .ceb., remanebunt trigona .abd. et .cdb. sibi inuicem equalia, ut predixi. Sed non transeat recta .eb. per punctum .d.; secabit ergo unum ex lateribus .ad. uel .cd.: secet quidem latus .cd. super punctum .z.; et copuletur recta .ed.; et iaceat .dz. ad .zi. sicut .bz. ad .ze.; et copuletur recta .bi. Dico si quidem, quadrilaterum .abcd. diuisum esse in duo equa á linea .bi.; quod sic probatur. Quoniam trigonum .ezd. et .biz. circa equales angulos, qui ad .z., contraria patiuntur latera, hoc est quod sunt mutue proportionis, ipsa trigona sibi inuicem sunt equalia. Est enim sicut .bz. ad .ze., ita .dz. ad .zi. Comune adiungatur trigonum .cez., erunt duo trigona .cez. et .biz. equalia trigono .ecd.; sed trigono .ecd. equale est trigonum .aed.; ergo trigona .cez. et .izb. equalia sunt trigono .ead.: sunt enim et trigona .eab. et .ebc. sibi inuicem equalia: quare si ab equalibus auferantur equalia, que remanebunt erunt equalia: auferatur quidem á trigono .eab. trigonum .ead., et á trigono .ebc. auferantur trigona .cez. et .izb., remanebunt quadrilaterum .abzd., et trigonum .edz. equalia trigono .cib.: sed trigono .edz. equale est trigonum .biz.; quare quadrilaterum .abid. equale est trigono | .cbi., ut predixi.

Incipit de diuisione figurarum plurium laterum.


SI PENTAGONVM equilaterum et equiangulum ab aliquo angulorum dato in duo equa secare desideras, lineam ab ipso angulo super dimidium lateris sibi oppositi protrahe. Verbi gratia: sit datum pentagonum equilaterum et equiangulum .abcde.; et datus angulus sit .a.; super dimidium quidem lateris .cd. lineam .af. protrahe. Dico, pentagonum .abcde. diuisum esse in duo equa á linea .af.; quod sic probatur: copulabo rectas .ac. et .ad., et erunt trigona .abc. et .aed. sibi inuicem equalia et equiangulara. Sunt enim et trigona .afc. et .afd. equalia; quare quadrilaterum .abcf. equale est quadrilatero .aedf.: diuisum est ergo pentagonum .abcde. ab angulo .a. dato á linea .af.; quod oportebat facere. Ex hoc ergo manifestum est, quod cum in pentagono equilatero et equiangulo super dimidium cuiuslibet lateris dirigatur linea ad angulum respicientem ipsum latus, quod ipsa linea diuidet pentagonum in duo equa. Et si á puncto .g. dato super latus .ab. eundem pentagonum in duo equa diuidere uis, considera si punctus .g. erit in medio lateris .ab.; quia tunc protrahenda erit recta á puncto dato .g. ad angulum .d.; et erit recta .gd. diuidens pentagonum .abcde. in duo equa. Et si punctus datus fuerit inter .a.g. puncta, qui sit .h., ut in secunda cernitur figura; tunc diuidam pentagonum á linea .af. in duo equa, et copulabo rectam .hf., cui protraham equidistantem lineam .ai.; et copulabo rectam .hi., que diuidit pentagonum .abcde. in duo equa; quod sic probatur. Quoniam trigona .hfa. et .hfi. sunt inter duas equidistantes, et super eandem basim .hf.; ideo sibi inuicem sunt equalia: si comuniter addatur quadrilaterum .hbcf., erit quadrilaterum .hbcf. equale quadrilatero .abcf.: sed quadrilaterum .abcf. est dimidium pentagoni .abcde.; quare et quadrilaterum .hbcf. erit dimidium pentagoni .abcde. Sed non sit pentagonum datum equilaterum et equiangulum, ut pentagonum .abgde.; et uolo ipsum diuidere in duo equa; producam rectam .eg.; et super dimidium ipsius ponam punctum .z., á quo diuidam quadrilaterum .abge. in duo equa á linea .zi.; et copulabo rectam .zd., que etiam diuidit trigonum .egd. in duo equa: recta quidem .zd. aut est

a punctum d. ced. sed e (fol. 88 verso, lin. 20, 21-28; pag. 143, lin. 3-10).




fol. 89 recto.


l lateris .cd. ipsa linea > (fol. 89 recto, lin. 6-13; pag. 143, lin. 21-28).



recta á puncto quadrilaterum .hbcf. (fol. 89 recto, lin. 16, 17-24; pag. 143, lin. 30-37).



.ed. aut est copulabo rectam > (fol. 89 recto, lin. 32-35; pag. 143, lin. 43 — pag. 144, lin. 4).




in directo recte .zi., aut non: esto primum una earum in directo alterius, ut in hac tertia cernitur figura: et erit manifestum quod linea .i.d. diuidet pentagonum .abgde. in duo equa: quod etiam si á puncto .t. dato super rectam .ab. ipsum pentagonum diuidere nis, copulabo rectam | .td.; et ipsi ponam ei equidistantem rectam .ik., et copulabitur .tk.; que etiam diuidet idem pentagonum in duo equa: demonstratio est eadem ut supra. SED non sit recta .zd. in directo .zi.; copulabo quidem rectam .id.; et ponam ei equidistantem rectam .zl.; et copulabo rectam .il.; que etiam diuidet pentagonum .abgde. in duo equa. Probatio. Recte quidem .iz. et .zd. diuidunt pentagonum .abgde. in duas portiones equales: et sunt trigona .idz. et .idl. sibi inuicem equalia: quibus si addatur quadrilaterum .ibgd., erit pentagonum .ibgdl. equale pentagono .ibgdz., hoc est dimidio pentagoni .abgde., ut oportet: et sic secundum hunc modum possumus perducere diuisionem super omne latus pentagoni, et ab omni puncto dato super ipsum; nec non et poterimus in plures partes diuidere eum per ea que dicta sunt. Nam si rectam .eg. in tres equas partes diuiderimus; et per puncta sectionum in equas partes diuiderimus quadrilaterum .abge., et trigonum .egd.; et deinceps processerimus ordine demonstrato, habebimus optatum. Et si pentagonum habuerit formam mitrę, ut pentagonum .bcdef., protrahemus ad rectos angulos super latus .cd. lineam .fa.; et inuestigabo embadum quadrilateri .bcdf., nec non et quadrilateri .fade.: que si inuenero esse equalia, erit utique pentagonum .bcdef. diuisum in duo equa á linea .af. Si autem embada eorum in equalia fuerint, sit maius eorum embadum quadrilateri .ae. secundum quantitatem numeri .g.; et ponam superficiem .fa. in .az. equalem numero .g.; et copulabo rectam .fz.; et erit embadum trigoni .faz. quantitas medietatis numeri .g.: quare linea .fz. diuidit pentagonum .bcdef. in duo quadrilatera equalia, que sunt .bczf. et .fzde.; et hoc fit secundum uulgarem modum. SED si geometricè hoc operari uolumus, copulabimus .be., et diuidemus .be. in duo equa super punctum .i., ut in hac alia cernitur figura: et diuidemus quadrilaterum .bcde. in duo equa á linea .ik.; que si transierit per punctum .f., diuiditur per lineam .fk. pentagonum .bcdef. in duo equa; quia si ex quadrato .bcki. auferamus triangulum .bif.; et á quadrilatero .ikde. auferamus triangulum .ief., remanebunt quadrilatera .fc. et .fd. sibi inuicem equalia.

ET si recta .ik. secat latus .ef. super punctum .l., ut in hac ultima figura cernitur. Ponam .ml. ad .lf. sicut .il. ad .lk.; et copulabo rectam .km., que diuidet pentagonum .bcdef. in duas sectiones equalis, | quarum una erit quadrilaterum .mkde., alia pentagonum .bckmf.: probatio: copulabo rectam .if., et erunt trigona .ifl. et .kml. sibi inuicem equalia, cum sit proportio .ml. ad .fl. sicut .il. ad .lk.: quare trigonum .ife. equale est trigonis .ile. et .klm.: est enim et trigono .ief. equale trigonum .bif.; quare trigonum .bif. equale est trigonis .iel. et .klm.: unde si á quadrilatero .bcki. auferamus triangulum .bfi.; et á quadrilatero .ikde. auferamus trigona .ile. et .klm., remanebunt quadrilaterum .bckl., et trigonum .ifl. equalia quadrilatero .kdem.: est enim trigonum .klm. equale trigono .ilf.; quare pentagonum .bckmf. equale est quadrilatero .mkde., ut predixi: quam etiam diuisionem perducemus á puncto .f., si copulauerimus .fk., et ponemus .ei. equidistantem lineam .mn., et copulauerimus .fn.; et sic erunt

fol. 89 verso.


que etiam ... erit pentagonum * (fol. 89 verso, lin. 2-8; pag. 144, lin. 5-10).




perducere diuisionem ... ad rectos angulos * (fol. 89 verso, lin. 10, 14-17; pag. 144, lin. 12-18).

g

super latus ... pentagonum .bcdef. * (fol. 89 verso, lin. 18-24; pag. 144, lin. 18-24).




copulabimus .be. ... inuicem equalia * (fol. 89 verso, lin. 26, 27-32; pag. 144, lin. 26-31).



fol. 90 r°

km. que ... sectiones equalis * (fol. 89 verso, lin. ultima, e margine inferiori: pag. 144, lin. 33 e 34).



quadrilatera *bcnf.* et *fnde.* sibi inuicem equalia: quod etiam pentagonum si in tres equas partes diuidere uolumus, ascidemus á quadrilatero *bcnf.* tertiam partem cum linea *op.*; et á quadrilatero *fnde.* secabimus similiter tertiam partem cum linea *qd.*; et erit pentagonum *bcdef.* diuisum in tres equas partes, quarum una est quadrilaterum *bcpo.*, secunda pentagonum *opdqf.*, tertia trigonum *qde.* Er notandum quod si exagonum diuidere uolumus, diuidemus ipsum in duo quadrilatera á linea protracta in ipso, que ponat tria latera eius in unam partem, et reliqua tria in aliam; et super dimidium ipsius lineę ponemus punctum, á quo diuidemus utrumque quadrilaterum in duo equa; ut si in exagono *abcdef.* protraxerimus lineam *ad.*, diuidet ipsum exagonum in duo quadrilatera, que sunt *abcd.* et *adef.*: unde si super dimidium lineę *ae.* posueramus punctum *g.*; et ab ipso protraxerimus rectas diuidentes utrumque quadrilaterum in duo equa; et deinceps imitati fuerimus ea que dicta sunt superius, poterimus ipsum exagonum cum linea una in duo equa diuidere; nec non et poterimus permutare sectiones ab omni puncto dato super aliquod ex lateribus eius; nec non, si secundum hoc processerimus in reliquis figuris plurium laterum, poterimus ad notitiam diuisionis ipsarum sauissime peruenire.


Incipit de diuisione circularum, et eorum partium.

Si circulum aliquem in duo equa secare uolumus, per lineam protractam á puncto dato super periferiam eius, aut extra circulum, ipsum punctum cum centro copula; et ipsam rectam usque ad periferiam ducere studeas; Verbi gratia: | Esto datus circulus *abgd.*; et extra ipsum sit datus punctus *e.*, et sit *z.* centrum circuli; copulata quidem recta *ez.*, et emissa usque in punctum *g.*, erit recta *ag.* dyiameter circuli *abgd.* Nam dyiameter circuli est recta per centrum ducta: et in utraque parte periferię terminata. Ducitur quidem recta *ag.* per centrum *z.*; ergo dyiameter est *ag.*; quare semicirculus est unaqueque portionum *abg.* et *adg.*: diuisus est ergo circulus *abgd.* á recta protracta á puncto *e.* dato extra circulum. Et si infra circulum punctus datus fuerit *i.*, copulabo rectam *iz.*, et ducam eam in utramque partem in puncta *b.d.*; et erit recta *bd.* dyiameter circuli, qui secat circulum *abgd.* similiter in duo equa. Et si circulum aliquem in tres partes diuidere uolumus, constituemus in ipsum trigonum equilaterum *abg.*; et centrum circuli sit *d.*; et copulabimus rectas *da.db.dg.*, que diuident circulum *abg.* in tres equas partes, quarum una est sector *dab.*, secunda est sector *dbg.*, tertia quoque est sector *dga.* Verbi gratia: quia equales sunt recte *ab.bg.ga.*, equales erunt arcus *ab.bg.ga.*; quia equales recte in equalibus circulis equales arcus subtendunt. Sunt enim á centro sibi inuicem equales recte *da.db.dg.*; et anguli qui ad *d.* sibi inuicem sunt equales: quare sectiones *e.z.i.* sibi inuicem sunt equales: diuisus est ergo circulus *abg.* in tres sectiones equales, ut oportet. Et si in plures partes ipsum á centro diuidere uis, in tot equales partes periferiam ipsius circuli diuide, quot partes ex eo facere uolueris; et puncta ipsarum sectionum cum centro copulare studeas, et peruenies ad optata.


Si uero circulum per lineas equidistantes in tria diuidere uolumus, hoc sine labore maximo fieri non posse cognosce; tamen qualiter hoc secundum propinquitatem fieri debeat, demonstrabo. Ponam primum in circulo *abg.* rectam *ag.*, que sit latus trigoni equilateri cadentis in ipso; quare periferia *ag.* erit tertia pars periferię totius circuli

(fol. 90 verso.


• Esto datus ... unaqueque portionum z (fol. 90 verso, lin. 1-6; pag. 145, lin. 20-25).




z et centrum ... in plures a (fol. 90 verso, lin. 13-20; pag. 145, lin. 30-37).




* contenta sub ... recta .ab. * (fol. 90 verso, lin. ultima, e margine inferiore; pag. 146, lin. 6-7).



* portio .tkl. sibi inuicem * (fol. 91 recto, lin. 9-16; pag. 146, lin. 14-21).




* ad angulos dato circulo * (fol. 91 recto, lin. 34, 35, e margine inferiore; pag. 146, lin. 36-38).



fol. 91 verso.

* .abg., cuius tertia pars * (fol. 91 verso, lin. 1-6; pag. 146, lin. 38-43).



.abg.; et ponam á centro .d. rectam .db. equidistantem recte .ag., et copulabo rectas .da. dg. ab. et .bg., et erunt trigona .dag. et .bag. sibi inuicem equalia : quibus si addatur augmentum comune portionem circuli contempta sub recta .ag., et arcu .ag.; erit figura contempta sub rectis .ba. et .bg., et arcu .ag. equalis sectori .dag., qui est tertia pars circuli; quare figura contenta sub rectis .ba. et .bg., et arcu .ag. tertia pars est circuli .abg. : cui addatur portio circuli contenta sub recta .bg., et arcu circuli .abg. secundum quantitatem portionis .bg. : quare inueniam embadum portionis contenta sub recta .bg., et periferia .bg.; et diuidam duplum super rectam .ab., et parum plus ex hoc quod prouenerit minuam ex periferia .bg.; et sit illud arcus .be.; et copulabo rectam .ae., et erit secundum propinquitatem portio .age. tertia pars circuli .abg. De inde super rectam .ae. protraham á centro .d. cathetum .dz., et perducam eam in .i., et sit recta .di. equalis recte .dz.; et per punctum .i. protraham rectam .tk. equidistantem recte .ae.; et erit portio .tkl. equalis portioni .abe. Reliquum uero, quod continetur sub rectis .ae. et .tk., et arcubus .ke. et .at., erit alia tertia pars; quod sic probatur. Ducam á puncto .e. super lineam .ab. cathetum .ec.; et sit illud quod prouenit ex diuisione dupli embadi portionis .bg. in rectam .ab.; et copulabitur recta .eb., et erit trigonum .abe. equalis portionis circuli .bg. : quare cum auferatur trigonum .abe. ex circuli portione .agb., remanebit portio .aeg. tertia pars circuli .abg. : et quia recte .tk. et .ae. equidistantes sunt, et equaliter distant á centro, sibi inuicem equales sunt. Et quoniam equalis est recta .tk. recte .ae., ipse due recte ab eodem circulo equales sectiones auferunt, ut in tertio libro EUCLIDIS panditur : equalis est ergo portio .tkl. portioni .aeg.; quare tertia pars est sectio .tkl. ; residuum uero quod continetur inter equidistantes .tk. et .ae. rectas, et arcus .ek. et .at. erit reliqua tertia pars, ut oportet. Et ut hec proutius haberentur, quam subtilius potui, inuestigauí proportionem recte .dz. ad semidyametrum circuli: et inueni, eam esse secundum propinquitatem sicut .9. ad .34. : unde cum aliquem circulum in tres equas partes cum equidistantibus rectis diuidere uoluerimus, dyametrum circuli inuenire studebimus; et eius medietas in proportionem dicta, cum ab utraque parte circuli centri diuisa fuerit, et per sectiones proportionum rectas ad rectos angulos duxerimus, diuidemus utique circulum in tres equas partes.

Similiter si circulum .abgde. in quatuor equas partes diuidere uolumus, dyametros .az. et .ge. super centrum circuli .c. ad rectos angulos secare faciam; deinde semidyametrum .cz. super punctum .k. diuidam; et sit proportio .ck. ad .cz. sicut .611. ad .1512. : et ponam rectam .cl. equalem recte .ck.; et per puncta .lk. producam rectas .bh. et .df. secantes dyametrum .az. ad angulos rectos, erit unusquisque semicirculorum secundum propinquitatem diuisus in duo equa. Et si inter duas equidistantes á dato circulo | .abg., cuius centrum sit .d., datam partem, que sit tertia, auferre uolumus, ponam rectam .ab. latus trianguli equilateri cadentis in circulo .abg. ; et per centrum .d. ponam ei equidistantem rectam .dg., et copulabo rectam .bg.; et diuidam periferiam .ab. in duo equa super punctum .e., et protraham rectam .ez. equidistantem recte .bg. Dico quod figura contenta sub rectis .bg. et .ez., et arcubus .eb. et .gz. tertia pars est circuli .abg. PROBATIO: protraham rectas .da. et .db. et .ag.; et erunt trigona

.gab. et *.dab.* equalia: quibus cum in comune additur portio *.abe.*, erit figura contenta sub rectis *.ga.* et *.gb.*, et arcu *.aeb.* equalis sectori *.daeb.*, qui est tertia pars circuli *.abg.*; ergo figura contenta sub rectis *.ga.* et *.gb.*, et arcu *.aeb.* est tertia pars circuli *.abg.*: et quia recte *.bg.* et *.ez.* equidistantes sunt, erunt arcus *.eb.* et *.gz.* equales. Sed arcui *.eb.* equalis est arcus *.ae.*; ergo et arcus *.ae.* equalis est arcui *.gz.*: comune addatur arcus *.bg.*, erit quidem arcus *.aebg.* equalis arcui *.ebgz.*; quare portio circuli *.ezgb.* equalis est portioni circuli *.agbe.*: comuniter auferatur portio contenta sub recta *.bg.*, et arcu *.gb.*, remanebit figura contenta sub rectis *.gb.* et *.ez.*, et arcibus *.be.* et *.gz.* equalis tertie parti circuli, scilicet figure contente sub rectis *.ga.* et *.gb.*, et arcu *.aeb.*; quod oportebat ostendere. Ostendam rursus quomodo auferatur á circulo dato qualiscunque pars data per circum equidistantem ei. Sit datus circulus *.abcd.* super centrum *.e.*, uolo á circulo *.abcd.* auferre partem datam, que sit tertia per circum equidistantem ei: protraham dyametrum *.ag.*; et ponam quadratum lineę *.ae.* triplum quadrati lineę *.ez.*; et centro quidem *.e.* spatio *.ez.* circinabo circum *.zit.* Dico: á dato circulo *.abcd.* secta est tertia eius, que est circulus *.zit.* Probatio. Quoniam *.ea.* recta dimidium est dyametri *.ag.*, erit quadratum dyametri *.ag.* quadruplum ex quadrato lineę *.ae.*: propter eandem ergo et quadratum lineę *.zt.* est quadruplum quadrati lineę *.ez.*; quare est sicut quadratum lineę *.ea.* ad quadratum lineę *.ez.*, ita quadratum dyametri *.ag.* ad quadratum dyametri *.tz.*: sed sicut quadratum dyametri *.ag.* ad quadratum dyametri *.tz.*, ita circulus *.abcd.* ad circum *.zit.*: sunt enim circuli ad se inuicem sicuti ad quadrata dyametrorum; ut in duodecimo EVCLIDIS monstratum est: quare erit sicut quadratum lineę *.ea.* | ad quadratum lineę *.ez.*, ita circulus *.abcd.* ad circum *.zit.*: est enim quadratum lineę *.ea.* triplum quadrati lineę *.ez.*; quare circulus *.abcd.* triplus est circuli *.zit.*; et sunt ambo circuli equidistantes, cum unum habeant centrum. Secta est ergo á circulo *.abcd.* tertia eius pars per circum *.zit.* equidistantem ei; quod oportebat facere.


Incipit De diuisione portionum circularum.

SI SEMICIRCULVM *.abg.* in duo equa secare uis; diuide rectam *.ag.* in duo equa super punctum *.d.*; et a puncto *.d.* ad rectos angulos rectam protrahe *.db.* Dico, diuisum esse semicirculum *.abg.* in duo equa á recta *.db.* Probatio: productis rectis *.ba.* et *.bg.*, erunt trigona *.bdg.* et *.bda.* sibi inuicem equalia; est enim latus *.ad.* lateri *.dg.* equale: et in comuni iacet recta *.bd.*; nec non et anguli ad *.d.* sunt recti; quare recta *.bg.* equalis est recte *.ba.*; equales uero recte equales sectiones auferunt; quare sectio *.bg.* sectioni *.ba.* equalis est. Sunt et trigona *.bdg.* et *.bda.* equalia; quare sectio *.bdai.* sectioni *.bdge.* est equalis: diuisum est ergo semicirculum *.abgd.* in duo equa; quod oportebat facere. Et si ipsum cum recta equidistante basi *.ag.* diuidere uis; semidyametrum *.bd.* super punctum *.z.* diuide: et sit *.dz.* ad *.zb.* sicut *.611.* ad *.1512.*: et per punctum *.z.* protrahe rectam *.ei.*, que diuidet similiter semicirculum *.abg.* in duo equa; que habentur ex his que diximus in diuisione circuli in quatuor partes.


Et si portio circuli, siue sit minor, siue maior semicirculo, in duo equa diuidere uis, simili modo super dimidium cordę eius sagittam protrahe: uerbi gratia: sit data portio maior semicirculo *.abg.*; et super dimidium cordę ipsius sagittam *.da.* pro-

fol. 92 recto.


recte equales . . . et sit *b* (fol. 92 recto, lin. 12, 13-17; pag. 147, lin. 34-38).




» Et si portio ... *d.*; deinde » (fol. 92 recto, lin. 21-29; pag. 147, lin. 41 — pag. 148, lin. 5)




» equales sunt ... duabus rectis » (fol. 92 recto, lin. ultima, e margine inferiore; pag. 148, lin. 9 e 10).



» sint, ipsos ... *ed.* dividat » (fol. 92 verso, lin. 2-12; pag. 148, lin. 11-20).



» recte *ea.* ... Explicit distinctio » (fol. 92 verso, lin. 14-22; pag. 148, lin. 21-30).



trahe: et erit portio circuli *abd.* equalis portioni *adg.*; quod probabitur per ea que dicta sunt in semicirculo: et si á puncto *d.* ad rectos angulos protraxerimus rectam *dc.* super cordam *bg.*, diuidetur utique in duo equa portio circuli *bcg.*, que est minor semicirculo. Rvrsvs si semicirculum *abc.* in tria equa diuidere uis, rectam *bc.* in duo equa partire super punctum *d.*; deinde arcum *bac.* in tria equa diuide super puncta *ag.*; et copulabis rectas *da. dg.*, que diuident semicirculum *abc.* in tres equas sectiones. Probatio. Quoniam semicirculus est portio *abc.*, erit utique punctus *d.* centrum circuli, cuius medietas est semicirculus *abc.*; quare recte *db. da. dg. dc.* sibi inuicem sunt equales: et quia arcus *ba.* et *ag.* et *gc.* sibi inuicem equales sunt, erit

fol. 92 r° sector una queque figurarum contentarum sub duabus rectis, | et arcu predictis; quare cum sub equalibus rectis, et sub equalibus arcibus sint, ipsos sectores sibi inuicem equales esse necesse est: diuisus est ergo semicirculus in tres sectores equales, que sunt *dab.*, et *dag.*, et *dgc.*; quod oportebat facere. Et si figuram aliquam contentam sub duabus rectis, et arcu periferiæ in duo equa diuidere uis, ut trigonum *abdg.*, cuius duo latera *ab.* et *ag.* sunt recta; reliquum uero latus *bdg.* sit arcus circuli. Copulabo primum rectam *bg.*, et diuidam ipsam in duo equa super punctum *e.*, á quo protraham rectam *ae.*; deinde super rectam *bg.*, et á dato puncto in ipsam *e.* protraham ad rectos angulos rectam *ed.* Recte *ae.* et *ed.* aut sunt in directo sibi inuicem, aut non: si fuerint in directo, diuisa erit figura *abdg.* in duo equa á linea *ad.*, cum recta *ae.* diuidat rectilineum trigonum *abg.* in duo equa; et recta *ed.* diuidat portionem circuli *bdg.* in duo equa. Sed non sit in directo recta *ed.* recte *ea.*, ut in hac alia cernitur formula. Copulabo tunc rectam *ad.*; et per punctum *e.* protraham rectam *ei.* equidistantem recte *ad.*; et copulabo rectam *ai.*, que diuidet totam figuram *abdg.* in duo equa. Probatio. Quoniam recte *ad.* et *ei.* equidistantes sunt, et in eis sunt trigona *dai.* et *dea.*, super basim *da.* ipsa trigona sibi inuicem equalia sunt: quibus addita in comuni figura contenta sub rectis *ab.* et *ad.*, et arcu *db.*, erit figura contenta sub rectis *di.* et *ia.* et *ab.*, et arcu *db.*, equalis figure contente sub rectis *de.* et *ea.* et *ab.*, et arcu *bd.*; que figura continet dimidium trianguli *abdg.*, ut oportebat facere.

Explicit distinctio quarta de diuisione camporum inter consortes.

Incipit quinta de radicibus cubicis inueniendis.

CVM Secundum promissa in huius operis principio de radicibus cubicis oporteat me tractare, de quibus in libro abbaci tractatum inserui spetialem: duxi eundem presentialiter rescribendum, ut continuatis distinctionibus suprascriptis ad finem eiusdem operis possim facilius peruenire.

Cvbus quidem numerus est, qui surgit ex multiplicatione trium equalium numerorum, uel ex aliquo quadrato numero in suam radicem ducto. Vt .8. et .27., nam .8. surgunt ex multiplicatione de .2. in .2. ducta in .2., uel ex multiplicatione quaternarij in suam radicem, scilicet in .2., et 27 surgunt ex tribus ternarijs, uel ex nouenario ducto in suam radicem, que est .3. Nam radix cubica octonarij est .2.; et radix cubica de .27. et .3.; et sic intelligas de reliquis cubis numeris, et eorum radicibus: reliqui autem numeri, qui cubi non sunt, radices cubicas in numeris habere non possunt: unde radices ipsorum cubice dicuntur surde. Nam qualiter secundum propinquitatem radix cubica cuiusuis nu-

fol. 93 r°

meri reperiri ualeat, demonstrabo. Sed primum, unde modus reperiendi has radices procedat, uolo presentialiter demonstrare. Cum itaque linea diuisa in duas partes fuerit: erunt cubi ipsarum portionum cum triplo multiplicationis quadrati unius cuiusque sectionis in alia equales cubo totius lineę. Verbi gratia: sit linea .*ab*. ut libet diuisa super punctum .*g*. Dico, cubos portionum .*ag*. et .*gb*. cum triplo quadrati portionis .*ag*. in .*gb*., et cum triplo quadrati portionis .*bg*. in .*ga*. equales esse cubo totius lineę .*ab*.; quod uideatur in numeris: sit tota .*ab*. 5.; et .*ag*. sit .3., remanebit .*gb*. .2.; quarum portionum cubi sunt .27. et .8.: quibus insimul iunctis faciunt .35.; et ex triplo quadrati de 3 in 2 ueniunt .54.; et ex triplo quadrati de .2. in .3. ueniunt .36.; et sic habentur in summa .125., scilicet cubus quinarij, scilicet lineę .*ab*. Nam .5. est radix cubica de .125.; quia ductis 5. in se faciunt .25.; quibus ductis in .5. faciunt .125. Et cum super hanc definitionem diutius cogitarem: inueni hunc modum repperiendi radices, secundum quod inferius explicabo. Sed primum uolo demonstrare quomodo secundum hanc definitionem debeat quilibet numerus cubicari, ut si uis cubicare .12., accipe cubum de .10., et cubum de .2., in quibus portionibus sint .12. diuisa, erunt .1008.; super que adde triplum quadrati de 10 ductum in .2., et triplum quadrati de .2. ductum in .10., scilicet 600 et 120, erunt in summa .1728., que sunt cubus de .12.: et sic potes operari in cubicatione cuiusque uis numeri. Vnde reuertatur ad inuentionem radicum cubicarum quorumlibet numerorum. Sed primum sciendum est, qui sunt numeri cubi, qui fiunt á numeris primi gradus. Nam cubus unitatis est .1., binarij .8., ternarij .27., quaternarij .64., quinarij .125., sexnarij 216., septenarij .343., octonarij .512., nouenarij .729., et cubus itaque decenarij .1000.; quibus per ordinem cordetenus cognitis; scias quod radix cubica numerorum unius et duarum et trium figurarum est una figura; quattuor uero figurarum et quinque et sex radix cubica est numerus duarum figurarum. Septem autem figurarum et otto et nouem radix est numerus trium figurarum: et sic semper deinceps crescendo unam, uel duas, uel tres figuras numero in eius radice crescet una figura tantum: his itaque intellectis, oportet docere qualiter inueniatur differentia, que est inter aliquem | cubum numerum, et suum sequentem; multiplicabis itaque radicem unius per radicem alterius; et quod prouenit, triplicabis, et summe addes .1., quod prouenit ex cubicatione unitatis, in qua radix maioris cubi superhabundat radicem minoris: uerbi gratia: uolo scire quantum addit cubus, qui fit á .3., super cubum qui fit á .2. : multiplicationem itaque de .2. in .3. triplica, erunt .18.; quibus adde .1., erunt .19. pro differentia quesita: que .19., si addantur super cubum, qui fit á binario, scilicet super .8., uenient .27., scilicet cubus, qui fit á ternario: his explicatis, ut inueniatur radix de .47., secundum propinquitatem accipe maiorem radicem, quam habent .47. in integris, et est .3.; quorum cubum, scilicet .27., extrabe de .47., remanent .20.; ergo radix cubica de .47. est .3., et remanent .20. Que .3. sit linea .*ab*.; et proportionabis .20. ad differentiam, que est inter cubum, qui fit á .3., et cubum, qui fit á .4.; quam differentiam inuenies ex triplo multiplicationis de .3. in .4., uno addito, uel extractione .27. de .64.; que differentia est .37.; ex quibus .20. sunt plus medietate: quare adde $\frac{1}{2}$ super lineam .*ab*., sitque .*bg*.; et inueniatur cubus numeri .*ag*.; qui sic inuenietur: cubicabo sectiones .*ab*. et .*bg*., erunt $\frac{1}{8}$ 27; quibus superaddam triplum quadrati numeri .*ab*. in .*bg*., nec non et triplum quadrati numeri .*gb*. in .*ba*., hoc est $\frac{1}{2}$ 13 et $\frac{1}{4}$ 2, erunt $\frac{7}{8}$ 42; quibus usque in .47. desunt $\frac{1}{8}$ 4; ergo radix cubica de 47 est $\frac{4}{8}$ 3, et su-

^a punctum .*g*. ... quadrati *s* (fol. 93 recto, lin. 8 e 9; pag. 149, lin. 5-6).

a _____ *g* _____ *b*

fol. 93 verso.

^a que est . . . differentiam *s* (fol. 93 verso, lin. 13 e 14; pag. 149, lin. 37 e 38).

a _____ *b* _____ *g* _____ *d*

perhabundat $\frac{1}{8}$ 4; que etiam proportionabis ad numerum, qui uenit ex triplo .ag. in .4., que sunt radix sequentis cubi; qui numerus est .42.: ex quibus predicta $\frac{1}{8}$ 4 sunt quasi decima pars: quare adde numero .bg. $\frac{1}{10}$, que sit .gd.; cuius cubus, qui est $\frac{1}{1000}$ cum triplo quadrati .ag. ducto in .gd., scilicet cum $\frac{1}{4} \frac{6}{10} 3$, nec non et cum triplo quadrati .gd. ducto in .ga., scilicet cum $\frac{1}{2} \frac{10}{100}$ extrahe de $\frac{1}{8}$ 4, remanebunt $\frac{844}{1000}$, que sunt $\frac{42}{125}$: ergo radix cubica de 47 est $\frac{1}{10} \frac{1}{2} 3$, scilicet $\frac{3}{5} 3$, et remanet inde parum plus $\frac{1}{5}$ unius integri: quam tertiam si proportionaueris ad numerum, qui peruenit ex triplo .ad. in .4., propius nimirum ad radicem de 47 deuenies. Item si uis inuenire radicem cubicam de 900. iam scis quia radix eorum quam habent in integrum, cum sint numerus tertij gradus, est una figura tantum; quam accipe, et est .9., quorum cubus est .729.: quibus extractis ex .900., remanent .171.; et inuenies differentiam, que est á cubo nouenarij in cubo decenarij; que differentia est .271.: proportionare ergo | residua .171. cum .271., ueniunt parum minus de $\frac{2}{3}$, quarum duarum tertiarum cubum, scilicet $\frac{8}{27}$, extrahe de .171., remanebunt $\frac{19}{27} 170.$: deinde multiplica triplum quadrati de .9., scilicet .243 per $\frac{2}{3}$, hoc est accipe $\frac{2}{3}$ de 243, erunt .162.; que extrahe de $\frac{19}{27} 170.$, remanent $\frac{19}{27} 8.$: deinde accipe quadratum de $\frac{2}{3}$, erunt $\frac{4}{9}$; quas triplica, ueniet $\frac{1}{3} 1$; quem numerum multiplica per .9., uenient .12.; que cum non possint extrahi de $\frac{19}{27} 8.$, extrahes $\frac{19}{27} 8$ de .12., remanent $\frac{8}{27} 3.$: diminuta ergo radix de .900. est $\frac{2}{3} 9$, et desunt inde $\frac{8}{27} 3.$, hoc est cubus de $\frac{2}{3} 9$ est $\frac{8}{27} 903.$: que inuenies si de $\frac{2}{3} 9$ facies tertias, scilicet .29., et cubicaueris .29., et eorum cubum per 27. diuiseris, scilicet per cubum ternarij. Et sic propius ad radicem de .900. uenire uis, multiplica $\frac{2}{3} 9$ per 10; et quod prouenerit, triplica; uel triplum de $\frac{2}{3} 9$ per 10. multiplica, exhibunt .290.; in quibus diuide $\frac{8}{27} 3$; et quod prouenerit abice de $\frac{2}{3} 9$, et habebis propositum. Rvrsvs si uis inuenire radicem de 2345., iam scis quia radix eorum, quam habent in integrum, est numerus duarum figurarum: quare ultima figura ipsius radice ponenda est sub secundo gradu; nam que figura ipsa esse debeat, indicabo. Relinque itaque ex 2345 tres figuras, que faciunt tertium: et secundum: et primum gradum, remanent .2.; ex quibus accipe maiorem radicem, quam habent in integrum, que est .1., et remanent .1.; quam radicem, scilicet .1., pones sub .4.; et pro uno, quod remanet, pone .1. super .2.; et copulabis ipsum cum .345., erunt .1345.; et sic pro radice de .2345. habentur .10., scilicet .1. in secundo gradu, remanent .1345.; pro quibus antepositum .1. oportet ponere talem figuram sub .5.; que multiplicata per triplum quadrati positę figurę sub .4., nec non et multiplicata eadem posita figura per triplum quadrati ponendę figurę: etiam et cubicata ipsa ponenda figura; et hec omnia extracta cum fuerint de .1345., non remaneat inde ultra triplum multiplicationis totius inuenctę radice in numerum sequentem in ordine numerorum. Quam figuram inuenire non poteris nisi ex usitato arbitrio; erit enim ipsa figura .3., que posita sub .5., triplicabis quadratum positę figurę, erunt .3., que pones sub tertio gradu; quia cum multiplicatur secundus gradus in se, tertium gradum facit; et multiplicabis posita .3. sub .5. per posita .3. sub .3., erunt .9.; que extrahe ex copulatione de .1. posito super .2. cum sequentibus .3., scilicet de .13., remanebunt .4., que pone super .5. tertij gradus; et triplicabis quadratum positorum trium sub .5., erunt .27., que pones sub secundo et primo gradu; quia cum primus gradus multiplicat se ipsum, primum gradum facit, uel terminationem in ipso, multiplicabis ipsa .27. per .1. positum sub .4., et extrahes ipsam multiplicationem ex copulatione quaternarij positi super .3., et se-

fol. 94 recto.

" quadrati posite ... per posita " (fol. 94 recto, lin. 23-30 e 31; pag. 150, lin. 31-38).

1	4	8		
1	4	7		
2	3	4	5	
		1	3	
		3	2	7

fol. 94 verso.

quentis quaternarij, scilicet de .44., remanent .17. super ipsa .44.; que copulabis cum .5. primi gradus, erunt .175.; de quibus extrahe cubum ternarij positi sub .5., scilicet .27., remanebunt .148., que non excedunt triplum multiplicationis radicis inuenctę, scilicet de .13. in numerum sibi sequentem, scilicet in .14.; ergo radix cubica de .2345. est .13., et remanent .148.: accipe ergo triplum multiplicationis de .13. in .14., et adde .1., erunt .547.: ex quibus 148. sunt parum amplius quartę partis. Quare adde $\frac{1}{4}$ inuenctę radici, erunt $\frac{1}{4}$ 13.: extrahe ergo cubicationem de $\frac{1}{4}$, scilicet $\frac{1}{64}$ ex 148., remanent $\frac{63}{64}$ 147.; et accipe triplum quadrati de 13, erunt .507.; que multiplica per $\frac{1}{4}$, uenient $\frac{3}{4}$ 126; que extrahe de $\frac{63}{64}$ 147., remanent $\frac{15}{64}$ 21. Item accipe triplum quadrati de $\frac{1}{4}$, scilicet $\frac{9}{16}$; et multiplica eas per 13., uenient $\frac{7}{16}$ 2.; que extrahe de $\frac{15}{64}$ 21, remanent $\frac{51}{64}$ 18.: et sic pro radice de 2345. habentur $\frac{1}{4}$ 13., et superhabundat ex eis $\frac{51}{64}$ 18.: quare multiplica triplum de $\frac{1}{4}$ 13. per primum sequentem numerum, scilicet per .14., erunt $\frac{1}{2}$ 556.: in quibus diuide $\frac{51}{64}$ 18., exhibit circa $\frac{1}{80}$; qua addita cum $\frac{1}{4}$ 13, reddent $\frac{17}{80}$ 13. pro quesita radice; et sic studeas facere in similibus.

Et si radicem cubicam de 56789. habere desideras; iam scis per ea que dicta sunt quia radix eorum est numerus duarum figurarum. Quare dimissis tribus primis figuris, radicem reliquarum, scilicet de .56. accipe, eritque .3., et remanent .29.: pone igitur .3. sub secundo gradu, et 29 super .56.; et triplica quadratum positi ternarij, erunt .27., que pone sub quarto et tertio gradu; quia cum secunda figura multiplicatur in se, facit tertium gradum, uel terminantem in ipso: et studeas antepositum ternarium ponere talem figuram que, cum multiplicata fuerit per .27., que sunt in quarto et tertio gradu; et ipsa multiplicatione extracta de .297., scilicet ex multiplicatione predictorum .29. et sequentium .7., remaneat inde numerus qui, cum copulatus fuerit cum sequenti figura, scilicet cum .8., possis ex ipsa copulatione extrahere multiplicationem tripli quadrati ponendę figurę in .3., scilicet in positam figuram; et remaneat inde numerus qui, cum copulatus fuerit cum .9. primj gradus, ualeas inde extrahere cubum ipsius ponendę figurę; et non remaneat inde ultra triplum multiplicationis totius radicis inuenctę in numerum sequentem. Et hanc considerationem habeas in omni ponenda figura; eritque illa figura .8.; qua posita sub primo gradu, multiplicabis eam per 27., hoc est primo per .2., et postea per 7. Nam ex ductis .8. in .2. ueniunt .16.; quibus extractis de .29., remanent .13. super ipsis; et ex ductis .8. in .7., ueniunt .56.; quibus extractis de .137., remanent .81. super ipsis: post hec multiplica .8. in se, erunt .64. terminantia in primo gradu; que triplica, erunt .192. similiter terminantia in primo gradu: quare pones ea super suos gradus, scilicet sub tertio, et secundo, et primo; et multiplica ultimam figuram de .192. per .3. posita sub secundo gradu, facient .3. in quarto gradu: quare extrahe eadem .8., scilicet ex ultima figura de .81., remanent .5. super .8.; et multiplica sequentem figuram de .192., scilicet .9. per eadem .3., erunt .27. terminantia in tertio gradu; quia cum secundus gradus multiplicat secundum, tertium gradum facit: quare extrahe .27. de .81., que sunt in tertio gradu, remanent in eisdem gradibus .24.; quibus copulatis cum .8. sequentibus, erunt .248.; ex quibus extrahe multiplicationem figurę primi gradus de .192. in .3. predicta, remanebunt .242.: quibus copulatis cum .9., erunt .2429.: ex quibus extrahe cubum octonarij, scilicet .512., remanebunt .1917. Vel aliter multiplica .8. in se, erunt .64.; que pone sub secundo, et primo gradu; mul-

* .29.: pone et non * (fol. 94 verso, lin. 21-31; pag. 151, lin. 17-27).

1
2 2
5 9
8 9 1
1 3 4 4
2 9 1 2 7
5 6 7 8 9
3 8
2 7
1 9 2
6 4

fol. 95 recto.

tiplicans .6. per .8., et extrahens de .242., remanent .194. super ipsis .242.; quibus copulatis cum .9. sequentibus, faciunt .1949.; ex quibus extrahe multiplicationem prime figure de .64. in .8., scilicet .32., remanebunt similiter .1917., que superhabundant triplum multiplicationis de .38. in .39. Ergo radix cubica de .56789. est .38., et remanebunt inde .1917.; quod residuum addit $\frac{3}{7}$ super predicta .38., et parum amplius.

Reversus si uis inuenire radicem de 456789., diuisis primis tribus figuris, radicem reliquarum trium, scilicet de 456., que est .7., pone sub secundo gradu; et residuum, quod est .113., pone super eis; et triplum quadrati de .7., scilicet .147., pone ita ut sint terminantia sub tertio gradu; et studeas inuenire figuram, que ponenda est sub primo gradu ante posita .7. per modum demonstratum; eritque .7., quam pone sub primo gradu: et multiplica ea per .1. de 147., erunt .7.; que extrahe ex .11., que sunt super .45., remanent .4. super quartum gradum; que copula cum .3. sequentibus, faciunt .43.; de quibus tolle multiplicationem eorundem .7. in .4. de .147., remanebunt .45. super .43.; quibus copulatis cum .7., erunt .157.; ex quibus tolle multiplicationem eorundem .7. primi gradus in .7., que sunt in .47., remanebunt .108. super .157.; deinde tripla quadratum septenarij primi gradus, erunt .147. terminantia in primo gradu; que ordinate per suas differentias per .7., que sunt posita sub secundo gradu, secundum quod in diuisione numerorum docuimus, multiplica. Nam ex uno ducto in .7. ueniunt .7.; quibus extractis de .10. remanent .3. | super .0.; et ex .4. ductis in .7. ueniunt .28.; quibus extractis de 38 remanent .10. super .38.; et ex ductis .7. in .7. ueniunt .49.; quibus extractis de .108. remanent .59. super tertium et secundum gradum; quibus copulatis cum .9. primi gradus faciunt .599.; ex quibus extrahe cubum septenarij, scilicet .343., remanent .256.; et sic radix inuencta est .77., et remanent .256.

Abhuc si uis inuenire radicem de 9876543., diuisis siquidem tribus primis figuris, remanent .9876.; quibus positus in aliam partem, eorum radicem inuenias ordine demonstrato, erit .21., et remanebunt inde 615.: pone ergo .21. sub tertio et secundo gradu: cum radix septem figurarum sit numerus figurarum trium; et remanentia .615. pone super .876., ut hic ostenditur; et tripla quadratum de .21., erunt .1323., que ponenda sunt terminantia in tertio gradu, in quo terminatur multiplicatio unitatis in se, que posita est sub secundo gradu: quibus ita positus cadit ultima figura eorum sub sexto gradu: deinde pone .4. ante .21.; que figura inuenitur ex magisterio superius demonstrato; et multiplicabis ipsa 4 per unamquamque figuram ordinate de .1323.; et incipies extrahere .6., que sunt super sextum gradum; quia cum primus gradus sextum multiplicat, sextum gradum facit: ergo multiplicabis .4. per 1, et extrahes de .6., remanebunt .2. super .6.; et .4. per 3, et extrahes de .21., remanebunt .9. super .1.; et 4 per 2, et extrahes de 95., remanebunt .87. super quintum, et quartum gradum; et 4 per 3, et extrahes de .875., remanebunt 863. super quintum, et quartum, et tertium gradum: deinde accipe triplum quadrati de .4., scilicet .48., et pone sub secundo, et primo gradu; et multiplicabis .4. ex ipsis .48. per 2. de 21 positus in radice, erunt 8., que extrahenda sunt de numero terminante in quarto gradu, scilicet de 86.; quia cum secundus gradus multiplicat tertium, quartum gradum facit, remanebunt .78. ex ipsis .86. super quintum, et quartum gradum: et eadem .4. multiplicabis per .1. de .21., erunt .4., que extrahenda sunt de numero terminante in tertio gradu, scilicet de .783.; quia cum secundus gradus

* quod residuum... eorundem * (fol. 95 recto, lin. 19, 20-30; pag. 152, lin. 5-14).

1
3 2
1 0 5
4 5 0 5
1 1 3 8 9 6
4 5 6 7 8 9
7 7
1 4 7
1 4 7
4 9

fol. 95 verso.

* 615. pone ... et extrahes * (fol. 95 verso, lin. 9-20; pag. 152, lin. 27-37).


6
7 7
7 8 2
8 6 3
2 9 7 9
6 1 5 3 6
9 8 7 6 5 4 3
2 1 4
1 3 2 3
4 8

secundum multiplicat, tertium gradum facit, remanebunt .779. super quintum, et quartum, et tertium gradum. Deinde multiplicanda sunt .8., que restant de .48., gradatim per eadem .21.; ergo multiplicabis .8. per .2., erunt .16., que extrahes de numero terminante in tertio gradu; quia cum primus gradus multiplicat tertium, tertium gradum facit, remanebunt .763. super quintum, et quartum, et tertium gradum; et 8 per 1. faciunt 8, que extrahes de numero terminante in secundo, scilicet de .7634.; quia cum primus gradus multiplicat secundum, secundum gradum facit, remanebunt inde .7626. | super quintum, et quartum, et tertium, et secundum gradum; que copula cum .3., que sunt in primo gradu, erunt .76263.; de quibus extrahe cubum de .4., scilicet 64., remanebunt .76199. super radicem inuentam, que est .214. Eodem modo si radicem alicuius numeri octo, uel nouem figurarum reperire uis; relictis primis figuris: radicem reliquarum per demonstratum modum inuenire studeas; et de inde, copulato residuo earum cum tribus dimissis figuris, facies secundum quod modo fecimus, et inuenies quesitum. Si deus uoluerit: eademque uia et ordine poteris operari in reperiendis radicibus cubicis numerorum decem, uel plurium figurarum.


Cum inter unitatem, et numerum aliquem duo numeri in proportione continua ceciderint, primus eorum radix cubica ultimi numeri esse in Geometria monstratur aperte. Vnde si geometricè radicem cubicam alicuius numeri inuenire uolumus, oportet nos uti modis antiquorum, per quos docetur ponere inter duas quantitates datas alias duas quantitates; ita ut omnes quatuor quantitates sint in proportione una: et quamuis hoc facili operari non possit; tamen, qualiter hoc fieri debeat, indicemus. Sint due date quantitates .c. et .f. Volumus inter .c. et .f. quantitates duas in continua proportione ponere; et sit .f. maior quam .c. Ponam siquidem circulum .abgd., cuius dyiameter .ag. sit equalis quantitati .f.; et ponam in circulo .abgd. lineam .gd. equalem quantitati .c.; et intelligam super semicirculum .adg. semicirculum esse orthogonaliter erectam, cuius semirotunditas cadat super arcus .adg.: quare dyiameter basis columnę cadet super dyametrum .ag.; et eius termini erunt super puncta .a. et .g.: et tunc erigetur super .ag. superficies plana semicolumnę orthogonaliter; et in ipsa circinabo semicirculum .aeg., cuius superficies orthogonaliter erecta est super superficiem circuli .abgd.; et á puncto .a. protraham rectam .az. faciens angulum rectum super rectam .ga., et faciam eam concurrere cum linea .gd. in punctum .z.; et mouebo semicirculum .aeg. ex parte .a.; et reuoluam trigonum .zag. super rectam .ag., que sit immobilis in reuolutione sua; et commouebo semicirculum .aeg., stabit immobiliter punctus .g.; et hoc faciam donec arcus .aeg. concurrat cum linea .gz. in superficie columnę in puncto .h.; et erit tunc dyiameter semicirculi .aeg. recta .gta.: et copulabo rectam .ht. cadens orthogonaliter super superficiem columnę super arcum .atd., et copulabo rectam .ah.: deinde intelligam, arcum .dkb. signatum esse á puncto .d., cum reuoluitur triangulus .zaig., et cadit punctus .d. super punctum .b. in reuolutione sua; et copulabo rectam .gh., et signabo punctum .l., ubi recta .gh. occurrit arcui .dkb.; et ducam .lm. rectam, que cadit orthogonaliter super circulum .abgd.; et protraham rectam .lt.: et quoniam in semicirculo .bkd. protracta est recta .lm. orthogonaliter super dyametrum eius .bd., erit superficies .bm. in .md. equalis eius quod á recta .lm. Sed superficiem .bm. in .md. equatur superficies .gm. in .mt., cum recte .db. et .gt. secant se in circulo

fol. 96 recto.

« ceciderint, primus ponere inter »
 (fol. 96 recto, lin. 10, 11-13; pag. 153, lin. 16-19).



« quatuor quantitates linea .gz. »
 (fol. 96 recto, lin. 14, 15-30; pag. 153, lin. 20-34).



fol. 96 verso.


.abgd.; quare angulus *.glt.* est rectus. Est enim et angulus *.gth.* rectus, cum recta *.ht.* sit in superficie columnę. Et quoniam semicirculus est arcus *.geha.*, erit et angulus *.gha.* rectus: similiter et angulus *.gml.* est rectus; orthogonia ergo sunt trigona *.gha.*, et *.gth.*, et *.glt.*, et *.gml.*, et habent unum angulum comunem, eum uidelicet qui sub *.lgm.*; ergo ipsa trigona sibi inuicem sunt similia: et habent circa comunem angulum latera proportionalia; quare est sicut *.ag.* ad *.gh.*, ita recta *.hg.* ad *.gt.*, et *.tg.* ad *.gl.*, et *.lg.* ad *.gm.*: posite quidem sunt tres recte continue proportionales inter rectas *.gm.* et *.ga.*, que sunt *.gl. gt. gh.* Inter rectas quoque *.gl.* et *.ga.* cadunt due recte *.gt.* et *.gh.* in proportione continua. Sed *.gl.* recte equalis est recta *.gd.* Sed *.gd.* equalis fuit recte *.c.*; et *.ga.* equalis est recte *.f.*; ergo inter *.cf.* quantitates posite sunt due quantitates in proportione continua, que sunt *.gt.* et *.gh.*; quare si quantitas *.c.* fuerit unum, erit quantitas *.gt.* radix cubica numeri *.f.*; quod oportebat facere.

OSTENDAM aliter qualiter inueniam inter duas lineas. Duas lineas ita ut continuentur omnes secundum proportionem unam. Ponam ergo duas lineas *.ab. bg.*; et angulus eorum sit rectus. Deinde continuabo *.ag.*; et faciam super lineam *.ag.* trianguli *.abg.* circulum *.abg.* Deinde protraham ex puncto *.a.* perpendiculararem *.ad.* super lineam *.ab.*; et ex puncto *.g.* super *.bg.* perpendiculararem *.dg.*; et protraham utramque secundum rectitudinem usque ad *.z.* et *.e.*; deinde faciam transire regulam, que moueatur super punctum *.b.*, et non separetur ab eo; et sic abscidens duas lineas *.dz.* et *.de.*, et non cesset moueri, donec sit illud quod cadit ex eis inter *.zb.* equale ei quod cadit inter *.eh.*; ergo linea *.zb.* est equalis lineę *.eh.*; ergo multiplicatio *.zh.* in *.zb.* est equalis multiplicationi *.be.* in *.he.*; uerum *.eb.* in *.he.* est equalis *.de.* in *.ge.*; et *.hz.* in *.zb.* est equalis *.dz.* in *.za.*; ergo multiplicatio *.dz.* in *.za.* est sicut multiplicatio *.de.* in *.ge.*; ergo proportio *.de.* ex *.dz.* est sicut proportio *.az.* ex *.ge.* Sed proportio *.ed.* ex *.dz.* est sicut proportio *.ba.* ex *.az.*; et proportio *.ba.* ex *.az.* est sicut proportio *.az.* ex *.ge.*, et etiam sicut proportio *.ge.* ex *.bg.*; et illud est quod demonstrare uolumus. Probatu hec figura per penultimam tertij EVCLIDIS, et per similitudinem triangulorum hoc modo: si *.gb.* ponatur aliquis numerus; et *.ab.* ponatur unum, erit *.az.* radix cubica de *.gb.*; quia sicut probatum est, ita se habet *.ba.* ad *.az.*, sicut *.az.* ad *.ge.*, et sicut *.ge.* ad *.gb.*; quare inter *.gb.* et *.ba.* iam ceciderunt due lineę proportionaliter, scilicet linea *.ge.*, et linea *.az.* et *.az.* sequitur unum in proportione; ergo est radix cubica.

ALITER sint rursus due quantitates *.a.b.*, inter quas uolumus ponere duas quantitates, ita ut continuentur secundum proportionem unam. Ponam quantitatem *.gd.* equalem quantitati *.a.*; et erigam ei lineam *.de.* rectum angulum; et ponam lineam *.de.* equalem quantitati *.b.*; et protraham lineam *.ge.*; et extendam duas lineas *.gd. ed.* secundum rectitudinem; et non ponam eis utrisque finem determinatum; et erigam super punctum *.e.* lineę *.ge.* lineam orthogonaliter erectam; et protraham ipsam donec occurrat lineę, que extenditur secundum rectitudinem cum linea *.gd.* super punctum *.z.*; et ponam ei equidistantem lineam *.gm.*; et extendam lineam *.mg.* in partem alteram secundum rectitudinem usque ad punctum *.p.*, ut sit linea *.mp.* equalis lineę *.ez.*; et extimabo quod possit *.ez.* moueri ex parte puncti *.z.* inseparabilis in motu suo in lineam *.zd.*; et linea in motu suo non cesset transire super punctum *.e.* lineę *.ge.*, ut quando mo-

3

« ex .ge. Sed proportio .ge. » (fol. 96 verso, lin. 34-35, e margine inferiore; pag. 154, lin. 24-26).



fol. 97 recto.

« occurat lineę et extendam » (fol. 97 recto, lin. 15 e 16; pag. 154, lin. 38-40).




uetur .ze. sicut narrauimus, tunc .z. est extremitas eius ex linea .zg.; tunc linea .ze. est in illa dispositione, ut secundum rectitudinem sit ostendendum, quod est inter motum puncti extremitatis eius, et punctum .e., sicut linea .ze. Deinde signabo super lineam extensam secundum rectitudinem signum .k.; et in maginabo quod linea .mp. moueatur ex parte puncti .m. ad partem puncti .k.; et sit extremitas eius, que est apud .m. inseparabilis in motu suo in linea .dk.; et linea .mp. in motu suo non cesset ire super punctum .g. lineę .ge., sicut narrauimus de motu lineę .ze. Et in maginabo quod due lineę .mp. .ze. in motu suo sint equidistantes: et in maginabo quod super extremitatem lineę .ze. super punctum .e. sit linea erecta orthogonaliter super lineam .ze. sequens eam in omni motu suo: et non ponam huic lineę finem determinatum; et hec linea non cesset abscidere lineam .mp. apud motum duarum linearum .ze. .mp. Cum ergo mouentur due lineę .ze. .mp.; et sint in motibus suis equidistantes, adherent extremitates utrarumque duabus lineis .zd. .mk.,| sicut narrauimus: procul dubio lineę fol. 97 v^o erecta super lineam .ze. orthogonaliter, que mouetur cum ea, et secat lineam .mp., peruenit ad punctum .p.

Quando ergo peruenit linea erecta super punctum .e. ad punctum .p., perueniunt illic due lineę .ze. .mp.; et copulabimus duas lineas .ep. .zm. Et scitum quidem est, quod linea .ep. erigit unamquamque duarum linearum .ze. .mp. orthogonaliter. Quoniam est linea, quam posuimus in principio esse erectam orthogonaliter super lineam .ze., et mouetur cum ea, donec peruenit ad punctum .p. Dico ergo quod due lineę .dm. .dz. sunt due quantitates, que iam ceciderunt inter duas quantitates .gd. et .de.; et proportio .gd. ad .dm. est sicut proportio .dm. ad .dz., et sicut proportio .dz. ad .de.; cuius demonstratio est. Quoniam due lineę .ze. .mp. sunt equidistantes et equales; et duo anguli .zep. et .mpe. sunt recti; tunc linea .zm. est equalis lineę .ep.; et unusquisque duorum angulorum .ezm. et .mpe. est rectus. Sed illa uero linea .md. est perpendicularis super lineam .zg.; et linea .zd. est perpendicularis super lineam .me. Ergo proportio lineę .gd. ad .dm. est sicut proportio .dm. ad .dz., et sicut proportio .dz. ad .de. Verum linea .gd. est equalis quantitati .a.; et linea .de. est equalis quantitati .b.; ergo due lineę .de. .dm. iam ceciderunt inter duas quantitates .a. .b.; et continuatur secundum proportionem unam; et illud est quod uolumus ostendere.


Incipit de multiplicatione radicum cubicarum inter se.

Si vis multiplicare radicem cubicam de .40. per radicem cubicam de .60., multiplica .40. per 60., erunt .2400., quorum radix cubica est id quod queris. Et si uis .5. multiplicare per radicem cubicam de .90., cubica .5., erunt .125.: ergo uis multiplicare radicem cubicam de .125. per radicem cubicam de .90.; quare multiplicabis .125. per .90.; et eius quod prouenerit radix cubica est illud quod queris. Et si uis multiplicare duas cubicas radices de 20. per tres radices cubicas de .40., redige eas ad radicem cubicam unius numeri sic: pro duabus radicibus de .20. cubicabis .2., erunt .8.; que multiplica per .20., erunt .160., quorum radix cubica equatur duabus radicibus de .20.: similiter pro tribus radicibus de .40. cubica .3., erunt .27.; que multiplica per .40., erunt .1080., quorum radix cubica habetur pro tribus radicibus de 40.: multiplica ergo .160. per .1080.; et eius quod prouenerit radix cubica erit illud quod queris. Item si uis multiplicare radicem cubicam de .20. per aliquid, unde proueniat aliquis numerus datus, ut dicamus .10., cubica .10., erunt .1000.; que diuide per .20., exhibunt .50.,

* lineam .mg. motu suo v (fol. 97 recto, lin. 17-29; pag. 154, lin. 40 — pag. 155, lin. 6).



* illic due Verum linea z (fol. 97 verso, lin. 4-16; pag. 155, lin. 17-28).



fol. 98 recto.

quorum radix cubica est id quod queris. Et si uis inuenire duas radices | cubicas numerorum non cuborum, que insimul multiplicata faciant numerum ratiocinatum, cubica unum numerum qualem uis : et inuenias duos numeros, qui insimul multiplicati faciunt ipsum cubum numerum. Cubice autem radices ipsorum duorum numerorum erunt quesita : uerbi gratia : cubicentur .6., erunt .216.; et inuenias duos numeros, qui insimul multiplicati faciant .216. ; eruntque .9. et .24. , quorum radices cubice sunt quesita. Aliter adiaceant duo numeri quadrati quales uis; sintque .4. et .9.; multiplica per unum quemque ipsorum per radicem alterius, exhibunt .12. et .18., quorum radices insimul multiplicata faciunt radicem cubi numeri, ut querebatur.

Incipit de diuisione radicarum inter se.

Si uis diuidere radicem cubicam de .100. per radicem cubicam de .5., diuide .100. per .5., prouenient .20., quorum radix cubica est id quod queris. Et si diuideris .5. per .100, prouenient $\frac{1}{20}$, cuius radix cubica est id quod prouenit ex radice de .5. diuisa in radicem de .100. Et uis diuidere .8. per radicem de .32., cubum de .8., scilicet .512., diuide per .32., uenient .16., quorum radix cubica est id quod queris. Et si uis diuidere radicem de .80. per .2., diuide .80. per cubum binarij, uenient .10., quorum radix cubica est id quod queris. Item si uis diuidere octo radices cubicas de .10. per tres radices cubicas de .5., rediges pluralitatem ipsarum radicum ad radicem unam, et habebis .5120 pro octo radicibus de .10.; et pro tribus radicibus de .5. habebitur radix de 133.

Incipit de aggregatione et disgregatione radicarum.


SCIAS in additione et disgregatione radicum cubicarum euenire ea que inter radices eueniunt quadratorum , uidelicet quod quedam ex eis possunt inter se aggregari, et disgregari: et quedam non. Cum itaque cubice radices inter se proportionem habuerint, ut cubus numerus ad cubum numerum, tunc inter se aggregari possunt, et disgregari. Vnde si eas, quarum cubi habent proportionem sicut numerus cubus ad cubum numerum aggregare uis; radices ipsorum cuborum insimul adde: et quod prouenerit, cubica; et cubicatam summam multiplica per multiplicatam, quam habent cubi ipsarum radicum ad cubos proportionis. Verbi gratia : uis addere radicem cubicam de .16. cum radice cubica de .54., quorum numerorum proportio est sicut cubus numerus .8. ad cubum numerum .27.; et unusquisque ipsorum duplus est sui cubi : adde ergo radicem cubicam de .8. cum radice cubica de .27., scilicet .2. cum .3., erunt .5.; que cubica, erunt 125.; que multiplica per .2. propter .16. et .54., que sunt dupla de .8. et de .27., erunt 250., quorum radix cubica est additio quesita. Et si ipsas radices disgregare uis, radicem de .8. ex radice de .27. extrahe, remanebit unum, cuius | cubum, scilicet .1., multiplica per predictam multiplicationem, scilicet per 2., et habebis radicem de .2. pro residuo quesite extractionis. Item si uis addere radicem cubicam de .4. cum radice cubica de .32., quorum numerorum proportio est sicut .4. ad .8.; et est unusquisque eorum quadruplus sui cubi. Quare radicem cubicam de .4. adde cum radice de .8., erunt .3.; quorum cubum, scilicet .27., quadruplica, erunt .108., quorum radix cubica est additio quesita. Et si radicem de .4. extrahere uis ex radice de .32., radicem de .1. extrahe ex radice de .8., remanet .1., cuius cubum, scilicet .1., quadruplica, erunt .4., quorum radix cubica est residuum quesite extractionis.

fol. 98 verso.

Aliter sit linea .*ab*. radix cubica de .32.; et .*bc*. sit radix de .4.; et uolo scire quan-

titatem totius .ac. Quoniam linea .ac. diuisa est in duo super punctum .b., erunt duo cubi portionum .ab. et .bc. cum triplo quadrati .ab. in .bc., nec non et cum triplo quadrati .bc. in .ab. equales cubo totius lineę .ac. Quare addantur cubi portionum .ab. et .bc., scilicet .32. cum .4., erunt .36.; et multiplicetur .ab. in se, scilicet radix cubica de .32., in radicem cubicam de .32., ueniet radix cubica de .1024.; quam radicem triplica, scilicet multiplica .1024. per .27., ueniet radix cubica de .27648.; quam radicem multiplica in .bc., scilicet in radicem cubicam de .4., ueniet radix cubica de .110592., que est .48.: uel aliter ex quadrato lineę .ab. in .bc. proueniet semper cubus numerus in similibus: quare multiplica .1024. per .4., erunt .4096., quorum radix cubica est .16.; que multiplica per .3., erunt .48.; que adde cum .36., erunt .84. Item quadratum lineę .bc., scilicet radicem cubicam de .16., multiplica per .ab., scilicet per radicem de .32., ueniet radix cubica de .512., que est .8.; quam multiplica per .3., erunt .24.; que adde cum .84., erunt .108. pro cubo totius lineę .ac. Ergo .ac., scilicet coniunctum ex radice de .32., et ex radice de .4. est radix cubica de .108., ut per alium modum inuenimus. Et si radicem de .4. per alium modum ex radice de .32. extrahere uis, quandam diffinitionem lineę diuise, quam huic operi necessariam inueni, oportet predicere, uidelicet. Vt cum aliqua linea utlibet diuisa in duo fuerit, cubus totius lineę cum numero solido, qui fit a quadrato unius portionis, et tota linea equalis duplo numeri solidi, qui fit a quadrato totius lineę, et ab eadem portione, et solido, qui fit a quadrato relique portionis, et a tota linea. Verbi gratia: sit linea .ab. .5. diuisa super .g.; et sit .ag. 3.; quare .gb. est .2.: erit itaque cubus lineę .ab. 125.; et solidus qui fit a quadrato lineę .gb. in lineam .ab. erit .20.: quibus additis cum .125., erunt .145., quibus equabitur [duplum solidi, quod fit a quadrato lineę .ab. in lineam .bg. cum solido, quod fit a quadrato lineę .ga. in lineam .ab.: quia ex ductu .ab. in se ueniunt .25.; quibus ductis in .gb., erunt .50., quorum duplum est .100.: quibus additis cum multiplicatione quadrati lineę .ga. in .ab., scilicet cum 45, faciunt .145., ut oportet. Hac itaque diffinitione intellecta, pro radice cubica de .32. adiaceat linea .de.; et accipiatur ex ea portio .ez., que sit radix cubica de .4., remanet .zd. ingnota, quam inuenire uolumus. Constituam igitur super lineam .de. quadrilaterum equilaterum et equiangulum .cdef.; et signabo punctum .b. in lineam .ef., ita ut .eb. sit equalis lineę .ez.; et per punctum .b. protraham lineam .ba.; et sit .ad. equalis lineę .be. Item per punctum .z. protraham .zg.; et sit .gf. equalis .ze. Quibus explicatis, accipiam cubum lineę .de., qui est .32.; et multiplicabo .ze. in se, prouenit radix cubica de .16. pro quadrato .hzeb.; quam superficiem ductam in altum secundum quantitatem lineę .de.; hoc est multiplicabo superficiem .zb., que est in plano, per equallem lineę .de.; quam intelligo eleuatam in altum, scilicet radicem de .16. per radicem de .32., prouenit radix cubica ipsius numeri, qui prouenit ex .16. in .32.: sed ex .16. in .32. prouenit idem quod ex dimidio de .16. in duplo de .32., scilicet ex .8. in 64.: sed ex ductis .8. in .64. prouenit numerus cubus, cum .8. et .64. sint cubi, cuius radix est illud quod prouenit ex radice de .8. in radice de .64., scilicet de .2. in .4.; et sic habentur .8. pro solido, qui fit a quadrato lineę .ez. in lineam .ed.: quibus .8. additis cum .32., scilicet cum cubo lineę .ed., faciunt .40.; de quibus si auferatur duplum solidi, qui fit a superficie .ade., et a linea .ed., hoc est duo solidi, qui fiunt a superficie predicta, et a superficie .zefg. eleuatis in altum secundum lineam .ed., remanebit so-

* in .bc. totius * (fol. 98 verso, lin. 13; pag. 157, lin. 2 e 3).




* qui fit duplo numeri * (fol. 98 verso, lin. 30; pag. 157, lin. 17 e 18).



fol. 99 recto.

* .16. per radicem predicta, et a * (fol. 99 recto, lin. 17-24; pag. 157, lin. 35-43).



lidum, quod fit eleuatum in altum secundum quantitatem lineę .*de*. super quadratum lineę .*za*. ignotę, scilicet super quadratum .*cahg*. Nam solidus qui fit á superficie .*adzh*. eleuata in .*de*. habetur ex multiplicatione .*be*. in .*ed*. ducta in .*ed*., hoc est ex quadrato lineę .*ed*. in .*ez*.; ergo multiplicabis radicem de .32. in se, ueniet radix de .1024.; quam multiplicabis per .*be*., hoc est per .*ez*., scilicet per radicem de .4., ueniet radix illius, quod prouenit ex duplo de .4. in dimidium de .1024., scilicet ex .8. in .512.: sed radix eius quod prouenit ex .8. in .512. est id quod prouenit ex .2. in .8., scilicet ex radice de .8. in radicem de .512.; ergo solidus qui fit ex .*de*. in .*ez*. producta in .*de*. erunt .16.; quorum duplum extrahe de .40., remanent .8. pro solido qui fit á quadrato lineę .*zd*. in lineam .*de*. Quare si diuiseris .8. per lineam .*de*., scilicet per radicem cubicam de .32., ueniet radix cubica de .16. pro quadrato lineę .*zd*., hoc est pro superficie quadrata .*ag*. Quare radix quadrata radicis cubicę de .16., scilicet radix cubica de .4., est linea .*ha*., hoc est linea .*zd*.: ergo si de radice cubica de .32. auferatur radix cubica de .4., remanet radix cubica de .4., ut per alium modum inuenimus. Et quia inuenta est linea .*zd*. equalis lineę .*ze*., erit tota linea .*de*. duplum lineę .*ez*. Vnde ex hoc manifestum est, quod cum aliquis numerus fuerit octuplum alterius, tunc radix cubica maioris erit duplum radicis cubicę minoris. Vnde radix cubica de .32. soluitur in duabus radicibus de .4.: quare cum uis addere radicem de 32. cum radice de .4., tunc uis addere duas radices de .4. cum una radice de .4., ex qua coniunctione proueniunt tres radices de 4, hoc est radix eius quod prouenerit ex ductis 27. in 4. Similiter cum uis extrahere radicem de 4. ex radice de 32., tunc ex duabus radicibus de .4. extrahe unam radicem de 4, remanebit una radix de 4, ut modo inuenimus. Et ut hec melius declarescant, addatur radix de 135 cum radice de 1715, quorum proportio est sicut cubus 27 ad cubum 343; et est unusquisque eorum quincuplus sui cubi. Quare accipe radices ipsorum cuborum, erunt .3. et 7: dic ergo te uelle addere tres radices de 5 cum 7 radicibus de 5; ex qua iunctione proueniunt decem radices cubice de 5, hoc est una radix de 5000. Et si uis extrahere radicem de 135 ex radice de 1715, extrahe tres radices de 5 ex septem radicibus de 5, remanebunt quatuor radices de 5, scilicet una radix de 320. Et sic intelligas in omnibus radicibus cubis inter se comunicantibus: relique uero radices, que proportionem non habent, addi, nec disgrari (*sic*) possunt. Vnde si uis addere radicem cubicam de 5 cum radice cubica de 3, proueniet ex eorum additione radix de 5, et radix de 3: et si uis eas disgregare, habebis radicem de 5, minus radice de 3; et aliter dici non possunt pulcrius. Vnde huic capitulo finem in ponimus.

Incipit distinctio .VI.^a in dimensione corporum.

CORPORVM QUIDEM GENERA SUNT plura, ex quibus sunt hec: SOLIDI. SERATILIA. PYRAMIDES. COLUMNE. SPERE., et eorum partes, nec non et CORPORA, que multorum basium nuncupantur, et describuntur circa speras: | proprie quidem SOLIDVM est, quod latum longum et altum habet; et constat ex sex superficiebus: ut sunt tassilla: scrinea: cisterne et similia.

SERATILE quoque est dimidium solidi constans ex tribus paralilominis, et duobus triangulis; quod habetur, cum superficies secat solidum sex basium super dyametros eius, soluens ipsum in duas portiones equales, quarum unaqueque Seratile, siue cunus nun-

cupatur. **PIRAMIS** quidem est figura á base, cuiusque sit formę, ad unum punctum deducta. **COLVNA** uero est figura orthogonaliter eleuata super basem circulařem terminata in circulo, qui equalis est sue basi; uel est illud quod ambit paralilogramum rectiangulum circa latus unum immobiliter fixum ad idem punctum reductum; que etiam uocatur figura teres: piramis colunę est, quam triangulus rectiangulus ambit circa unum ex lateribus, rectum continens angulum immobiliter fixum ad idem punctum reductum. Si ergo latus fixum alteri equum fuerit, piramis rectiangula est: si longius, exigonium est; si breuius, ampligonium nuncupatur, cuius axis est latus fixum: basis uero circulus.

SPERA uero quidem est corpus undique rotundum, quam uulgo pallam dicimus; et est illud quod ambit semicirculus circa dyametrum immobiliter fixum, ad idem punctum reductus, cuius centrum est centrum semicirculi, á quo omnes recte, que egrediuntur ad superficiem sperę, sibi inuicem sunt equales. **SEMISPERA** quidem est, que medietatem sperę amplectitur, cuius basis est circulus maior, qui in spera potest circinari, cuius dyameter est dyameter sperę, cuius termini poli sperę dicuntur.

PORTIO uero spere est, que plus uel minus est semisperę, cuius basis est circulus minor circulo semisperę. **SOLIDA** multarum basium sunt multimoda, ex quibus sunt solida .viii. basium, et xii. basium, et xx. basium equalium, que **EVCLIDES** in xiii. libro infra speram construere docet. Sunt etiam alie infinite corporum speties, quorum mensure habebuntur per ea que super prescripta corpora dicere procurabimus: et ut modus mensurandi corpora perfecte habeatur. Hanc distinctionem in tres partes diuidimus. In prima quarum mensurabimus solida equidistantium laterum, nec non et ea que supra bases suas, cuiusque sint formę, in altum eleuantur, et deficiunt in superficies similes, et equales suis basibus. In secunda quoque mensurabimus piramides, et eorum partes. In tertia quoque uero mensurabimus speras, et eorum partes, nec non et solida multarum basium cadentium infra speras. Et notandum cum dicimus aliquod corpus continere tot ulnas, uel palmos, uel digitos, seu uncias, uel aliquas alias mensuras, tunc intelligimus, illas mensuras esse corporales, seu cubicas; que tribus equalibus dimensionibus, latitudine scilicet, et longitudine, atque altitudine constant. Nam palmus corporalis, siue cubicus est, qui unum palmum in latum, et longum, et altum, et omnes angulos rectos habet: quod idem intellige de ulnis, et alijs mensuris. Et ut ea que dicere uolumus certis probationibus demonstrantur. Quedam que sunt undecimo, et reliquis sequentibus libris **EVCLIDIS** probata apertissime proponantur, ex quibus sunt hec. Linea recta nequaquam potest esse in plano, et alto. Et cum due linee sese inuicem secant, in una sunt superficie. Et omne trigonum in una superficie est. Et cum due plane superficies sese inuicem secant, comunis eorum sectio est linea recta. Et cum super sectionem duarum rectorum recta aliqua perpendiculariter steterit, toti superfici ei orthogonaliter stabit. Et cum steterit linea recta supra comunem sectionem trium linearum cum unaquaque rectum continens angulum, hee tres linee in una superficie sunt linee recte; si eidem superfici ei perpendicularares fuerint, equidistantes sunt. Inter duas lines equidistantes utcumque recta linea continuetur, in earum superficie est. Linearum equidistantium cuicumque superfici ei altera perpendicularares fuerit, eidem perpendicularis est. Linee cuiuslibet uni equidistantes, licet non omnes in eadem superficie sunt, et sibi inuicem equidistantes. Linee due continentes angulum, si equidistent lineis dua-

bus alium angulum continentibus; nec ipse in una superficie anguli tantum equales ab uno cuiuscumque superficiei puncto duas eidem superficiei perpendiculares in eandem partem erigi impossibile. Si lineae duae superficiem continentibus duabus lineis aliam superficiem continentibus equidistant; nec ipse lineae in una superficie, haec superficies equidistantes sunt. Cum superficies duas superficies equidistantes secat, communes sectiones earum equidistantes sunt. Lineas duas, si superficies equidistantes secant, proportionaliter secari necesse est. Ex perpendiculari supra quamlibet superficiem stante quaecumque superficies educte fuerint, super eandem superficiem orthogonaliter stabunt. Quaecumque superficies supra quamlibet superficiem orthogonaliter stantes sese inuicem secant, communis earum sectio subiecte superficiei perpendicularis est. Angulus solidus, si tres planos contineat, eorumque duo simul accepti maius sunt reliquo. Omnes anguli plani, quos angulus solidus continet, quattuor rectis sunt minores. Si equales lineae tres angulos | planos continent, quorum quisque duo accepti reliquo sunt maiores, eorum cordis triangulum fieri possibile est. Omnes solidi superficierum equidistantium omnes superficie opposite equales sunt, et equidistantium laterum solidum equidistantium laterum si superficies secet, equidistans duabus eius superficibus oppositis proportione basium secari necesse est. Solidum equidistantium laterum, si superficies secet per dyametrum duarum eius superficierum oppositarum, per medium secari necesse est. Solida laterum equidistantium supra basem eandem super lineam unam eiusdem altitudinis equalia: solida laterum equidistantium supra basem eandem, nec super lineam unam, dum eiusdem altitudinis sint equalia: solida laterum equidistantium supra bases equales lineis á basibus in altum orthogonaliter, eademque altitudine eductis equalia. Solida laterum equidistantium supra bases equales, nec lineis á basibus orthogonaliter, dumtaxat eadem altitudine erectis equalia. Omnium solidorum laterum equidistantium eiusdem altitudinis, quae basis ad basem proportio. Solida laterum equidistantium, si lineis á basibus orthogonaliter erectis pariter et equalia fuerint, erunt bases, et altitudines earum mutue proportionis. Solida laterum equidistantium quaecumque, si equalia fuerint, bases et altitudines eorum mutue proportionis sunt: quod si bases, et altitudines eorum mutue sint proportionis, erunt et ipsa equalia. Inter solida superficierum equidistantium similia proportio solidi ad solidum tripla proportioni laterum eorum adinuicem relatorum. Solida similia dicuntur quae angulos habent equales, et circa equales angulos latera proportionalia. A' planis duobus angulis equalibus, si lineae duae in altum erigantur, quarum utraque duas altrinsecus angulorum cum lineis angularibus contineant, equales duobus angulis, quos altera similiter hinc inde cum lineis angularibus continet. Cum á punctis in lineis in altum erectis quacumque designatis descendant perpendiculares due inter superficies linearum angularium, tum et puncta in quae perpendiculares incidunt recte lineae cum ipsis angulis continent: haec quoque lineae cum lineis erectis equales angulos continebunt. Inter solida duorum laterum equidistantium, quorum alterum continent tres lineae proportionales: alterum latera equalia, singula medie trium proportionalium, tum et anguli eorum equalis fiunt, et ipsa equalia. Si super lineas proportio solida laterum equidistantium similia, eademque informatione construuntur, fiunt et ipsa proportionalia: quod si solida laterum equidistantium similia proportionalia fuerint, lineas quoque, | super quas constructa sunt, proportionaliter esse

fol. 101 recto.

fol. 101 verso.

conuertitur. Si duarum cubi superficierum oppositarum cunctis lateribus per medium diuisis inter puncta diuisionum due describantur superficies, et cubum sese inuicem secantes, comunis eorum sectio dyametron cubi media mediam secat. Si cunei duorum, quorum alterius paralilograma, alterius basi triangule dupla, eque alti fuerint, equales necesse est. Omnium pyramidum eiusdem altitudinis, quibus triangule ubi fuerint in pyramidis binas equales totis similes ad cuneos binos equales erunt, proportio basis ad basem, que cuneorum unius ad cuneos alterius. Omnium pyramidum, quibus bases triangule, si eque alte fuerint, proportio ad inuicem, que basis ad basem. Omnis cuneus diuidi potest in tres pyramidis equales basium triangularum. Omnium pyramidum, quibus bases triangule, si equales fuerint, fiunt bases, et altitudines earum mutue proportionis. Quod si bases, et altitudines earum mutue sint proportionis, ipsas pyramidis equales esse conuertitur. Omnium pyramidum similium basium triangularum adinuicem proportio tripla proportioni laterum adinuicem relatorum. Omnes columnę, quibus una basis, uel que super equas bases sunt, est earum proportio sicut axis ad axem. Omnis columna teres equalium terminorum, et spissitudinis pyramidi tereti super eandem basim eius altitudinis tripla. Omnis columnę, ac pyramidis teretis, quibus una basis, idem axis, proportio tripla proportioni, que inter dyametrum basium. Omnis pyramis, columnęque teretis, quibus una basis, idem axis, si eque alte fuerint pyramidi, columnęque tereti, quibus una basis, idem axis, erit et pyramidum, et columnarum proportio, que basis ad basem. Omnis pyramis, et columna teres, quibus una basis, idem axis, si equales fuerint pyramidi, columnęque tereti, quibus similiter una basis, idem axis, erunt bases, et altitudines earum mutue proportionis. Quod si bases, et altitudines earum mutue sint proportionis, ipsas etiam equales esse conuertitur. Omnium sperarum proportio tripla proportioni dyametrorum. Linea proportione medij et extremorum diuisa, si pars maior directe producat ad equum dimidij lineę diuise, productę lineę tetragonus quincuplum est tetragono dimidij lineę. Linea in duo diuisa, si totius tetragonus quincuplus fuerit tetragono partis minoris, tum pars maior producat usque ad duplum partis minoris. Producta linea proportione medij et extremorum diuisa est, cuius pars maior, pars maior lineę prioris. Linea proportione medij et extremorum diuisa, si parti minori continuetur dimidium partis maioris, eius lineę tetragonus quincuplus est dimidij partis maioris. Linea proportione medij et extremorum diuisa, si producat ad equum partis maioris, tota quoque linea proportione medij et extremorum diuisa est, cuius pars maior lineę prior. Linea proportione medij et extremorum diuisa, lineę tetragonus simul cum tetragono partis minoris triplus est tetragono partis maioris. Omni lineę rationali proportione medij et extremorum diuisa, pars utraque residuum est. In pentagono equilatero si tres anguli fuerint equales, erunt omnes anguli equales. In circulo describitur triangulus equilateralis, lateris eius tetragonus triplus est tetragono dimidij dyametri. In circulo descripto lateri decagonico intrinsecus continuetur latus exigonicum tota lineę lineę proportione medij et extremorum diuisa est, cuius pars maior latus exigonicum. In circulo descripto pentagono equilatero latus pentagonicum potest super latus exigonicum, ac latus decanonicum. In circulo descripto pentagono equilatero duorum eius angulorum corde sese inuicem secant, utraque secari necesse est. Ad idem punctum proportione medij et extremorum maior utriusque pars equalis lateri penta-

col. 102 recto.

gonico in omni circulo, cuius dyametrum rationali pentagoni equilateri latus irrationale est, cui nomen linea minor. In sphaera, cuius dyametros longitudine rationalis, si construatur solidum .xx. basium triangulorum equilaterum, latus eius irrationale est, cui nomen linearum minor. In sphaera, cuius dyametrum potentia rationale, si construatur solidum .xij. basium pentagonorum, latus eius in rationale est, cui nomen est residuum.


Incipiunt theoremata quartidecimi libri.

LATVS exigonicum, si proportione medij et extremorum diuidatur, pars maior est latus decagonicum. In centro circuli deducta perpendicularis á latus pentagonicum equalis est dimidio lateris exagonici, laterisque dacagonici. In circulo tetragonus lateris pentagonici simul cum tetragono corde anguli pentagonici quincuplum est tetragono lateris exagonici. Depositis assumimus demonstrandum, quoniam pentagonum solidum .xij. basium pentagonorum et triangulorum .xx. basium triangularum in eadem sphaera constructarum; idem circulus continet in circulo descripto pentagono equilatero tringituplum superficiei contente | latere pentagonico ac perpendiculari á centro circuli ad latus pentagonicum deducta, equum est superficiei solidi .xij. basium pentagonorum. Similis demonstrationis est; quoniam si triangulum equilaterum circulus contineat, á cuius centro in latus trianguli perpendicularis descendat, tringituplum superficiei latere trianguli, et ea perpendiculari contente equum est superficiei solidi .xx. basium triangularum. Depositis assumimus quoniam proportio superficiei solidi .xij. basium pentagonarum ad superficiem solidi xx basium triangularum in eadem sphaera constructarum, que lateris cubici eiusdem sphaerae ad latus solidi .xx. basium triangularum. De inde assumimus, quoniam proportio lateris cubici ad latus solidi .xx. basium triangularum eiusdem sphaerae, que lineae potentis tetragonum totius lineae proportione medij et extremorum diuise partem cum tetragono partis maioris ad lineam potentem tetragonum eiusdem lineae totius simul cum tetragono partis minoris: per hoc, concluditur, quoniam que proportio lateris cubici ad latus solidi .xx. basium triangularum, ipsa est solidi xij basium pentagonarum ad solidum xx basium triangularum. Quicquid enim decidit cuicumque proportione medij et extremorum diuise idem accidit omni lineae similiter diuise. Post has quidem omnes probationes oportet nos scire subscriptas operationes, que in eisdem libris EVCLIDIS dicuntur, videlicet. Vt á dato puncto in altum á puncto in alto designato supra datam superficiem perpendicularem deducere á dato puncto in designata superficie perpendicularem eidem superficiei in altum erigere. Ex tribus angulis planis quorum quique duo simul accepti maius sunt reliquo, angulum solidum construere: Vnde necesse est, eos tres angulos iii^{or} rectis esse minores. Ad signatum punctum datę lineę angulum solidum construere equalem signato angulo lineis contempto. Supra datam lineam solidum construere simile signato solido superficierum equidistantium. Inter duos circulos, qui sunt ab uno centro, describere superficiem multiangulam minime contingentem minorem circulum. Inter duas sphaeras, que sint ab uno centro, describere solidum plurimarum superficierum maiorem sphaeram contingens minorem sphaeram. Et infra datam sphaeram solidi . iii^{or} , et sex., et viij., et xij., et xx basium construere: nec non et latera ipsarum quinque figurarum infra unam sphaeram insimul collocare: et quedam ex suprascriptis quinque solidis infra quedam eorum aptare: ut in quintodecimo libro fieri docetur. |

CVM autem aliquod corpus huius primę partis mensurare desideras; embadum basis ipsius, secundum quod superius in tractatu embadorum docui, diligenter inquiras: quod per ipsius corporis altitudinem multiplica, et quod prouenerit, erit embadum ipsius corporis: est enim altitudo corporum huius primę partis linea recta, que orthogonaliter erigitur supra basem, et terminatur in superficiem equidistantem basi. Et ut hec aperte monstrentur, adiaceat primum cubus .*aeg.* habens palmos .10. in latitudine: longitudine: et latitudine. Cuius sex superficies sunt tetragonę, cum habeant angulos rectos, lateraque equalia; et sit basis eius tetragonum .*ac.*, cui equidistans est tetragonum .*eg.*: cumque aream basis, que est .100., in lineam .*ac.*, que est altitudo cubi, multiplicaueris, .1000. palmos cubicos pro embado ipsius cubi habebis: et si dyametrum ipsius cubi, scilicet lineam .*hb.* habere uis, quadrata laterum .*ba.* et .*ad.* insimul iunge, et habebis .200. pro linea .*db.*: quibus si addatur tetragonum lineę .*dh.*, quod est .100., habebuntur .300. pro quadrato dyametri .*bh.*: ergo dyameter .*bh.* est radix trecentorum. Et notandum quod recta .*bh.* est dyameter sperę, in qua cadit cubus .*aeg.* Et tantum notitiam dyametri .*bh.* habueris; et per ipsam latera cubi, et embadum eius habere desideras: dyametrum in se multiplica, et eius quod prouenerit tertiam accipe, et habebis tetragonum lateris cubi; quod tetragonum, si per radicem eius multiplicaueris, nimirum embadum ipsius cubi procreabitur. Et si aliquis dixerit: agregau quadratum dyametri cubi cum quadrato ipsius lateris, et prouenerunt .400.; ponam latus .*ab.* rem, quam multiplicabo in se, et proueniet census; quem addam cum triplo eius, scilicet cum quadrato dyametri .*bh.*, proueniet .111^{or} census, qui equantur .400. dragmis: diuide ergo .400. per .4., ueniet .100. pro quadrato lateris cubi, quod est .*ab.*; quare .*ab.* est 10. Item agregau quadratum dyametri cum latere ipsius, et prouenerunt .310.: ponam iterum latus .*ab.* rem, scilicet radicem; quare quadratum dyametri .*bh.* equatur tribus censibus, hoc triplo quadrati lineę .*ab.*: ergo pro quadrato dyametri cubi, et pro latere ipsius habentur tres census, et una radix, que equantur .310.: redige hoc ad censum unum, scilicet accipe tertiam partem omnium adiacentium, et proueniet census, et tertia radiceis, que equantur $\frac{1}{3} 103$: quare dimidianda est illa tertia radiceis, et proueniet $\frac{1}{6}$; quam in se multiplica, ueniet $\frac{1}{36}$; quam adde cum $\frac{1}{3} 103$, erunt $\frac{13}{36} 103$: quorum radicem accipe, que est $\frac{1}{6} 10$, et extrahe inde sextam pro ea quam multiplicasti, remanebunt .10. pro latere .*ab.*; cuius quadratum, scilicet .100. triplica, et habebis quadratum dyametri .*bh.*: et sic secundum hoc | possumus consimiles subtilitates in cubis inuenire. Rursus esto solidum, cuius basis sit tetragona habens in uno quoque latere pedes .10.; altitudo quoque ipsius sit plus uel minus laterum basis; multiplicabis similiter embadum basis per eius altitudinem; quam pono esse .12., uenient pedes .1200. pro embado ipsius solidi; cuius dyametrum inuenies esse radicem de 344.: si super duplo quadrati lateris ipsius, scilicet super 200, addideris quadratum altitudinis eius, quod est 144. Et si proponatur, dyametrum solidi equidistantium laterum esse radicem de 344., cuius basis sit tetragona; et eius altitudo excedat latera basis in duobus; et queratur latus ipsius basis, nec non et ipsius solidi embadum, ut in solido .*aei.*, cuius dyameter sit linea .*tb.*; ponam latus .*ab.* radicem, et addam quadratum lineę .*ab.* cum quadrato lineę .*ad.*, et uenient duo census pro quadrato lineę .*db.*: et signabo punctum .*c.* in rectam .*dt.*, et sit .*ct.* duo; remanebit ergo .*dc.* equalis recte .*da.*; quare .*dc.*


fol. 103 recto.

equalia; et sit eius multiplicaueris * (fol. 103 recto, lin. 9-19, 20; pag. 163, lin. 8-17).



fol. 103 verso.


e altitudo quoque ... cum duplo * (fol. 103 verso, lin. 3-15, 16; pag. 163, lin. 34 — pag. 164, lin. 2).



est radix: et quia recta *.dt.* diuisa est in duo super punctum *.c.*, erunt duo quadrata sectionum *.dc.* et *.ct.* cum duplo *.tc.* in *.cd.* equalia quadrato lineę *.td.* Nam ex *dc* in se prouenit census; et ex *.ct.* in se prouenient 4.; et ex duplo *.tc.* in *.cd.* proueniunt 117^{or} radices: ergo pro quadrato lineę *.td.* habetur census, et 117^{or} radices, et 4 dragme; quibus additis duobus censibus, scilicet cum quadrato lineę *.db.*, uenient tres census, et 117^{or} radices, et 4 dragme pro quadrato dyametri *.tb.*, que equantur 344.: ex quibus si communiter auferantur .4 dragme, remanebunt tres census, et 117^{or} radices, que equantur 340.: quare si hec redigentur ad censum unum, ueniet census, et radix $\frac{1}{3} 1$, que equantur $\frac{1}{3} 113$: quare si dimidiauerimus $\frac{1}{3} 1$, uenient $\frac{2}{3}$; quibus in se multiplicatis, et cum $\frac{1}{3} 113$ additis, erunt $\frac{7}{3} 113$; de quorum radice, que est $\frac{2}{3} 10$, si auferantur $\frac{2}{3}$, remanebunt .10. pro latere *.ab.*; quare altitudo *.dt.* est .12.; in qua si multiplicabitur tetragonum *.ag.*, quod est 100., uenient .1200. pro embado solidi *.aei.* Rursus esto basis *.ag.* tetragona; et altitudo *.dt.* excedat latus *.ab.* in duobus; et agregauit quadrata linearum *.ba.*, et *.ad.*, et *.dt.* cum quadrato dyametri *.tb.*; et fiunt totum illud quod aggregatum est 688.; quoniam quadratum dyametri *.tb.* habetur ex aggregatione quadratorum linearum *.ba.*, et *.ad.*, et *.dt.*: si dimidiauerimus 688., uenient 344. pro quadrato dyametri *.tb.*, cum quibus operaberis ut supra. Item agregauit latera *.ab.*, et *.bd.*, et *.dt.* cum quadrato dyametri *.tb.*, et fuit illud quod aggregatum est .376.: ponam iterum latus *.ab.* radicem; quare ex aggregato *.ab.*, et *.bd.*, et *.dt.*, | ueniunt tres radices, et duo; quibus additis cum quadrato dyametri *.tb.*, scilicet cum tribus censibus, et 117^{or} ., erunt tres census, et septem radices et .6., que equantur 376: comuniter si auferantur .6., remanebunt tres census, et septem radices equales de 370.: quibus reductis ad censum unum, ueniet census, et radices $\frac{1}{3} 2$, que equantur $\frac{1}{3} 123$ etc. Possumus quidem in simili solido diuersas huiusmodi ponere questiones, que omnes per hunc modum soluuntur. Item sit solidum equidistantium laterum *.aeg.* cum lineis á base orthogonaliter erectis, cuius latitudo *.ba.* sit .10.; et *.ad.* longitudo sit .11.; et *.dh.* altitudo sit .12.; et sit orthogonium quadrilaterum *.ac.*: quare si eius embadum, quod est ex *.ba.* in *.ad.*, producet in *.dh.*, habebuntur 1320 pro embado ipsius solidi. Nam quadratum dyametri eius, qui est *.hb.*, habebimus ex aggregatione quadratorum linearum *.ba.*, et *.ad.*, et *.dh.*, quorum suma est 365. Et si in simili modo ponamus dyametrum radicem esse 365.; et longitudinem basis ipsius superhabundare latitudinem eius in unum; et altitudinem eius *.dh.* superhabundare eandem latitudinem *.ab.* in .2.; et uolumus inuenire basis, nec non et solidi altitudinem, ponamus *.ab.* radicem; quare latus *.ad.* erit radix, uno addito; et *.dh.* altitudo erit similiter radix, duobus additis; quare ex quadrato lineę *.ab.*, hoc ex *.ab.* in se, prouenit census; et ex *.ad.* in se prouenit census, et due radices, uno addito; et ex *.dh.* prouenit census, et 117^{or} radices, et quatuor; et sic habebimus tres census, et sex radices, quinque additis, pro quadrato dyametri *.hb.*, quod est .365.: comuniter si auferantur .5., remanebunt .360., que equantur tribus quadratis, et sex radicibus: quare census, et due radices equantur 120.; quare dimidium radicum multiplicauerimus in se, ueniet unum; quo addito cum 120., erunt .121.; de quorum radice auferatur .1., remanebunt .10. pro *.ba.*; quare *.ad.* est .11., et *.dh.* est 12. Similiter si dicatur: addidi quadrata linearum *.ab.*, et *.ad.*, et *.dh.* cum quadrato dyametri *.hb.*; et fuit totum illud quod

fol. 104 recto.

ex *.dh.* duobus additis » (fol. 104 recto, lin. 20-32, 33; pag. 164, lin. 36 — pag. 165, lin. 5).




aggregatum est .730; dimidiabo siquidem ea, et uenient 365. pro quadrato dyametri *hb.*, cum quibus operandum est ut supra. Sed si dictum fuerit: aggregaui altitudinem *dh.* cum quadrato dyametri *hb.*, et habui 377.; et fuit *dh.* uno plus ex *da.*, et *da.* uno plus ex *ab.*; ponam similiter *ba.* rem; quare et *ad.* erit res, uno addito, et *dh.* erit res, duobus additis; et erunt quadrata earum trium linearum, secundum quod demonstratum est superius, tres census, et sex radices, et 3, que equantur quadrato dyametri *hb.*: cui si addatur altitudo *dh.*, que est radix, duobus additis, erunt tres census, et septem radices: septem additis, que equantur 377: de quibus comuniter diminutis .7., remanebunt tres census, et septem radices, que equantur 370; quare census, et radices $\frac{4}{8} 2$ equantur 123 et $\frac{1}{8}$: deinde procedas ut supra. Sed si unde procedat embadum similium solidorum embadum provenire ex multiplicatione basis ipsius in eius altitudinem scire uis, considera quod, cum ex altitudine ipsius summatur mensura unius pedis; et per terminum ipsius pedis superficies equidistans basi infra ipsum solidum adsignetur, erunt tunc tot pedes cubici inter basim, et ipsam superficiem, quot pedes superficiales fuerint in embado basis. Similiter si per duplum unius pedis lex altitudine superficiem aliam signauerimus equidistantem basi, erunt utique inter ipsam superficiem, et basem tot pedes cubici, quot in duplo basis sunt pedes superficiales. Similiter ex triplo unius pedis accepta in altum procreatur solidum, in cuius embado erunt tot pedes cubici in ipso solido, quot fuerunt in triplo basis pedes superficiales; ergo quoniam multiplex est altitudo cuiuscumque solidi unius pedis, tam multiplices sunt pedes embadi ipsius solidi ex embado basis. Quare quando multiplicatur embadum basis per altitudinem solidi, habetur utique embadum solidi, ut dictum est. Et quanuis non eleuetur aliquod solidum á lineis orthogonaliter erectis supra basem, tamen solida, que super equas bases, et sub eadem altitudine sunt, sibi inuicem equentur; erit utique illud idem in eo, uidelicet quod ex ducta base in eius altitudinem procreabitur embadum solidi; hoc idem intelligi potest de quoque corpore huius primę partis.

ADIACEAT RURSUS solidum equidistantium superficierum *dhf.*, cuius basis *abcd.* sit orthogonia, super quam sint erecte recte *ae. bf. cg. dh.* minime orthogonaliter stantes, ita ut anguli *abf.* et *dcg.* sint acuti; quare anguli *eab.* et *hdc.* sunt otusi; et erunt superficies *af.* et *dg.* ambo rumbi, uel rumboides: relique uero due superficies *fc.* et *ed.* erunt aliquando rectiangule, aliquando non: sed qualescumque sint, si altitudinem ipsius solidi inueniremus, et eam per basis embadum multiplicauerimus, ipsius solidi embadum incontanter habebimus. Nam qualiter ipsam altitudinem habere debeamus, breuiter indicabo: á pñcto quidem *f.* super lineam *ab.* cathetum protraham *fi.*; linea uero *fi.* aut est cathetus super superficiem *ac.*, aut non. Nam si cathetus est, erit altitudo ipsius corporis ipsa linea *if.*: si uero cathetus non est linea *if.*, protraham per punctum *i.* rectam *ko.* ad rectos angulos super rectam *ab.*; super quam protraham cathetum á puncto *f.*, et habebo altitudinem ipsius corporis; uel aliter, secundum uulgarem modum, eiciam á puncto *f.* super planum *ac.* plumbum cum filo | cadere faciam; et sic inueniam cathetum eius, si á puncto *f.* ceciderit super latus *ab.*, uel extra. Nam si infra corpus ceciderit super basem *ac.*, et corpus densatum fuerit, ita ut non possit plumbum orthogonaliter cadere á puncto *f.* infra basem *ac.*, faciam ipsum cadere a puncto *h.*, uel etiam á puncto *e.*, ut cadat extra figuram. Sed si se-

fol. 104 verso.

* sit orthogonia cum filo * (fol. 104 verso, lin. 23-35; pag. 165, lin. 27-39).




fol. 105 recto.

cundum artem operari uolumus, oportebit nos uti arundinum instrumento: sic erigam arundinem orthogonaliter á puncto b . supra basem ac ., que sit bm ., cuius longitudo sit nota; et aptabo super eam arundinem mn . faciens angulum rectum, qui ad m .; et ponamus rectam of . cathetum esse solidi dhf .; et erit proportio bm . ad of ., sicut bn . ad bf .: ergo si nota erit longitudo recte bf ., et habebitur similiter et cathetum fo . notum; que etiam omnia ostendamus cum numeris: esto latus ab . 18; latus quoque bc . 12; unum quodque laterum ae . bf . cg . dh . sit 20; et uolumus inuenire cathetum fo .: sit quidem arundo bm . 4., et arundo mn . 3.; quare bn . erit 5.; et copulabo rectam bo ., et erit triangulus fob . similis triangulo bm .; quare erit sicut fb . ad bn ., ita fo . ad mb ., quadrupla est fb . ex bn .; quadrupla ergo erit fo . ex mn .; quare fo . erit 16.; ex ductu ab . in bc . proueniunt 216.; quibus ductis in fo ., scilicet in 16., ueniunt 3456. pro embado solidi dhf .


ET SI SERATILE aliquod, quod secundum quosdam cunus appellatur, metiri uolumus, basem, que trigona est, in eius altitudinem ducemus, secundum quod fit in solidis sex basium: ad cuius rei euidenciam esto cunus $abgdez$., cuius basis esto trigonum abg .; et sint linee ad . bc . gz . equales sibi inuicem, et orthogonaliter erecte supra trigonum abg .; quare trigonum dez . trigono abg . equale, et equidistans est; recta quidem de . recte ab . et dz . ei que est ag . et ez . equalis est recte bg .: parallogramina ergo sunt quadrilatera ae ., et eg ., et gd . Inueniam quidem aream trigoni abg ., et ipsam multiplicabo per lineam ad ., que est altitudo cūni, et habebō embadum ipsius; quod sic probatur: per punctum quidem a . protraham rectam ai . equalem, et equidistantem recte recte (*sic*) bg .; et copulabo rectam ig ., et eleuabo orthogonaliter rectam ik . equalem rectis da . eb . zg .; et copulabo rectas dk . kz .: sex ergo basium equidistantium, qui erit solidum ike ., et diuisum in duo equa á quadrilatero $dagz$.: est enim parallogramum basis ib .; quare dyiameter ag . diuidit ipsam basem in duo equa; ergo trigonum abg . trigono agi . est equale: similiter et trigonum dez . trigono dzk . est equale. Quare seratile $abgdez$. seratili $agidzk$. equale est. Dimidium ergo solidi ike . est seratile $abgdez$.: ex ducto quidem embado quadrilateri ib . in altitudinem ad . prouenit duplum multiplicationis basis trigoni abg . in altitudinem ad . Sed ex ducta base bi . in ad . prouenit embadum solidi ike .; quare ex ducto embado trigoni abg . in altitudinem ad . prouenient embada cuni, ut predixi. Et sit notandum, quod trigona abg . et dez . ambo sunt aut equilatera, aut equicuria, siue diuersilatera; vnde cuiuscunque forme fuerit, embadum trigoni abg . inueniendum est per modum demonstratum superius in tractatu triangulorum. Et ut aliqua inde cum numeris dicamus; ponamus latus ab . esse 13., et ag . 15., et basem bg . 14.; quare et de . erit similiter 13., et ez . 14., et dz . 15.: et protraham in trigono abg . cathetum al ., qui erit 12.; quem multiplicabo per dimidium bg ., et uenient 84. pro embado trianguli abg .; quibus ductis in altitudinem ad ., que sit 20., uenient 1680. pro embado seratilis $abgdez$. Et si recte da ., et eb ., et zg . non sint orthogonaliter erecte supra trigonum abg ., sed declinauerint ad aliquam partem, studeas altitudinem ipsius cuni inuenire per modos demonstratos in solido antecedente. Et si ex cuno $abgdez$. iaceat in plano basis $ebgz$., multiplicabo embadum ipsius per dimidium catheti al ., et habebō propositum. Verbi gratia: quia orthogonium est quadrilaterum eg ., multiplicabo bg . per be ., scilicet 14.

in solidis ... equale: similiter (fol. 105 recto, lin. 20, 21-33 e 34; pag. 166, lin. 14-26).



fol. 103 verso.

ex ducto ... aliquam partem (fol. 105 verso, lin. 1-14; pag. 166, lin. 28-40).




per 20, et uenient .280. pro embado basis quadrilateri .eg.; quibus ductis in dimidium .al., scilicet in .6., uenient .1680., ut supra, pro embado seratilis .abgdez.


Si uero corpus aliquod commistum fuerit ex solido sex basium equidistantium, et aliquo cuno, ut sunt arcg, in quibus tenetur frumentum : embadum solidi cum embado seratilis in unum coniunge, et habebis propositum, uel catheti trianguli dimidium super altitudinem solidi equidistantium laterum adde; et quod prouenerit, in basem arcg multiplica. Verbi gratia : esto arca, cuius basis sit quadrilaterum orthogonium .abcd.; et super angulos eius stent orthogonaliter recte .ae. bf. cg. dh., que sint sibi inuicem equales; et super puncta .eh. protracte recte .le. ih. facientes angulum .eih.; similiter super puncta .fg. eleuentur recte .fk. kg. facientes angulum .fkg.; et sit pentagonum .aeihd. in superficie una: pentagonum quoque .bfkgc. in superficie alia; et sint ambo pentagona sibi inuicem equalia; et copulentur recte .ik. ef. fg. gh. et .he.; et erit quadrilaterum .eg. equidistans, et equale basi .ac.: quadrilaterum quoque .af. quadrilatero .gd., nec non et quadrilaterum .fc. quadrilatero .ad. Solidum ergo equidistantium laterum est .dhf., cuius embadum habebitur ex .ab. in .da. ducta in fol. 106 r^o .ae.: embadum quoque seratilis .efghik. habebitur ex superficie .ef. in .eh., hoc est ex .ba. in .ad. ducta in dimidium catheti trianguli .fkg. Verbi gratia : sit .ab. 8.; et .ad. sit .6., et .ae. sit .9.; et unumquodque laterum trigonorum .eih. et .fkg. sit .5.; quare cathetus .kl. erit .4.; et multiplicetur .ba. in .ad., erunt .48.; pro quo ducto per .ae., et per dimidium .kl., hoc est per 11., uenient .528. pro embado totius arcg. Et si commistio solidi et seratilis fiat secundum alium modum, ita quod una ex superficiebus, que supra basem erecta est, sit altior superficiei sibi equidistanti; et relique due superficies coniungantur eis, secundum quod fit in domibus, uel ut in sequenti figura patet, in qua ponimus superficiem .abgd. erectam orthogonaliter super superficiem .af.; et sit unaqueque rectarum .ab. et .gd. ulnarum .20.; et altitudo ipsius superficiei, que est .ag., uel .bd. sit ulnarum .15.; et ponimus superficiem .efch. equidistantem superficiei .ad.; et sit una queque rectarum .ec. fh. ulnarum .8.; et in unoquoque laterum .ae. et .bf. contineat ulnas .24. Quare una queque rectarum .gc. et .dh. erit .25; quod sic cognoscitur : per puncta quidem .ch. rectis .ea. et .fb. equidistantes protraham rectas .ci. hl., eritque unaqueque earum .24., cuius quadratum, scilicet .576., si addatur cum quadrato lineę .ig., quod est .49., uenient .625. pro quadrato lineę .gc., quorum radix, que est .25., erit linea .gc. Vnde si embadum huius corporis habere uis, lineas .ec. et .ag. in unum coniunges; et eorum dimidium, quod est $\frac{1}{2} 11$, per embadum basis .af. multiplica, scilicet per 480., erunt 5520. pro embado totius corporis.

ETSI basis alicuius corporis huius prime partis quadrilatera, sed non rectiangula fuerit, non etiam latera sint equidistantia, cum in simili superficie, et equali, et equidistanti basi terminetur. Nimirum habebitur embadum eius, si area basis in altitudinem corporis ducatur; quod manifeste uidebitur, si per dyametros basis, et superficiei sibi equidistanti superficiem transire fecerimus secantem ipsum corpus in duo seratilia, quorum embadum habebitur, ut demonstratum est, per multiplicationem basis uniuscuiusque: que triangula erunt in eorum altitudine, que est eadem. Similj quoque modo si basis alicuius corporis huius partis fuerit pentagona, uel plurium laterum, poterunt

² Si uero est .dhf. a (fol. 105 verso, lin. 22-35, e margine inferiore; pag. 167, lin. 3-15).




³ equidistanti; et si embadum a (fol. 106 recto, lin. 8, 9-19; pag. 167, lin. 22-32).



fol. 106 verso.

* corda .ag. totius exagoni * (fol. 106 verso, lin. 10, 41-49, 20; pag. 468, lin. 12-20).



resolui in tres, uel plures cunos habentes bases triangulas, cum quelibet figura plana rectilinea resoluatur in duos triangulos minus numero laterum ipsius, ut pentagonum quod resoluatur in tres triangulos, exagonum in .iii^{or}. etc. Vnde cum areas omnium triangulorum cadentium infra basem | similium corporum: hoc est aream eiusdem basis per altitudinem corporis multiplicaueris, nimirum embadum ipsius corporis habere non dubites. Sed quia inuentione embadum multilaterum figurarum cadentium in circulis alia, preter ea que dicta sunt, dicere possumus; ut hoc opus perfectum sit, aliqua inde dicere presentialiter procurauim. Habetur quidem embadum exagoni equilateri et equian- guli cadentis in circulo ex multiplicatione dyametri in tres quartas cordis anguli ex- agonici; que corda est latus trianguli equilateris cadentis in eodem circulo, cuius qua- dratum est triplum quadrati semidyametri circuli, hoc est lateris exagonici. Ad cuius rei euidenciam, in circulo .agd. esto exagonum .abgdez.; et protrahatur in ipso corda .ag., que secetur in duo equa per dyametrum .be. super punctum .k.; erit ergo trian- gulus .iab. sexta pars exagoni .abgdez.; et corda .ag. est latus trianguli equilateri cadentis in circulo .agd., cum arcus .abg. sit tertia circumferentig circuli; et diui- datur .kg. in duo equa super punctum .l.; erit ergo .ak. duplum .kl.: ex ductu quidem .ak. in .bi. prouenit duplum embadi trianguli .abi.; quare ex ductu .al. in .bi. prouenit triplum embadi trigoni .abi. Sed dyameter .be. duplus est ex .bi.; quare ex ducto dyametro .be. in .al. prouenit sextuplum embadi trianguli .abi. Quod se- xcuplum embadi trianguli .abi. est embadum totius exagoni. Est enim .al. medietas et quarta, hoc est $\frac{3}{4}$ corde .ag.: ergo ex dyametro circuli ducto in tres quartas corde anguli exagonici habetur embadum exagoni, ut predixi. Quod etiam habebitur ex multiplicatione trium quartarum dyametri in totam cordam anguli exagonici. Et cum similj inuentione inueni embadum tetragoni prouenire ex multiplicatione dyametri circuli continentis ipsum in septem octauas corde anguli exagonici. Embadum quoque octagoni prouenit ex multiplicatione dyametri circuli continentis ipsum in totam cor- dam anguli octagonici; que corda est latus quadrati cadentis in ipso circulo: et sic secundum hanc inuestigationem possunt inueniri embada figurarum plurium laterum cadentium in circulis.


fol. 107 recto

Et si columnam metiri desideras, cuius dyameter basis sit pedum .7.; et altitudo uero, scilicet axis eius, sit pedum .20., aream circuli sup basis, que est $\frac{1}{2}$ 38, per al- titudinem suam multiplica, et habebis pedes .770. pro embado ipsius columnę. Et no- tandum, quod omnia corpora cuiuscumque sint forme, cum sibi inuicem fuerint similia, erit proportio embadi unius ad embadum alterius, sicut proportio triplicata similis lateris unius ad simile latus | alterius. Verbi gratia: si alicuius solidi longitudo fuerit pedum .2., et alterius longitudo sit pedum .3., erit proportio minoris solidi ad maius sicut proportio binarij ad ternarium triplicata. Nam proportio triplicata binarij ad ternarium est sicut cubus, qui sit á binario ad eum, qui fit á ternario, hoc est sicut .8. ad .27. Est enim sicut sicut (sic) .2 ad 3, ita 8 ad 12., et 12 ad 18, et 18 ad 27.; et sicut proportio de .8 ad 27 est triplicata proportio binarij ad ternarium. Vnde si embadum minoris corporis sciueris, et eum per 27 multiplicaueris, et sumam per 8 diuideris, nimirum embadum maioris solidi proueniet, et cet.. Et notandum, quod quic- quid dictum est superius de solidis, uel columna, hoc idem intellige de cisternis, et puteis, cum in eis intelligatur esse latum, longum, et altum.

Incipit pars secunda de dimensione pyramidum.


Cum itaque pyramidem aliquam metiri desideras, embadum sup basis, cuiuscumque sit formę, per tertiam altitudinis ipsius multiplica; et quod prouenerit, erit embadum ipsius pyramidis; que regula prouenit ex eis que demonstrata sunt in EVCLIDE. Videlicet quod solidum est duplum seratilis. Seratile quoque est triplum sup pyramidis habentem trigonam basem. Ad cuius rei euidentiã. Esto pyramis .*abgd.* equilatera habens basem triangulam, que est .*abg.*; altitudo uero eius est id quod cadit orthogonaliter á puncto .*d.* supra basem .*abg.*: quare oportet nos inuenire casum ipsius in triangulo .*abg.*; quod sic fit: circa triangulum .*abg.* describam circulum .*abg.* circa centrum .*e.* Dico quidem, .*e.* punctus est casus perpendicularis cadentis á puncto .*d.* super superficiem trianguli .*abg.*: quod si non est, esto .*z.*, et copulentur recte .*dz.* .*za.* .*zb.* .*zg.*; et quoniam .*dz.* perpendicularis est super planum .*abg.*, rectus est unusquisque angulorum .*dza.* et .*dzb.* et .*dzg.*: latera ergo .*dz.* et .*za.* possunt super rectam .*da.* Similiter et quadrata rectarum .*dz.* .*zb.* equantur quadrato lineę .*db.*: similj quoque modo et quadratum lateris .*dg.* equatur quadratis rectarum .*dz.* .*zg.* Sed latera .*da.* .*db.* .*dg.* sibi inuicem sunt equalia; ergo duo quadrata linearum .*dz.* et .*za.* duobus quadratis linearum .*dz.* et .*zb.* equalia sunt: comuniter auferatur quadratum lineę .*dz.*, remanebunt quadrata linearum .*za.* .*zb.* equalia; quare .*za.* recta equalis est recte .*zb.* Similiter ostendetur, rectam .*zb.* equalem esse utrique rectarum .*za.* .*zb.*; ergo á puncto .*z.* ad periferiam circulj .*abg.* concurrunt tres recte sibi inuicem equalis; quare punctus .*z.* est centrum circulj .*abg.*: quod minime locum habet, cum .*e.* punctus sit centrum circulj .*abg.* Protracto quidem catheto .*de.*, si tertiam eius multiplicabimus per aream trigonj .*abg.*, habebimus | embadum pyramidis .*abg.* Quod ostendimus cum numeris: sit unumquodque laterum pyramidis .*12.*; et copulentur recte .*ae.* .*be.* .*ge.*, que sibi inuicem sunt equalis; et protrahantur recte .*ae.* .*be.* in punctis .*i.* .*t.*; et erit punctus .*i.* super dimidium lateris .*bg.*, cum anguli .*bai.*, et .*gai.* sibi inuicem sint equalis: et quia .*ab.* et .*ag.* sibi inuicem sunt equalia, .*ai.* cathetus est super rectam .*bg.*: et quia recta .*bt.* secat super dimidium lateris .*ag.*, secabit etiam et cathetum .*ai.* super tertiam eius, ut in tractatu triangulorum in tertia distinctione huius operis demonstrari. Extracto quidem quadrato recte .*bi.* ex quadrato lateris .*ab.*, scilicet 36 de .*144.*, remanent .*108.* pro quadrato lineę .*ai.*: et quia .*ei.* est tertia ex .*ai.*, erit quadratum lineę .*ei.* nona pars quadrati lineę .*ai.*: ergo quadratum lineę .*ei.* est .*12.*; cui si addatur quadratum lineę .*ib.*, erunt .*48.* pro quadrato lineę .*be.*: vel quia .*ae.*, hoc est .*be.*, est $\frac{2}{3}$ ex .*ai.*, erit quadratum lineę .*be.* .*48.* scilicet $\frac{4}{9}$ ex quadrato lineę .*ai.*: quod si auferatur ex quadrato lineę .*db.*, remanebit quadratum catheti .*de.* .*96.*: ex ductu quidem .*ai.* in .*bi.* prouenit radix de .*3888.* pro area trianguli .*abg.*: quod si ducatur in tertiam .*de.*, hoc est in nonam quadrati eius, que est $\frac{2}{3}$.*10.*, uenient *41472.* pro quadrato embadi pyramidis .*abgd.*, cuius radix est $\frac{3}{5}$.*203.*, et aliquantulum plus; quod plus est minus de $\frac{1}{20}$, et plus de $\frac{1}{21}$. Ex hoc quidem erit manifestum quod in omni pyramide equilatera quadratum sup altitudinis est $\frac{2}{3}$ quadrati unius laterum eius; nec non et quadratum rectę procedentes ab unoquoque angulorum ad casum altitudinis pyramidis est tertia quadrati eiusdem lateris: quod possumus inue-

.*zb.* .*zg.*, et ... recte .*zb.* (fol. 107 recto, lin. 23-30; pag. 169, lin. 12-19).



fol. 107 verso.


embadum pyramidis ... triangulorum (fol. 107 verso, lin. 1-7; pag. 169, lin. 23-29).




stigare hoc modo. Est enim *bi.* dimidium ex *bg.*; quare quadratum ex *bi.* est quarta quadrati ex *ab.*; quare quadratum ex *ai.* est $\frac{2}{3}$ ex quadrato, quod fit á recta *ab.*: est enim recta *ae.* $\frac{2}{3}$ ex *ai.*; quare quadratum ex *ae.* est $\frac{4}{9}$ ex quadrato recte *ai.*; ergo quadratum ex *ae.*, hoc est ex *be.*, uel ex *ge.*, est $\frac{4}{9}$ de $\frac{3}{4}$ quadrati lateris *ab.* Sed $\frac{4}{9}$ de $\frac{3}{4}$ alicuius rei est quantum $\frac{2}{3}$ de $\frac{4}{9}$ eiusdem rei, hoc est $\frac{4}{9}$; ergo quadratum uniuscuiusque rectarum *ae. be. ge.* est tertia quadrati lateris *ba.*; hoc est ex latere *da.* Vnde si ex quadrato lateris *da.* auferatur quadratum lineæ *ae.*, remanebunt pro quadrato altitudinis *de.* $\frac{2}{9}$ ex quadrato lateris *da.*, ut predixi. Et notandum quod in

fol. 108 recto.

de]monstram. Ad ... 78, minus s (fol. 108 recto, lin. 7, 8-14; pag. 170, lin. 17-24).



que sunt ... de .160., cum s (fol. 108 recto, lin. 24-35; pag. 170, lin. 32-43).




fol. 108 verso.

omni pyramide, cuius basis triangula est habente latera ab angulis basis ipsius adscendentia ad punctum summitatis eius sibi inuicem equalia; casus ipsius altitudinis erit centrum circuli continentis | basem ipsius pyramidis. Rvrsvs esto pyramis *abcd.* habens latera *da. db. dc.* sibi inuicem equalia; basis uero eius, scilicet trigonum *abc.*, sit cuiuslibet triangule forme; et uolumus inuenire casum cadentem á puncto *d.* super trigonum *abc.* per numerum; qui casus erit centrum circuli continentis trianguli *abc.*; protraham primum cathetum *ae.* in triangulo *abc.*, in quo diuidam id quod fit ex *ba.* in *ac.*; et quod prouenerit, erit dyameter circuli continentis triangulum *abc.*, ut in tractatu circulorum superius demonstram. Ad cuius rei similitudinem esto latus *ab.* 13., latus *ac.* 15., latus quoque *bc.* sit 14.; quare cathetus *ae.* erit 12.: in quo si diuiderimus superficiem ex *ba.* in *ac.*, hoc est .195., uenient $\frac{1}{4}$ 16. pro dyametro circuli continentis triangulum *abc.*; cuius dimidium, scilicet $\frac{1}{8}$ s., est differentia, que est á casu altitudinis pyramidis ad unumquemque angulorum basis. Ponamus etiam, unumquodque laterum *da. db. dc.* esse 12.; quare si ex quadrato ipsius, que est 144, auferatur quadratum de $\frac{4}{9}$ 8, quod est $\frac{4}{64}$ 66, remanebunt 78, minus $\frac{1}{64}$ pro quadrato catheti *dg.*; in cuius nonam si multiplicauerimus quadratum trianguli *abc.*, quod est 7056., habebitur quadratum embadi totius pyramidis. Et notandum quod si basis similium pyramidum fuerit acutiangula, tunc casus altitudinis ipsius cadet infra trigonum *abc.*; et si angulus *bac.* fuerit rectus, tunc dyameter circuli continentis triangulum *abc.* erit recta *bc.*; et superscriptus casus erit super dimidium lineæ *bc.*; et si angulus *bac.* fuerit obtusus, tunc ipse casus erit extra triangulum á parte *bc.* Item ponam pyramidem, cuius basis *abg.* sit trigonum equilaterum, uel equiclurium; ex lateribus uero *da. db. dg.* sint duo tantum sibi inuicem equalia, que sunt *db. dg.*; uolo ostendere modum quomodo habeatur altitudo ipsius pyramidis. Quoniam in trigono *dbg.* duo latera *db.* et *dg.* alteruis equalia sunt; si á puncto *d.* super basem *bg.* cathetus ducatur *de.*, diuidet basem *bg.* in duo equa super *e.* Similiter quia trianguli *abg.* latera *ab.* et *ag.* equalia sunt; si á puncto *c.* recta protrahatur *ea.*, erit utique *ae.* recta cathetus super basem *bg.*; producatu quidem *ae.* in utramque partem in infinitum in punctis *f. c.*; deinde super rectam *fc.* producatur cathetum á puncto *d.*, qui erit altitudo pyramidis *dabg.*, cuius altitudinis casus quandoque cadet inter *ae.*, quando cadet extra triangulum inter puncta *a. f.*, uel *e. c.*, uel aliquando in puncto *a.*, uel in puncto *e.*; que omnia ostendamus cum numeris. Esto unumquodque laterum *ab.* et *ag.* 10; latus quoque *bg.* 12.; et unumquodque laterum *db.* et *dg.* 11.; latus quoque *da.* sit 12.: inueniam primum cathetum *de.*, qui erit radix de .160., cum | quadratum casus *be.* ablatum sit ex quadrato lateris *db.* Similiter


cathetus *.ae.* erit *.8.*: deinde inueniam casum trigoni *.dae.* super basem *.ae.* sic: ex quadrato quidem, quod fit ex *.de.*, auferam quadratum ex *.da.*, scilicet 144. de 160., remanebunt *.16.*; quibus diuisis per *.ae.*, uenient *.2.*; quibus additis cum *.ae.*, erunt *10.*; cuius dimidium, scilicet *.5.*, est maior casus á latere maiori *.de.*: quare ponam *.h.* super punctum casus, ut sit *.eh.* *.5.*, remanebunt pro *.ah.* *.3.*: ergo si quadratum lineę *.ah.* auferatur ex quadrato lineę *.da.*; uel ex quadrato lineę *.de.* auferatur quadratum lineę *.eh.*, erit illud quod remanebit, scilicet 135., quadratum catheti *.dh.* Et notandum, quod si angulus *.dah.* esset rectus, tunc *.da.* esset cathetus descendens á puncto *.d.*; et si angulus *.dah.* esset maior recto, tunc cathetus descendens á puncto *.d.* caderet extra triangulum super lineam *.af.*: similj quoque modo si angulus *.deh.* esset rectus, tunc *.de.* esset altitudo pyramidis; et obtusus esset angulus *.deh.*, tunc cathetus descendens á puncto *.d.* caderet inter puncta *.e.c.* extra triangulum: et si unusquisque angulorum *.dah.* et *.deh.* acutus esset, caderet utique tunc perpendicularis inter puncta *.a.e.* super lineam *.ae.* Esto rursus pyramis, cuius summitas sit *.a.*; basis quoque eius sit trigonum *.bcd.* diuersilaterum, cuius latus *.bc.* sit *13.*; latus quoque *.cd.* *14.*; latus uero *.db.* *15.*, cuius cathetus esto recta *.be.*; ex reliquis uero lateribus descendentibus á puncto *.a.* ad puncta *.b.c.d.* sint latera *.ac.* et *.ad.* equalia, quorum unumquodque sit pedum *10.*; reliquum uero latus *.ab.* sit *15.*: uolo ergo cathetum cadentem á puncto *.a.* super planum, in quo est trigonum *.bcd.*, inuenire. Protraham primum in trigono *.acd.* cathetum *.af.*; et per punctum *.f.* in superficie trigoni *.bcd.* protraham lineam *.fg.* facientem rectos angulos *.gfd.* et *.gfe.*; et copulabo rectam *.ag.*; et in trigono *.afg.* super lineam *.fg.* cathetum producam, que erit cathetus cadens á puncto *.a.* super planum trigoni *.bcd.*; que cathetus sic per numerum inuenitur: quia rectus est angulus *.gfd.*, erit linea *.fg.* equidistans catheti *.be.*; quare est sicut *.df.* ad *.de.*, ita *.dg.* ad *.db.*: est enim *.de.* *9.*, et *.df.* est *7.*, scilicet dimidium ex *.ed.*, cum equidistans sit trigonum *.acd.*; ergo est sicut *7* ad *9.*, ita *.dg.* ignota ad *.db.* notam, que est *15.*: quare si multiplicauerimus *.7.* per *15.*, et diuiserimus per *.9.*, uenient $\frac{2}{3}11$. pro linea *.dg.* Similiter si multiplicauerimus *.df.* per *.be.*, scilicet *7* per *12*, et diuiserimus per *.de.*, uenient $\frac{1}{3}9$ pro linea *.fg.*: deinde in trigono *.abd.* super latus *.bd.* cathetum protraham *.ah.*, et erit casus longior *.bh.* $\frac{2}{3}11$; breuior uero *.dh.* erit $\frac{1}{3}3$: quare quadratum catheti *.ah.* erit $\frac{8}{9}88$; cum quo si addatur quadratum lineę *.hg.*, quod est $\frac{4}{9}69$, erunt $\frac{4}{9}158$. pro quadrato lineę *.ag.* Rursus si de quadrato lineę *.ad.* auferatur quadratum ex *.df.*, scilicet *49* de *100.*, remanebunt *.51.* pro quadrato lineę *.af.*; ergo linea *.af.* est radix de *.51.*; et linea *.ag.* est radix de $\frac{4}{9}158$; linea quoque *.fg.* est $\frac{1}{3}9$: et postquam habemus latera trigoni *.afg.* nota, possumus notitiam catheti descendentis ab *.a.* super lineam *.fg.* habere per doctrinam, quam docuimus in dimentione embadorum triangulorum.

Rvrsvs adiaceat pyramis *.a.b.g.d.*, cuius basis est trigonum *.abg.* diuersilaterum; latera uero descendentia á puncto *.d.* in puncta *.a.b.c.* sint similiter diuersa, et inqualia; quare aliquando erit unum ex eis orthogonaliter erectum super trigonum *.abg.*, et quandoque erunt omnia latera declinantia. Verbi gratia: sit latus *.ab.* *10.*, et *.ag.* *.9.*, et *.bg.* *.5.*, et *.da.* *15.*; latus quoque *.db.* *13.*, et *.gd.* sit *12.*; in hoc pyramide recta *.dg.* est cathetus ipsius, cum quadrata linearum *.bg.* et *.gd.* equentur quadrato lineę

quadratum casus . . . unusquisque (fol. 105 verso, lin. 1-14; pag. 170, lin. 43 — pag. 171, lin. 12).




lineam .fg. . . . 7. per 15. (fol. 108 verso, lin. 24-30; pag. 171, lin. 20-27).



fol. 109 recto.


diuersilaterum; . . . pyramidis .a.b.g.d. (fol. 109 recto, lin. 7, 8-15; pag. 171, lin. 38 — pag. 172, lin. 3).




.db.; nec non et quadrata linearum *.dg.* et *.ga.* equentur quadrato lineę *.ad.*; ergo si tertia ex *.dg.* ducatur per embadum trianguli *.abg.*, habebitur embadum pyramidis *.ab.g.d.* Sed non sit cathetus pyramidis aliqua ex lineis descendentibus á summitate eius, ut in pyramide *.abcd.*, cuius latus *.ab.* sit .13., *.bc.* 14., *.ac.* 15.; latus quoque *.bd.* 13., et *.dc.* 15., et *.da.* 14. Primum in triangulo *.abc.* protraham cathetum *.ae.*; et in trigono *.dbc.* protraham cathetum *.df.*; et per punctum *f.* protraham lineam *.fh.* equidistantem catheto *.ae.*, ut sit angulus *.hfc.* rectus: deinde in trigono *.dac.* protraham cathetum *.dg.* super rectam *.ac.*; ex quibus omnibus habebitur nota linea *.dh.*; quare latera trigoni *.dfh.* erunt nota; ergo et cathetus cadens in ipso á puncto *d.* super lineam *.fh.* erit nota, que erit altitudo pyramidis. Verbi gratia: cathetus quidem *.ae.* est .12.; casus quoque *.be.* 5.; et casus *.ec.* est .9. Similiter cathetus *.df.* in superficie trianguli *.dbc.* est .12.; et casus *.fc.* est .5.: et quia *.fh.* equidistans est catheto *.ae.*, erit sicut *.cf.* ad *.ce.*, ita *.fh.* ad *.ae.*, et *.ch.* ad *.ca.*; quare *.fh.* est $\frac{2}{3}$ 6., et *.ch.* est $\frac{1}{3}$ 8.: deinde ut inueniamus cathetum *.dg.*, auferam quadratum *.dc.* ex quadrato lateris *.da.*, scilicet 169 de 196., remanent .27.; quibus diuisis per *.ac.*, ueniet $\frac{4}{5}$ 1.; quod addam cum *.ac.*, erunt $\frac{1}{5}$ 16; cuius dimidium, scilicet $\frac{2}{5}$ 8., est casus maior *.ag.*; quare casus minor *.gc.* est $\frac{3}{5}$ 6.; et ex his habebuntur $\frac{1}{5}$ 11 pro catheto *.dg.*: cuius quadrato si addatur quadratum ex *.gh.*, habebuntur $\frac{1}{9}$ 128. pro quadrato lineę *.dh.*; quare *.dh.* est $\frac{1}{3}$ 11.: restat ut in trigono *.dfh.* inueniamus cathetum cadentem á puncto *d.* super lineam *.fh.*; et erit casus maior *.fi* $\frac{1}{2}$ 4.; quare cathetus *.di.*, qui est

fol. 109 v. altitudo pyramidis, erit radix de $\frac{2}{3}$ 123.: in qua si multiplicauerimus tertiam embadi trigoni *.abc.*, que est .28., habebimus radicem de 97020 pro embado pyramidis *.abcd.* Notandum, quod si trigoni *.dbc.* angulus *.dcb.* fuerit obtusus, tunc cathetus *.df.* cadet extra triangulum *.dbc.*, ut in hac alia cernitur formula, in qua ponimus latus *.ac.* .13., et *.bc.* 9.; latus quoque *.ab.* radicem de 100.; et sit latus *.da.* 19.; latus quoque *.db.* 17.; latus uero *.dc.* sit .10.: quare cathetus *.ae.* erit .12.; et casus *.be.* erit .4.; et *.ec.* erit .5.: cumque extraxerimus quadratum *.dc.* de quadrato lateris *.db.*, remanebunt 189 diuidenda per *.bc.*, scilicet per .9., uenient .21.; que si addita fuerint cum eisdem .9.; et summa diuidatur in duo equa, prouenient .15. pro casu *.bf.*: ergo punctus *f.* cadit extra *.bc.*; et est *.cf.* 36., cuius quadratum si auferatur ex quadrato lateris *.dc.*, uenient .64. pro quadrato catheti *.df.*; quare *.df.* est .8.: deinde protraham lineam *.fh.* equidistantem catheto *.ae.*; et faciam eam concurrere cum linea *.ba.* in puncto *h.*; et copulabo *.dh.*, et erit trigonum *.hbf.* orthogonium, et simile trigono *.abe.*: quare erit sicut *.be.* ad *.ea.*, ita *.bf.* ad *.fh.*; quare *.fh.* est .45., cuius quadratum, quod est 2025, si addiderimus cum quadrato basis *.bf.*, quod est 225, uenient .2250 pro quadrato lineę *.bh.* Vel quia est sicut *.be.* ad *.bf.*, ita *ba* ad *bh*; si multiplicauerimus quadratum ex *bf.* per quadratum ex *ba.*, hoc est 225 per 160, et diuiserimus summam per quadratum ex *be.*, quod est 16, uenient similiter .2250. pro quadrato lineę *.bh.*: deinde ut perueniamus ad notitiam lineę *.dh.*, inueniam cathetum trigoni *.dba.* cadentem á puncto *d.* super latus *.ba.*; quod sic fit: ex quadrato, quod fit ex *.da.*, auferam quadratum ex *.db.*, scilicet 289 de 361, remanebunt .72. diuidenda per latus *.ba.*, quod est radix de .160.; quare quadratum de 72, quod est 5184, diuidam per 160, et ueniet $\frac{2}{5}$ 32.; quibus additis cum 160, uenient $\frac{2}{5}$ 192.: de quibus si auferatur du-


* *.ac.*; ex quibus de 196., remanent (fol. 109 recto, lin. 22-29 c. 30; pag. 172, lin. 8-15).



* altitudo pyramidis *.deb.* fuerit (fol. 109 verso, lin. 1-3 e 4, e margine superiore; pag. 172, lin. 21-23).




* sicut *.be.* ... quod fit (fol. 109 verso, lin. 16-32; pag. 172, lin. 34 - pag. 173, lin. 6).



plum radices multiplicationis de $\frac{2}{5} 32$ in 160.; quod duplum est .144., remanebunt $\frac{2}{5} 48$. pro quadrato dupli minoris casus, qui sit .*bk.*; quare quadratum ex .*bk.* erit $\frac{4}{10} 12$, scilicet quartum de $\frac{2}{5} 48$; quibus $\frac{4}{10} 12$ extractis de quadrato lineę .*db.*, remanebunt $\frac{9}{10} 276$ pro quadrato catheti .*dk.*: deinde ut habeamus notitiam lineę .*kh.*, addam quadratum ex .*bk.* cum quadrato, quod fit á .*bh.*, scilicet $\frac{4}{10} 12$ cum 2250, erunt $\frac{4}{10} 2262$; ex quibus auferam duplum radices eius, quod fit ex $\frac{4}{10} 12$ in 2250; quod duplum est .330., remanebunt $\frac{4}{10} 1932$ pro quadrato lineę .*kh.*: cui si addatur quadratum ex .*dk.*, scilicet $\frac{9}{10} 276$, uenient .2209. pro quadrato lineę .*dh.*; quare .*dh.* est 47.: deinde ut inueniamus cathetum]trigoni .*dfh.* cadentem á puncto .*d.* super latus .*fh.*, quod est .45.; et latus .*df.* est .8., operabimur suprascripto modo; et inueniemus, ipsum cathetum cadere extra lineam .*hf.* secundum quantitatem de $\frac{4}{9} 1$; qui casus esto .*fl.*; et auferatur quadratum ex .*fl.*, quod est $\frac{2}{9} 1$, ex quadrato ex .*df.*, quod est .64., remanebunt $\frac{2}{9} 62$ pro quadrato lineę .*dl.*, scilicet cathetum pyramidis .*abcd.* Quod idem inuenies, si ex quadrato lateris .*dh.* auferatur quadratum casus .*hl.*; uel si ex quadrato lineę .*dc.* auferatur quadratum lineę .*cl.*; et est quadratum lineę .*cl.* equale duobus quadratis linearum .*cf.* .*fl.*: uel aliter protraham lineam .*ae.* in puncto .*m.*; et sit .*em.* equalis .*fl.*; quare tota .*am.* erunt $\frac{4}{9} 13$.; et copulabo .*Im.*, que erit equalis ex .*ef.*, que est .41.: addam quadrata linearum .*am* et .*ml.*, et habebó quadratum lineę .*al.*: quod si auferam ex quadrato lineę .*da.*, scilicet ex .361., remanent similiter $\frac{2}{9} 62$ pro quadrato catheti .*dl.* Ex hoc ergo patet, quod recta .*dl.* orthogonaliter stat super planum .*fbh.*, cum faciat rectos angulos cum lineis .*lh.* .*la.* .*lc.*: deinde si cathetum .*dl.* multiplicauerimus per tertiam trigoni .*abc.*, que est .18., habebimus .20160 pro quadrato embadi totius pyramidis .*abcd.*; et sic in omnibus pyramidibus procedere studeas: potes etiam ad notitiam altitudinum omnium pyramidum cum instrumentis suprascriptis arundinum, uel cum filo, et plumbo uerissime peruenire. Er si basis alicuius pyramidis fuerit quadrilatera, aut multilatera, non minus tertia sup altitudinis, in totam basim erit multiplicanda; quia si basis, quodcumque sit laterum, in trigona diuisa fuerit; et ab angulis ipsorum triangulorum ad punctum altitudinis pyramidis recte protrahantur, resoluetur itaque tota pyramis in tot pyramides habentes bases triangulas, quot fuerint trianguli protracti in ipsa base; et erit altitudo omnium pyramidum una. Quare si tertia pars ipsius altitudinis ducatur in aream uniuscuiusque trianguli, hoc est in totam basim diuisę pyramidis, nimirum embadum omnium pyramidum resolutorum, scilicet totius pyramidis, habebitur. Et si ab aliqua piramide auferatur pyramis aliqua per superficiem equidistantem sue basi; et uolueris scire embadum residui; quod curta, siue decurtata pyramis nuncupatur. Ex embado totius pyramidis embadum abscisę pyramidis tolle: et quod remanserit, erit embadum decurtatę pyramidis. Verbi gratia: si ex pyramide .*dabg.*, cuius basis est trigonum .*abg.*, auferatur pyramis .*dezi.*, cuius basis, scilicet trigonum .*ezi.*, sit equidistans basi .*abg.*; et uolumus embadum curte pyramidis .*abgezi.* inuenire. Ex embado quidem pyramidis] .*dabg.* tollemus embadum pyramidis .*dezi.*; et quod residuum fuerit, erit embadum decurtatę pyramidis .*abgezi.*: uel aliter, quoniam trigonum .*ezi.* equidistans est trigono .*abg.*; et sunt latera trigoni .*ezi.* secantia superficies .*dab.* et .*dbg.* et .*dga.*, erunt etiam et latera ipsorum trigonorum equidistantia; latus quidem .*ez.* lateri .*ab.*, et latus .*ei.* lateri .*ag.*: similiter et latus .*zi.* lateri .*bg.*: et quoniam


fol. 110 recto.

si cathetum . . . cuius basis a (fol. 110 recto, lin. 15-33; pag. 173, lin. 24-37)




fol. 110 verso.

« equidistantia trigonorum .*abg.* »
 (fol. 110 verso, lin. 5-25; pag. 173,
 lin. 42 — pag. 174, lin. 17).



« et .*ezi.* et latus » (fol. 111 verso,
 lin. 26-30; pag. 174, lin. 17-22).



« ADIACEAT auferatur » (fol. 111
 recto, lin. 11; pag. 174, lin. 36).




in trigonis .*dab.* et .*dag.* et .*dbg.* protracte sunt recte .*ez.* .*ei.* .*zi.* equidistantes basibus .*ab.* .*ag.* .*bg.*, erunt anguli exteriores equales oppositis et interioribus angulis, siquidem qui sub .*dez.* angulo qui sub .*dab.*, nec non et anguli qui sub .*dze.* et .*dzi.* et .*diz.* et .*die.* et .*dei.* angulis qui sub .*dba.* et .*dbg.* et .*dgb.* et .*dga.* et .*dag.* sunt equales. Sunt enim et anguli .*zei.* et .*eiz.* et .*ize.* equales angulis .*bag.* et .*agb.* et .*gba.*, cum superficies .*ezi.* equidistet superfici ei .*abg.* Quare anguli solidi qui ad .*e.* et .*z.* et .*i.* pyramidis .*dezi.* equantur angulis solidis, qui sunt ad .*a.* et .*b.* et .*g.* Vnde patet, pyramidem .*dezi.* similem esse toti pyramidi .*dabg.* Similes ergo pyramides ad se inuicem sunt in triplici proportione similium laterum: quare proportio pyramidis .*dabg.* ad pyramidem .*dezi.* est proportio triplicata lateris .*bg.* ad latus .*zi.*; quare ponamus esse sicut .*bg.* ad .*zi.*, ita quantitas .*c.* ad .*f.*; et sicut .*c.* ad .*f.*, ita .*f.* ad .*x.* et .*x.* ad .*y.*; et erit .*c.* ad .*y.* proportio triplicata lateris .*bg.* ad latus .*zi.* Quare est sicut .*c.* ad .*y.*, ita pyramis .*dabg.* ad pyramidem .*dezi.*: auferatur quidem ex quantitate .*c.* quantitas .*y.*, et remaneat quantitas .*h.*; erit deinceps sicut .*c.* ad .*y.*, ita quantitas .*h.y.* ad quantitatem .*y.* Ergo est sicut quantitas .*h.y.* ad quantitatem .*y.*, ita pyramis .*dabg.* ad pyramidem .*dezi.*: erit ergo disiunctim sicut .*h.* ad .*y.*, ita curta pyramis .*abgezi.* ad pyramidem .*dezi.* Vnde si latera trigonorum .*abg.* et .*ezi.*; et altitudo pyramidis .*dabg.* erunt nota, erit siquidem notum, per ea que dicta sunt, embadum curte pyramidis .*abgezi.* Que ostendantur cum numeris. Sit latus .*ab.* 13., et .*ag.* 15., et .*bg.* 14.; et altitudo pyramidis .*dabg.*, que sit recta .*dk.*, sit 24.; et super dimidio laterum .*da.* .*db.* .*dg.* transeat superficies trigoni .*ezi.*; et erit latus .*ez.* $\frac{1}{2}$ 6; et latus .*ei.* $\frac{1}{2}$ 7; latus quoque .*zi.* erit 7.; et cathetum .*dk.* ponamus 24., que secta est á superficie .*ezi.* in duo media in puncto .*t.* Et ponamus quantitatem .*c.* esse 8.; et quia latus .*bg.* duplum est lateri .*zi.*, erit quantitas .*c.* duplum quantitatis .*f.*, et .*f.* quantitatis .*x.*, nec non et .*x.* duplum est quantitatis .*y.*; quare .*f.* est 4., et .*x.* 2., et .*y.* est 1.; et tollatur ex quantitate .*c.* equalis | quantitati .*y.*, scilicet 1. de 8, remanebunt 7. pro quantitate .*h.*: et quia inuenimus esse sicut .*h.* ad .*y.*, ita pyramis curta .*abgezi.* ad pyramidem .*dezi.* Est enim .*h.* septuplum ex .*y.*; quare decurtata pyramis .*abgezi.* est septuplum pyramidis .*dezi.* Sed pyramis .*dezi.* est 84., que proueniunt ex ductu tertie partis altitudinis .*dt.*, que est 4., in triangulum .*ezi.*, qui est 21. Quare si multiplicauerimus 84. per 7., habebimus 588. pro embado curte pyramidis .*abgezi.*: uel si ex tota pyramide .*dabg.*, que est 672.; que proueniunt ex ductu tertie partis altitudinis .*dk.*, que est 8., in triangulum .*abg.*, qui est 84., extraxerimus 84., scilicet pyramidem .*dezi.*, remanebunt similiter 588 pro pyramide .*abgezi.*


ADIACEAT rursus pyramis .*dabg.*, cuius summitas sit .*d.*; et auferatur á pyramide .*dabg.* pyramis .*dezi.* cum superficie .*ezi.* equidistante basi .*abg.*; et protrahatur in ea á puncto .*d.* cathetus .*dk.* Dico quod embadum curte pyramidis .*abgezi.* prouenit ex ductu tertie partis altitudinis ipsius, que est .*ek.*, in summam arearum basis, et capitis illius, et superfici ei, que est in proportione media inter superficiem basis, et superficiem capitis. Quod sic probatur: super rectam quidem .*bg.* ordinabo superficiem rectiangulam .*bm.* equalem superfici ei trianguli .*abg.*; et ponam lineam .*ng.* equalem linee .*zi.*; et applicabo super rectam .*ng.* superficiem rectiangulam .*nopg.*

equalem superficiem trianguli *.ezi.*; et ducam rectam *.po.* in *.q.* Dico primum, superficiem *.np.* similem esse superficiem *.bm.* Quod sic probatur: quoniam, ut in antecedente figura, trigona *.abg.* et *.ezi.* demonstrata sunt equiangula esse, erunt etiam propter hoc sibi inuicem similia. Similia uero trigona in duplici proportione sunt similium laterum. Latera quidem *.bg.* et *.zi.* sibi inuicem sunt similia; quare proportio trigoni *.abg.* ad trigonum *.ezi.* est duplicata lateris *.bg.* ad latus *.zi.*: sit itaque sicut *.bg.* ad *.zi.*, ita *.zi.* ad *.u.*; quare est sicut *.bg.* ad *.v.*, ita trigonum *.abg.* ad trigonum *.ezi.* Sed trigono *.abg.* equalis est superficies rectiangula *.bm.*, et trigono *.ezi.* equalis superficies *.np.* Quare erit sicut *.bg.* ad *.v.*, ita superficies *.bm.* ad superficiem *.np.*: et est *.ng.* equalis recte *.zi.* Vnde est sicut *.bg.* ad *.ng.*, ita *.ng.* ad *.v.* Et quando tres recte continue proportionales sunt, erit sicut prima ad tertiam, ita figura, que est a prima, ad figuram que est ad secundam similem, et similiter descriptam. Vnde est sicut *.bg.* ad *.v.*, ita quadrilaterum *.bm.* ad quadrilaterum descriptum a linea *.gn.* simile quadrilaterum *.bm.* Vnde si quadrilaterum *.np.* non est simile quadrilatero *.bm.*, describentur super lineam *.ng.*, et in angulo *.ngm.* aliud quadrilaterum, quod erit maius, uel minus quadrilatero *.np.*: ad quod quadrilaterum *.bm.* descriptum a linea *.bg.* haberet proportionem eam quam habet *.bg.* ad *.v.* Sed sicut *.bg.* ad *.v.* ita demonstratum est quadrilaterum *.bm.* ad quadrilaterum *.np.*: ergo quadrilaterum *.bm.* ad duo diuersa haberet eandem proportionem; quod est inconueniens. Simile est ergo quadrilaterum *.np.* quadrilatero *.bm.*, ut predixi. Similes quidem superficies circaequales angulos latera habent proportionalia. Vnde est sicut *.bg.* ad *.gm.*, ita *.ng.* ad *.gp.*: permutatim ergo est sicut *.bg.* ad *.ng.*, ita *.mg.* ad *.pg.* Sed sicut *.mg.* ad *.pg.*, ita superficies *.bm.* ad superficiem *.bp.*; et etiam sicut *.bg.* ad *.ng.*, hoc est sicut *.mg.* ad *.pm.*, ita superficies *.bp.* ad superficiem *.pn.*; ergo est sicut superficies *.bm.* ad superficiem *.bp.*, ad superficiem *.pn.* Quare superficies *.bp.* est media in proportione inter superficiem *.bm.*, et superficiem *.pn.*, hoc est inter superficiem *.abg.*, et trigonum *.ezi.* Quare ostensum est quod multiplicatio tertie partis *.tk.* in coniunctum ex superficiebus trigonorum *.abg.* et *.ezi.*, et superficie *.bp.*, hoc est in coniunctum ex superficiebus *.bm.* et *.bp.* et *.pn.* faciat embadum abscisionis *.eziabg.*: primum quidem manifestum est quod embadum totius pyramidis *.dabg.* habetur ex multiplicatione tertie partis altitudinis *.dk.* in superficiem trianguli *.abg.*, hoc est in superficiem *.bm.*; ergo ex ductu *.dk.* in superficiem *.bm.* prouenit triplum aree pyramidis *.dabg.* Sed multiplicationi *.dk.* in superficiem *.bm.* equales sunt multiplicationes ex *.dt.* et *.tk.* in superficiem *.bm.*; ergo ex multiplicationibus *.dt.* in *.bm.*, et ex *.tk.* in *.bm.* prouenit triplum aree pyramidis *.dabg.*: de quo triplo si auferatur triplum aree pyramidis *.dezi.*; quod triplum habetur ex ductu *.dt.* in superficiem trianguli *.ezi.*, hoc est in superficiem *.np.*, remanebit multiplicatio ex *.tk.* in superficiem *.bm.*, et ex *.dt.* in superficiem *.R.* et *S.* pro area tripli curte pyramidis *.eg.*: his itaque demonstratis, copulabo rectas *.bk.* et *.zt.*, que erunt in superficie trianguli *.dkb.*; et erunt recte *.bk.* et *.tz.* equidistantes. Quare est sicut *.bd.* ad *.zd.*, ita *.kd.* ad *.dt.* Sed sicut *.bd.* ad *.zd.*, ita *.bg.* ad *.ng.*, et *.mg.* ad *.pg.*: quare diuisum erit sicut *.bn.* ad *.ng.*, uel sicut *.mp.* ad *.pg.*, ita *.kt.* ad *.dt.* Sed sicut *.mp.* ad *.pg.*, ita superficies *.qm.* ad superficiem *.bp.*; quare multiplicatio *.tk.* in superficiem *.bp.*

in pyramide quod erit a (fol. 111 recto, lin. 12-35; pag. 174, lin. 36 — pag. 175, lin. 16).




maius, uel superficiem *.bm.*, et (fol. 111 verso, lin. 1-24; pag. 175, lin. 16-37).



* curtam pyramidem ... erit .2.; quia *
(fol. 112 verso, lin. 2-35; pag. 176,
lin. 37 — pag. 177, lin. 22).

fol. 112 recto.



fol. 112 verso

equalis est multiplicationi ex *.dt.* in superficiem *.R.*, hoc est in superficiem *.qm.* Rur-
sus quia est sicut *.bn.* ad *.ng.*, ita *.tk.* ad *.dt.*; et est sicut *.bn.* ad *.ng.*, ita su-
perficies *.S.*, hoc est superficies *.bo.*, ad superficiem *.np.*: quare multiplicatio ex *.tk.*
in superficiem *.np.* equatur multiplicationi ex *.dt.* in superficiem *.S.*; ergo multipli-
catio ex *.tk.* in coniunctum ex superficiebus *.bp.* et *.pn.* | equalis est multiplicationi
.dt. in superficiem *.R. S.*: comuniter adiaceat factum ex *.tk.* in superficiem *.bm.*, erit
multiplicatio *.tk.* in superficies *.bm. bp.* et *.pk.* equalis multiplicationi *.tk.* in *.bm.*,
et ex *.de.* in superficies *.R.S.* Sed ex multiplicatione *.tk.* in superficiem *.bm.*, et ex
.dt. in superficies *.rs.* prouenit triplum areę curtę pyramidis *.eg.*; ergo ex ductu *.tk.*
in superficies *.bm. bp. pm.*, hoc est in superficies trigonorum *.abg. ezi.*, et in su-
perficiem *.bp.*, que est media inter ipsa trigona, prouenit triplum embadi abscisę py-
ramidis *.eg.* Quare multiplicatione tertię partis ex *.tk.* in superficies trigonorum *.abg.*
et *.ezi.*, et in superficiem *.bp.* prouenit embadum propositę abscisionis pyramidis; et hoc
est quod uolui demonstrare. Et si numeris utilibet. Esto latus *.bg.* palmorum *.12.*; cathe-
tus cadens in triangulo *.abg.* a puncto *.a.* super latus *.bg.* sit *.15.*; latus quoque *.zi.*
sit *.4.*; altitudo quidem *.tk.* esto *.12.* Quare erit sicut *.3.* ad *.1.*, ita *.bg.* ad *.zi.*: tri-
plum est enim latus *.bg.* lateris *.zi.*; et est sicut *.bg.* ad *.zi.*, ita *.zi.* ad *.v.*; quare
.bg. nonuplum est ex *.v.*: et quia est sicut *.bg.* ad *.v.*, ita superficies trigoni *.abg.*
ad superficiem trigoni *.ezi.* Superficies ergo trianguli *.abg.* est nonupla trianguli *.ezi.*
Nam superficies trianguli *.abg.* est palmorum *.90.* quadratorum, qui colliguntur ex
ducto catheto predicto in dimidium basis *.bg.*: quare nona pars de palmis *.90.*, scilicet
.10., est area trianguli *.ezi.*; superficies uero cadens inter triangulum *.abg.*, et trian-
gulum *.ezi.*, in proportione media est *.30.*; quia est sicut *90* ad *30.*, ita *30* ad *10.* Col-
lectis itaque his tribus superficiebus in unum, scilicet *90* et *30* et *10.*, faciunt *130.*;
quibus ductis per tertiam *.tk.*, scilicet per *4.*, uenient palmi cubici. *520.* pro area curtę
pyramidis *.eg.* Ad quam etiam summam ueniemus, si ex toto pyramide *.dabg.* aufe-
ramus pyramidem *.dezi.*; quod sic fit. Quoniam est sicut *.bg.* ad *.zi.*, hoc est sicut
.bg. ad *.ng.*, ita *.dk.* ad *.dt.*: disiunctim ergo erit sicut *.bn.* ad *.ng.*, ita *.kt.* ad *.td.*:
quare si multiplicauerimus *.ng.* per *.kt.*, hoc est *4* per *12.*, et diuiserimus per *.ba.*,
hoc est per *8.*, uenient *.6.* pro catheto *.dt.*; quare tota *.dk.* erit *18.*; ex quibus tertia
ducta in trigonum *.abg.*, scilicet in *90.*, uenient *540.* pro embado totius pyramidis
.dabg.; de quo embado si auferatur embadum pyramidis *.dezi.*, scilicet *20.*, que pro-
ueniant ex ducta tertia catheti *.dt.* in triangulum *.ezi.*, scilicet de *2.* in *10.*, rema-
nebunt *520.*, ut supra, pro embado curtę pyramidis *.eg.* Similiter ostendetur eisdem
demonstrationibus, si basis alicuius curtę pyramidis fuerit quadrilatera, uel multilatera,
uel circularis, ex eis | omnia que dicta sunt euenire; tamen ut hoc opus magis per-
fectum sit, quandam curtam pyramidem habentem basem, et caput circulares pro-
ponamus.


Esto quidem pyramis curta *.ec.*, cuius basis sit circulus *.abcd.*, et eius caput sit
circulus *.efgh.*, et altitudo eius sit linea *.ik.*, cuius termini sunt centra circulorum
predictorum; et protrahantur dyametri ipsorum *.bd.* et *.fh.*; et sint ipsi circuli sibi
inuicem equidistantes. Quare multiplicabitur tertia ex *.ik.* in summam superficieum
circulorum *.abcd.* et *.efgh.*; et eius superficiei, que est media in proportione utriusque

circulj. Verbi gratia: semi *bd.* pone inter utrumque in proportione media semi-dyamentum *bk.* et *if.l.m.* lineam, cuius spatio circinetur circulus *mno.* Dico primum, circulum *mno.* cadere in proportione media inter circulum *abc.*, et circulum *efg.* PROBATIO. Quoniam est sicut *bk.* recta ad rectam *lm.*, ita recta *lm.* ad rectam *if.* Quare erit sicut *bk.* ad *fi.*, ita quadratum ex *bk.* ad quadratum ex *lm.* Sed sicut quadratum ex *bk.* ad quadratum ex *ml.*, ita quadratum dyamenti *bd.* ad quadratum dyamenti *pm.* Est enim sicut quadratum dyamenti *bd.* ad quadratum dyamenti *pm.*, ita circulus *abcd.* ad circulum *mnp.o.*: ergo est sicut quadratum semidyamenti *bk.* ad quadratum semidyamenti *ml.*, ita circulus *abc.* ad circulum *mno.*; et quia est sicut *bk.* ad *lm.*, ita *lm.* ad *if.* erit sicut quadratum ex *bk.* ad quadratum ex *n.q.m.*, ita quadratum ex *lm.* ad quadratum ex *if.* Quare est sicut quadratum ex *ml.* ad quadratum ex *if.*, ita circulus *abc.* ad circulum *omn.* Est etiam et sicut quadratum ex *lm.* ad quadratum ex *if.*, ita circulus *omn.* ad circulum *ofg.* Ostensum est enim esse sicut quadratum ex *mb.* ad quadratum ex *if.*, ita circulus *abc.* ad circulum *omn.*; ergo est sicut circulus *abc.* ad circulum *omn.*, ita circulus *omn.* ad circulum *efg.*; ergo circulus *omn.* medius est in proportione inter circulum *abc.*, et circulum *efg.*; et hoc uolui demonstrare. Et ut habeamus summam super ex horum suma trium circulorum, aggregabimus quadrata semidyamentorum *bk. ml. fi.* in unum; et quod prouenerit, ducemus in $\frac{4}{7}$ 3., et habebimus summam arearum ipsorum trium circulorum; quam si duxerimus in tertiam altitudinis *ik.*, habebimus embadum curte pyramidis *ec.* Que ostendantur cum numeris. Sit semidyameter *bk.* 4., et semidyameter *if.* sit 1. Quare semidyameter *lm.* erit .2.; quia est sicut .4. ad .2., ita .2. ad .1.; et aggregemus quadrata horum trium semidyamentorum, scilicet .16. et .4. et .1., erunt .21.; quibus ductis in $\frac{4}{7}$ 3., uenient .66.; quibus ductis in tertiam altitudinis *ik.*, que sit .5., uenient pro embado totius pyramidis *ec.* 330. Et si uolumus supplere totam pyramidem *qabcd.*, intelligemus, trigonum *qbd.* secare pyramidem *qabcd.* in duo equa, in cuius superficie est cathetus *ik.*: quo catheto protracto in *q.*, erit linea *kq.* cathetus trianguli *qbd.*; in quo si protrahamus lineam *fr.* equidistantem linee *ik.*, erit linea *fr.* equalis linee *ik.*, cum equidistans sit linea *fi. ke. bk.*; et erit *rk.* equalis linee *fi.*; et trigona *qif.* et *frb.* erunt sibi inuicem similia. Vnde si extraxerimus *kr.*, hoc est *if.* ex *kb.*, remanebit *br.* 3.: et quia est sicut *br.* ad *rf.*, ita *fi.* ad *iq.*: si multiplicamus *rf.* per *if.*, et diuiserimus per *br.*, uenient .5. pro catheto *qi.* Quare tota *qk.* est 20., que est altitudo pyramidis *qabcd.*

DEMONSTRABO rursus aliter quomodo ex ductu altitudinis cuiuscumque pyramidis decurtatę in summam superficieum basis et capitis ipsius, et eius superficiei, que media est in proportione inter utramque, egrediatnr triplum ipsius pyramidis decurtatę. Ad quod demonstrandum, adiaceat pyramis decurtata *abgdez.*, cuius basis sit triangulus *abg.* maior; et eius caput sit triangulus *dez.* minor equidistans basi. Iaceat quidem inter *ab.* et *de.* in proportione media recta *it.*, et triangulus *kit.* similis unicuique triangulorum *abg.* et *dez.*; et erit sicut *ab.* prima ad *de.* tertiam, ita trigonum *abg.* ad trigonum *kit.* Sit rursus sicut *it.* ad *de.*, hoc est sicut *ab.* ad *it.*, ita *de.* ad *i.*: permutatim erit sicut *bg.* ad *de.*, ita *it.* ad *i.* Sed sicut *it.* ad *b.*, ita trigonum *kit.* ad trigonum *dez.*; ergo equale est sicut trigonum *abg.* ad trigonum


fol. 113 recto.

* *Aq.* cathetus Iaceat quidem * (fol. 113 recto, lin. 7-19; pag. 177, lin. 27-38).




* inter *ab.* triangulus *kit.* * (fol. 113 recto, lin. 20; pag. 177, lin. 39).

ad *de.* tertiam ... *eg.* et *dg.*; et
(fol. 113 recto, lin. 22-31; pag. 177,
lin. 40 — pag. 178, lin. 5).



c. 113 r^o


tractus eorum ... ad pyramidem
(fol. 113 verso, lin. 4-16, 17; pag.
178, lin. 11-22).



pyramidem *gedz.* ... diuisa est
(fol. 113 verso, lin. 16 e 17; pag. 178,
lin. 22 e 23).

l

recta *ab.* ... et earum ... (fol. 113
verso, lin. 19-33; pag. 178, lin. 24-37).



c. 114 r^o

kit., ita trigonum *kit.* ad trigonum *dez.*; ergo trigonum *kit.* est in proportione media inter trigonum *abg.*, et trigonum *dez.* Eleuetur siquidem super trigonum *kit.* cathetus *km.* equalis catheto cadenti inter triangulum *daz.*, et triangulum *abg.*; et copulentur recte *mi.* et *mt.*; et erit altitudo pyramidis *mkit.* equalis altitudini pyramidis decurtate *abgdez.* De inde protrahantur recte *ae.* et *eg.* et *dg.*; et fient in dicta pyramide decurtata tres pyramides continue proportionales, quarum maior est pyramis *abge.*, media *agde.*, minor uero *dgze.* Quod sic probatur. Quoniam linee *de.* et *ab.* equidistantes sunt; et in eis sunt trigona *abe.* et *ade.*, erit altitudo utriusque trianguli una; | quare erit sicut *ab.* ad *de.*, ita trigonum *abe.* ad trigonum *ade.*; ita pyramis *gabe.* maior ad pyramidem *gade.* mediam. Sunt enim ambe pyramides sub altitudine una, que est á *g.* puncto; quia est sub tractus eorum ad planum *dabe.*; ergo est sicut *eba.* ad *de.*, ita pyramis *gab.* ad pyramidem *gdae.* Rursus quia equidistantes sunt recte *ag.* ad *dz.*, ita trigonum *agd.* ad trigonum *gdz.* Sed sicut trigonum *agd.* ad trigonum *gdz.*, ita pyramis *eagd.* media ad pyramidem *edgz.* minorem, cum sint sub una altitudine: habent enim caput unum, quod est *e.*; et bases eorum sunt in uno plano, scilicet in eo, in quo est quadrilaterum *dagz.*; ergo est sicut *ag.* ad *dz.*, ita pyramis *edg.* ad pyramidem *edgz.* minorem. Sed sicut *ag.* ad *dz.*, ita *ab.* ad *de.*, cum trigona *abg.* et *dez.* sint equidistantia. Ostensum est etiam et sicut *ab.* ad *de.*, ita pyramis *gab.* maior ad pyramidem *gade.* mediam; et est etiam sicut *ab.* ad *de.*, hoc est sicut *ag.* ad *dz.*, ita pyramis *gade.* media ad pyramidem *gdez.* minorem. Quare est sicut pyramis *eabg.* ad pyramidem *eagd.*, ita pyramis *eagd.* ad pyramidem *gedz.* Quare tota pyramis *abgdez.* decurtata diuisa est in tres pyramides continue proportionales, in ea uidelicet, in qua est recta *ab.* ad rectam *de.*: sed sicut *ab.* ad *de.*, ita fuit triangulus *abg.* ad triangulum *kit.* Sed sicut triangulus *abg.* ad triangulum *kit.*, ita pyramis *eabg.* ad pyramidem *mkit.*: sunt enim ambe sub equali altitudine; ergo est sicut *ab.* ad *de.*, ita pyramis *eabg.* ad pyramidem *mkit.* Demonstratum est etiam sicut *ab.* ad *de.*, ita pyramis *eabg.* ad pyramidem *gdae.*; ergo pyramis *eabg.* ad duas pyramides, que sunt *mkit.* et *gdae.*, eandem proportionem habent: quare equalis est pyramis *mkit.* pyramidi *gade.* Quare erit sicut pyramis *gdae.* ad pyramidem *gdez.*, hoc est sicut *ab.* ad *de.*, ita pyramis *mkit.* ad pyramidem *gdez.*: pyramides ergo *eabg.* et *mkit.* et *gdez.* continue proportionales sunt, et sub equali altitudine, nec non et toti pyramidi *abgdez.* equantur. Vnde si ducatur altitudo eorum in bases ipsorum, scilicet in trigona *abg.kit.dez.*, nimirum triplum ipsorum pyramidum, hoc est totius decurtate pyramidis *abgdez.* deueniet; et hoc est quod uolui demonstrare.

Explicatis his que ad areas cubicas pyramidum, et earum partium pertinent.


Nunc tractemus de his que spectant ad mensurationem, et earum partium.

Si infra speram summatur punctus, á quo quatuor recte sibi inuicem equales | ad superficiem sperę concurrant: et termini ipsarum non sint in una superficie plana; punctus erit centrum sperę. Verbi gratia: sit spera *ab.*; et in ipsa sit punctus *z.*, á quo protracte sint quatuor recte *zb.* *zg.* *zd.* *ze.* sibi inuicem equales; et non sint puncta *b.g.d.e.* in una superficie plana. Dico, punctum *z.* esse centrum sperę *ab.*

Probatio: protrahantur á puncto *b*. in puncta *g.d.e.* recte *bg. bd. be.*; et copulentur recte *dg. de.*, et erunt omnes iste recte infra speram. Et quoniam omne trigonum, ut in undecimo habetur EVCLIDIS, est in uno plano, erunt puncta *b.g.d.* in uno plano; et puncta *b.d.e.* in alio; circa que puncta circinentur circuli *bgd.* et *bde.*; et á puncto *z.* ad plana circulorum *bgd. bde.* perpendiculares protrahantur *zi. zt.*, et emittantur ab utraque parte in puncta *kl.m.n.*; et per punctum recte protrahatur *ib. ig. id.* Et quoniam *zi.* stat orthogonaliter super planum circuli *bgd.*, erunt siquidem anguli *zib.* et *zig.* et *zid.* recti; et quia recte *zb. zg. zd.* sibi inuicem equales sunt; et in comune iacet recta *zi.*; erit itaque recte *ib.* et *ig.* et *id.* sibi inuicem. Quare ut in EVCLIDE habetur, *i.* punctus centrum est circuli *bgd.*; et quoniam *kl.* transit per centrum circuli *bgd.* orthogonaliter, erit ipsa *kl.* dyameter sperg; et puncta *kl.* erunt poli circuli *bgd.*, ut in libro MILES. et TEODOSII probatum est; propter quod in linea *kl.* est centrum sperg. Similiter ostendetur, punctum *t.* esse centrum circuli *bde.*; propter quod et linea *mn.* probatur esse dyameter sperg *ab.*; quare in recta *mn.* est centrum sperg; et quia *z.* punctus est in utroque dyametro *kl.* et *mn.*, patet ipsum esse centrum sperg, ut predixi.


Cum linea que protrahitur ex puncto capitis omnis pyramidis columnę ad centrum basis eius perpendicularis super basim ipsius; tunc linee rectę, que protrahuntur ex puncto capitis eius ad circulum continentem superficiem basis eius sunt equales: et multiplicatio unius linearum que protrahuntur ex capite eius ad circulum continentem basim eius in medietatem circuli continentis basi eius est embadum superficiem pyramidis columnę, hoc est eius que est inter punctum capitis, et lineam continentem circulum basis. Verbi gratia: esto pyramis columnę *abgd.*, cuius summitas sit *a.*; et eius basis sit circulus *bgd.*, cuius centrum est *e.*; et linea *ae.* orthogonaliter erecta sit super planum circuli *bgd.*; et á puncto *a.* ad lineam continentem circulum *bgd.* per superficiem pyramidis *abgd.* protrahatur quocumque recte *ab. ag. ad.* Dico quidem, rectas *ab. ag. ad.* sibi inuicem | equales esse. Probatio: protrahantur á centro *e.* recte *eb. eg. ed.*; que omnes sibi inuicem equales sunt á centro. Et quoniam *ae.* perpendicularis est super planum circuli *bgd.*, erunt anguli *aeb.* et *aeg.* et *aed.* recti. Quare orthogonia sunt trigona *aeb.* et *aeg.* et *aed.*, et habent bases equales, que sunt *eb. eg. ed.*; et latus *ae.* est comune eis. Quare latera subtendentia angulos rectos, que sunt *ab. ag. ad.* sibi inuicem sunt equalia: et propter hoc est manifestum, quod omnes rectę, que protrahi possunt ab *a.* ad lineam circumferentem *bgd.*, equantur linee *ab.* Item dico, quod ex ductu *ab.* in dimidium lineę circumferentis *bgd.* prouenit area superficiem pyramidis *abgd.*, que est á circulo basis *bgd.* usque ad summitatem eius: si non fuerit ita, tunc sit multiplicatio lineę *ab.* in quantitatem longiorem, aut breuiorem medietate circumferentię circuli *bgd.* ipsum embadum superficiem pyramidis *abgd.*; et sit quantitas *iz.*; et duplum *iz.* est longius circulo *bgd.* Ergo faciam super circulum *bgd.* figuram rectilineam habentem latera, et angulos equales continentem ipsum; et sint latera eius aggregata, minus duplo lineę *iz.*, que sit figura *tkl.*; et protraham lineas *at. ak. al.*; et ostendam, lineam *ab.* perpendicularem esse super lineam *bk.* hoc modo: protraham lineam *et.*, et erunt quadrata linearum *eb.* et *bt.* equalia quadrato lineę *et.* Comune adiaceat quadratum

erunt siquidem utroque dyametro » (fol. 114 recto, lin. 13-23; pag. 179, lin. 7-15).



fol. 114 verso.

equales esse lineam *ak.* » (fol. 114 verso, lin. 1-17; pag. 179, lin. 27-42).




duo puncta .*b.c.*; et sit arcus .*bc.* minor semicirculo; et protraham á punctis .*b.c.* dyametros .*bd. ce.*; et copulabo rectas | *ab. ac. ad. ae.* et .*be.*; et signabo super lineas .*ab.* et .*ac.* et .*ad.* et .*ae.* super comunem sectionem, quam habent ipse recte cum superficie .*kikl.* puncta *h.i.k.l.*: et quoniam trigona .*abd.* et .*ace.* sese inuicem secant super puncta .*af.*, comunis eorum sectio erit linea recta, que est linea cadens perpendiculariter ab .*a.* in .*f.*; ergo linea .*af.* est axis pyramidis .*abcd.*, quam secat superficies .*hikl.* super punctum .*m.* Rursus quoniam trigona .*abd.* et .*ace.* et .*abe.* secant duas superficies equidistantes .*bcde.* et .*hikl.*, erunt comunes earum sectiones equidistantes; hoc est recta .*hk.* equidistat recte .*bd.*, et recta .*il.* recte .*ce.*, et recta .*hi.* recte .*be.*: et quoniam in trigono .*abd.* protracta est recta .*hk.* equidistans basi .*bd.*, erit sicut .*a.b.* ad .*ah.*, ita .*bd.* ad .*hk.*. Est enim sicut .*ba.* ad .*ah.*, ita .*ac.* ad .*ai.*: cum in triangulo .*abc.* equidistans basi .*bc.* protracta sit linea .*hi.*; et est sicut .*ac.* ad .*ai.*, ita .*ce.* ad .*il.*; ergo erit sicut .*ab.* ad .*ah.*, ita .*ce.* ad .*il.* Est enim ut .*ab.* ad .*ah.*, ita .*bd.* ad .*dk.*: per equale ergo erit sicut .*bd.* ad .*hk.*, ita .*ce.* ad .*il.*: permutatim ergo ut .*bd.* ad .*ce.*, ita *hk.* ad .*il.*; est enim .*bd.* equalis .*ce.*; quare recta .*hk.* equalis est recte .*il.*: et quoniam in trigonis .*afb.* et .*afc.* et .*afd.* et .*afe.* protracte sunt recte .*hm. im. km. lm.* equidistantes suis basibus .*bf. cf. df. ef.*, erit sicut .*bf.* ad .*fa.*, ita .*hm.* ad .*ma.*; et sicut .*cf.* ad .*fa.*, ita .*im.* ad .*ma.*; nec non et sicut .*df.* ad .*fa.*, ita .*km.* ad .*ma.*; et sicut .*ef.* ad .*fa.*, ita .*lm.* ad .*ma.* Sed proportio linearum .*bf. cf. df. ef.* ad .*fa.* est proportio una; cum ipse quatuor recte sibi inuicem equantur. Sunt enim omnes á centro, et circuli omnes deducte. Quare proportio rectarum .*hm. im. km. lm.* ad .*ma.* est similiter proportio una: propter quod patet, ipsas sibi inuicem equales esse; et ducuntur á puncto .*m.* ad comunem sectionem superficiei .*hikl.*, et pyramidis .*abcd.* Quare manifestum est, superficiei .*hikl.* circulum esse: et eius centrum est .*m.*, per quod centrum transit axis .*af.*; et hoc est quod nolui demonstrare.


In omni portione pyramidis columnę, cuius basis est circulus, et cuius superius est circulus, et cuius basis superficies equidistat superficiei superioris eius; et linea que egreditur ex centro basis eius ad centrum superficiei superioris eius est perpendicularis super duas superficies; tunc si protrahantur in basi eius, et in circulo, quod est in superiore eius, due dyametri equidistantes; et continuatur quod est inter duas extremitates duarum dyametrorum per duas lineas, erit multiplicatio unius earum in medietatem | circumferentię amborum circularum, area superficiei, que continetur
l. 116 r.
inter utrumque circulum. Verbi gratia: Sit pyramis columnę decurtata .*abgdz.*, cuius basis sit circulus .*abg.*, et eius caput sit circulus .*dez.*; qui circuli sibi inuicem equidistant: et copulata in centris eorum recta .*it.* perpendicularis utrique circulo: et producantur duo dyametri .*bg.* et .*ez.* sibi inuicem equidistantes: et copulentur extremitates eorum cum lineis .*be.* et .*gz.* Dico quod ex multiplicatione unius linearum .*be. gz.* in medietatem circumferentię circularum .*abg. dez.* provenit area superficiei, que est inter circulum .*abg.*, et circulum .*dez.* Quod sic probatur. Compleatur pyramis .*mabg.*; et protrahantur recte .*be. gz.* in punctum .*m.*, et erunt recte .*mb.* et .*mg.* equales sibi inuicem: nec non et recte .*me.* et .*mz.* sibi inuicem equantur. Quare recta .*be.* recte .*gz.* equalis est. Et quoniam omnis circulus addit super suum dyametrum tri-

fol. 115 verso.

* .*ab. ac. ad. ae.* . . . superiore eius *
(fol. 115 verso, lin. 1-33; pag. 181, lin. 2-31).



circumferentie amborum ... multiplicationibus * (fol. 116 recto, lin. 1-25; pag. 181, lin. 33 — pag. 182, lin. 11).



* arcus sunt ... Et si ex * (fol. 116 verso, lin. 1-23; pag. 182, lin. 20-41).


(Figura simile alla precedente)

plum eius, et septimam, erit sicut circulus .*abg.* ad suum dyametrum .*bg.*, ita circulus .*dez.* ad suum dyametrum .*ez.*: et propter hoc erit sicut arcus .*bag.*, qui est medietas circuli .*abg.* ad dyametrum .*bg.*, ita arcus .*edz.*, qui est medietas circuli .*dez.* ad dyametrum .*ez.*: permutatim ergo est arcus .*bag.* ad arcum .*edz.*, sicut .*bg.* ad .*ez.* Sed sicut .*bg.* ad .*ez.*, ita .*mb.* ad .*me.*, cum in triangulo .*mbg.* recta .*ez.* equidistans sit basi .*bg.*: abscidam quidem ex arcu .*bag.* arcum .*ag.* equalem arcui .*edz.*; et erit proportio arcus .*bag.* ad arcum .*ag.*, sicut recta .*mb.* ad rectam .*me.*: quare disiunctim erit arcus .*ba.* ad arcum .*ag.*, sicut recta .*be.* ad rectam .*em.* Ergo multiplicatio .*me.* in arcum .*ba.* est sicut multiplicatio .*be.* in arcum .*ag.*, hoc est in arcum .*edz.* Comuniter si addatur multiplicatio .*be.* in arcum .*bag.*, erunt multiplicationes .*be.* in arcum .*bag.*, et .*be.* in arcum .*edz.* equales multiplicationibus .*be.* in arcum .*bag.*, et .*em.* in arcum .*ba.*: comuniter addatur multiplicatio .*em.* in .*ag.*, hoc est ex .*em.* in arcum .*edz.*, erit multiplicatio totius .*mb.* in arcum .*bag.* equalis multiplicationibus .*be.* in arcum .*bag.* et .*edz.*, et ex .*em.* in arcum .*edz.* Sed multiplicatio .*mb.* in arcum .*bag.* est area superficiei pyramidis .*mabg.*, que est inter circulum .*abg.*, et punctum .*m.*; ergo multiplicatio .*be.* in arcum .*bag.* et .*edz.* cum multiplicatione .*em.* in arcum .*edz.* facit eandem aream. Sed ex multiplicatione .*me.* in arcum .*edz.* provenit area pyramidis .*medz.*, que est inter circulum .*dez.*, et punctum .*m.* Quare residuum aree pyramidis .*abcd.*, quod est inter circulos .*abg.* et .*dez.*, provenit ex .*be.* in arcum .*bag.* et .*edz.* qui arcus sunt medietas circumferentie utriusque circuli; et hoc uolui demonstrare. Et ut probentur cum numeris; ponam dyametrum .*bg.* 14., et dyametrum .*ez.* duas quintas eius, que sunt $\frac{2}{5} 5.$; et lineam .*be.* 15, et .*it.* $\frac{2}{5} 14.$; et copulabo rectam .*mi.*; et per puncta .*e.z.* protraham lineas .*ec.zf.* equidistantes recte .*it.*; et erunt recte .*ct.* et .*tf.* equales, sicut sunt (sic) .*ei.* et .*iz.*; relique .*bc.* et .*gf.* sibi inuicem equantur. Quare trigona .*ecb.* et .*zfg.* similia sunt sibi inuicem et equalia: et anguli qui ad .*b.* et .*g.* equales sibi inuicem sunt: ergo trigonum .*mbg.* equicrurium est habens latera .*bm.* et .*mg.* equalia: et quia recta .*ez.* equidistat recte .*bg.*, erit trigonum .*mez.* simile trigono .*mbg.*; ergo trigonum .*mez.* equicrurium est habens angulos qui ad .*e.* et .*z.* equales. Quare recta .*mi.* cathetus erit super .*ez.*, cum punctus .*i.* sit super dimidium .*ez.*: fuit autem angulus .*tib.* rectus; quare patet, lineam .*mit.* esse continuatam; ergo .*mt.* est perpendicularis pyramidis .*mabg.*, et transit per centrum circuli .*edz.*: et quoniam recte .*mb.* et .*mg.* sunt equales; si ab ipsis auferatur .*me.* et .*mz.*, remanebunt .*eb.* et .*zg.* sibi inuicem equales: ergo .*zg.* est 15.: et quia .*ez.* ad .*bg.* est sicut 2. ad 5., est propter hoc .*me.* ad .*mb.* sicut 2. ad 5.; quare .*me.* ex .*eb.* est $\frac{2}{5}$, scilicet 10.: tota ergo .*mb.* erit 25.: de cuius quadrato si auferatur quadratum ex .*tb.*, quod est 49., remanebunt 576. pro quadrato catheti .*mt.*; et erit arcus .*bag.* 22., que proveniunt ex .*tb.* ducta in $\frac{1}{7} 3.$; et erit arcus .*edz.* $\frac{1}{5} 8.$, scilicet $\frac{2}{5}$ ex arcu .*bag.*: quibus arcubus in unum coniunctis faciunt $\frac{1}{5} 30.$; quibus multiplicatis in lineam .*eb.*, scilicet in 15. faciunt 462. pro area superficiei contente inter circulos .*abg.* et .*dez.* Et si ex area superficiei pyramidis .*mabg.*, que provenit ex .*mb.* in arcu .*bag.*, scilicet de 25. in 22. tollatur area superficiei pyramidis .*mez.*, que provenit ex .*me.* in arcu .*dz.*, scilicet de 10. in $\frac{1}{5} 8.$, remanebunt similiter 462. pro area contenta inter circulum .*edz.* et circulum .*bag.*; et hoc uolui declarare.

Cum fuerit circulus, cuius dyameter sit protracta, et protrahitur ex centro ipsius linea stans super dyametrum orthogonaliter: et perueniens ad lineam continentem ipsum; et secatur una duarum medietatum circuli in duo media; tunc cum diuiditur una harum quartarum in diuisiones equales quecumque sint; deinde protrahitur corda sectionis, cuius una extremitas est punctus, super quod secat se linea recta stans super dyametrum, et linea continens circulum: et producitur linea dyametri in parte, in quam concurrere, donec concurrant; et protrahuntur in circulo corde equidistantes linee dyametri ex omnibus punctis diuisionum, | per quas diuisa est quarta circuli; tunc linea recta, que est inter punctum, super quod est concursus duarum linearum protractarum; et inter centrum circuli est equalis medietati dyametri, et cordis, que protracte sunt in circulo equidistantibus dyametro coniunctis. Verbi gratia: In circulo quidem *abcd.* protracta sit dyameter *ab.*; et centrum circuli sit *e.*, á quo protracta sit linea *ec.* stans orthogonaliter super dyametrum *ab.*, que diuidit arcum *acb.* in duo equa; et diuidatur arcus *cda.* in quotlibet diuisiones equales, que sint arcus *cd. df. fg. ga.*; et protrahatur corda *cd.*, et emittatur extra circulum pariter cum dyametro *ba.*, donec concurrant in puncto *h.*; et per puncta *d.f.g.* protrahantur recte *di. fk. gl.* equidistantes dyametro *ab.* Dico, lineam *he.* equalis esse dyametro *ea.*, et cordis *gl. fk. di.* coniunctis. Probatio. Copulabo rectas *al. gk. fi.*; et ducam rectas *if. kg.* in partes *f.g.*, donec concurrant linee *ah.* super puncta *m.n.* Et quoniam in equidistantibus *ab.* et *gl.* recta incidit *al.*, erunt anguli *bal.* et *alg.* equales: equales nero anguli super equas periferias consistunt, siue ad centrum: siue ad periferiam fuerint constituti. Quare arcus *bl.* equalis est arcui *ag.* Item quia in equidistantibus *gl.* et *fk.* recta incidit *gk.*, erunt anguli *lgk.* et *gkf.* equales; et ideo arcus *lk.* arcui *gf.* est equalis. Similiter ostendetur, arcum *ki.* arcui *fd.* equalis esse. Sunt enim arcus *ag.* et *gf.* et *fd.* sibi inuicem equales. Quare et arcus *bl.* et *lk.* et *ki.* sibi inuicem equales sunt; cum arcus *bl.* equalis sit arcui *ag.*, et *lk.* arcui *gf.*, et *ki.* arcui *fd.* Quare totus arcus *bi.* toti arcui *ad.* existit equalis. Reliquus *ic.* reliquo *cd.* equalis est: et est equalis unicuique arcui *ik. kl. lb.* Quare anguli *cdi.* et *ifk.* et *kgl.* et *gab.* sibi inuicem sunt equales. Rursus quia in equidistantibus *hb.* et *di.* recta incidit *ch.*, erit exterior angulus *cdi.* equalis opposito et interiori, qui sub *chb.* Similiter ostendetur, angulus *imb.* equalis esse exteriori *ifk.*, nec non et angulus *knb.* equalis esse angulo *kgl.* Est enim angulus *lab.* equalis unicuique predictorum angulorum: ergo anguli *lab.* et *knb.* et *imb.* et *chb.* sibi inuicem sunt equales: recte ergo *la. kn.* et *im.* et *ck.* sibi inuicem equidistantes sunt, cum in eis incidat recta *bh.* faciens cum ipsis exteriores angulos equales oppositis et interioribus. Et quia recte *la.* et *gn.* copulant duas rectas equidistantes *na.* et *gl.*, erit *na.* equalis recte *gl.* Item quia equidistantes *kn.* et *fm.* copulant duas rectas equidistantes *mn.* et *kf.*, erit | propter hoc recta fol. 117 verso *nm.* equalis recte *kf.* Rursus quia recte *im.* et *dh.* copulant equidistantes *mh.* et *id.*, erit *mh.* equalis recte *id.* Quare tota *ah.* equatur rectis *gl. fk. di.* coniunctis. Communiter addatur semidyametrum *ea.*, erit semidyametrum *ea.* cum rectis *lg. kf. id.* equalis toti *eh.*; et hoc est quod uolui demonstrare.

Si in medietate sperg componatur corpus ex quotcumque portionibus pyramidum

fol. 117 recto.
 * per quas ... in eis incidat a (fol. 117 recto, lin. 1-31; pag. 183, lin. 8-35).



columnarum: et superior harum sit pyramis perfecta habens summitatem eius in alio super


polum sperę (sic) super polum circuli basis semisperę; et circulus basis ipsius sit caput sequentis portionis, cuius basis etiam sit caput sequentis portionis pyramidis; et hoc semper fiat, donec basis inferioris portionis sit circulus maior cadens in sphaera; et sint omnes circuli portionum equidistantes circulo maiori; et perpendicularis cadens á polo ipsius maioris circuli, scilicet ab eo super quo cadit punctus summitatis superioris portionis ad centrum sperę, transeat per centra omnium circulorum: et lineę recte cadentes in terminis dyametrorum uniuscuiusque portionis sint sibi inuicem equales. Tunc area superficiei totius corporis compositi ex quacumque multitudine portio-

num columnarum erit minus duplo areę maioris circuli cadentis in semisphaera contentis ipsum corpus: et erit etiam maius duplo areę maioris circuli semisperę contentę ab ipso corpore. Probatio. Sit circulus maior semisperę circulus *abgd.*, cuius centrum sit *e.*, quod etiam est centrum sperę, quia centrum sperę est centrum omnium circulorum magnorum cadentium in sphaera: et polus circuli *abgd.* esto *z.*; et transeat circulus magnus per polum *z.* stans orthogonaliter super circulum *abgd.* Quare comunis sectio eorum erit dyametrum utriusque circuli, que sit recta *ag.*; et erit arcus *azg.* semicirculus, et equalis semicirculo *abg.* Et constituatur in semisphaera, cuius basis est circulus *abgd.*; et polus eius est *z.* corpus compositum ex tribus portionibus pyramidum columnarum, et ex una pyramide: et prima portio sit pyramis decurtata, cuius basis est circulus *abgd.*, et eius caput est circulus, cuius dyametrum est linea *mn.*; et lineę que protrahuntur á terminis dyametrorum sint *am.* et *gn.* Secunda uero portio est, cuius basis est circulus, cuius dyameter est recta *mn.*, et cuius caput est circulus, cuius dyametrum est recta *kl.*; et recte cadentes in terminis dyametrorum sint *mk.* et *nl.*: tertie quidem portionis basis est circulus, cuius dyameter est linea *kl.*, et eius caput est circulus, cuius dyameter est linea *it.*: pyramis quidem columnę est, cuius basis est circulus, cuius dyameter est linea *it.*, et eius sumitas est polus sperę: et lineę descendentes ab ipso secundum rectitudinem in terminos dyametri basis sint recte *zi.* et *zt.*; et sint recte *am.* *mk.* *ki.* *iz.* sibi inuicem equales. Quare ipsis rectis equales erunt recte *zt.* *tl.* *ln.* *ng.*, cum bases et capita ipsarum portionum sibi inuicem equidistant: et erunt omnes in una superficie plana, que secat totum corpus in duo media super dyametros portionum, per quam superficiem descendit perpendicularis *ze.* transiens per centra omnium circulorum: deinde protrahantur dyametrum *ga.*, et corda *zi.* in punctum *h.*; et erit *eh.* equalis semidyametro *ea.*, et dyametris *mn.* *kl.* *it.* coniunctis: et protrahatur *hz.* cathetus *ec.*, qui cadit super dimidium corde *zi.* cum ipso *ec.* descendat á centro *e.*: et quia in trigono *hez.* orthogonio protracta est perpendicularis *ec.* super latus subtendens angulum rectum; erit proportio *hz.* ad *ze.*, sicut *ez.* ad *zc.* Quare multiplicatio *hz.* in *zc.* est equalis quadrato lineę *ez.* Sed linea *ez.* equalis est semidyametro *ea.*; ergo multiplicatio *zh.* in *zc.* est sicut quadratum semidyametri *ea.*: sed ex *zc.* dupla est *zi.*; quare multiplicatio *hz.* in *zi.* erit sicut duplum quadrati semidyametri *ea.*: quod duplum si ducatur in $\frac{1}{3}$, reddit duplum areę circuli *abgd.*; ergo duplum areę circuli *abgd.* prouenit ex multiplicatione *zh.* in *zi.* ducta in $\frac{1}{3}$: maior enim

in alio cadentis in sphaera continente ipsum corpus.


ad hęc basis ... circulus, cuius ... (fol. 117 verso lin. 10, 11-35, e margine inferiore; pag. 184, lin. 4-24).

fol. 118 recto.




quadruplica; uel quadratum dyametri, quod est 49., per $\frac{1}{7}$ 3. multiplica, et habetur 154. pro area superficiei ipsius sperg: et si medietatem quadrati dyametri per $\frac{1}{7}$ 3 multiplicaueris, uel duplicaueris aream suprascripti circuli, habebis utique .77. pro area superficiei medietatis sperg predictg. Et si 154., que sunt area superficiei totius sperg, in sextam dyametri sperg, scilicet in $\frac{1}{6}$ 1.; uel si tertiam partem de 154. in medietatem dyametri, que est $\frac{1}{2}$ 3., duxeris, habebis $\frac{2}{3}$ 179., que sunt area magnitudinis totius sperg: quia probatum est á sapientibus, quod multiplicatio tertie partis superficiei sperg in medietatem totius dyametri facit embadum totius sperg. Ad quod etiam demonstrandum adiaceat spera .ab.; et medietas dyametri eius sit linea .ag., et centrum eius sit punctus .g. Dico ergo quod multiplicatio .ag. in tertiam superficiei sperg .ab. est equalis embado corporis sperg .ab.; cuius hec est demonstratio. Si enim non est multiplicatio .ag. in tertiam superficiei sperg .ab. equalis corpori sperg, erit tunc equalis corpori sperg maioris spera .ab. aut minoris. Sit itaque in primis equalis spera maiori spera .ab.; et sit spera .de., que sit cum spera .ab. super centrum unum; possibile igitur est ut sit spera .de. figura corporis plurium basium, cuius basis sint non contingentes superficiem sperg .ab. Quare erit unaqueque perpendicularium, uel cadentium productarum ex centro .g. super superficiem eius maior linea .ag.: si ergo continuentur anguli illius corporis uenientis in spera .de. cum centro sperg, prouenient pyramides, quarum omnium capita erit centrum sperg, et earum bases erunt bases corporis; et embadum uniuscuiusque pyramidis earum proueniet ex multiplicatione sup perpendicularis in tertiam basis sup. Et propterea quod linea .ag., que est medietas dyametri sperg .ab., est minor unaquaque illarum perpendicularium, est uel erit propter illud multiplicatio lineg .ag. in tertiam cuiusque basis minor embado pyramidis, cuius basis est illa: ergo multiplicatio lineg .ag. in tertiam superficiei illius corporis est minor embado corporis: At superficies illius corporis est maior superficie .ab.; multiplicatio igitur .ag. in tertiam superficiei sperg .ab. erit multo minor embado corporis: et iam fuit posita multiplicatio lineg .ag. in tertiam superficiei sperg .ab. equalis sperg .de.; ergo oportet ut sit spera .de. multum minor corpore, quod est intra ipsam; quod est in possibile. Non igitur multiplicatio lineg .ag. in tertiam superficiei sperg .ab. est maior spera .ab. Et dico iterum quod non erit minor spera .ab. Quod si possibile est, tunc sit; erit ergo equalis sperg, que est minor spera .ab., sicut est spera .zh., que sit super centrum .g.: et possibile iterum est ut sit in spera .ba. corpus plurium basium, cuius bases non contingant superficiem sperg .zh. Quare erit unaqueque perpendicularium cadentium ex centro sperg .ab. super superficies illius corporis minor medietate dyametri sperg .ab., que est linea .ag.: erit ergo multiplicatio .ag. in tertiam cuiusque superficiei eorum maior embado pyramidis, cuius basis est illa superficies, et cuius caput est centrum .g.: multiplicatio igitur lineg .ag. in tertiam cuiusque superficiei sperg .ab. est maior plurimum embado corporis. Iam ante posita fuit equalis embado sperg .zh.; ergo spera .zh. est multo maior corpore: et ipsa est inter ipsum; hoc uero impossibile est: non igitur multiplicatio lineg .ag., que est medietas dyametri sperg .ab., in tertiam superficiei sup est maior corpore eius; ipsa igitur est equalis corpori eius; et id est cuius uolumus declarationem. Et cum hoc declaratum sit; et uolumus habere medietatem alicuius sperg, multipli-

* quod lineade. multum * (fol. 119 recto, lin. 25-32 e 33; pag. 186, lin. 21-28).



fol. 119 verso.


* sit; erit ergo tertiam cuiusque * (fol. 119 verso, lin. 1-8; pag. 186, lin. 31-38).



cabimus aream superficiei ipsius in sextam sui dyametri, uel medietatem dyametri eius ducemus in tertiam partem sup superficiei: uerbi gratia: sit dyameter datę spherę .10.; quam si multiplicamus per medietatem eius, uenient .50.; quibus ductis per $\frac{4}{7}$ 3., uenient $\frac{4}{7}$ 157., que sunt area superficiei semispherę: quam si duxerimus per sextam dyametri, scilicet per $\frac{2}{3}$ 1.; uel si tertiam de $\frac{4}{7}$ 157. ducemus in .5., scilicet in medietatem dyametri, habebimus $\frac{4}{3} \frac{6}{7}$ 261 pro embado semispherę.

Et si oportuerit nos metiri portionem aliquam spherę, que sit minor uel maior medietate spherę, ut sunt fontes rotundi, et alia quelibet uasa similia; altitudinem ipsius corporis, que est linea, que extenditur á centro circuli oris ipsius ad punctum poli eiusdem circuli, cum semidyametro spherę proportionare curabimus; ipsamque proportionem de superficie semispherę, nec non et ex embado ipsius accipere curabimus, et habebimus optatum. Uerbi gratia: sit linea .*ab.* dyameter fontis; et .*g.* sit centrum eius: et punctus .*d.* sit polus ipsius circuli. Quare linea .*dg.* stat orthogonaliter super superficiem circuli, cuius dyameter est .*ab.*; cumque quadratum medietatis dyametri .*ab.* diuiserimus per .*gd.*, habebimus illud quod restat de toto dyametro spherę super lineam .*gd.* Uerbi gratia: sit dyameter .*ab.* radix de .160.; quare .*gb.*, que est medietas dyametri .*ab.*, erit radix de .40., cuius quadratum erit .40.: que si diuiserimus | per .*gd.*, quam ponamus .4., uenient .10. pro residuo dyametri super lineam .*dg.*; quod sit linea .*ge.*, et erit tota .*de.* 14., que est dyameter spherę; quam diuidamus in duo equa super .*z.*, et erit .*z.* centrum circuli magni cadentis in sphaera; qui circulus sit circulus .*aebd.*: proportionabo ergo lineam .*gd.* cum semidyametro .*zd.*, scilicet .4. cum .7., et erit .*dg.* ex *dz.* $\frac{4}{7}$: quare accipiam $\frac{4}{7}$ ex area superficiei semispherę, scilicet de .308., que prouenit ex superficie .*dz.* in .*de.* ducta in $\frac{4}{7}$ 3., uenient .176. pro area superficiei portionis spherę, cuius basis est circulus dyametri .*ab.*, et eius polus est .*d.*; et arcus cadens in ipsa portione ex circulis magnis cadentibus in sphaera est arcus .*adb.*; cuius portionis embadum habebitur, si tertia pars areę superficiei ipsius ducatur in .7., scilicet in semidyametrum .*zd.*, et inde auferatur pyramis columnę, cuius summitas est punctus .*z.*; et eius basis erit circulus, cuius dyameter est linea .*ab.*, et eius altitudo est linea .*zg.*, que est .3., et embadum ipsius pyramidis est $\frac{5}{7}$ 125.; remanent pro embado portionis dictę 285. minus $\frac{1}{31}$. Et si aream maioris reliquę portionis spherę, cuius basis est idem circulus: dyameter .*ab.*, et eius altitudo est linea .*eg.*, que sagitta nuncupatur; quam ponamus esse .10., habere uolumus, eodem modo, secundum quod in minori portione operati sumus, erit procedendum. Videlicet quadratum lineę .*gb.*, quod est .40., diuidimus per sagittam .*ge.*, et habebimus .4. pro linea .*gd.*, que est sagitta reliquę portionis spherę. Quare tota dyameter spherę .*ed.* erit 14.; in quam si multiplicauerimus sagittam .*eg.*; et illud totum duxerimus per $\frac{4}{7}$ 3.; uel si de area superficiei semispherę, que est .308., accipiamus $\frac{40}{79}$, scilicet proportionem, quam habet sagitta .*eg.* ad semidyametrum .*ez.*, habebimus 440. pro area huius maioris portionis spherę: quam aream, si in sextam dyametri spherę: uel si tertiam eius in medietatem dyametri duxerimus, habebimus $\frac{2}{3}$ 1026; quibus si addiderimus pyramidem columnę supradictę, que est $\frac{5}{7}$ 125, habebimus $\frac{2}{3} \frac{1}{7}$ 1152 pro magnitudine ipsius maioris portionis. Et ut hec que dicta sunt geometricè demonstrantur. Adiaceat semisphaera .*bzd.*, cuius basis sit circulus .*abgd.*, et eius polus sit punctus

* sit dyameter .*ab.* ... si diuiserimus *
(fol. 119 uersa, lin. 34, 35 e margine inferiore; pag. 187, lin. 16-18).




fol. 120 recto.

7. in alio arcus semicirculj magnj .azg.

8. in alio per superficiem semicirculj .azg.
fol. 120 verso.

9. cum linea sicut superficies * (fol. 120 verso, lin. 9-31; pag. 188, lin. 9-32).



4. in alio pyramidum columnarum


.z.; et signetur super semispera .bzd. circulus magnus .azg., qui stet orthogonaliter super circulum .abgd.; et comunis eorum sectio .ag. est dyameter utriusque circulj; et descendat á polo .z. per superficiem circulj .azg. perpendicularis .ze. super dyametrum .ag.; et erit .e. punctus centrum utriusque circulj; et diuidatur arcus .az. | in quotlibet partes equales, que sint arcus .ai. it. tz.; et per puncta .i.t. equidistantes dyametro .ag. protrahantur corde .ik. tl.; et protrahatur corda .zt. extra circulum in puncto .m.; ad quem punctum proueniat etiam dyameter .ga. Extra circulum protracta: et protrahatur una ex duabus cordis aquidistantibus dyametro .ag. extra circulum .azg., donec concurrat lineę .mz. Quare si protraxerimus cordam .ki., concurret cum linea .mz. in puncto .n. Et á polo .z. spatio cordę, et arcus .zti. circinetur circulus .ihkx., qui erit equidistans circulo .abgd.; et eius centrum erit .f.; et .ik. erit dyametrum ipsius circulj; qui circulus abscidit á semispera .dz. portionem .xzh., cuius portionis sagitta, siue perpendicularis est linea .zf. Dico quidem, portionem superficię portionis .xzh. ad superficiem semisperę .dzb. esse sicut .zf. ad semidyametrum sperę .ze. Probatio: habetur quidem ex premissis, lineam .me. equalem esse semidyametro .ea. et cordis .ik. tl. coniunctis. Similj quoque modo demonstrabitur, lineam .nf. equalem esse semidyametro .fi. et corde .itl. coniunctis. Et quoniam in triangulo .mez. protracta est recta .nf. equidistans basi .em., erit sicut .zf. ad .ze., ita .nf. ad .me. Sed sicut recta .nf. ad rectam .me., ita superficies .zt. in .nf. ad superficiem .zt. in .me. Sed sicut superficies .zt. in .nf. ad superficiem .zt. in .me., ita est multiplicatio superficię .zt. in .nf. in $\frac{1}{3}$ ad multiplicationem de $\frac{1}{3}$ ad superficiem .zt. in .em. Sed ex multiplicatione .me. in .tz. ducta in $\frac{1}{3}$ prouenit superficies corporis compositi ex tribus portionibus pyramidum columnarum cadentis infra semisperam, quorum omnium altitudo est linea .ze.; et basis maioris earum est circulus .abgd. Similiter ostendetur quod ex multiplicatione .nf. in .tz. ducta in $\frac{1}{3}$ prouenit super-

ficies corporis compositi ex duabus portionibus columnarum cadentis in portione sperę .hzx. Ergo erit sicut .zf. ad .ze., ita corpus compositum ex duabus portionibus pyramidum columnarum, cuius altitudo est .zf., ad superficiem corporis compositi ex tribus portionibus pyramidum columnarum, cuius altitudo est linea .ze. De inde ponam superficiem .y. ad superficiem semisperę .dzb. sicut superficies corporis altitudinis .zf. ad superficiem corporis altitudinis .ze. Quare permutatim erit sicut superficies corporis altitudinis .ze. ad superficiem | semisperę .dzb., ita superficies corporis altitudinis .zf. ad superficiem .y. Sed superficies corporis, cuius altitudo est .ze., cum est infra semisperam, est minor superficie semisperę; et cum ipsum corpus contineat semisperam, est superficies corporis maior superficie semisperę: Vnde quando superficies corporis altitudinis .ze. est minor superficie semisperę: tunc superficies corporis altitudinis .zf. erit minor superficie .y.; et cum fuerit maior: maior. Sed cum superficies corporis altitudinis .ze. est minor superficie semisperę .dzb., tunc superficies corporis altitudinis .zf. est similiter minor superficie portionis sperę .hzx.; et cum est maior: maior. Et propter hoc superficies .y., et superficies portionis sperę ad superficiem corporis, cuius altitudo est .zf, habent unam et eandem portionem: Vnde patet, superficiem portionis sperę .hzx. equalem esse superficię .y.: et quia est sicut superficies corporis altitudinis .ze. ad superficiem semisperę .dzb., ita superficies cor-

poris altitudinis *.zf.* ad superficiem *.y.*: erit propter hoc sicut superficies corporis altitudinis *.ze.* ad superficiem semisperę *.dzb.*, ita superficies corporis altitudinis *.zf.* ad superficiem portionis sperę *.hzx.*: et cum permutabitur, erit proportio portionis *.hzx.* ad superficiem semisperę *.bzd.* sicut proportio superficię corporis altitudinis *.zf.* ad superficiem corporis altitudinis *.ze.* Sed proportio horum duorum corporum est sicut linea *.nf.* ad lineam *.me.*; et proportio lineę *.nf.* ad lineam *.me.* est sicut sagitta *.zf.* ad semidyametrum sperę *.ze.*; ergo proportio superficię portionis *.hzx.* ad superficiem semisperę *.dzb.* est sicut *.zf.*, que est altitudo ipsius portionis, ad semidyametrum *.ze.*; et hoc est quod nolui demonstrare.

Si in sphaera aliqua construatur cubus et pyramis quatuor basium triangularium et equalium laterum, erit cubus triplus pyramidis. Ad quod demonstrandum adiaceat dyameter datę sperę *.ab.*, et diuidatur in *.c.* punctum; et sit *.bc.* duplum ex *.ca.*; et circinetur semicirculus *.adb.*; et á puncto *.c.* super rectam *.ab.* ad rectos angulos trahatur recta *.cd.*; et copulentur recte *.bd.* et *.ad.*; et erit recta *.ad.* latus cubi, et recta *.bd.* latus trigonorum pyramidis cadentium in sphaera, cuius dyameter est recta *.ab.*; et erit propter similitudinem trigonorum *.adb.* et *.dcb.* et *.dac.* quadratum dyametri *.ab.* triplum quadrati lineę *.ad.*, et quadratum lineę *.bd.* quadrati lineę *.dc.*, ut EVCLIDES ostendit; nec non et quadratum lineę *.db.* erit duplum quadrati lineę *.ad.*; nec non et proportio quadrati lineę *.bc.* ad quadratum lineę *.ad.* erit sicut *.4.* ad *.3.* Verbi gratia: quoniam trigona *.dab.* et *.dac.* sibi inuicem sunt similia; et similia trigona circa equales angulos, uel circa eundem angulum latera habent proportionalia; erit sicut *.ba.* ad *.ad.*, ita *.ad.* ad *.ac.*; et quando tres recte continue proportionales sunt, erit sicut prima ad tertiam, ita quadratum lineę *.ab.* ad quadratum lineę *.ad.* Sed *.ba.* ex *.ac.* est tripla; quare quadratum lineę *.ab.* triplum est quadrati lineę *.ad.* Item quia trigona *.adb.* et *.dcb.* similia sunt; erit similiter sicut quadratum lineę *.ba.* ad quadratum lineę *.ad.*, ita quadratum lineę *.bd.* ad quadratum lineę *.dc.*, cum anguli *.dab.* et *.cdb.* sibi inuicem sunt equales. Quare quadratum lineę *.bd.* triplum est quadrati lineę *.dc.* Item quia recta *.dc.* in proportione media est inter *.bc.* et *.ca.*, erit sicut *.bc.* prima ad *.ca.* tertiam, ita quadratum lineę *.bc.* ad quadratum lineę *.ca.*: sed sicut *.bc.* ad *.ca.*, ita *.bd.* ad *.da.* Quare est sicut *.bc.* ad *.ca.*, ita quadratum lineę *.bd.* ad quadratum lineę *.da.*: est enim *.bc.* dupla ex *.ca.*; quare quadratum lineę *.bd.* erit duplum quadrati lineę *.da.*, ut superius dictum est. Item proportio quadrati lineę *.bc.* ad quadratum lineę *.ad.* componitur ex proportione quadrati lineę *.cb.* ad quadratum lineę *.ba.*, et ex proportione quadrati lineę *.ba.* ad quadratum lineę *.ad.*: est enim *.bc.* ad *.ba.* sicut *.2.* ad *.3.*: quare quadratum lineę *.bc.* ad quadratum lineę *.ba.* est sicut *.4.* ad *.9.*: proportio uero quadrati *.ba.* ad quadratum *.ad.* est sicut *.9.* ad *.3.*, cum quadratum lineę *.ba.* triplum sit quadrati lineę *.ad.*: ergo proportio quadrati lineę *.bc.* ad quadratum lineę *.ad.* componitur ex ea quam habet *.4.* ad *.9.*, et ex ea quam habet *.9.* ad *.3.*: quare patet quod proportio quadrati lineę *.bc.* ad quadratum lineę *.ad.* est sicut *.4.* ad *.3.* His itaque omnibus intellectis, ponam lineam *.ef.* equalem lineę *.ad.*; et constituam super lineam *.ef.* cubum *.efghiklmn.*; et ponam lineam *.no.* equalem lineę *.cd.*; et spatio *.no.* circinabo circulum *.opq.*, et inscribam in circulo *.opq.* trigonum equi-


^e demonstrandum erit propter (fol. 121 recto, lin. 25, 26-30; pag. 189, lin. 11-16).




fol. 121 verso.

^f in alio ita quadratum quod fit à prima ad quadratum quod fit à secunda; ergo est sicut *.ba.* ad *.ac.*


^g sicut quadratum ad quadratum (fol. 121 verso, lin. 7-11 e 12; pag. 189, lin. 26-30).



^h quadratum lineę et .ogr. (fol. 121 verso, lin. 22-29; pag. 189, lin. 38 — pag. 190, lin. 2).



« quare trigona ... et quia quadratum »
(fol. 121 verso, lin. 34, 35, margine
inferiore e fol. 122 recto, lin. 1; pag.
190, lin. 6-8).




f. 122 recto.

laterum $.opq.$; et protraham $.on.$ in $.r.$, et erit $.or.$ dyameter circuli $.opq.$; et copulabo rectas $.pr.$ et $.qr.$, et erunt trigona $.opr.$ et $.oqr.$ equalia et similia; quare angulus $.por.$ equalis est angulo $.qor.$; quare est sicut $.po.$ ad $.oq.$, ita $.ps.$ ad $.sq.$ equalis $.po.$ ex $.oq.$, ergo $.ps.$ equalis est $.sq.$: comunis adiaceat recta $.os.$; due ergo recte $.ps.$ et $.os.$ duabus $.qs.$ et $.os.$ sunt equales; basis uero $.op.$ basi $.oq.$ iacet equalis: quare trigona $.osp.$ et $.osq.$ sibi inuicem equalia sunt; et angulus $.osp.$ angulo $.osq.$ est equalis: cathetus ergo est $.os.$ super rectam $.pq.$: et quia quadratum lateris trigoni equilateri cadentis in circulo triplum est quadrati semidyametri sui circuli, erit ergo quadratum lineę $.op.$ quadrati semidyametri $.on.$ triplum: est enim $.on.$ equalis recte $.dc.$; quadrata ergo linearum $.op.$ et $.bd.$ ad equalia eandem habent proportionem; quare $.op.$ equalis est recte $.db.$: deinde super centro $.n.$ erigam in altum cathetum $.nt.$ equalem recte $.bc.$; et copulabo rectas $.no.$ $.np.$ $.nq.$; et erit unaqueque ipsarum equalis lineę $.db.$, hoc est lineę $.op.$: sunt enim quadrata linearum $.tn.$ et $.no.$, uel $.tn.$ et $.np.$, uel $.tn.$ et $.nq.$ equalia quadratis linearum $.bc.$ et $.cd.$ Quare unumquodque quadratorum linearum $.to.$ $.tp.$ $.tq.$ equale est quadrato lineę $.bd.$: constituta est igitur pyramis $.topq.$ ex quatuor triangulis equalibus et equilateralibus, cuius unumquodque latus equalis est lineę $.bd.$, ut oportet. Dico quidem, cubum $.eil.$ triplum esse pyramidis $.topq.$; quod sic probatur. Quoniam linea $.ps.$ medietas est recte $.op.$, erit quadratum lineę $.op.$ quadruplum quadrati lineę $.ps.$ Sed quadratum lineę $.op.$ duplum est quadrati lateris cubi $.eil.$, scilicet lateri $.if.$, cum $.op.$ equalis sit $.bd.$, et $.if.$ recte $.da.$: quare est sicut $.op.$ ad $.if.$, ita $.if.$ ad $.ps.$; quare rectiangula superficies $.op.$ in $.ps.$ equalis est quadrato lineę $.if.$, hoc est tetragono $.eg.$ Quare proportio tetragoni $.eg.$ ad superficiem rectiangulam ex $.os.$ in $.sp.$ est sicut superficies $.op.$ in $.ps.$ ad superficiem $.os.$ in $.sp.$ Sed proportio superficię rectiangule $.op.$ in $.ps.$ ad superficiem rectiangulam $.os.$ in $.sp.$, hoc est ad superficiem trianguli $.opq.$, est sicut $.op.$ ad $.os.$; ergo sicut $.op.$ ad $.os.$, ita tetragonum $.eg.$ ad trigonum $.opq.$ Quare quadratum tetragoni $.eg.$ ad quadratum trigoni $.opq.$ est sicut quadratum lineę $.op.$ ad quadratum lineę $.os.$ Sed proportio quadrati lineę $.op.$ ad quadratum lineę $.os.$ est sesquitertia. Quia cum de quadrato lineę $.op.$ tollitur quadratum lineę $.ps.$, quod est quarta eius, remanent tres quarte quadrati lineę $.op.$ pro quadrato lineę $.os.$: ergo proportio quadrati lineę $.op.$ ad quadratum lineę $.os.$ est sicut $.4.$ ad $.3.$; que proportio dicitur sesquitertia: ergo quadratum tetragoni $.eg.$ ad quadratum trigoni $.opq.$ est sicut $.4.$ ad $.3.$ Sed sicut $.4.$ est ad $.3.$, ita quadratum lineę $.cb.$ ad quadratum lineę $.ad.$: est enim perpendicularis $.tn.$ equalis $.cb.$, et $.ei.$, scilicet altitudo cubi, equalis est recte $.ad.$: per equale ergo erit sicut $.4.$ ad $.3.$, ita quadratum perpendicularis $.tn.$ ad quadratum [altitudinis $.ei.$: ergo sicut proportio quadrati tetragoni $.eg.$ ad quadratum trigoni $.opq.$, ita quadratum perpendicularis $.tn.$ ad quadratum lineę $.ei.$: per equale ergo erit sicut tetragonum $.eg.$ ad trigonum $.opq.$, ita perpendicularis pyramidis $.topq.$ ad altitudinem cubi $.hmk.$, hoc est $.tn.$ ad $.ei.$ Quare multiplicatio trigoni $.opq.$ in perpendicularem $.tn.$ est sicut multiplicatio tetragoni $.eg.$ in altitudinem $.ei.$ Sed ex multiplicatione tetragoni $.eg.$ in altitudinem $.ei.$ prouenit area cubi $.kmh.$; et ex multiplicatione trigoni $.opq.$ in perpendicularem $.tn.$ prouenit triplum


fol. 122 verso.

« $.opq.$, ita ... prouenit triplum » fol.
122 verso, lin. 4-8; pag. 190, lin. 39
-43).




areę pyramidis *.topq.*; ergo cubus *.eil.* constructus in sphaera, cuius dyiameter est *.ab.*, triplum est pyramidis *.topq.* in eadem sphaera constructę; et hoc est quod uolui demonstrare. Aliter in cubo *.eil.* protraham rectas *.if. ih. fh. fl. lh. et .il.*; et erit in cubo *.hmk.* constructa pyramis *.lhif.* quatuor superficierum triangularum et equalium laterum, quorum unumquodque est dyiameter unius sex quadratorum continentium cubum. Quare quadratum unius cuiusque ipsorum laterum est duplum quadrilateris cubi; est enim quadratum unius cuiusque lateris pyramidis *.topq.* duplum quadrati lateris cubi, ut superius ostensum est. Quare latera pyramidis *.lhif.* equalia sunt lateribus pyramidis *.topq.* Vnde patet, pyramidem *.lhif.* equalem esse pyramidi *.topq.*: ablata siquidem pyramide *.lhif.* ex cubo *.hmk.* remanebunt ex ipso cubo quatuor pyramides sibi inuicem similes et equales; que sunt pyramides *.ihef.* et *.lhgf.* et *.fikl.* et *.himl.*: est enim basis unius cuiusque duarum primarum pyramidum medietas tetragoni *.eg.*; et sunt sub equali altitudine, scilicet sub *.ei.* et *.gl.*: reliquarum uero duarum pyramidum bases continent tetragonum *.km.*, quod est equale tetragono *.eg.*; et altitudo ipsarum et una, scilicet altitudo cubi; cum altitudines ipsarum sint *.mh.* et *.kf.*: protraham siquidem in cubo lineam *.gi.*; et quoniam pyramides *.ihef.* et *.lhgf.* sibi inuicem equales sunt, erit agregatum ex eis duplum pyramidis *.ihel.* Et quoniam tetragonum *.eg.* duplum est trigoni *.hif.*, erit pyramis *.ihesfg.*, cuius basis est tetragonum *.eg.*, duplum pyramidis *.ihesf.*, cuius basis est trigonum *.hesf.*: sunt enim ambe sub una altitudine, que est linea *.ei.* Quare pyramis *.ihesfg.* equalis est duabus pyramidibus *.ihesf.* et *.lhgsf.*: pyramides uero *.ihesfg.* et *.topq.* habent bases et altitudines mutę proportionis: est enim sicut tetragonum *.eg.* ad trigonum *.opq.*, ita altitudo *.tn.* ad altitudinem *.ie.*; que uero | pyramides habent bases et altitudines mutę proportionis sibi inuicem equales sunt; equalis est ergo pyramis *.ihesfg.* pyramidis *.topq.*: sunt enim et pyramides *.ihesf.* et *.lhgsf.* equales pyramidi *.ihesfg.*; et que eidem equalia sunt et alterius sunt equalia; pyramides ergo *.ihesf.* et *.lhgsf.* pyramidi *.topq.* sunt equales. Similiter demonstrabitur, relique due pyramides, que sunt *.fikl.* et *.himl.* equales esse pyramidi *.topq.*: demonstratum est ergo, cubum *.kmh.* continere quantitatem trium pyramidarum equalium pyramidi *.topq.* Vnde patet, cubum *.kmh.* triplum esse pyramidis *.topq.*; et hoc uolui demonstrare. Et ut hec liquidius declarecant, ponam dyiameterum sperę *.e.*, et erit latus cubi, scilicet *.ef.*, radix de *.12.*; et latus pyramidis, scilicet *.op.*, radix de *.24.*; et erit quadratum lateris *.ef.*, scilicet tetragonum *.eg.*, *.12.*: quibus ductis in latitudinem *.ei.*, scilicet in radicem de *.12.*, uenient *.12.* radices de *.12.*, que sunt una radix de *.1728.* pro quadrato cubi *.hmk.*: de quo quadrato si accipiatur nona pars, uenient *.192.* pro quadrato pyramidis *.topq.* Verbi gratia: de quadrato lateris *.op.* accipiamus quartam, et habebimus *.6.* pro quadrato lineę *.ps.*: quod si extraxerimus ex quadrato lateris *.op.*, scilicet de *.24.*, remanebunt *.18.* pro quadrato catheti *.os.*: quod si multiplicauerimus in quadratum lineę *.ps.*, quod est *.6.*, uenient *.108.* pro quadrato trigoni *.opq.*: quod si duxerimus in quadratum tertię altitudinis, scilicet in nonum quadrati perpendicularis *.tn.*; quod quadratum est *.16.*: uel si nonum de *.108.*, quod est *.12.*, duxerimus per *.16.*, habebimus similiter *.192.* pro quadrato pyramidis *.topq.*: quod si duxerimus per *.9.*, habebimus *.1728.*, ut supra, pro quadrato cubi *.hmk.*; et

rectas *.if.* ... siquidem pyramide
(fol. 122 verso, lin. 12-19 e 20; pag. 191, lin. 3-10).




scilicet sub ... tetragonum *.eg.* (fol. 122 verso, lin. 24-34; pag. 191, lin. 13-22).



fol. 123 recto. k

vaest in alio totum hoc uidelicet sunt enim et pyramides *.ihesf.* et *.lhgsf.* pyramidis *.topq.*

* exterius tetragonum summatur centrum » (fol. 123 recto, lin. ultima e margine inferiore; pag. 192, lin. 8 e 9).



* .eh. contingitibe. sint » (fol. 123 verso, lin. 2-9; pag. 192, lin. 10-17).

(Figura simile alla precedente)

fol. 124 recto.


hoc uolui demonstrare. Est enim .42. parum plus radice de .1728.; et .14., que sunt tertia pars de .42., sunt parum plus radice de .102.; per que ostenditur, cubum esse triplum pyramidis.

Si circa circulum describatur tetragonum, cuius latera omnia contingant circulum; et in contactis copulentur recte, quadrilaterum quod inde prouenerit, tetragonum erit; et exterius tetragonum duplum erit interioris tetragoni. Circa circulum .abcd., adiacet tetragonum .efgh. contingens circulum in punctis .a.b.c.d., in quibus copulentur recte .ab.bc.cd.ad. Dico quadrilaterum .abcd. tetragonum esse; et exterius tetragonum .eg. duplum esse tetragono .abcd.: summatur centrum | circuli .abcd., sitque .i.; et copulentur recte .ia.ib.ic.id.: et quoniam recta .eh. contingit circulum .abcd. in puncto .a.; et in ipso contactu á centro copulata est recta .ia.; recta ergo .ia. cathetus est super rectam .eh., ut in Geometria habetur: rectus est ergo uterque angulorum .iae. et .iah. Similiter ostendetur, rectos esse angulos .ibe. et .ibf. et .icf. et .icg. et .idg. et .idh.: et quoniam in rectas .be. et .ia. recta incidit .ea.; et sunt anguli qui ad .e., et qui sub .eai. recti; erunt quidem recte .eb. et .ia. equidistantes. Similiter ostendetur, rectas .ib. et .ae. equidistantes esse, cum anguli qui ad .e., et qui sub .ibe. sint recti: ostense sunt etiam et recte .ia. et .ba. equidistantes esse; quare recta .ia. equalis est recte .be., et .ib. recte .ae. Equilaterum ergo est quadrilaterum .ebia; dico quidem et orthogonium; est enim unus quisque angulorum, qui sub .ibe. .bea. .eai. rectus; quare reliquus, qui sub .bia. rectus est. Tetragonum ergo est .ei. Similiter ostendetur, quadrilatera .fi. .gi. .hi. tetragona esse. Quare omnes anguli, qui sunt ad .i. centrum, recti sunt: unde patet, rectam .ai. continuari cum recta .ic., et rectam .bi. cum recta .id.; ergo recte .ac. et .bd. dyametri sunt circuli .abcd., et secant se ad rectos angulos. Quare unaqueque rectarum .ab. .bc. .cd. .ad. corda est quartę circuli; equalis ergo sunt recte .ab. .bc. .cd. .da. sibi inuicem: equilaterum ergo est quadrilaterum .abcd.; dico etiam et orthogonium: quoniam orthogonium est trigonum .aib., cuius duo latera .ib. et .ia. sunt equalia, cum sint á centro ad periferiam deducta, anguli .iba. et .bai. sibi inuicem sunt equalis; et est rectus angulus .bia.: quare semirectus unusquisque angulorum, qui sub .iba. et .iab. Demonstrabitur etiam per trigona .bic. .ida. et .icd. unumquemque angulorum qui sub .ibc. .icb. .icd. .ido. et .ida. et .iad. semirectum esse; quare anguli .abc. et .bcd. et .cda. et .dab. recti sunt: orthogonium ergo est quadrilaterum .abcd.: ostensum est etiam et equilaterum; ergo equilaterum .abcd. tetragonum est. Dico rursus, tetragonum .eg. continens circulum duplum esse tetragoni .abcd. continenti á circulo: est enim paralilogramum unumquodque tetragonorum .ie. .if. .ig. .ih.; et dyametri ipsorum, que sunt .ab. .bc. .cd. .da., ea per equalia secant: quare trigonum .aib. equalis est trigono .eab.: eodemque modo et trigonum .bic. equalis est trigono .fbc., et trigonum .icd. trigono .gcd., nec non et trigonum .aid. | trigono .adh. Quare trigona .aeb. et .bfc. et .cgd. et .ahd. reliquis quatuor trigonis .aib. et .bic. et .cid. et .dia. continentibus totum tetragonum .abcd. equalia sunt. Vnde patet, tetragonum .eg. duplum esse tetragoni .abcd. Aliter quoniam semicirculus est sectio .dab., et in ipso angulus est qui sub .dab.; angulus ergo qui sub .dab. est rectus: et quia latera .ad. et .ab. equalia sunt, erit unusquisque angulorum qui sub .abd. et .adb. me-

dieta recti: est enim et angulus *iab.* semirectus; et est rectus qui sub *aib.*: quare trigona *abd.* et *abi.* sibi inuicem sunt similia: et habent unum angulum comunem, eum uidelicet qui sub *dba.*: quare proportionaliter est ut *db.* ad *ba.*, ita *ba.* ad *bi.* Quare est sicut prima *db.* ad tertiam *bi.*, ita quadratum quod á prima *db.* ad quadratum quod á secunda *ab.*: est enim dyametro *db.* equale unumquodque laterum tetragoni *ef. gh.*; ergo est sicut *db.* ad *bi.*, ita tetragonum quod á recta *ef.* ad tetragonum quod á recta *ab.*; est enim *db.* ex *bi.* dupla; quare et tetragonum quod á recta *ef.* duplum eius quod á recta *ab.* Sed tetragonum quod á recta *ef.* est tetragonum *efgh.*; et tetragonum quod á recta *ab.* est tetragonum *abcd.*; ergo tetragonum *eg.* duplum est tetragoni *abcd.*; quod oportebat ostendere.

Si in cubo describatur columna eiusdem altitudinis, et in columna spera, et in spera pyramidis columnę duorum capitum, cuius due extremitates sint in centra circulorum basis et capitis columnę; et eius uenter sit circulus secans columnam et speram in duo media; et sit ipse circulus equidistans circulis basis et capitis columnę; et in ipsa pyramide describatur solidum octobasium triangularum, cuius uenter sit tetragonum cadens in superficie predicti circuli secantis columnam et speram in duo media, cuius tetragoni angulis ad centra columnę circulorum basis et capitis ascendentis quatuor recte utrique facientes super ipsum tetragonum octo trigona equilatera et equiangulara, quarum unumquodque latus est equale uniuscuiusque lateris ipsius tetragoni; erit proportio horum omnium corporum inter se sicut narro: proportio quidem cubi ad columnam est sicut *.14.* ad *.11.*; columnę ad speram est sesquialtera; sperę ad pyramidem dupla; pyramidis ad solidum octo basium est sicut *.11.* ad *.7.* Vnde colligetur, proportionem cubi ad speram esse sicut *.21.* ad *.11.*; ad pyramidem sicut *.42.* ad *.11.*; ad solidum octo basium sexcuplam: et proportionem columnę ad pyramidem esse triplam, et ad solidum octobasium sicut *.33.* ad *.7.*; nec non et proportionem sperę ad solidum octobasium sicut *.22.* ad *.7.* Ad hec autem omnia demonstranda adiaceat tetragonum *abcd.*; et in ipso describatur circulus *efgh.*; et eius centrum sit *i.*; et eleuetur á puncto *i.* superficiem tetragoni *ac.* orthogonaliter linea *ik.*, que sit equalis unicuique laterum tetragoni *ac.*; et intelligam, tetragonum *ac.* esse unam ex sex superficiebus continentibus cubum: et circulum *efgh.* esse basem columnę; et altitudinem utriusque corporis esse secundum quantitatem lineę *ik.*; quare *ik.* erit axis columnę; et *k.* punctus erit centrum circuli capitis columnę. Et quia ad habendam magnitudinem cubi oportet ut quadratum *ac.* ducatur in altitudinem cubi, scilicet in *ik.*; et ad habendam magnitudinem columnę oportet ut area circuli *efgh.* multiplicetur similiter per *ik.*; erit ergo proportio cubi, cuius basis est tetragonum *ac.*, et altitudo *ik.* ad columnam, cuius basis est circulus *efgh.*, et altitudo *ik.* sicut tetragonum *ac.* ad circulum *efgh.* Sed proportio tetragoni *ac.* ad circulum *efgh.* est sicut *.14.* ad *.11.*, ut superius in inuentione embadi circulorum monstratum est; uel aliter protrahatur á centro *i.* semidyameter *if.*, et erit *if.* medietas lateris *ab.*; quare quadratum lineę *if.* quarta est quadrati lineę *ab.* Sed ex quadrato lineę *ab.* prouenit tetragonum *ac.*; ergo ex tetragono lineę *if.* prouenerit quarta tetragoni *ac.*: quod quadratum si multiplicetur in $\frac{4}{7} 3$, prouenient tres quarte et septimam quarte, hoc est $\frac{11}{14}$ tetragoni *ac.*; et ex quadrato lineę *if.* ducto in $\frac{4}{7} 3$. prouenit circulus *efgh.*; ergo propor-

* á recta *ab.* . . . recte utrique * (fol. 124 recto, lin. 18-28; pag. 193, lin. 9-18).



]. in alio ad centra circulorum basis et capitis colunę ascendant quatuor recte

fol. 124 verso.

* basium sexcuplam . . . intelligam tetragonum * (fol. 124 verso, lin. 1-6, 7; pag. 193, lin. 24-29).

(Figura simile alla precedente)

tio circuli $efgh.$ ad tetragonum $ac.$ est sicut $.11.$ ad $.14.$; conuersim ergo proportio tetragoni ad circulum est sicut $.14.$ ad $.11.$, ut predixi; et proportio ergo cubi ad columnam est sicut $.14.$ ad $.11.$; et hoc uolui demonstrare.

Rursus intelligam, rectam $ik.$ esse dyameter sperę cadentis in dicta columna; et diuidam $ik.$ in duo equa super $l.$; et intelligam, punctum $l.$ esse centrum circuli magni cadentis in spera et equalis et equidistantis circulo $efgh.$; et erit circulus, cuius centrum est $l.$, secans columnam in duo media: et quia area superficiei sperę est quadruplum ipsius circuli, qui est equalis circulo $efgd.$; et ex multiplicatione ipsius superficiei in sextam dyametri sperę habetur magnitudo sperę, que sit $.im.$; ergo si circulus $efgh.$ multiplicetur per quadruplum sextę dyametri sperę; quod quadruplum sit linea $in.$, proueniet utique magnitudo ipsius sperę. Sed ex multiplicatione circuli $efgh.$ in dyametrum sperę, scilicet in altitudinem columnę, que est $if.$, prouenit magnitudo columnę; ergo quam proportionem habet linea $ik.$ ad lineam $in.$ eandem proportionem habet predicta columna ad predictam speram: et quia $ik.$ est sexcupla ex $.im.$, et $in.$ est quadrupla eiusdem $.im.$, erit proportio $ik.$ ad $in.$ sicut $.6.$ ad $.4.$, hoc est in minimis numeris sicut $.3.$ ad $.2.$: quare proportio columnę ad speram est sicut $.3.$ ad $.2.$; que proportio sexquialtera nuncupatur: et quia proportio cubi ad columnam est sicut $.14.$ ad $.11.$, erit proportio eorundem corporum sicut triplum $.14.$ ad triplum de $.11.$, hoc est sicut $.42.$ ad $.33.$: et quia proportio columnę ad speram est sicut $.3.$ ad $.2.$, erit proportio eorundem sicut undecuplum de $.3.$ ad undecuplum de $.2.$, hoc est sicut $.33.$ ad $.22.$: et quia proportio cubi ad columnam est sicut $.42.$ ad $.33.$; et proportio columnę ad speram sicut $.33.$ ad $.22.$; per equale ergo erit sicut $.42.$ ad $.22.$, hoc est sicut $.21.$ ad $.11.$, ita cubus ad speram; et hoc uolui demonstrare. Item intelligam á circulo, cuius centrum est $l.$ ad utrumque polum sperę, scilicet ad puncta $ik.$ prouenire singulam pyramidem columnę; quę pyramides simul composite faciunt pyramidem duorum capitum; et erit altitudo unius pyramidis linea $lk.$, alterius uero linea $il.$; et est ut diximus tota $ik.$ dyameter sperę. Ad habendam istam magnitudinem huius compositi corporis, oportet ut circulus, cuius centrum est $l.$, multiplicetur in tertiam suę altitudinis, scilicet in tertiam lineę $ik.$. Sed ex multiplicatione circuli, cuius centrum est $l.$, in duas tertias dyametri $ik.$, scilicet in $in.$, prouenit magnitudo sperę; ergo proportio sperę ad ipsum corpus duorum capitum est sicut proportio duarum tertiarum dyametri sperę ad tertiam eiusdem dyametri: Sed proportio duarum tertiarum cuiusque rei ad tertiam eiusdem rei est dupla; ergo et proportio sperę ad pyramidem duorum capitum cadentem in ipsa est dupla: et quia proportio columnę ad speram est sicut $.3.$ ad $.2.$; sperę ad pyramidem sicut $.2.$ ad $.1.$, erit proportio columnę ad pyramidem tripla; et hoc uolui demonstrare. Rursus circa idem centrum $l.$ intelligam circulum equalem circulo superiori $efgh.$; et in eo intelligam, tetragonum esse descriptum equale tetragono $efgh.$; et á punctis angulorum ipsius tetragoni lineabo quatuor lineas ad unum quemque polum sperę, scilicet ad puncta $ik.$; et perficietur solidum octo basium, quod EVCLIDES in tertio decimo libro infra speram describere docet: quod solidum diuiditur in duas pyramides super tetragonum descriptum in circulo, cuius centrum $l.$, quarum unaqueque habet basem tetragonam: et super ipsam eleuantur quatuor trigona equilatera; et altitudo unius pyramidis est

† in alio secans columnam et speram


fol. 125 recto.

fol. 125 verso.

linea .kl., et alterius .il.; que altitudines sibi inuicem sunt equales; est enim unaqueque earum medietas lineę .ik., hoc est dyametri sperę, uel axis columnę, seu altitudinis cubi; quarum pyramidum magnitudines, hoc est magnitudinem totius solidi octobasium habebis ex multiplicatione tetragoni descripti in circulo, cuius centrum est .l., in tertiam partem lineę .ik. Sed magnitudo pyramidis duorum capitum continentis hoc solidum octobasium habetur ex multiplicatione circuli continentis ipsum tetragonum in eandem tertiam partem lineę .ik.; ergo proportio pyramidis duorum capitum ad solidum octobasium est sicut circulus ad quadratum descriptum infra ipsum circulum; que proportio est sicut .11. ad .7., cum proportio tetragoni continentis circulum ad ipsum circulum sit sicut .14. ad .11. Et exterius tetragonum interioris sit duplum; ergo proportio pyramidis duorum capitum ad solidum octaedron est sicut .11. ad .7.: fuit etiam proportio cubi ad pyramidem duorum capitum sicut .42. ad .11.; et proportio pyramidis ad octaedron sicut .11. ad .7.: quare proportio cubi ad octaedron est sicut .42. ad .7.; que proportio sexcupla est. Rursus quia proportio columnę ad pyramidem duorum capitum fuit tripla, hoc est sicut .33. ad .11.; et proportio pyramidis ad octaedron est sicut .11. ad .7.; erit proportio columnę ad octaedron, hoc est ad solidum octobasium, sicut .33. ad .7. Item quia proportio sperę ad pyramidem duorum capitum fuit dupla, hoc est sicut .22. ad .11.; et proportio pyramidis ad octaedron sicut .11. ad .7., erit proportio sperę ad octaedron sicut 22. ad .7.; quam proportionem habet circumferentia cuiuscumque circuli ad suum dyametrum; his itaque demonstratis si magnitudo alicuius horum quinque corporum fuerit nota, erit possibile per ipsam magnitudinem reliquas magnitudines inuenire. Ad cuius rei demonstrationem ponamus latus cubi .ab. esse .6.; quare tetragonum .ac. erit .36.; quod si multiplicetur in altitudinem .ik., que erit similiter .6., uenient .216. pro magnitudine cubi: et hoc est cubicare unum ex lateribus cubi: et quia proportio cubi ad columnam est sicut .14. ad .11., | si de .216. acceperimus $\frac{14}{11}$, scilicet proportionem, quam habet columna ad cubum, uenient pro magnitudine columnę $\frac{5}{7}$ 169. Similiter si de .216. acceperimus proportionem, quas habent spera: et pyramis duorum capitum, et solidi octobasium ad cubum, nimirum pro magnitudine sperę uenient $\frac{4}{7}$ 113., et pro magnitudine pyramidis $\frac{3}{7}$ 56., et pro magnitudine solidi octobasium .36. Item sit nota magnitudo columnę, que est $\frac{5}{7}$ 169.; quam si multiplicauerimus per .14., et diuiderimus per .11., uenient .216. pro magnitudine cubi: et si de $\frac{5}{7}$ 169. acceperimus $\frac{2}{3}$, que sunt proportio sperę ad columnam, uenient $\frac{4}{7}$ 113. pro magnitudine sperę: et si de $\frac{5}{7}$ 169. acceperimus tertiam partem, que est proportio pyramidis ad columnam $\frac{4}{7}$ 56., uenient pro magnitudine pyramidis: item si de $\frac{5}{7}$ 169 acceperimus $\frac{2}{3}$, scilicet proportionem octaedri ad columnam, uenient .36. pro magnitudine octaedri. Eodemque modo poteris operari si magnitudo alicuius reliquorum corporum fuerit nota.


Ad inueniendum magnitudinem duodecaedri in spera constructi, cuius sperę dyameter sit nota. Ponam pentagonum .abcde., quod sit unum ex duodecim pentagonis equalibus continentibus ipsum solidum: et circa ipsum pentagonum describam circulum .abcde., cuius centrum sit .f.; et protraham in eo dyametrum .ag., nec non et cordam .be., que est corda anguli pentagonici; et ponam centrum sperę punctum .h., et copulabo rectam .ah., et circinabo super speram semicirculum magni circuli .ali., et producam .ah. in punctum .i., et erit tota .ai. dyameter sperę, nec non et semicirculi .ali.;

quod solidum ... est magnitudinem ... (fol. 125 verso, lin. 1-7, 8 e margine superiore; pag. 194, lin. 40 — pag. 195, lin. 3).



fol. 126 recto.

* speram semicirculum solidi duodecim * (fol. 126 recto, lin. 22-35; pag. 195, lin. 42 — pag. 196, lin. 9).



* basium pentagonorum Vnde qualiter * (fol. 126 verso, lin. 1-13; pag. 196, lin. 9-17).

(Figura simile alla precedente)

.DIS.

et ponamus eam esse unarum .6.; et abscidam ab ea lineam .ak., que sit tertia ex .ai.; et producam ad rectos angulos super lineam .ai. lineam .kl., et copulabo rectas .al. et .il.; et ab angulis pentagoni .abcde. ad centrum sperę perducam lineas .bh. .ch. .dh. .eh.; et erit pyramis .habcde., cuius basis est pentagonum .abcde., et sumitas eius .h. duodecima pars totius

t. 126 v. solidi duodecim | basium pentagonorum descripti in spera, cuius dyiameter est .ai.; quia si á centro sperę, quod est .h., ad omnes angulos duodecaedri ducantur recte, nimirum in duodecim pyramides equales totum corpus duodecaedri diuidetur, quarum una est pyramis .habcde.: quare si magnitudinem eius inuenerimus, et eius duodecuplum acceperimus, utique habebimus magnitudinem totius corporis. Vnde qualiter operari in his debeamus, indicemus. Primum considerandum est quod trigona .ali. et .alk. sibi inuicem sunt similia: habent enim angulos .ali. et .akl. rectos: et angulum qui ad .a. communem: reliquis ergo qui sub .alk. reliquo qui ad .i. equalis est: trigona enim similia circa communem angulum habent latera proportionalia: quare est sicut .ia. ad .al., ita .al. ad .ak.: et quando tres recte proportionales sunt; erit sicut prima ad tertiam, ita quadratum quod á prima ad quadratum quod á secunda: ergo est sicut .ia. ad .ak., ita quadratum dyametri .ai. ad quadratum lineę .al.: est enim .ai. ex .ak. tripla; quare et tetragonum ex .ai., quod est .36., triplum est tetragoni lineę .al.; ergo tetragonum lineę .al. est .12. Et est .al., vt in tertiodecimo libro EVCLIDIS habetur, latus cubi cadentis in spera, cuius dyiameter est .ai. Nam latus cubi

cadentis in spera est corda anguli pentagonici unius cuiusque pentagoni duodecim superficieum facientium solidum duodecim basium; ergo quadratum cordę .be., que est corda anguli pentagonici .bae., est .12.: et ut inueniamus unum ex lateribus pentagoni .abcde., oportet ut corda .be. media et extrema proportione diuidatur; quia ut in tertiodecimo libro EVCLIDIS habetur corda anguli pentagonici media et extrema proportione diuisa; pars maior est latus pentagonicum.

Modus diuidendi lineam media et extrema proportione.

Nam modus diuidendi corda .be. media et extrema proportione est vt super quadra-

tum eius, quod est .12., addamus quartam eius, erunt .15.; de quorum radice auferatur medietas lineę .be., que est radix trium, | et habebitur pro maiori parte radix .de. 15. minus radice trium; ergo latus penthagonicum .ae., quod est unum ex lateribus penthagoni, est radix de .15. minus radice trium. Et quia, ut in quartodecimo EVCLIDIS habetur, quadrata cordę et lateris penthagonici possunt quincuplum lateris exagonici. Et ut habeam latus exagonicum, addam quadratum cordę .be., quod est .12., cum quadrato lateris .ae., quod est .18., minus radice de .180., ut inferius demonstrabo, erunt 30 minus radice de 180.; quorum quinta, que est .6., minus radice de $\frac{1}{5} 7$, est quadratum lateris exagonici .af. Nam exagonicum latus equale est semidyametro circuli; quod quadratum si auferatur ex quadrato semidyametri sperę .ah., scilicet de .9., remanebunt .3. et radix de $\frac{1}{5} 7$ pro quadrato perpendicularis .hf. Est enim trigonum .ahf. retriangulum, cum recta .hf. stet orthogonaliter super planum circuli .abgd.; quia ut habetur in libro MILEI et in ALMAIESTI., cum superficies secat speram, comunis eorum sectio est circulus; et cum á centro sperę ad centrum circuli secantis speram linea protrahitur, illa linea stat orthogonaliter super superficiem circuli.

fol. 127 recto.


¶ in distinctione ultima ubi est paragonum ¶ Demonstrabo rursus per lineam .rac. quod sic iacet.

r
a
e

Habita quidem notitia semidyametri .af. et perpendicularis .hf., ostendamus modum mensurandi pyramidem .habcde. Diuidam primum .fg. in duo equa super .o., et erit .a o. dodrans, hoc est tres quarte dyametri .ag.; et auferam ex corda .be. sextam eius, que sit .bn., remanebit .en. distans, scilicet $\frac{5}{6}$ cordę .be.; et quia ut in quartodecimo libro habetur, ex dodrante .ao. in distantem .en. peruenit planum penthagoni .abcde.; quod planum si ducatur in perpendicularem .hf., ueniet triplum pyramidis .habcde.; quod etiam triplum si ducatur in .h., habebitur magnitudo totius dedocædri, cuius duodecima pars est pyramis .habcde. Sed quia proportio dodrantis .ao. ad semidyametro .af. est sicut .6. ad .4., que proportio est sexqualtera, erit superficies .af. in .fh. ducta in .en. et producta in .6. sicut superficies ex .ao. in .en. ducta in .hf. et producta in .4. Item quia proportio .be. ad .en. est sicut .6. ad .5., erit superficies ex .af. in .be. ducta in .fh. et producta in .5. sicut superficies ex .fa. in .en. ducta in .hf. et producta in .6. Sed ex superficie .fa. in .en. ducta in .fh. et producta in .6. prouenit magnitudo totius duodecaedri; ergo ex superficie .af. in .be. ducta in .hf. et producta in .5. uenit magnitudo eiusdem duodecaedri: quare ducam primum quadratum ex .af., hoc est .6. minus radice de $\frac{1}{5} 7$. in 3, et radicem |

de $\frac{1}{5} 7$, uenerit etiam $\frac{4}{5} 10$. et tres radices de $\frac{1}{5} 7$: uerbi gratia: ex ductu .6. in .3. ueniunt .18.; et educta radice de $\frac{1}{5} 7$ addita in radicem de $\frac{1}{5} 7$ diminutam ueniunt $\frac{1}{5} 7$ diminuta; quibus extractis de .18. remanent $\frac{4}{5} 10$.; et ex multiplicatione de .3. in radicem de $\frac{1}{5} 7$ diminutam ueniunt tres radices de $\frac{1}{5} 7$ diminute: et ex multiplicatione de .6. in radicem de $\frac{1}{5} 7$ additam ueniunt sex radices de $\frac{1}{5} 7$ addite: extractis ergo tribus radicibus diminutis de sex

fol. 127 verso.



de $\frac{1}{5} 7$, ... sex radices s (fol. 127 verso, lin. 1-12; pag. 197, lin. 34-42).

radicibus additis, remanent tres radices de $\frac{1}{5}$ 7. addite. Et sic habemus 10 et $\frac{1}{5}$ et radices tres de $\frac{1}{5}$ 7., que sunt una radix de $\frac{1}{5}$ 64. Post hec ducam quadratum ex .be. in quadratum de .5., uenient .300., in quibus multiplicabo $\frac{1}{5}$ 10. et radicem de $\frac{1}{5}$ 64. Nam ex .300. ductis in $\frac{1}{5}$ 10. ueniunt .3240., et ex ductis .300. in radicem de $\frac{1}{5}$ 64. uenit radix numeri, qui fit ex quadrato trecentorum, scilicet de .90000. in $\frac{1}{5}$ 64: de qua multiplicatione proueniunt 5832000. ; ergo pro quadrato magnitudinis totius dodecaedri habentur .3240. et radix de 5832000.; et hoc quadratum est binomium primum, cum maius nomen possit plus minore secundum quantitatem quadrati numeri: quare radix eius est binomia, ut in .x.^{mo} EVCLIDIS habetur; que radix est radix de 2700. et radix de 540.; quas radices, si subtiliter acceperimus, habebimus parum minus de ulnis $\frac{1}{5}$ 75. pro magnitudine positi dodecaedri: uel si radicem de 5832000 quam propius acceperimus, et inueniemus eam esse parum minus de .2415.; quam si super .3240. addiderimus, habebimus parum minus de .5655.; quorum radicem similiter inueniemus esse parum minus de $\frac{1}{5}$ 75. Et notandum quod diximus, radicem de .3240. et radicem de .5832000 esse radicem de .2700. et radicem de .540., tunc diuisimus .3240. in duas partes, quarum una fuit .2700., et altera .540.; et ex multiplicatione unius earum in aliam prouenit quarta de .5832000.; et ita nos docet EVCLIDES in similibus operari. Demonstrabo rursus quomodo quadratum lineę .ae., scilicet lateris pentagoni | inueniendum sit. Reiterabo lineam .ae., et addam ei lineam .ra., que sit radix trium: et erit tota .er. radix de .15.; quare .ae. erit radix de 15. minus radice trium; de qua .ae. uolumus quadratum accipere. Quoniam linea .er. diuisa est in duobus utlibet super punctum .a., erunt quadrata linearum .er. et .ar. equalia duplo superficiei .ar. in .er., et quadrato lineę .ae. Vnde si ex quadratis linearum .er. et .ar. tollamus duplum superficiei .ar. in .er., remanebit quadratum lineę .ae.: est enim .er. radix de .15.; quare quadratum eius est .15., et .ar. est radix de .3. Quare quadratum eius est .3.; ergo quadrata linearum .er. et .ar. sunt .18.; et ex .ar. in .er., scilicet ex radice trium in radicem de .15. uenerit una radix de .45.: quare ex duplo .ar. in .er. ueniunt due radices de .45.; quibus extractis de .18. inuentis, remanent .18. minus duabus radicibus de .45.; que due radices sunt una radix de .180.; ergo quadratum lineę .ae. est .18. minus radice de .180., ut superius inuenimus.


De magnitudine solidi 20 basium triangularium constructi in eadem sphaera, cuius dyiameter sit 6.

Ad habendam siquidem magnitudinem ycosaedri constructi in sphaera data Adiaceat trigonum .abc. equilaterum et equiangulum, quod sit una ex .20. superficiebus contentibus solidum: et circa ipsum describam circulum .abc., et in ipso protraham dyiameterum .ad. secans rectam .bc. super punctum .e., et centrum circuli sit .f.; et ponam centrum sperę punctum .g., et copulabo rectam .ag., et producam eam in puncto .h., qui sit punctus in superficie sperę: et signabo super speram semicirculum circuli magni .aih., et copulabo rectas .bg. cg.; et erit .gabc. pyramis, cuius basis est trigonum .abc., et eius summitas est .g.; que pyramis est $\frac{1}{20}$ totius ycosaedri; quia si á puncto

metrum .ad. secans rectam .bc. super punctum .e., et centrum circuli sit .f.; et ponam centrum sperę punctum .g., et copulabo rectam .ag., et producam eam in puncto .h., qui sit punctus in superficie sperę: et signabo super speram semicirculum circuli magni .aih., et copulabo rectas .bg. cg.; et erit .gabc. pyramis, cuius basis est trigonum .abc., et eius summitas est .g.; que pyramis est $\frac{1}{20}$ totius ycosaedri; quia si á puncto

Magnitudo dodecaedri.


« minus de ... lateris pentagoni » (fol. 127 verso, lin. 30-35 e margine inferiore; pag. 198, lin. 13-18).



« de .15. minus ... ex duplo .ar. » (fol. 128 recto, lin. 3-11; pag. 198, lin. 19-27).




« rectam .bc. ... et quia » (fol. 128 recto, lin. 21-35; pag. 198, lin. 35— pag. 199, lin. 4).



.g., qui est centrum sperę, lincetur recte ad omnes angulos .20. triangulorum continentium ipsum ycosaedron, nimirum ipsum in .20. pyramides equales dinidetur, quarum una est pyramis .gabc., cuius magnitudinem si in .20. duxerimus, habebimus utique magnitudinem totius solidi .20. basium: et quia | ut in EVCLIDE habetur, circulus continens unum ex trigonis ycosaedri est equalis circulo continenti unum ex pentagonis dodecaedri, cum ambo solida sint in eadem spera constructa; erit propter hoc quod diximus superius, semidyiameter circuli .abc. nota; hoc quadratum ex .af. erit .6. minus radice de $\frac{1}{3}$ 7., et quadratum perpendicularis .gf. erit .3. et radix de $\frac{1}{3}$ 7. Est enim semidyiameter sperę .ag. 3., et eius quadratum est 9.: et quia quadratum lateris trianguli equilateri descripti in circulo est triplum quadrati semidyametri ipsius circuli; si triplicauerimus quadratum semidyametri .af., quod est .6. minus radice de $\frac{1}{3}$ 7., habebimus .18. minus tribus radicibus de $\frac{1}{3}$ 7. pro una ex lateribus trigoni .abc.; de inde copulabo rectas .db. et .dc., et erunt trigona .abd. et .acd. orthogonia et equalia. Est enim latus .ab. equale lateri .ac.; quare arcus .ab. equalis est arcui .ac.; est enim et totus arcus .abd. toti arcui .acd. equalis: reliquus ergo arcus .bd. reliquo .cd. est equalis; quare recta .bd. recte .cd. est equalis: equilatera enim sunt trigona .abd. et .acd., nec non et equiangula; quare angulus .bad. equalis est angulo .cad. Est enim et angulus .abc. equalis angulo .acb.; quare anguli qui ad .e. equales sibi inuicem sunt: et si equales, ergo recti. Et quoniam in circulo .abc. dyiameter .ad. quandam rectam .bc. ad rectos angulos secat: et per equalia eam secat; ergo recta .be. equalis est recte .ec.; ergo .be. medietas est ex .bc., hoc est ex .ab.; quare quadratum ex .ab. quadruplum est ex quadrato .be. Sed quadrato lineę .ab. equalia sunt quadrata linearum .ae. et .eb.; ergo quadrata linearum .ae. et .eb. quadrupla sunt quadrato lineę .eb. Quare quadratum lineę .ae. triplum est quadrato lineę .eb.; ergo et quia in trigono orthogonio .abd. ab angulo .b. recto cathetus .ae. protracta est super basem .ad., erit sicut .ae. ad .eb., ita .be. ad .ed. Quare est sicut quadratum lateris .ae. ad quadratum lateris .eb., ita .ae. ad .ed. Sed quadratum lateris .ae. ad quadratum lateris .ed. est triplum; et .ae. ergo ex .ed. tripla est. Quare patet .ed. totius dyametri .ad. quartam esse. Est enim et .af. medietas dyametri .ad.; reliqua .ef. est alia quarta pars ex tota .ae. continent tres quartas totius dyametri .ad. Quare .ae. | ad .af. est proportio sexqualtera. Demonstratum est recta .ae. cathetum esse super rectam .bc. Quare ex ductu .ae. in .bc. prouenit duplum trigoni .abc.; que si multiplicauerimus per .10., habebimus aream .20. triangulorum equalium continentium solidum .20. basium. Sed quia proportio ex .ae. ad .af. est sicut .15. ad .10., ueniet ex multiplicatione .af. in .bc. ducta in .15. superficies eorundem .20. triangulorum: quam superficiem si duxerimus in tertiam perpendicularis .gf.; que perpendicularis est altitudo .20.

fol. 128 verso.

Est enim ... Quare .ae. > (fol. 128 verso, lin. 30-35 e margine inferiore; pag. 199, lin. 30-32).




fol. 129 recto.

pyramidarum continentium totum solidum ycosaedri; ergo si multiplicauerimus $.af.$ in $.bc.$; et illud totum in $.5.$; et quod prouenerit, duxerimus in $.gf.$, habebimus utique magnitudinem totius solidi: ergo si multiplicauerimus quadratum ex $.af.$ in quadratum ex $.bc.$; et illud totum duxerimus per quadratum de $.5.$, scilicet per $.25.$; et hoc totum produxerimus in quadratum ex $.gf.$, habebimus ex hoc toto quadratum magnitudinis solidi. Nam ex multiplicatione quadrati lineae $af.$ in quadratum ex $fg.$, scilicet ex multiplicatione de $.6.$ minus radice de $\frac{4}{5} 7.$ in tres et radicem de $\frac{4}{5} 7.$, uenient $\frac{4}{5} 10.$ et radix de $\frac{4}{5} 64.$, ut superius inuenimus; que multiplicanda sunt per quadratum lateris trianguli $.bc.$, scilicet per $.18.$ minus tribus radicibus de $\frac{4}{5} 7.$, scilicet minus una radice de $\frac{4}{5} 64.$; que multiplicatio sit fit: primum multiplicanda sunt $\frac{4}{5} 10$ per $.18.$, scilicet integra per integra, ueniunt $\frac{2}{3} 194.$; de quibus tollenda est multiplicatio radice de $\frac{4}{5} 64$ addite in radicem de $\frac{4}{5} 64.$ diminutam; ex qua multiplicatione proueniunt integra $\frac{4}{5} 64.$, remanent $\frac{2}{3} 129.$ Item multiplicanda est radix de $\frac{4}{5} 64.$ addita per $.18.$, ueniunt radices decem et octo de $\frac{4}{5} 64.$ Et radix de $\frac{4}{5} 64.$ diminuta multiplicanda est per $\frac{4}{5} 10.$, ueniunt radices $\frac{4}{5} 10.$ de $\frac{4}{5} 64.$ diminute: extractis ergo radicibus $\frac{4}{5} 10.$ diminutis ex radicibus $.18.$ additis, remanent radices $\frac{4}{5} 7.$ de $\frac{4}{5} 64.$: ergo ex quadrato $af.$ in $fg.$ ducto in quadratum ex $.bc.$ ueniunt $\frac{2}{3} 129.$ et radices $\frac{4}{5} 7.$ de $\frac{4}{5} 64.$: quibus multiplicatis per quadratum de $.5.$, scilicet per $.25.$, ueniunt $.3240.$ et radices $.180.$ de $\frac{4}{5} 64.$ pro quadrato totius solidi ycosaedri. Nam si illas $.180.$ radices ad radicem unius numeri tantum reducere uolumus: multiplicabimus $.180.$ in se, ueniunt $.32400.$; et de $\frac{4}{5} 64.$ faciemus quintas, erunt quinte $.324.$; quas multiplicabo per $.5.$, ueniunt $.324.$; que multiplicabo per $\frac{4}{5}$ de $.32400.$, scilicet per $.6480.$, ueniunt $.2099520.$: ergo quadratum totius solidi est $.3240.$ et radix de $.2099520.$; et hoc est binomium quartum, cum maius nomen, scilicet $.3240.$, sit ratiocinatum, et possit plus minore, scilicet super $.2099520.$, secundum quantitatem numeri non quadrati: unde si radicem de $.2099520.$, que est parum minus de $.1449.$, addiderimus super $.3240.$, ueniunt parum minus de $.4689.$; quorum radix, que est parum minus de $\frac{4}{5} 68.$, est quantitas magnitudinis ycosaedri. Et si uolumus ad notitiam semidiametri $af.$ aliter deuenire. Ponam $.kh.$ quadruplam ex $.ak.$; et per punctum $.k.$

super dyametrum sperae $.ah.$ ad rectos angulos protraham lineam $.ki.$; et copulabo rectas $.ai.$ $.ih.$; et erit per ea que dicta sunt superius ut $.ha.$ ad $.ai.$, ita $.ai.$ ad $.ak.$ Quare erit sicut $.ha.$ ad $.ak.$, ita quadratum dyametri $.ah.$ ad quadratum lineae $.ai.$ Est enim $.ah.$ quincupla ex $.ak.$ Quare quadratum ex $.ah.$, quod est $.36.$, est quincuplum quadrati ex $.ai.$; ergo quadratum ex $.ai.$ est $\frac{5}{1} 7.$; et $.ai.$ est semidiametrum circuli, cuius pentagoni latus cadentis in ipso circulo est latus trianguli $.abc.$ suprascripti, ut in Euclide habetur: quod latus pentagonicum ita ex semidiametro sui circuli habetur si super quadratum ipsius semidiametri, scilicet super $\frac{4}{5} 7.$, addemus quartam eius, et erunt $.9.$; de quorum radice, que est $.3.$, tollam medietatem semidiametri, cuius medietatis quadratum est quarta pars quadrati semidiametri; et illud est $\frac{4}{5} 1.$; et habebimus $.3.$

fol. 129 verso

* minus de 1449. ... circuli habetur *
(fol. 129 verso, lin. 1-14 e margine
superiore; pag. 200, lin. 25-39).



minus radice de $\frac{4}{5}$ 1.; et hoc est latus dacagonicum: super cuius quadratum, quod est $\frac{4}{5}$ 10 minus radice de $\frac{4}{5}$ 64., si addiderimus quadratum semidyametri, scilicet $\frac{3}{4}$ 7., erunt .18. minus radice de $\frac{4}{5}$ 64. pro quadrato unius laterum trigoni .*abc.*; quod quadratum cum sit triplum quadrati semidyametri .*af.*, diuidenda sunt .18., minus radice de $\frac{4}{5}$ 64., per .3., et uenient .6., minus radice de $\frac{4}{5}$ 7., pro quadrato semidyametri .*af.*, ut superius inuentum est. Et quia EVCLIDES inuenit esse sicut latus cubi, scilicet corde anguli penthagonici, ad latus trianguli equilateri cadentis in eodem circulo, sicut proportio lineę potentis super lineam media et extrema proportione diuisam, et super maiorem partem eius ad lineam potentem super eandem lineam diuisam, et super minorem eius partem; ita solidum .12. basium penthagonorum ad solidum .20. basium triangularium in eadem spha constructarum, est possibile inuenire magnitudinem unius eorum solidorum habita magnitudine alterius. Verbi gratia: inuenimus superius cordam anguli penthagoni fuisse radicem de .12.; et latus trianguli esse radicem de .18. minus radice de $\frac{4}{5}$ 64. Et solidum .12. basium esse $\frac{4}{5}$ 75.; ergo sicut radix de .12. est ad radicem de .18. minus radice de $\frac{4}{5}$ 64., ita $\frac{4}{5}$ 75. est ad magnitudinem solidi .20. basium. Quare erit sicut .12. ad .18. minus radice de $\frac{4}{5}$ 64., ita quadratum de $\frac{4}{5}$ 75., quod inuenimus esse superius .5655., ad quadratum magnitudinis ycosaedri; accipiamus ergo quam subtilius possumus radicem de $\frac{4}{5}$ 64., et inueniemus eam esse $\frac{4}{20}$ 8.; et auferamus eam de .18., remanebunt .10. minus $\frac{4}{20}$.; ergo est sicut .12. ad .10. minus $\frac{4}{20}$, ita .5655. ad quadratum ycosaedri: multiplicabimus ergo .5655. per .10. minus $\frac{4}{20}$, erunt 56267.; quibus diuisis per .12. reddunt parum minus de .4689. pro quadrato ycosaedri, ut superius inuenimus. Et si quadratum ycosaedri esset notum, multiplicarem illud per .12., et summam diuideremus per .10. minus $\frac{4}{20}$, et habemus quadratum dodecaedri notum. Et si uolumus inuenire proportionem, quam habet linea potens super lineam media et extrema proportione diuisam ad lineam potentem super eandem lineam diuisam et minorem partem eius. Ponam lineam .*ab.*, et diuidam eam media et extrema proportione super .*g.*; et maior pars esto .*gb.* Quare erit sicut .*ab.* ad .*bg.*, ita .*bg.* ad .*ga.*; et á puncto .*g.* super rectam .*ab.* ad rectos angulos ponam rectam .*gd.*; et ponam ipsam equalem recte .*ab.*; et copulabo rectas .*da.* .*db.* , et erit recta .*db.* potens super rectas .*dg.* et .*gb.*; et .*db.* erit potens super rectas .*dg.* et .*ga.*; et quia .*dg.* equalis est recte .*ab.*, erit recta .*db.* potens super rectas .*ab.* .*gb.*, hoc est super totam lineam diuisam et maiorem partem eius; et linea potens super eandem lineam .*ab.* et maiorem partem eius, que est linea .*ag.*; ergo est et sicut .*db.* ad .*da.*, ita solidum .12. basium ad solidum .20. basium; erit propter hoc et sicut quadratum lineę .*db.* ad quadratum lineę .*da.*, ita quadratum dodecaedri ad quadratum ycosaedri: et ut hec ponantur in numeris, ponam .*ab.* 10.; et erit .*bg.* radix quincupli quadrati medietatis lineę .*ab.* minus ipsa medietate; ergo .*bg.* erit de .125. minus 5.; et .*ag.* erit tripla medietatis .*ab.* minus radice quincupli quadrati medietatis eiusdem lineę; ergo erit .*ag.* 15. minus radice de .125. Accipiamus ergo quadratum ex .*gb.*; et erit .150. minus decem radicibus de .125., que sunt una radix de .12500.: et addamus ipsi quadrato quadratum lineę .*dg.*, quod est .100., cum linea .*dg.* sit equalis lineę .*ab.*, erunt .250. minus radice de .12500. pro quadrato lineę .*db.* Item super quadratum lineę .*ag.*, quod est

fol. 130 recto.

fol. 130 verso.


.350. minus .30. radicibus de .125. addamus quadratum lineę $gd.$, erunt .450. minus radice de 12500. pro quadrato lineę $da.$: et quia unumquodque quadratorum linearum $db.$ et $da.$ est [abscisio aut recisum, ut non habeamus ignotius per ignotum, accipiamus radicem quam subtilius poterimus de .12500. et de 112500.; et auferamus eas de nominibus maioribus, que sunt in ipsis recisis; et erit proportio quadrati lineę $db.$ ad quadratum lineę $da.$ ratiocinata. Verbi gratia: radix de 12500. est $\frac{1}{5}$ 111.; qua extracta de 250., remanet parum minus de $\frac{1}{5}$ 138. pro quadrato lineę $db.$ Item radix de 112500. est parum plus de $\frac{2}{5}$ 335.; qua extracta de .450., remanet parum minus de $\frac{3}{5}$ 114. pro quadrato lineę $da.$; ergo est sicut $\frac{1}{5}$ 138. ad $\frac{3}{5}$ 114., ita quadratum solidi .12. basium ad quadratum solidi 20. basium. Et est hec proportio equalis proportionis supradictę, quam habet quadratum cordę anguli pentagonici ad quadratum lateris trigoni cadentis in eodem circulo. Habita siquidem notitia magnitudinum omnium solidorum cadentium in una spera, per ea que dicta sunt, erit possibile inuenire magnitudines similium solidorum cadentium in aliqua alia spera; cum proportio similium solidorum sit proportio triplicata similium laterum: uel etiam dyametrorum sperarum, in quibus ipsa solida fuerint constituta: est enim proportio triplicata dyametri unius sperę ad dyametrum alterius ea quam habet cubus dyametri unius sperę ad cubum dyametri alterius. Vnde si uolumus inuenire magnitudinem solidi .12. basium cadentis in spera, cuius dyameter sit .7., erit sicut cubus senarij ad cubum septenarij, hoc est sicut .216. ad .343., ita inuentum solidum, cuius magnitudo est $\frac{1}{5}$ 75., ad magnitudinem quesiti solidi. Quare multiplicanda sunt $\frac{1}{5}$ 75. per 343., et summa diuidenda est per .216., uenient $\frac{5}{12}$ 119. parum minus; uel si quadratum de .343. multiplicabitur per quadratum solidi, scilicet per .3240., et radicem de 5832000.; et summa diuidatur per quadratum de .216., et habebitur quadratum solidi .12. basium cadentis in spera, cuius dyameter est .7. Quod idem intelligas de solido. 20. basium, et de reliquis solidis.

Incipit septima distinctio de inuentione altitudinum rerum eleuatarum, et profunditatum atque longitudinum planitierum.

Si vis metiri aliquam altitudinem: Erige astam in plano: et fac eam stare orthogonaliter super ipsum planum: et elonga te ab ipsa asta, et ab altitudine metienda: et pones oculum in terra prospiciens per summitatem astę: et si uisus tuus transibit ad punctum summitatis metiendę altitudinis, signa punctum in terra in locum ubi erit oculus. Et si linea egrediens ab oculo tuo per summitatem astę | non uenerit ad punctum summitatis altitudinis ipsius, muta te retro uel ante, donec linea progrediens ab oculo tuo per summitatem astę ascendat recte ad summitatem altitudinis predictę: et tunc erit proportio plani, quod est inter oculum et rem eleuatam, ad ipsam rem eleuatam quam uis metiri, sicut planum, quod est inter oculum et astam, ad ipsam astam. Verbi gratia. Sit altitudo $ab.$, que sit erecta super planum, in quo sit linea $bc.$; quare angulus $abc.$ erit rectus; et in ipso plano, et super rectam $bc.$ orthogonaliter erigatur asta $de.$; et punctus $c.$ sit oculus tuus, á quo transeat linea $ac.$ ascendens per summitatem astę, que est punctus $e.$; et erit trigonum $abc.$ ex summitate $ab.$ et lineę $bc.$ existens in plano; et ex linea $ac.$ quam facit oculus tuus; et trigonum $edc.$ erit ex asta $ed.$ et ad planum $dc.$ et linea $ce.$ trigona quidem


fol. 131 recto.

in ante ... ex asta * (fol. 131 recto, lin. 2-11; pag. 202, lin. 34-43).




.abc. et *.edc.* sibi inuicem sunt similia, quia sunt equiangula; est enim uterque angulorum *.abc.* et *.edc.* rectus: et angulus qui ad *.c.* utriusque triangulo est communis; reliquus qui ad *.a.* reliquo qui sub *.ced.* est equalis: equiangula ergo sunt trigona *.abc.* et *.dec.*; quare et similia. Similia enim trigona circa equales angulos habent latera proportionalia; est enim sicut *.cd.* ad *.de.*, ita *cb.* ad *ba.* Vnde si *.cd.* et *.de.*, scilicet spatium quod est inter oculum et astam; et ipsa asta *.de.* fuerint nota, erit nota linea *.cb.*; erit utique nota et altitudo *.ab.*: quia si equalis est *.cd.* ex *.de.*, equalis erit *.cb.* ex *.ba.*; et si maior, maior: et si minor, minor: Que ostendantur cum numeris. Esto asta *.ed.* quinque palmorum; et spatium *.cd.* sit equale ei; et sit spatium *.cb.* 30. ulnarum; erit propter hoc et altitudo *.ab.* similiter 30. ulnarum, cum *.cd.* sit equalis *.de.*, ut in prima figura patet. Item esto *.cd.* maior asta *.ed.*, erit propter hoc et planum *.cb.* maius altitudine *.ab.*, ut in hac secunda figura patet, in qua ponimus spatium *.cd.* 12. palmorum: et astam *.ed.* octo palmorum; et planum *.cb.* 60. ulnarum. Quare erit ut *.cd.* ad *.de.*, hoc est sicut 12. ad 8.; uel in minoribus numeris sicut 3. ad 2., ita *.cb.* ad *.ba.*: unde si multiplicauerimus 60. per 2., et diuiserimus per 3., uenient ulne 40. pro altitudine *.ab.* Rursus esto *.cd.* minor quam *.de.* Quare spatium *.cb.* erit minus altitudine *.ab.*, ut in hac tertia patet figura; in qua ponimus *.cd.* 9., scilicet spatium quod est inter oculum et astam: et astam *.ed.* 12., et planum *.cb.* 45. Quare quantum addit *.ed.* super *.dc.*, tantum addet altitudo *.ab.* super planum *.bc.*: est enim *.ed.* ad *.dc.* proportio sexquiertia. Quare altitudo *.ab.* addit super planum *.cb.* tertiam eius, que est 15.; et sic altitudo *.ab.* est 60.: uel si 45., scilicet *.cb.*, multiplicentur per 12., hoc est per *.ed.*; et summa diuidatur per *.cd.*, scilicet per 9., uenient 60. pro altitudine *.ab.*: uel si *.cb.* multiplicetur per $\frac{4}{3}$ ex *.ed.*, et diuidatur per $\frac{3}{2}$ ex *.cd.*, uenient similiter 60. pro *.ab.*: uel si $\frac{4}{3}$ ex *.cb.* multiplicetur per $\frac{4}{3}$ ex *.ed.*, uenient 60. pro altitudine *.ab.* Ex hoc quidem quidam uolens metiri in nemoribus arbores aptas nauibus, talem modum acceperunt: habent arundinem equalem suę staturę, quam habent ab extremitate tali usque ad oculum; et ponunt se in terra contra arborem, quam metiri uolunt, extense tenendo arundinem orthogonaliter erectam secus extremitatem utriusque tali, ut quanta sit altitudo arundinis, tanta sit longitudo staturę a talo usque ad oculum ipsius; et mutant se aliquando uersus arborem appropinquando, aliquando elongando ab ea; et hoc faciunt donec transeat uisus eorum per summitatem arundinis ad summitatem arboris: et tunc quanta est longitudo, que est inter oculum et pedem arboris, tantam dicunt esse altitudinem arboris. Verbi gratia: sit altitudo arboris *.ab.*, arundinis *.cd.*, et statura hominis *.de.*; et sit *.e.* oculus eius, cuius uisus linea *.ae.* transiens per punctum *.c.*; et tunc erit *.eb.* sicut *.ed.* ad *.dc.*, ut superius ostensum est. Geometre uero, uolendo aliquam subtilitatem geometricam ostendere, stant non multum longe ab arbore, et cum arcu duas sagittas sagittant ad arborem, vnã ad radicem eius: et aliam ad punctum summitatis eius; sed unicuique sagitte ligant unum filum, et tendunt ipsa fila perducentes ea ad unum punctum in plano, facientes ex ipsis filis et ex arbore trigonum orthogonium, cuius cathetus est ipsa arbor; et eius basis est filum sagitte ad pedem arboris protractę, et eius ypothenusa est filum alterius sagitte, quod subtendit angulum rectum. Verbi gratia: sit arbor linea *.ab.*; et filum inferioris sa-

* et *.edc.* rectus et sit *a* (fol. 131 recto, lin. 14-22; pag. 103, lin. 2-10).




* cum *.ed.* planum *.cb.* *a* (fol. 131 recto, lin. 24-33; pag. 203, lin. 11-19).




fol. 131 verso.


* *.ab.* addit. similiter 60. *a* (fol. 131 verso, lin. 1-4 e margine superiore; pag. 203, lin. 21-24).



* pro altitudine eius, cuius *a* (fol. 131 verso, lin. 5-6-17; pag. 203, lin. 25-35).




et arbore; et cum ... arboris .ab.: a (fol. 131 verso, lin. 21-30; pag. 203, lin. 38 — pag. 204, lin. 3).



gittę sit .bc., et filum alterius sit .ac. Cumque utriusque fili mensuram habuerint : quadratum fili .bc. extrahetur ex quadrato fili .ac., remanet eis quadratum arboris .ab.: ut si filum .ac. fuerit cubitorum .50., et filum .bc. fuerit .30., auferatur quadratum de .30., quod est .900., de quadrato de .50., quod est .2500., remanebunt pro quadrato arboris .ab. 1600.; cuius radix, que est .40, est altitudo arboris .ab. Possimus etiam dimensionem cuiuscumque altitudinis per aliquem triangulum ligneum habere, dum in ipso | triangulo ab uno angulorum cathetus producta fuerit; et basis super quam cathetus cadet ponatur in plano. Verbi gratia: sit altitudo metienda .ab.; et triangulus ligneus esto .e.c.f., cuius cathetus esto .ed.; et stet trigonum .ecf. super planum altitudinis, ita ut linea .ed. stet orthogonaliter super ipsum planum: et tunc ponant oculum super latus trigoni .ec.; qui oculus sit .h., et aspiciat per punctum .e.: et si uisus tuus transeundo per .e. uenerit ad .a., erit sicut .cd. ad .de., ita .cb. ad .ba. : et si uisus transeundo per .e. uenerit inter .ab., apropinquabis triangulum ad altitudinem .ab.: et si idem uisus ascendet super altitudinem .ab., reduces triangulum retro, et facies semper cathetum .ed. orthogonaliter stare super planum, fulciendo ipsum triangulum cum lapillis et cum terra; et hoc facies donec oculus tuus per .e. uideat .a.: et cum hoc factum fuerit, erit ut dixi sicut .cd. ad .de., ita .cb. ad .ba.: ut si .cd. fuerit .3. cuiuscumque mensurę, et .de. fuerit .4., et .cb. 30. passuum, erit propter hoc altitudo .ab. passus .40.; quia .ed. addit super .cd. tertiam eius: quare et .ab. addit similiter tertiam super .cb.: uel si .cb. multiplicetur per .ed., et suma diuidatur per .cd., uenient similiter .40. pro altitudine .ab. Et quia pulcre et subtiliter et facile cum quadrante, quem quidem oroscopum uocant, altitudines metiuntur, ipsum quadrantem, et ea que in ipso ponuntur ad nostrum propositum facientia designare curauit ad presens ut subtilius que intendo ualeam demonstrare. Pono punctum .a. centrum et ab ipso protraho duas rectas equales .ab. et .ac. continens angulum rectum et spatio unius rectorum .ab. uel .ac. circino arcum .bdc. producens ipsum extra aliquantulum in puncto .e.; nec non et lineam .ab. produco usque ad .g. et pono lineam .eg. equidistantem lineę .ac. et diuido angulum .bac. in duo equa cum linea .ad. et protraho a puncto .d. super rectas .ab. et .ac. cathetos .dh. di.; et ex hoc monstrabitur, quadrilaterum .dhai. equilaterum et rectiangulum esse; quia tres anguli eius, qui sunt ad puncta .a.h.i., recti sunt; reliquus qui ad .hdi. rectus est, cum omne quadrilaterum habeat quatuor angulos equales quatuor rectis: et quia angulus .bac. diuisus est in duo equa a linea .ad., erit unusquisque angulorum .dab. et .dac. semirectus sunt enim et anguli .ahd. et .aid. recti; quare unusquisque angulorum .adh. et .adi. semirectus est. Quare trigona .hda. et .ida. equicruria sunt; sunt enim et orthogonia: quare linea .ad. subtendens angulos rectos trigonorum .ahd. et .aid. est duplum uniuscuiusque | laterum .ah. dh. id. ai.; ergo et ipsa quatuor latera sibi inuicem sunt equalia: tetragonum ergo est quadrilaterum .ahdi. ; et in puncto .a. figi filum cum quodam plumbino, quod pendeat extra arcum .bdc.; et diuidam utrumque latus .dh. et .di. in partes .12. uel .60. equales, et notabo ipsas partes omnes, ut in similibus instrumentis notate inueniuntur : et sic perfecta est forma quadrantis; et non est in ea linea .eg.: sunt enim .e. et .g. foramina: et si cum hoc instrumento altitudinem aliquam metiri uolueris; poneres oculum ad foramen .e., et stabis contra altitudinem me-


et .ad. subtendens ... uniuscuiusque a (fol. 132 verso, lin. ultima e margine inferiore; pag. 204, lin. 36).



fol. 132 verso.


tiendam; et leuabis quadrantem á parte *b.*, uel declinabis donec uisus tuus egrediatur per foramen *e.*, et transeat per foramen *g.*, et perueniat ad cacumen altitudinis metiendę; et tunc in ipsa linea cadet linea *eg.*, quam superius notauimus: et consideratur punctus ubi cadit predictum filum super lineas *hd. di.*; quia si ceciderit filum super punctum *d.*, tunc tanta erit altitudo metienda, quanta erit longitudo, que est inter te et pedem ipsius altitudinis; et tantum plus quantum est statura tua. Et si filum ceciderit inter puncta *di.* super lineam *di.*, ut dicamus in puncto *k.*, tunc erit proportio plani, quod est inter te et altitudinem, ad superhabundantiam, quam habet ipsa altitudo super staturam tuam, sicut *ki.* ad *ia.*, hoc est sicut *ki.* ad *di.*; et hec est proportio partis uel partium ad suum totum: et si filum ceciderit super lineam *dh.*, ut dicamus in puncto *l.*, erit tunc proportio plani ad dictum residuum altitudinis metiendę, sicut linea *ah.* ad lineam *hl.*, hoc est sicut linea *hd.* ad *hl.*; et hec proportio est totius ad aliquam sui partem uel partes. Et ut hec geometricè demonstrantur, cadat filum primum super punctum *d.*, quod sit linea *am.*; et *m.* sit plumbinum; et quia filum *am.* pendet á puncto *a.*, quod est in alto, erit illud filum equidistans altitudini metiende, quia stabit filum orthogonaliter super planum, super quod stat ipsa altitudo: et intelligam, ipsum filum transire in altum donec concurrat linee quam fecit uisus tuus ab *e.* transiens per *g.* ad summitatem altitudinis metiendę; et intelligam rursus ab *e.* puncto, scilicet ab oculo tuo, uenire lineam equidistantem plano, quod est inter altitudinem metiendam, que signabit in ipsa altitudine punctum habentem in sua altitudine á terra equale altitudini stature tuę, et ipsa linea cum residuo altitudinis metiendę: et cum linea, quam fecit oculus tuus transiens per *g.* ad summitatem eiusdem altitudinis, facit triangulum simile triangulo, quem facit filum cum duobus lateribus quadrati descripti in quadrante. Verbi gratia: sit altitudo metienda *fq.*, cuius summitas sit *q.* punctus ad quem perueniat uisus tuus per *g.* ab *e.*; et intelligam, lineam *en.* esse equalem stature tuę: et intelligam similiter *eo.* equidistantem lineę *nf.*, que est in plano; quare *of.* erit equalis stature tuę, que est *en.*; quare triangulus *eoq.* erit similis triangulo *dia.*, qui est in quadrante. Ad quod demonstrandum intelligam filum *ma.* ascendens donec concurrat cum linea *eq.*, et concurrat in puncto *k.*; et erit linea *eo.* equidistans lineę *ai.* Quare angulus qui sub *d.a.i.* angulo *dke.* est equalis: et quia altitudini *qf.* equidistat filum *adm.*, et in eis incidit recta *eq.*, erit angulus *dre.* equalis angulo *f.e.* Sed angulo *dre.* ostensus est equalis angulo *d.a.i.*; quare angulus *d.a.i.* equalis est angulo *o.q.e.* Est enim et angulus *e.o.q.* angulo *a.i.d.* equalis: est enim rectus uterque, quia linea *eo.* equidistat lineę *nf.*; et est angulus *qfn.* rectus; quare et angulus *eoq.* rectus est: et angulus *aid.* est rectus in quadrante: reliquus ergo qui sub *o.e.q.* reliquo qui sub *adi.* equalis est; quare trigonum *qoe.* trigono *aid.* similis est: est ergo ut *di.* ad *ia.*, ita *eo.* ad *oq.*: est enim *di.* equalis *ia.*; quare et *qo.* equalis est *oe.*, hoc est *fn.*; et *fn.* est planum, quod est inter te et radicem altitudinis *fq.*: cui si addatur altitudo *fo.*, hoc est *en.*, scilicet statura tua, erit altitudo *fq.* nota; et hoc uolumus demonstrare. Et si filum ceciderit super lineam *di.* in puncto *k.*, ostendetur etiam, trigonum *qoe.* simile esse trigono *aik.*: erit itaque angulus *kai.* equalis angulo *qoe.*; et anguli qui ad *o.*

* altitudini metiende . . . altitudinis *
(fol. 132 verso, lin. 26, 27-35 e margine inferiore; pag. 205, lin. 16-23).



fol. 133 recto.


* equalis: est enim . . . ex *di.* est *
(fol. 133 recto, lin. 13, 14-27; pag. 205, lin. 34 — pag. 206, lin. 4).



et .i. sunt recti; quare reliquus qui sub .aki. reliquo qui sub .o.e.q. equalis est. Vnde erit sicut .ki. ad .ia., hoc est ad .di., ita .eo. ad .oq. Que ergo pars est .ki. ex .ia. uel partes, eadem pars est .eo. ex .oq. uel partes. Si ergo .ik. ex .ai., hoc est ex .di. est medietas: et .e.o. ex .oq. est medietas: et si tertia, tertia: et si due tertie, due tertie: et de incept. Et ut melius in numeris intelligantur: Sit planum .nf., hoc est linea .e.o., 50. ulnarum; et .ik. sit .37. note ex .60. notis equalibus, que sunt in .di., hoc est in .ai. Quare erit sicut .37. ad .60., ita .eo., scilicet .50. ad .oq. Quare multiplicanda sunt .50. per .60., et summa diuidenda est per .37., et uenient inde ulne $\frac{2}{37}$ 81. pro altitudine .oq.; cui si addatur equale stature tue, que est .of., erit altitudo .fq. nota, ut dictum est. |

fol. 133 verso.

Rursus cadat filum super latus .hd. super punctum .l., quod sit linea .a.l.m.; et




... a.l.m.; etqoe. trigono s (fol. 133 verso, lin. 2-14 e 15; pag. 206, lin. 11-21).

producat filum .ma. in puncto .r.; et erit angulus .m.r.e. equalis angulo .o.q.e.; nec non et angulus .m.a.i. erit equalis angulo .o.q.e.; et quia tetragonum est .ahdi., opposita latera .ai. et .hd. equidistantia sunt: et quia in equidistantibus .ai. et .hd. recta incidit .al., erit angulus .lai. angulo .alh. et angulo .oqe. equalis. Item enim permutatim, ut in primo libro Euclidis ostenditur, erit ergo et angulus .alh. angulo .oqe. equalis. Sunt enim et anguli .qoe. et .ahl. recti; reliquus qui sub .oeg. reliquo qui sub .hal. remanet equalis. Similie est ergo trigonum .qoe. trigono .ahl., quod est in quadrante. Similia uero trigona circa [equales] angulos latera habent proportionalia. Quare est sicut .ah. ad .hl., ita .e.o. ad .o.q.: quam multiplex ergo est .ah. ex .hl., tam multiplex est .e.o., hoc est planum .nf. ex .oq. Que ut melius uideantur, esto .hl. partes .39. ex partibus

.hd., que sunt .60.; et .nf. sit cubitorum .105.: proportionaliter ergo erit sicut .60. ad .39.; que proportio in minimis numeris est sicut .20. ad .13., ita .105. ad altitudinem .oq. Quare multiplicanda sunt .13. per quintam de .105., scilicet per .21., et summa diuidenda est per quintam de .20., scilicet per .4., uenient cubita $\frac{1}{4}$ 68. pro altitudine .oq. |

... pro altitudine .oq. s (fol. 133 verso, lin. 24 25 e margine inferiore; pag. 206, lin. 30 e 31).




Incipit distinctio octaua de quibusdam subtilitatibus geometricis.

fol. 134 recto.


Circvli, cuius dyameter sit .10., uolo latus penthagonicum inuenire. Adiaceat circulus .*abgde.*, et in ipso sit penthagonum equilaterum et equiangulum .*abgde.*; et protrahatur in ipso corda anguli penthagonici .*ag.*, nec non et dyameter .*bf.* secans cordam .*ag.* in duo equa ad punctum .*c.* Quare angulus .*bca.* est rectus: et proponam dyametrum .*fb.* 10., et latus penthagonicum .*ab.* rem; et protraham lineam .*af.*; et erit triangulus .*baf.* orthogonium, cum sit in semicirculo .*baf.*; et est ab angulo recto in basim cathetus ducta .*ac.* Quare multiplicatio .*fb.* in .*cb.* est sicut .*ba.* in se: multiplicemus ergo .*ba.* in se, scilicet rem, ueniet census; quem diuidamus per .*fb.*, scilicet per .10., ueniet pro .*cb.* $\frac{1}{10}$ census: auferamus ergo quadratum $\frac{1}{10}$ census ex quadrato lateris .*ba.*, scilicet ex censu quadratum ex .*cb.*, remanebit pro quadrato lineę .*ac.* census, diminuta $\frac{1}{100}$ census census: et quia .*ag.* dupla est ex .*ac.*, erit quadratum ex .*ag.* quadruplum quadrati ex .*ac.* Quare quadruplicemus quadratum lineę .*ac.*, et habebimus .4. census minus $\frac{1}{25}$ census census pro quadrato cordę .*ag.*: et quia in circulo .*abgd.* protractum est quadrilaterum .*agde.*, erit multiplicatio .*de.* in .*ga.* cum multiplicatione .*gd.* in .*ea.*, sicut multiplicatio unius dyametrorum ipsius quadrilateri in alium; et est unus illorum dyametrorum .*ge.*, et alter .*da.*; et est unusquisque eorum equalis lineę .*ag.*, cum unusquisque eorum sit corda anguli penthagonici: ergo multiplicatio .*de.* in .*ag.* cum .*gd.* in .*ae.* est sicut .*ag.* in se. Sed ex .*ag.* in se proueniunt .4. census minus $\frac{1}{25}$ census census; ergo ex .*de.* in .*ga.*, et ex .*gd.* in .*ea.* proueniunt .4. census minus $\frac{1}{25}$ census census: de quibus si tolamus censum, qui prouenit ex .*gd.* in .*ae.*, scilicet ex re in rem, remanebunt .3. census minus $\frac{1}{25}$ census census pro multiplicatione .*de.* in .*ag.* Quare si diuiderimus .3. census minus $\frac{1}{25}$ census census per rem, scilicet per .*de.*, exhibunt .3. res minus $\frac{1}{25}$ cubi pro quantitate cordę .*ga.*: multiplicemus ergo .3. res minus $\frac{1}{25}$ cubi in se, uenient .9. census et $\frac{1}{25}$ cubum cubi minus $\frac{6}{25}$ census census, que equantur .4. censibus minus $\frac{1}{25}$ census census. Addamus ergo utrique parti $\frac{6}{25}$ census census, et tolamus ab utraque parte .4. census, remanebunt .5. census et $\frac{1}{625}$ cubi cubi equales 5° census census: diuidamus nunc hec omnia | per censum, et uenient .5. dragme, et $\frac{1}{625}$ census census equales 5° census census: reducamus itaque hec omnia ad censum census; et est ut multiplicemus ea per 625, et erunt census census, et 3125 dragme equales .125. censibus: multiplica ergo medietatem censuum, que est $\frac{1}{2}$ 62, in se, uenient $\frac{1}{4}$ 3906; de quibus abice .3125., remanebunt $\frac{1}{4}$ 781; quorum radicem abice de $\frac{1}{2}$ 62., remanebunt $\frac{1}{2}$ 62. minus radice de $\frac{1}{4}$ 781. pro quantitate census, radix quorum est res, scilicet latus penthagonicum. Aliter á dyametro .*bf.* accipiamus centrum .*h.*, et addamus super semidyametrum .*bh.* quartam eius, que sit .*hi.*, et erit tota .*bi.* $\frac{1}{4}$ 6.; et sicut in tertio decimo EVCLIDIS demonstratum est, erit sicut .*bi.* ad .*ic.*, ita .*ic.* ad .*ih.* Quare est sicut prima .*bi.* ad tertiam .*ih.*, ita quadratum lineę .*bi.* ad quadratum lineę .*ci.*: est enim .*bi.* quincuplum ex .*ih.* Quare quadratum ex .*bi.*, quod est $\frac{1}{16}$ 39, est quincuplum quadrati .*ci.* Ergo .*ci.* est radix de $\frac{13}{76}$ 7.; qua ablata ex .*bi.* remanent $\frac{1}{4}$ 6. minus radice de $\frac{13}{76}$ 7. pro quantitate lineę .*bc.*: et quia est sicut .*fb.* ad .*ba.*, ita .*ba.* ad .*bc.*; erit multiplicatio .*ba.* in se sicut multiplicatio .*fb.* in .*bc.*: est enim .*fb.* 10.; que si duxerimus in .*bc.*, scilicet in $\frac{1}{4}$ 6. minus radice de $\frac{13}{76}$ 7.,

ac. Quare ... census pro s (fol. 134 recto, lin. 10-18; pag. 207, lin. 8-14).




fol. 134 verso.

reducamus itaque ... tertio decimo (fol. 134 verso, lin. 2-9; pag. 207, lin. 30-37).




* hoc est de $\frac{1}{4}$ 784. * (fol. 124 verso, lin. ultima e margine inferiore; pag. 208, lin. 16 e 17).



fol. 135 recto.

* Aliter inueniam quaedam linearum * (fol. 135 recto, lin. 10-19; pag. 208, lin. 26-35).



uenient pro quadrato lineę .ba. $\frac{1}{2}$ 62. minus radice de $\frac{1}{4}$ 784., quorum radix est latus pentagonicum .ab., et est radix residui, quod est á radice $\frac{1}{4}$ 784. usque in $\frac{1}{2}$ 62.; quorum residuum est parum plus de $\frac{1}{2}$ 34., cuius residui, secundum propinquitatem, radix est .6. minus $\frac{1}{8}$; et hec est quantitas .ab. secundum propinquitatem.

Et si uis habere notitiam lateris decagoni cadentis in circulo, cuius dyiameter sit .10. Et diuidatur arcus semicirculj .abcf. in quinque portiones equales, que sint .ab. .bc. .cd. .de. .ef.; et protrahantur in eis recte .ab. .bc. .cd. .de. .ef., et erit unaqueque ipsarum latus decagoni; et copulentur recte .ac. et .df., et erit unaqueque ipsarum latus pentagoni; et producantur recte .ad. et .cf.: et quoniam equalis est arcus .ac. arcus .fd., comuniter adiaceat arcus .cd., erit tunc arcus .acd. equalis arcui .cdf.: quare recta .ad. equalis est recte .cf.: in circulo quidem .abg. constitutum est quadrilaterum .cafd., et in ipso protrecti (sic) sunt duo dyametri ipsius quadrilateri .cf. et .ad. Quare multiplicatio .af. in .cd. cum .ac. in .fd. est sicut .cf. in .ad.: sed .cf. in .ad. est sicut .cf. in se: his itaque intellectis, propone rectam .cd., que est latus decagoni rem, et multiplica eam in .af., scilicet in .10., uenient .10. res; quibus adde id quod prouenit ex .ca. in .df., hoc est ex .ca. in se; quod inuenimus superius esse $\frac{1}{2}$ 62. minus radice de $\frac{1}{4}$ 784., | erunt .10. res et dragme $\frac{1}{2}$ 62. minus radice $\frac{1}{4}$ 784., que equantur quadrato lineę .cf.; cui superadde quadratum lateris .ca., quod est $\frac{1}{2}$ 62. minus radice $\frac{1}{4}$ 784., erunt .10. res et 125 dragme minus .2. radicibus de $\frac{1}{4}$ 784., que sunt una radix de 3125., que equantur .100. dragmis, scilicet quadrato dyametri .af., cum angulus .fca. sit rectus: est enim angulus .fca. in semicirculo .abf.: adde ergo utrique parti radicem de 3125., et tolle ab utraque parte .125., remanebunt .10. res equales radici .3125. minus .25. dragmis. Quare radicem .3125. minus 25. diuide per .10., et uenient radix $\frac{1}{4}$ 31. minus dragmis $\frac{1}{2}$ 2. pro quantitate rei, scilicet pro latere .cd. decagonico.


Aliter inueniam latus decagoni: et pentagoni per dyiameterum notum. Sit rursus dyiameter circulj .abg. 10.; et accipiatur centrum eius, quod sit .i. et ad rectos angulos trahatur recta .ig. et diuidetur .if. in duo equa ad punctum .h. et protrahatur recta .gh., cui iaceat equalis recta .hl.; et copuletur recta .gl. Dico .il. esse latus decagoni, et .gl. latus pentagoni cadentium in circulo .abfg. Quod sic probatur: Quoniam recta .fi. diuisa est in duo equa in puncto .h., et .ei. addita est recta .il., erit multiplicatio .il. in .fl. cum quadrato lineę .ih., sicut .hl. in se. Sed recte .hl. equalis est recta .gh.; ergo .li. in .fl. cum .hi. in se est sicut .hg. in se. Sed .hg. in se est sicut .gi. in se et .ih. in se; ergo .il. in .fl. cum quadrato lineę .hi. est sicut quadrata linearum .gi. et .ih.: comuniter auferatur quadratum lineę .ih., remanebit .il. in .fl. sicut quadratum lineę .gi. Sed recte .gi. equalis est recta .fi.; ergo superficies .il. in .fl. est sicut .fi. in se. Quare proportionaliter est ut .lf. ad .fi., ita .fi. ad .il.: linea ergo .fl. diuisa est media et extrema proportione; et est maior pars, scilicet .fi. latus scilicet exagonicum. Quare minor pars .il. erit latus decagonicum, ut in EVCLIDE habetur: et quia latus pentagonicum potest super latus exagoni et decagoni; et est .gi. latus exagonicum., et .il. latus decagonicum, erit quippe recta .gl. latus pentagonicum. Et ut hec operentur in numeris, sit dyiameter .af. 10.; quare .gi. erit .5 et .ih. erit $\frac{1}{2}$ 2.; et ducamus .gi. in se, et .ih. in se,

uenient $\frac{1}{4} 25.$ et $\frac{1}{4} 6.$; quibus insimul iunctis, erunt $\frac{1}{4} 31.$ pro quadrato lineę $gh.$, hoc est pro quadrato lineę $hl.$ Quare recta $hl.$ est radix de $\frac{1}{4} 31.$: de qua si auferatur linea $hi.$, que est $\frac{1}{2} 2.$, remanebit pro linea $il.$, scilicet pro latere decagoni, radix $\frac{1}{4} 31.$ minus $\frac{1}{2} 2.$, ut superius inuenimus. Et si multiplicauerimus $il.$ in se, et $gi.$ in se, uenient $\frac{1}{2} 62.$ minus radice $\frac{1}{4} 781.$ pro linea $gl.$, scilicet pro latere pentagoni, ut supra diximus.


Et quando uolueris scire latus pentagoni circundantis circulum scitum, fac | circulum scitum $thm.$, et pone dyametrum eius $.10.$; circundet ipsum circulum pentagonus $.abcdf.$; et á centro $.e.$ copulentur recte $.ea. et .eb. eh.$; et protrahatur corda $.th.$, que est corda pentagoni cadentis in ipso circulo; et est secta in duo equa á linea $.eb.$; et anguli qui ad $.l.$ sunt recti; et est quadratum totius cordę $.th.$ $\frac{1}{2} 62.$ minus radice $\frac{1}{4} 781.$ Quare quadratum medietatis cordę $.th.$, scilicet ex $.tl.$, est quarta pars, que est $\frac{5}{8} 15$ minus radice $\frac{5}{8} 48.$; quod quadratum si auferatur ex quadrato semidyametri $.et.$, quod est $25.$, remanebunt $\frac{3}{8} 9.$, et radix $\frac{5}{8} 48.$ pro quadrato lineę $.el.$: et quia triangulus $.eta.$ similis est triangulo $.etl.$, cum ambo sint recti anguli; et cum anguli $.aet.$ et $.tel.$ sint equales, erit proportio $.at.$ ad $.te.$ sicut proportio $.tl.$ ad $.le.$ Est enim $.ab.$ duplum ex $.at.$, et $.th.$ ex $.tl.$ Quare est sicut $.ab.$ prima ad $.te.$ secundam; ita $.th.$ tertia ad $.le.$ quartam. Quare multiplicatio $.ab.$ in $.el.$ est sicut multiplicatio $.te.$ in $.th.$ Pone igitur latus $.ab.$ rem, et duc quadratum eius, quod est census, in quadratum ex $.el.$, scilicet in $\frac{3}{8} 9.$, et in radicem $\frac{5}{8} 48.$, uenient census $\frac{3}{8} 9.$, et radix census $\frac{5}{8} 48.$, que equantur ei quod prouenit ex quadrato semidyametri $.te.$, quod est $25.$, in quadratum cordę $.th.$, quod est $\frac{1}{2} 62.$ minus radice $\frac{1}{4} 781.$; ex qua multiplicatione proueniunt $\frac{1}{2} 1562$ minus radice $\frac{1}{4} 488281.$: reduc totum quod habes ad censum, quod est ac ducas totum quod habes in $\frac{6}{25}$ dragme, diminuta radice $\frac{4}{125}$ dragme: et ex ductis $\frac{6}{25}$ et minus radice $\frac{4}{125}$ in census $\frac{3}{8} 9.$, et in radicem censuum $\frac{5}{8} 48.$, uenient census: de inde duc $\frac{1}{2} 1562.$, diminuta radice $\frac{1}{4} 488281.$ in $\frac{6}{25}$, et in radicem $\frac{4}{125}$ dragme proueniunt 375 dragme, et radix $.15625.$ dragmarum, et minus $\mathcal{R} 78125$ dragme, et diminuta radice 28125 dragme; et hec omnia facio $500.$ minus radice $.200000.$; ergo census equatur $.500.$ minus radice $200000.$, quorum radix est linea $.ab.$, que est unum ex lateribus pentagoni circundantis circulum, cuius dyameter est $.10.$ Aliter prontius: quia in orthogonio trigono $.etb.$ ab angulo recto producta est cathetus $.tl.$, erit proportio quadrati $.be.$ ad quadratum $.et.$ sicut quadratum $.et.$ ad quadratum $.el.$ Quare multiplicatio quadrati $.be.$ in quadratum $.el.$ est sicut multiplicatio quadrati $.et.$ in se, quod est $.625.$ Quare ponam $.be.$ rem, et ducam eam in se, exhibit census; quem ducam in quadratum $.el.$, quod est $\frac{3}{8} 9.$, et radix $\frac{5}{8} 48.$, uenient census $\frac{3}{8} 9.$, et radix $\frac{5}{8} 48$ censuum census, que equantur $625.$ dragme. Reduc hec ad censum, hoc est 625 per $\frac{6}{25}$ dragme, diminuta radice $\frac{4}{125}$, uenient $.150.$ minus radice $.12500.$, que equantur | censui, hoc est quadrato $.be.$: de quo si auferatur quadratum $.et.$, quod est $.25.$, remanebunt pro quadrato $.tb.$ $125.$ minus radice $12500.$; quorum quadruplum, quod est $.500.$, minus radice $200000.$, est quadratum totius $ab.$, ut superius inuenctum est. Et si uis inuenire mensuram lateris decagoni circundantis circulum, cuius dyameter sit $.10.$, super circulum $.def.$, cuius dyameter sit $.10.$, describatur duo latera decagoni circundantis ipsum $.ab.$ et $.bg.$, et contingentia circu-

fol. 135 verso.

« circulum scitum . . . ipso circulo »
(fol. 135 verso, lin. 1-3 e margine superiore; pag. 209, lin. 7-10).




« $\frac{5}{8} 48.$; quod . . . Quare est sicut »
(fol. 135 verso, lin. 7-11; pag. 209, lin. 13-17).



fol. 136 recto.

centrum circuli $hd. \frac{5}{8} 15.$ »
 (fol. 136 recto, lin. 9-15; pag. 210,
 lin. 2-8).



lum *def.* in punctis *d.e.*; et copulentur recte *de.* et *ha.* et *hb.* et *et. hd.* et *ha.*; et sit *h.* centrum circuli; et erit per ea que dicta sunt in superiori figura, sicut *ab.* ad *dh.*, ita *de.* ad *hl.* Vnde multiplicatio quadrati, et quadratum *ab.* in *hl.* est sicut multiplicatio quadrati; et quadratum *de.* in *dh.* etiam est corda *de.* latus decagoni cadentis in circulo *def.*, cuius mensuram inuenimus esse radicem $\frac{1}{4} 31.$ minus $\frac{1}{2} 2$: quare medietas eius est radix $\frac{1}{16} 7.$ minus $\frac{1}{4} 1.$, cuius quadratum est $\frac{2}{8} 9$ minus radice $\frac{5}{8} 48.$: que si auferantur ex quadrato *dh.*, quod est 25., remanebunt pro quadrato *hl.* $\frac{5}{8} 15.$, et radix $\frac{5}{8} 48.$: quod quadratum si multiplicaueris in quadratum *ab.*, quod sit census, uenient census $\frac{5}{8} 15.$, et radix census census $\frac{5}{8} 48.$, que equantur multiplicationi quadrati *dh.*, quod est 25., in quadratum *dl.*, quod est $\frac{2}{8} 9$ minus radice $\frac{5}{8} 48.$; que multiplicatio est $\frac{1}{2} 937.$ minus radice $\frac{1}{4} 48928.$: reduc igitur hec omnia ad census, quod est ut multiplices ea per $\frac{2}{25}$ minus radice $\frac{4}{3125}$: ex ductu quidem $\frac{2}{25}$ minus radice $\frac{4}{3125}$ in census $\frac{5}{8} 15.$, et in radicem census census $\frac{5}{8} 48.$, ueniet census: et duc $\frac{1}{2} 937$ minus radice $\frac{1}{4} 48928.$ in $\frac{2}{25}$ minus radice $\frac{4}{3125}$, et erit census equalis .75., et radici .625. dragmarum minus radice .3125. dragme, et minus radice .1125. dragme; quod totum est .100. minus radice .8000., quorum radix est latus *ab.*, quod est unum ex lateribus decagoni circundantis circulum, cuius dyameter est .10.


Aliter fac *hb.* rem, et duc eam in se, et ueniet census; quem multiplica per quadratum *hl.*, quod est $\frac{5}{8} 15.$, et radix $\frac{5}{8} 48.$, uenient census $\frac{5}{8} 15.$, et radix census census $\frac{5}{8} 48.$, que equantur quadrato *dh.* ducto in se, scilicet .625. dragmis: multiplica igitur hec omnia per $\frac{2}{25}$ minus radice $\frac{4}{3125}$, erit census equalis .50. minus radice .500. dragme; et hoc est quadratum lineę *hb.*: de quo si auferatur quadratum *hd.*, quod est .25., remanebunt pro quadrato lineę *db.* 25. minus radice .500.; quorum quadruplum, quod est 100., minus radice .8000., est quadratum lineę *ab.*, ut superius inuenimus.

Et postquam demonstratum est per notitiam dyametri inuenire latera pentagoni | et decagoni cadentia infra circulum et extra. Restat ut per eadem latera, cum fuerint nota, doceatur inuenire longitudinem dyametri: ut si dicamus: corda quintę circuli est .10., quanta est longitudo dyametri. Pone pentagonum *abgde.* habens unoquoque laterum .10. ex numeris; et circunda ipsum á circulo, cuius dyameter sit linea *dc.*; et copulentur recte *ge.* et *eb.* et *bd.*; et erit quadrilaterum *ebgd.* in circulo *abgd.* Quare multiplicatio *eb.* in *dg.* cum *gb.* in *de.* est sicut multiplicatio *eg.* in *db.*, hoc est sicut *eg.* in se. Quare pone rectam *eb.* rem, et duc eam in *dg.*, uenient .10. res; quibus adde multiplicationem *bg.* in *de.*, que est .100., erunt .100. et 10. res equales multiplicationi *eg.* in se; et est *eg.* res, cum sit equalis *eb.*; ergo .100. et 10. res equantur censui; quare res est radix 125 et 5. dragme; et hec est longitudo lineę *ge.*, quorum medietas erit *gl.*; et hec est radix de $\frac{1}{4} 31.$, et dragme $\frac{1}{2} 2.$: multiplica ea in se, erunt $\frac{1}{2} 37.$, et radix de $\frac{1}{4} 781.$; que extrahe ex ducto *gd.* in se, scilicet ex .100., remanebunt $\frac{1}{2} 62.$ minus radice de $\frac{1}{4} 781.$ pro quadrato lineę *dl.* Vnde si multiplicauerimus *cd.* in *dl.*, erit sicut multiplicatio *de.* in se, cum in triangulo *ced.* ab angulo recto in basim cathetus ducta sit *el.* Vnde si posuerimus dyametrum *cd.* rem, et multiplicauerimus quadratum eius, quod est census, in quadratum lineę *dl.*, uenient census $\frac{1}{2} 62.$ minus radice census census $\frac{1}{4} 781.$, que equantur quadrato multiplicationis *de.* in se, scilicet .10000. dragmis: ad quam etiam equationem possumus

fol. 136 verso.

et in tertia distinctione huius probatur
 ubi alligatur octauo theuomate (sic)
 sexti euclidis.

« multiplicationem *bg.* . . . in quadra-
 tum » (fol. 136 verso, lin. 8, 9-18;
 pag. 210, lin. 33-41).




aliter peruenire. Videlicet cum circulo, cuius dyiameter est .10., latus penthagoni cadentis in ipso sit radix $\frac{1}{2}$ 62. minus radice $\frac{1}{4}$ 781.; et nolo latus penthagoni esse .10.; et ex hoc queratur notitia dyametri; erit proportio $\frac{1}{2}$ 62. minus radice $\frac{1}{4}$ 781. ad quadratum sui dyametri, scilicet ad .100., sicut proportio quadrati lateris dati penthagoni, quod est .100., ad quadratum sui dyametri ignoti. Quare si posuerimus ipsum dyametrum ignotum rem, et multiplicauerimus quadratum eius, quod est census, per $\frac{1}{2}$ 62. minus radice $\frac{1}{4}$ 781., uenient similiter census $\frac{1}{2}$ 62. minus radice censuum census $\frac{1}{4}$ 781., que equantur multiplicationi de .100. in .100., hoc est .10000. dragmis, ut superius inuenimus. Vnde si hec ad unum censum reduceris, quod est ut multiplices omnia que habes per $\frac{1}{50}$, et per radicem $\frac{1}{5125}$ unius dragme, uenient .200., et radix .8000. pro quadrato dyametri .cd. Quare radix eorum, que est circa .17., erit dyiameter .dc. quesitus.


Aliter quia corda anguli penthagonici, et corda ^{quinto} quesite (sic) circuli possunt quincuplum lateris exagoni, scilicet medietatis dyametri, ut in quarto decimo EVCLIDIS habetur; multiplica .eg. in se, que est radix 125. et 5. dragme, uenient .150. et radix .12500.; quibus adde quadratum lateris .gd., quod est .100., erunt .250. et radix .12500., que sunt quincuplum quadrati semidyametri; quare accipe quintam partem eorum, uenient .50. et radix .500. pro quadrato medietatis dyametri; quadruplum uero eorum, scilicet .200. et radix .8000. erit quadratum dyametri, ut superius inuenctum est. Item si uis inuenire dyametrum circuli, cuius $\frac{e}{10}$ corda sit .10. ex numeris; quia erit proportio ipsius corde ad dyametrum circuli ipsius, sicut proportio alicuius similis corde ad suum dyametrum; et est corda decagoni radix $\frac{1}{4}$ 31. minus $\frac{1}{2}$ 2. circuli, cuius dyiameter est .10.; si pones pro ipso ignoto dyametro rem, et multiplica eam in radicem $\frac{1}{4}$ 31., minus $\frac{1}{2}$ 2., ueniet radix census $\frac{1}{4}$ 31. minus rebus $\frac{1}{2}$ 2., que equantur .100., que proueniunt ex multiplicatione notę corde, que est .10., in dyametrum notum: adde utrique parti res $\frac{1}{2}$ 2., erunt .100. et res $\frac{1}{2}$ 2. equales radici censuum $\frac{1}{4}$ 31.: multiplica hec omnia in se, et erunt census $\frac{1}{4}$ 31. equales censibus $\frac{1}{4}$ 6. et 10000. dragmis, diminutis inde 500 radicibus: tolle ab utraque parte census $\frac{1}{4}$ 6., et adde utrique parti .500. res, erunt census .25., et 500 res equales .10000. dragmis. Redige ergo hec omnia ad censum, quod est ut diuides omnia que habes per .25., et ueniet census, et 20. res equales .400. dragmis: age in his secundum algebram, et erit res radix .500. dragmarum, et 10 ex numeris; et hec est longitudo dyametri quesiti. Aliter adiaceat factus circulus .abc defg.; et in medietate ipsius protrahantur .5. corde equales, que sint recte .ab. bc. cd. de. ef.; et erit unaqueque ipsarum corda $\frac{1}{10}$ circuli .acg.; et dyiameter circuli sit .af.; et a terminis ipsius producantur recte .ac. et .fd., quarum unaqueque est latus penthagoni cadentis in ipso circulo, cum unaqueque ipsarum subtendat angulum decagonicum: et protrahantur etiam recte .ad. et .cf.; et sit unaqueque corda decagoni .10. ex numeris; et ponam dyametrum .af. duas res; et multiplicabo eas in corda .cd., que est .10., et uenient .20. res; et multiplicabo lineam .ac. in lineam .fd., hoc est latus penthagonicum in se, uenient census, et 100 dragme: et hoc dico quia latus penthagonicum potest super latus exagonicum et decagonicum: et hic est latus exagonicum res: et eius potentia census: et latus decagonicum est .10., et eius potentia .100.: et adde censum et .100. cum .20. rebus, erunt census et 100. et 20 res, que proueniunt ex .af. in .cd., et ex .ac. in .fd.; et hec equantur multiplicationi .ad.

fol. 137 recto.

a minus $\frac{1}{2}$ 2. ... numeris; et hec e (fol. 137 recto, lin. 9, 10-20; pag. 211, lin. 23-31).




a census: et latus ... cf.; cui e (fol. 137 recto, lin. 32-35 e margine inferiore; pag. 211, lin. 41 — pag. 212, lin. 1).




fol. 137 verso.

• *gh.*; et ponam multiplicemus in se » (fol. 137 verso, lin. 9-20; pag. 212, lin. 8-17).



.i. idest linee *ih.* fol. 138 recto.

• $\frac{1}{2}$ dyametri dyametri circuli » (fol. 138 recto, lin. 13-21; pag. 212, lin. 42 — pag. 213, lin. 6).




in *cf.*, hoc est quadrato lineę *cf.*; cui | quadrato si addatur quadratum lineę *ac.*, quod est census et .100., habebuntur siquidem .2. census, et .20. res, et .200. dragme; que equantur .4. censibus, scilicet quadrato dyametri : abice ergo ab utraque parte .2. census, et reliquum dimidia, ueniet census equalis .10. rebus, et .100. dragmis: age in his secundum algebram, et erit res, scilicet medietas dyametri *af.*, radix .125., et .5. dragme, quorum duplum, scilicet radix .500., et .10. dragme, erit longitudo dyametri quesiti, ut superius inuenimus. Aliter in eodem circulo á centro *h.* super dyametrum *af.* super rectos angulos protraham lineam *gh.*; et ponam *hi.* medietatem ex *fh.*, et copulabo *gi.*; et ponam *ik.* equalem *gi.*, et copulabo *gk.*, et erit *gk.* latus pentagonicum in circulo *a.c.f.*, secundum quod superius demonstratum est; et *hk.* erit latus decagoni, et *gh.* erit latus exagonicum: et ponam *gh.* rem. Quare *ih.* erit medietas rei: et ducam *gh.* in se, et ueniet census; et *ih.* in se, et ueniet quarta census; et sic pro quadrato lineę *gi.*, hoc est pro quadrato lineę *ik.*, habetur census $\frac{1}{4}$ 1; ergo *ik.* est radix unius census et $\frac{1}{4}$; ex qua si auferatur *ih.*, remanebit *hk.* radix census $\frac{1}{4}$ 1 minus $\frac{1}{2}$ radix, hec est *hi.*, que equantur .10. dragmis, cum latus decagonicum ponatur esse .10. Vnde si addatur $\frac{1}{2}$ rei utrique parti, erit radix census $\frac{1}{4}$ 1 equalis .10., et medietati rei: que omnia si multiplicemus in se, erit census $\frac{1}{4}$ 1. equalis .10. rebus et .100. dragmis, et $\frac{1}{4}$ census. Vnde si ab utraque parte tollatur $\frac{1}{4}$ census, remanebit census equalis .100. et .10. rebus; et sic res, que est medietas dyametri circuli *adg.*, erit .5., et radix de .125. dragmis; quorum duplum, scilicet .10. et radix .500. dragmarum, est longitudo dyametri *af.*: et ex hoc modo inuenitur quod omnis dyameter cuiuscumque circuli addit super latus decagonicum cadentis in ipso radicem quincupli quadrati lateris decagonici: ut si latus decagonicum fuerit .6., erit dyameter circuli similiter .6., et radix quincupli quadrati senarij, que radix est de .180.; et ita intelligas in omnibus similibus euenire. Possumus etiam per hanc figuram per latus pentagoni dyametrum circuli inuenire. Verbi gratia : quod eiusdem circuli *agd.* est latus pentagoni cadentis in ipso recta *gk.*, quam ponamus esse .10.; et quadratum eius, quod est .100., equatur duobus quadratis linearum *gh.* et *hk.*; et est *gh.* semidyameter; et latus *hk.* est corda $\frac{e}{10}$ circuli. Ponamus lineam *gh.* rem, et ducamus eam in se, et ueniet census : et ducamus *hk.* in se, que | est radix census $\frac{1}{4}$ 1. minus $\frac{1}{2}$ rei, ueniet census $\frac{1}{2}$ 1. minus radice censuum census $\frac{1}{4}$ 1. ; que addē cum censu, scilicet cum quadrato lineę *gh.*, uenient census $\frac{1}{2}$ 2 minus radice census census $\frac{1}{4}$ 1., que equantur .100. dragmis. Reduc hec omnia ad censum, quod est ut multiplices omnia que habes per $\frac{1}{2}$, et per radicem $\frac{1}{20}$ dragme, uenient .50., et radix .500. dragmarum equales censui, hoc est quadrato medietatis dyametri; quorum quadruplum, scilicet .200., et radix .8000. erit longitudo dyametri. Et nota quia cum in quolibet circulo latus pentagonicum fuerit notum, si quadratum ipsius lateris multiplicabitur per $\frac{1}{2}$, et per radicem $\frac{1}{20}$ unius dragme; et illud quod prouenerit est quadratum medietatis dyametri.

Et si uis habere notitiam dyametri circuli circundati á pentagono equilatero et equiangulo *abgde.*, cuius quodlibet latus est .10. ex numero, et centrum circuli *m.*, et medietas dyametri circuli continentis pentagonum linea *am.*, quod est $\frac{1}{2}$ dyametri eius .50., et radix .500., prohice ex eo quadratum *ac.*, quod est .25., re-

manebunt pro quadrato .cm. 25., et radix 500.; quorum quadruplum, quod est .100., et radix .8000. est quadratum dyametri circuli contenti á penthagono .abcde. Et si uolueris ex quadrato dyametri continentis penthagonum, quod est .20., et radix 8000. penthagoni, remanebunt similiter .100., et radix .8000. pro quadrato quesiti dyametri. Quia quadratum omnis dyametri circuli continentis figuram equilateram et equiangulam equatur quadrato lateris ipsius figure; et quadrato dyametri circuli contenti ab ipsa figura. Et ad hoc demonstrandum adiaceat circulus .abc.; et in ipso scribatur triangulus .abc. equilaterus et equiangularis; et á centro .d. protrahantur recte .da. .db. .dc.; et diuidantur latera trianguli in duo equa in punctis .e. .f. .g.; et producantur á centro recte .de. .df. .dg.; et erit unaqueque ipsarum cathetus super latera trianguli .abc., et equabuntur sibi inuicem; nec non et recte .da. .db. .dc. sibi inuicem sunt equales; et est unaqueque ipsarum semidyameter circuli .abc.: et quia recte .de. .df. .dg. sibi inuicem sunt equales, est unaqueque ipsarum semidyameter circuli circundati á triangulo .abc.: et quia quadrata linearum .de. et .eb. equantur quadrato lineę .db., quadruplum quadratorum .de. et .eb. equatur quadruplo quadrati .db. Sed quadruplum quadrati .de. est quadratum dupli .de., hoc dyametri circundati á triangulo .abc.; nec non et quadruplum quadrati lineę .eb. est quadratum lineę .ab.; et quadruplum quadrati semidyametri .db. est quadratum dyametri circuli .abc. continentis triangulum .abc.; ergo quadratum dyametri circuli circundati á figura triangula et equilatera cum quadrato lateris trianguli circundantis ipsum circulum equatur quadrato dyametri circuli circundantis ipsum triangulum. Et ita esse ostendetur ex qualibet figura multilatera et equilatera et equiangulara circundante circulum, et circundata á circulo; et hoc est quod uolui demonstrare. Rursus si habere uis notitiam dyametri circuli circundati á decagono equilatero et equiangularo, cum dyameter circuli circundantis ipsum decagonum sit radix .500. et 10.; si multiplicauerimus ipsum in se, et ex ipsa multiplicatione extraxerimus quadratum lateris decagoni, quod est .100., remanebunt .500., et radix .20000. pro quadrato dyametri quesiti. Et si dicemus tibi: trianguli equilateri cum sua perpendiculari est .10. ex numeris; et queratur quanta sit perpendicularis, faciamus triangulum .abg., cuius perpendicularis .ad. cum triangulo .abg. sit .10.; et uis scire quanta est .ad., pone ipsam rem, et erit .db. radix $\frac{4}{3}$ census; et unaqueque linearum .ab. .bg. .ag. erit radix census $\frac{1}{3}$ 1. Vnde si multiplicauerimus .ad. in .db., scilicet in radicem $\frac{4}{3}$ census, ueniet pro triangulo .abg. radix $\frac{4}{3}$ census census; cui si addatur perpendicularis .ad., erit res et Radix $\frac{4}{3}$ census census equalis .10. dragmis: restaura radicem $\frac{4}{3}$ census census, ut sit radix census census, quod est ut multiplices illud in radicem .3.: ergo multiplica totum quod habes in radicem .3., et ueniet radix census census, que est census, et radix .3. censuum, et quales (sic) radici .300.: dimidia igitur radicem .3. censuum, et exibat radix $\frac{3}{4}$; quam duc in se, et proueniunt $\frac{9}{16}$; quos adde ad radicem .300., erunt $\frac{3}{4}$, et radix .300.; quorum accipe radicem, et prohice $\frac{3}{4}$, et residuum est linea .ad., que est perpendicularis trianguli .abg.; et hoc est quod uolumus exponere.


In quadrato quidem equilatero et equiangularo .abgd., cuius unumquodque latus est .10., protractum est penthagonum .acefh. equilaterum. Volo scire longitudinem uniuscuiusque lateris penthagoni. Ponam pro uno quoque ipsorum rem, remanebit una-

et á centro .d.db.. quadruplum (fol. 138 recto, lin. 24-30, 31; pag. 213, lin. 8-15).




fol. 138 verso.


circundati á figura et equiangularo (fol. 138 verso, lin. 1-6 e margine superiore; pag. 213, lin. 19-24).




si multiplicauerimus $\frac{1}{3}$ 1. Vnde (fol. 138 verso, lin. 8-14; pag. 213, lin. 25-31).



longitudinem ... et census $\frac{1}{2}$ (fol. 138 verso, lin. 25, 26-35; pag. 213, lin. 42 — pag. 214, lin. 9).



circumstantis ipsum ... et radix * (fol. 139 recto, lin. 15, 16-25; pag. 214, lin. 22-30).



queque rectarum $hd.$ et $cb.$ 10., minus re: et quia latera $ce.$ et $hf.$ sunt equalia, erunt quadrata linearum $cb.$ et $be.$ equalia quadratis linearum $hd.$ et $df.$ Sed $cb.$ equalis est $hd.$, remanebit $be.$ equalis $fd.$; relique $eg.$ et $gf.$ sibi inuicem equalis erunt, cum latera $bg.$ et $gd.$ sunt equalia; et quia $ef.$ est res; si ducatur in se, producit censum. Vnde unaqueque rectarum $eg.$ et $gf.$ est radix $\frac{1}{2}$ census; remanet ergo pro $df.$ 10. minus radice medietatis census; ducamus eam in se, uenient .100. et $\frac{1}{2}$ census minus radice .200. censuum: et duc etiam $dh.$ in se, que est .10. minus re, uenient .100. et census minus .20. rebus; aggrega hec omnia, et erunt 200 et census $\frac{1}{2}$ 1., | minus 20. rebus, et minus radice .200. censuum, que equantur censui, scilicet quadrato lineę $hf.$: adde utrique parti .20. res, et radicem .200. censuum; et abice ab utraque parte censuum, remanebunt .200. et $\frac{1}{2}$ census equalis 20. rebus, et radici .200. censuum: reduc hec omnia ad censum, quod est ut duplices omnia que habes, et erunt census et 400. equalis 40 rebus, et radici .800. censuum: dimidia ergo radices, que sunt .20., et radix .200.; et duc eas in se, uenient .600., et radix .320000.; de quibus abice .400., remanebunt .200., et radix 320000; quorum radicem extrahe de .20., et de radice .200., residuum erit res, scilicet latus pentagoni.


Pentagoni equilateri et equianguli mensura est .50. dragme, quantum est quodlibet latus eius: pro ipso quidem pentagono ponam pentagonum $abgde.$, et $c.$ centrum circuli circumstantis pentagonum; et protraham ab ipso centro lineas $ca.$ $cb.$ $cg.$ $cd.$ $ce.$, et erit totus pentagonus $abgde.$ diuisus in quinque triangulis equalibus: ex quibus unus est triangulus $ace.$, cuius mensura est .10. Et iam scis quod quando latus pentagoni est .10., quod quadratum dyametri circuli circumstantis ipsum pentagonum est .200., et radix .8000. Quod etiam potest haberi ex duplo quadrati lateris pentagoni, et ex radice $\frac{4}{5}$ in quadrato eiusdem lateris. Vnde si ponamus latus pentagoni rem, uenient pro quadrato dyametri circuli circumstantis pentagonum .2. census, et radix $\frac{4}{5}$ censuum census; cuius dyametri medietas est unaqueque linearum $ca.$ et $ce.$; et est quadratum uniuscuiusque earum quarta pars quadrati dicti dyametri; ergo quadratum lineę $ca.$ est $\frac{1}{2}$ census, et radix $\frac{1}{20}$ census census: de quo si auferamus quadratum lineę $af.$, quod est $\frac{9}{4}$ census, remanebunt pro quadrato perpendicularis $cf.$ quarta census, et radix $\frac{4}{20}$ census census: cadit enim perpendicularis super medium basis $ae.$, cum equalia sint latera $ac.$ et $ce.$: multiplica ergo quadratum $cf.$ in quadratum $fa.$, hoc est $\frac{1}{4}$ census, et radix $\frac{1}{20}$ census census per $\frac{1}{4}$ census, uenient $\frac{4}{16}$ census census, et radix $\frac{4}{320}$ census census census, que equantur quadrato trianguli $ace.$, quod est 100. Restaura ergo $\frac{4}{16}$ census census, ubi sit census census, quod est ut ducas eum in .16.; et propter hoc duc omnia que habes in .16., et uenient census census, et radix $\frac{4}{5}$ census census census, que equantur .1600. Reduc totum quod habes ad censum census; et est ut ducas totum quod habes in .5., diminuta radice .20., et prouenit census census equalis .8000., et radici .5120000.; radix eius est quodlibet latus pentagoni.

fol. 139 verso.


Et si dicemus tibi: mensura decagoni equilateri et equianguli est .100., quanta est | longitudo cuiuslibet lateris. Intelligamus, lineam $bg.$ esse unum ex lateribus ipsius decagoni, et $a.$ centrum circuli circumstantis ipsum. Quare unaqueque linearum $ab.$ et $ag.$ est semidyameter ipsius circuli; et est triangulus $abg.$ 10.; quia est $\frac{1}{10}$ totius de-

goni. Et iam scis quod quando latus decagoni est .10., quod dyameter circuli circumdantis decagonum est .10. et radix .500. Vnde medietas eius est .5., et radix .125. Similiter cum ponamus latus .bg. rem, erit dyameter circuli similiter res, et radix .5. censuum, hoc est radix quincupli quadrati rei. Vnde semidiameter .ab. erit $\frac{1}{2}$ rei, et radix census $\frac{1}{4}$ 1.: protrahe tunc cathetum .ad., et ueniet punctus .d. in medio .bg.; quare .bd. erit medietas rei: duc ergo .ab. in se, que est $\frac{1}{2}$ rei, et radix census $\frac{1}{4}$ 1., ueniet census $\frac{1}{2}$ 1., et radix census census $\frac{1}{4}$ 1.: quibus abice quadratum lineę .bd., quod $\frac{1}{4}$ census, remanebunt pro catheto .ad. census $\frac{1}{2}$ 1., et radix census census $\frac{1}{4}$ 1.; que multiplica in quadratum lineę .bd., quod est $\frac{1}{4}$ census, uenient $\frac{5}{16}$ census census, et radix $\frac{5}{16}$ census census census census, que equantur .100., scilicet quadrato trianguli .abg.: restaura $\frac{5}{16}$ census census, ut sit census census; quod est ut multiplices illud per $\frac{1}{3}$ 3.; et ideo multiplica omnia que habes per $\frac{1}{3}$ 3., erunt census census, et radix $\frac{1}{3}$ census census census census, que equantur 320. Reduc ergo hec omnia ad censum census, quod est ut multiplices omnia que habes per .5. minus radice de 20., et erit census census equalis .2600. minus radice 2048000.: de quorum radice si acceperis radicem, ueniet res, scilicet latus decagoni quesiti. Potes etiam lineam .ab., cum sit latus exagoni, aliter inuenire, uidelicet cum diuiditur latus exagonicum media et extrema proportione, tunc maior pars eius erit latus decagonicum, ut in EVCLIDE habetur; et latus decagonicum est linea .bg.: unde si ab .ab. abscidamus equalem lineę .bd., que sit linea .eb., erit quadratum lineę .ae. quincuplum quadrati lineę .eb., ut in eodem EVCLIDE habetur. Sed quadratum lineę .eb. est $\frac{1}{4}$ census, cum sit $\frac{1}{2}$ rei; quia ponimus lineam .bg. rem; ergo quadratum lineę .ae. erit census $\frac{1}{4}$ 1.: et sic tota linea .ab. erit $\frac{1}{2}$ 40., et radix census $\frac{1}{4}$ 1., ut superius inuenctum est. Et si dicemus tibi: pentagoni .abgde. mensura trianguli .agd. est .10.; et uis scire quanta est longitudo lineę .gd., que est unum ex lateribus pentagoni; quam pone rem; et quia linea .ag. est corda anguli pentagonici, scilicet lineę .gd., est corda anguli decagonici. Vnde si á linea .ag. abscidamus lineam .gz. equalem lineę .gd., erit proportio .ag. ad .gz. sicut .gz. ad .za.; et si diuiderimus |gz. in duo equa in puncto .i., erit quadratum lineę .ai. quincuplum quadrati lineę .gi.; et est .gi. medietas rei, et quadratum eius $\frac{1}{4}$ census: quare linea .ai. erit radix .5. quartarum census, hoc est ex censu $\frac{1}{4}$ 1.; et tota linea .ai. erit radix census $\frac{1}{4}$ 1. et $\frac{1}{2}$ rei: de inde protrahe cathetum .at., qui cadit in medio recte .gd.; et quia triangulus .agd. habet latera .ag. et .ad. lateribus superioribus trianguli .abg., qui fuit decima pars supradicti decagoni; et ambo trianguli habent bases equales, quarum unaqueque est res; si processerimus in hoc triangulo secundum quod egressi sumus in illo, inueniemus similiter censum census equalis esse .1600. dragmis minus radice 2048000. Quare radix radice huius census est latus .gd., quod posuimus esse rem. Et si dicemus: mensuram trianguli .abe., qui est ex pentagono .abgde. est .10., quanta est longitudo lineę .be. Pone rem lineam .be., que est subtendens angulum pentagoni; et protrahe cathetum .az., que diuidit lineam .be. in duo equa; et quando linea .be. diuiditur media et extrema proportione, maior eius pars est equalis lateri pentagonico, ut in EVCLIDE habetur: in quo etiam inuenitur quod quando linea aliqua media et extrema proportione diuiditur, et additur maiori parti medietatem lineę

* erit medietas minus radice * (fol. 139 verso, lin. 19-20; pag. 215, lin. 6-15).




* est corda si diuiderimus * (fol. 139 verso, lin. 33-35 e margine inferiore; pag. 215, lin. 26-28).



fol. 140 recto.

* censum census parti medietatem * (fol. 140 recto, lin. 9-16, 17; pag. 215, lin. 36-43).




diuise, quadratum additę lineę erit quincuplum quadrati medietatis ipsius diuise lineę: et quia quando linea .be. diuisa est media et extrema proportione, maior eius pars est linea .ab., que est latus penthagonicum; si ei adiungatur linea .bz., que est medietas lineę .be.; itaque ex utraque fiat una linea; erit quadratum ipsius lineę coniunctę ex .ab. et .bz. quincuplum quadrati lineę .ze.; et .ze. est $\frac{1}{2}$ rei, et quadratum eius $\frac{1}{4}$ census lineę coniunctę ex .ab. et .bz. Vnde si ex radice ipsius auferatur linea .bz., remanebit pro linea .ab. radix census $\frac{1}{4}$ 1. minus $\frac{1}{2}$ rei: quam duc in se, uenient census $\frac{1}{2}$ 1. minus radice census census $\frac{1}{4}$ 1.: abice inde quadratum lineę .bz., quod est $\frac{1}{4}$ census, remanebit pro quadrato lineę .az. census $\frac{1}{4}$ 1 minus radice census census $\frac{1}{4}$ 1.; quod multiplica per quadratum lineę .bz., quod est $\frac{1}{4}$ census, uenient $\frac{5}{16}$ census census minus radice $\frac{5}{16}$ census census census census, que equantur quadrato trianguli .abe., quod est .100.: multiplica quidem hec omnia per $\frac{4}{3}$ 3., ueniet census census minus radice $\frac{4}{3}$ census census census census, qui equantur .320. dragmis: redige hec omnia ad censum census; quod est ut multiplices totum quod habes per .5., et per radicem de .20., ueniet census census equalis dragmis .1600., et radici .2048000., quorum radix erit quadratum lineę .be.

Et si dicemus tibi decagoni .abgdeihtc. equilateri et equianguli mensuram trianguli .cth. est .10. ex numero, quanta est linea .ch., que est | corda $\frac{2}{5}$ circundantis ipsum decagonum. Esto centrum ipsius circuli m.; et ducatur linea .tm., que diuidit lineam .ch. in duo equa in puncto .l.; et ponam .ch. rem; et quando .ch. est res; ergo eius quadratum est census, et quadratum dyametri ipsius circuli est .2. census, et radix $\frac{1}{2}$ census census; et quadratum medietatis dyametri, scilicet linea .mt., est $\frac{1}{2}$ census minus radice $\frac{1}{20}$ census census: et quia latus penthagoni .ch. potest super latera .ta. et .te., hoc est super latera exagonici et decagonici: et posuimus .ch. rem; et quadratum eius est census; ergo quadrata linearum .mt. et .tc. equantur censui: unde si ex censu auferatur quadratum lineę .tm., quod est $\frac{1}{2}$ census, et radix $\frac{1}{20}$ census census, remanebit pro quadrato lineę .tc. $\frac{1}{2}$ census minus radice $\frac{1}{20}$ census census: de quo si auferatur quadratum lineę .cl., quod est $\frac{1}{4}$ census, remanebit pro quadrato lineę .tl. $\frac{1}{4}$ census minus radice $\frac{1}{20}$ census census: quod si ducatur in quadratum .cl., scilicet in $\frac{1}{4}$ census, ueniet $\frac{1}{16}$ census census, et radix $\frac{1}{20}$ census census census census, que equantur .100. dragmis. Restaura $\frac{1}{16}$ census census, ubi sit census census; quod est ut multiplices illud per .16.; et propter hoc multiplica omnia que habes per .16., et erit census census minus radice $\frac{4}{3}$ census census census census equalis .1600. dragmis. Reduc ergo hec omnia ad censum census; quod est ut multiplices omnia que habes per .5., et per radicem de .20., deueniet census census equalis 8000, et radici 31200000, quorum radix radice est linea .ch.; et hoc uolui inuenire.

Expliciunt questiones geometricales: et incipiunt questiones, quorum solutiones non sunt terminate, hoc est quod non cadunt ad unum terminum tantum, sed ad plures.


Vt est ista in qua proponitur inuenire aliquis quadratus numerus, cui si addatur .5., proueniat inde quadratus numerus; et hoc potest fieri multipliciter. Pones pro radice maioris numeri rem, et aliquot dragmas; que cum in se multiplicata fuerint, faciant minorem numerum quam .5.; et sit dragma: et multiplicentur res et dragme

« Et si dicemus ... que est » (fol. 140 recto, lin. 34, 35 e margine inferiore; pag. 216, lin. 17 e 18).



fol. 140 verso.

« corda $\frac{2}{5}$... et quadratum » (fol. 140 verso, lin. 4-8; pag. 216, lin. 18.25).



in se, ueniet census, et 2 res, et dragma una, que equantur censui, et 5. dragmis: abice ab utraque parte censum, et dragmam, remanebunt .2. res equales .4. dragmis; ergo res est .2. dragmarum; et quadratum eius est .4. quesitus numerus: cui si addatur .5., ueniet .9.; qui numerus quadratus est; et radix eius est .3. Et si ponamus cum re dragmas duas, multiplicemus ea in se, exhibit census, et .4. res, et .4. dragme equales censui, et .5. dragmis: proiciamus ab utraque parte censum, et .4., remanebunt .4. res equales uni dragme; quare res est $\frac{1}{4}$ dragmę; qua in se multiplicata facit $\frac{1}{16}$ unius dragmę pro quesito numero: cui si addantur .5., uenient $\frac{1}{16}$ 5.; qui numerus quadratus est; et radix eius est $\frac{1}{4}$ 2. Aliter pone pro ipso quadrato numero quadratum .ag.; et addatur ei superficies .de., que sit .5.; et iaceat linea .ge. in directo lineę .bg.; et erit numerus superficialis numerus .ae., et prouenit ex .ab. in .be.: et proponitur numerus .ae. esse quadratus; quare numeri .ab. et .be. similes superficiales sunt; hoc est quod proportio numeri .eb. ad numerum .ab. ae., sicut quadratus numerus ad quadratum numerum. Vnde possumus infinitos duos numeros inuenire habentes inter se proportionem sicut quadratus numerus ad quadratum numerum, cum quibus poterimus ad propositum deuenire. Quare ponamus proportionem numeri .eb. ad numerum .ba., hoc est ad numerum .gb., esse sicut .4. Quare proportio .eg. ad .gb. erit sicut .5. ad .4.; et est proportio superficiei .de. ad quadratum .db. sicut .eg. recta ad rectam .gb.: ergo superficies .de. ad quadratum .db. est sicut .5. ad .4.: unde si superficies .de. est .5., et quadratum .db. est .4.; ergo quesitus quadratus numerus est .4.: cui si addatur .5., ueniunt .9., qui etiam quadratus est. Et nota quod proportio superficiei .de., que est .5., ad quadratum .db. oportet esse sicut aliquis quadratus numerus, cuius quinta pars sit quadrata ad alium quemlibet quadratum numerum. Verbi gratia: sit proportio .eb. ad .bg. sicut est .5. ad .4.; erit ergo proportio .de., que est .5., ad .db. sicut .80. ad .4.; de quibus .80. sextadecima pars. Vnde quadratum .db. est $\frac{1}{16}$ de .1., cuius radix est $\frac{1}{4}$, quod habetur pro latere .gb.; et sic tota superficies .ae. erit $\frac{1}{16}$ 5., cuius radix est $\frac{1}{4}$ 2., ut superius inuenctum est. Aliter quia omnes quadrati numeri ordinate proueniunt ex aggregatione ipsorum numerorum ab unitate ascendentium per ordinem; si colligamus impares numeros, qui sunt infra .5., scilicet .1. et .3., procreabuntur inde .4.; qui numerus quadratus est: cui si addantur .5., uenient .9., qui est quadratus numerus: et si multiplicauerimus aliquem imparem quadratum numerum, ut dicamus .9., per .5., uenient .45.; et acceperimus quadratum, qui prouenit ex aggregatione omnium numerorum imparium, qui sunt ab uno usque in .43., hoc est qui sunt infra .45.; qui quadratus numerus est .484., et eius radix est .22.; et super ipsum quadratum addiderimus .45., nimirum in quadratum numerum .529. ueniemus: et quia ita est, si diuiserimus utrumque quadratum numerum per ipsum quadratum numerum, per quem multiplicauimus .5., nimirum duo quadrati numeri ex ipsa diuisione prouenerint, quorum unus excedit alterum in .5., ut quesitum est; et erit unus ipsorum quadratorum $\frac{7}{9}$ 53., et alter $\frac{7}{9}$ 58.: et si uis habere radices eorum, diuide radicem de .9., uenient $\frac{1}{3}$ 7. Similiter si multiplicauerimus .5. per aliquem quadratum parem in duas, uel in quatuor, uel in plures partes, ita quod unaqueque pars sit impar; et iaceant ipse partes impares in ordine imparium numerorum, poterimus ad solutionem superscriptę questionis deuenire. Verbi gratia: multiplicemus .5.

fol. 141 recto.

fol. 141 verso.


per .16., uenient .80.; et diuidamus .80. in duos pares numeros, qui sint continui in ordine imparium numerorum, eruntque .39. et .41.: deinde aggrega omnes impares numeros ab unitate, qui sunt infra .39.; quam aggregationem habebis, si multiplicauerimus in se medietatem duorum extremorum, scilicet de .1. et 37.; de qua multiplicatione exhibit .361.: cum quibus si addiderimus .80., uenient .441.: si diuiderimus hos duos quadratos per .16., habebimus $\frac{9}{16}$ 22. et $\frac{9}{16}$ 27., et radices eorum habebimus, si per radicem de .16., que est .4., diuiderimus .19. et 21., qui sunt radices de 361. et de 441.

Et si de .80. fecerimus .4. partes impares, que sunt .17. et 19 et 21 et 23; que quatuor partes sunt circa quartam de .80., que est .20.; et aggregabimus numeros impares, qui sunt infra .17., ueniunt .64., qui est quadratus numerus, cuius radix est .8.; super quem si addiderimus .80., uenient .144.: unde si diuiderimus .64. per .144. per .16., et radices eorum per .4., habebimus optatum ut supra. Et si dicemus: de quodam quadrato numero abstulij .10., et remansit quadratus numerus; hec questio similis est antecedenti; quia si super minorem quadratum addantur .10, prouenit inde quadratus numerus: operare ergo in eam secundum quod superius operati fuimus, et inuenias.

Subscripte triangulorum questiones ponende sunt in antecedenti quinterno post triangulum equilaterum, cuius mensura cum sua perpendiculari est .10.


Et si dicemus tibi: in triangulo .*abc.*, cuius unumquodque latus est .10., protractum est quadrilaterum .*dbce.*, cuius latus .*de.* equidistans est lateri .*bc.*; et mensura ipsius quadrilateri est .10.; et uis scire quantitatem lineę .*de.*, protrahe primum in triangulo .*abc.* perpendicularem .*af.*, et erit quadratum ipsius 75, scilicet $\frac{3}{4}$ quadrati unius laterum: et quadratum lineę .*bf.*, que est medietas lateris .*bc.*, est tertia pars quadrati perpendicularis .*af.* Vnde si multiplicetur .*bf.* in radicem de .75., scilicet .5. in radicem de .75., ueniet radix .1875. pro mensura trianguli .*abc.*: et quia linea .*de.* equidistans est lineę .*bc.*, similis est triangulus .*ade.* triangulo .*abc.*: equaliter est ergo triangulus .*ade.* Vnde si ponamus latus .*de.* rem, quod est unum ex equalibus lateribus trianguli .*ade.*, erit quadratum eius census; quare quadratum perpendicularis .*ag.*, erit $\frac{3}{4}$ census, quorum tertia pars, scilicet $\frac{1}{4}$ census, est quadratum lineę .*dg.*: quod si multiplicauerimus per quadratum perpendicularis .*ag.*, uenient $\frac{3}{16}$ census census pro quadrato trianguli .*ade.*; ergo triangulus .*ade.* est radix $\frac{3}{16}$ census census; cum qua radice addamus quadrilaterum .*dbce.*, quod est .10., habebuntur pro toto triangulo .*abc.* .10., et radix $\frac{3}{16}$ census census. Sed triangulus .*abc.* est radix 1875.; ergo .10., et radix $\frac{3}{16}$ census census equatur radici 1875. Vnde si ab utraque parte tollatur .10., remanebit radix $\frac{3}{16}$ census census equales radici 1875. minus .10.: redige ergo hec omnia ad censum, quod est ut multiplices omnia que habes per radicem de $\frac{1}{2}$ 5., quia | cum multiplicetur radix $\frac{3}{16}$ census census per radicem de $\frac{1}{2}$ 5., prouenit radix $\frac{15}{16}$ census census, hoc est radix census census; et radix census census est census: et si multiplicabis radicem de 1875. per radicem de $\frac{1}{2}$ 5., ueniet radix .10000, que est .100.; et cum multiplicetur radix de $\frac{1}{2}$ 5 per 10., prouenit radix de $\frac{1}{2}$ 533.; ergo census hoc quadratum lineę .*de.* est .100. minus radice de $\frac{1}{2}$ 533., quorum radix est linea .*de.*; et hoc uolui inuenire. Et quia triangulus .*ade.* est equalium laterum, erit et quadratum lateris .*ad.* similiter .100. minus radice $\frac{1}{2}$ 533. Vnde si si (*sic*) radix eorum auferatur de .10., remanebunt pro linea .*db.* 10. minus radice differentię,

* 75, scilicet ... *ag.*, erit a (fol. 141 verso, lin. 21-27; pag. 218, lin. 21-28).



fol. 142 recto,


* multiplica(bis radicem ... á puneto .*d.* (fol. 142 recto, lin. 2, 3-9; pag. 218, lin. 38 — pag. 219, lin. 1).




que est inter radicem de $\frac{1}{3}$ 533., et 100. dragmas: et si á puncto *.d.* protrahatur cathetus *.dh.*; et uis inuenire longitudinem eius, pone ipsum rem, et accipe medietatem laterum *.de.* et *.bc.*, et multiplica eam in rem; et que prouenerint, equabantur .10., hoc est quadrilatero *.dbce.* Verbi gratia: quadratum lateris *.de.* est .100. minus radice $\frac{1}{3}$ 533.; quare quadratum medietatis lineę *.de.* est 25 minus radice $\frac{1}{3}$ 33.; ergo medietas lineę *.de.* est radix accepta sui quadrati; et medietas lateris *.bc.* est .5.; et sic pro medietate laterum *.de.* et *.bc.* habentur .25. minus radice $\frac{1}{3}$ 33., accepta eorum radice, et 5. dragmis; que multiplica per rem, hoc est per cathetum *.dh.* Et pro multiplicatione rei in .5. habebis 5. res; et pro multiplicatione rei in .25. minus radice $\frac{1}{3}$ 33., accepta eorum radice, habebis census .25. minus radice census census $\frac{1}{3}$ 33., accepta eorum radice; que omnia equantur .10.: tolle quidem ab utraque parte .5. res, remanebunt .25. census minus radice censuum [census $\frac{1}{3}$ 33., accepta eorum radice, equales .10. minus .5. rebus: multiplica itaque hec omnia in se, uenient .25. census minus radice censuum census $\frac{1}{3}$ 33. equales .25. censibus, et .100. dragmis minus 100. rebus: ergo adde utrique parti 100. res, et radicem censuum census $\frac{1}{3}$ 33., et tolle ab utraque 25 census, remanebunt .100. dragme, et radix censuum census $\frac{1}{3}$ 33., que equantur .100. rebus: multiplica iterum .100., et radicem censuum census $\frac{1}{3}$ 33. in se, uenient census census $\frac{1}{3}$ 33., et .10000. dragme, et .200. radices censuum census $\frac{1}{3}$ 33, que equantur .10000. censibus, scilicet multiplicationi .100. rerum in se: reduc hec omnia ad censum census, quod est ut diuidas omnia que habes per $\frac{1}{3}$ 33., exhibit census, et .300. dragme, et .6. radices censuum census $\frac{1}{3}$ 33.; que radices sunt una radix censuum census .1200., que equantur 300 censibus; tolle ab utraque parte radicem censuum census 1200., remanebunt census census, et 300. dragme equales .300. censibus, diminuta ex eis radice .1200. censuum census: et sic reducta est hec questio ad unam ex sex regulis algebrę; quia est sicut quando dicitur: census et numerus equantur radicibus; quod uolo demonstrare per figuram. Pone | pro censu census quadratum *.ik.*, cuius unumquodque latus est census; et ponam superficiem *.lm.* equalem .300. dragmis; et addam lineę *.tm.* lineam *.mo.*, ut sit tota linea *.to.* 300.; et complebo superficiem *.no.*; erit ergo tota superficies *.i.o.* 300. census, cum *.to.* sit .300., et *.it.* sit census; et superficies *.im.* est sicut census census, et 300. dragme, et equantur 300 censibus minus radice 1200 censuum census. Quare superficies *.no.* est radix .1200. censuum census. Vnde necesse est, ut linea *.mo.* sit radix .1200. dragmarum; quia cum ducitur census in radicem .1200. prouenit radix .1200. censuum census. Vnde si ex tota *.to.*, que est .300., auferatur *.mo.*, remanebit linea *.tm.* 300. minus radice .1200. dragmarum: diuidamus itaque eam in duo equa ad punctum *.p.*, et erit *.tp.* 150., minus radice .300. dragmarum: linea igitur *.tm.* diuisa est in duo equalia ad punctum *.p.*, et in duo inequalia ad punctum *.k.* Vnde si ex quadrato lineę *.tp.* auferatur superficies, que fit ex *.tk.* in *.km.*, hoc est ex *.lk.* in *.km.*, remanebit quadratum lineę *.kp.* Quare multiplicemus *.tp.*, hoc est .150. minus radice .300. in se, uenient 22800. minus radice 6750000.; de quibus auferamus id quod prouenit ex *.lk.* in *.km.*, quod est .300., remanebunt .22500. minus radice de 6750000. pro quadrato lineę *.pk.*; quorum radix si auferatur ex *.tp.*, remanebit pro quantitate census *.tk.* 150. minus radice .300., et minus radice differentię, que est inter radicem .6750000., et dragmas .22500.; et hoc quod remanet, quod est cen-

fol. 142 verso.

* sit tota linea . . . est census * (fol. 142 verso, lin. 3-20; pag. 219, lin. 28 — pag. 220, lin. 4).



* et ex ... radix $\frac{2}{4}$ » (fol. 142 verso,
lin. ultima e margine inferiore; pag.
220, lin. 14).




fol. 143 recto.

sus $.tk.$, est secundum propinquitatem circa $\frac{1}{3}$ 1; cuius radix, que est circa $\frac{1}{13}$ 1., est cathetus quesita $.dh.$; et hoc uolui demonstrare. Et si dicetur: in triangulo $.abg.$, cuius unumquodque latus est .10., protractum est quadrilaterum oblongum et rectorum angulorum $.cdef.$, et quadrilaterum $.hikl.$, quod est similiter oblongum et rectorum angulorum; et est .10. mensura uniuscuiusque quadrilateri; et queritur quanta est longitudo laterum $.cf.$ et $.hl.$, que sunt sibi inuicem equidistantia, nec non et lateris $.bg.$; protraham primum perpendicularem $.am.no.$, et pro utroque laterum $.cf.$ et $.hf.$ ponam radicem rei; et erit unaqueque perpendicularium $.am.$ et $.an.$ radix $\frac{2}{4}$ rei; quibus extractis ex perpendiculari $.ao.$, que est radix .75., remanebit pro unaquaque linearum $.mo.$ et $.no.$ radix .75. minus radice $\frac{2}{4}$ rei: et quia embadum quadranguli $.cdef.$ surgit ex ductu $.dc.$ in $.cf.$, hoc est ex $.om.$ in $.cf.$, multiplicemus $.om.$ in $.cf.$, hoc est radicem .75. minus radice $\frac{2}{4}$ rei, in radicem rei; et que prouenerunt, equabuntur .1017.: ex multiplicatione radice rei in radicem .75. dragmarum uenient radix .75. rerum; et ex multiplicatione radice rei in radicem $\frac{2}{4}$ rei diminutam prouenit radix $\frac{2}{4}$ | census diminuta, que equantur .10. Et si multiplicauerimus $.on.$ in $.hl.$, hoc est radicem .75. minus radice $\frac{2}{4}$ rei, in radicem rei, ueniet similiter radix 75 rerum minus radice $\frac{2}{4}$ census; que etiam equantur .10.: adde ergo utrique parti radicem $\frac{2}{4}$ census, remanebit radix .75. rerum equalis .10. dragmis, et radice $\frac{2}{4}$ census: multiplica ergo .10., et radicem $\frac{2}{4}$ census in se, uenient .100., et $\frac{2}{4}$ census, et radix 300 censuum, que equantur radice .75. rerum ducta in se, hoc est 75. rebus. Reduc hec omnia ad censum, quod est ut multiples omnia que babes per $\frac{1}{3}$ 1., et uenient census, et dragme $\frac{1}{3}$ 133., remanebunt census, et dragme $\frac{1}{3}$ 133. equales .100. rebus, diminuta inde radice censuum $\frac{1}{3}$ 533.: accipe ergo medietatem radicum, que est .50., minus radice $\frac{1}{3}$ 133.; et multiplica eas in se, uenient .2633. minus .100. radicibus de $\frac{1}{3}$ 133.; de quibus extrahe dragmas $\frac{1}{3}$ 122., que sunt cum censu, remanebunt .2500. minus radice $\frac{1}{3}$ 1333333.; quarum radicem extrahe de medietate radicum, scilicet de 50. minus radice $\frac{1}{3}$ 3133. Residuum erit res minor, scilicet quadratum lineę $.cf.$ Et super .50. minus radice $\frac{1}{3}$ 133. addideris radicem residui, quod est inter radicem $\frac{1}{3}$ 1333333., et dragmas .2500., quod prouenerit, erit quadratum maioris rei, scilicet lineę $.hl.$; et est quadratum lineę $.cf.$ secundum propinquitatem $\frac{7}{9}$ 1; et eius radix est $\frac{1}{3}$ 1.; et quadratum lineę $.hl.$ secundum propinquitatem est $\frac{1}{9}$ 75; et eius radix est $\frac{2}{3}$ 8.: et si uolumus habere notitiam laterum $.cd.$ et $.hl.$, ponemus similiter unumquodque eorum radicem rei: et quia trigona $.hbi.$ et $.cbd.$ similia sunt trigono $.abo.$, erit sicut quadratum lineę $.bi.$ ad quadratum lineę $.ih.$, ita quadratum lineę $.bo.$ ad quadratum lineę $.oa.$ Sed quadratum lineę $.bo.$ est $\frac{1}{3}$ quadrati lineę $.oa.$; quare quadratum lineę $.bi.$ est $\frac{1}{3}$ rei, cum linea $.ih.$ sit radix rei: propter eadem ergo quadratum lineę $.kg.$ erit $\frac{1}{3}$ rei; ergo unaqueque rectorum $.bi.$ et $.kg.$ est radix $\frac{1}{3}$ rei; quibus extractis ex tota $.bg.$, que est .10., remanebit linea $.ik.$ 10. minus duabus radicibus $\frac{1}{3}$ dragmę, que sunt radix de $\frac{1}{3}$ 1.: multiplicemus ergo lineam $.hi.$ in lineam $.ik.$, scilicet radicem rei in .10. minus radice $\frac{1}{3}$ 1., ueniet radix .100. rerum minus radice census $\frac{1}{3}$ 1., que equantur .10. Similiter quia est sicut $.bo.$ ad $.oa.$, ita $.hd.$ ad $.dc.$, et $.el.$ ad $.ef.$ Quare unaqueque rectorum $.bd.$ et $.eg.$ est radix $\frac{1}{3}$; quibus extractis ex $.bg.$, remanebit $.de.$ 10. minus radice $\frac{1}{3}$ 1.: unde cum multiplicauerimus $.cd.$, que est radix rei, in $.de.$, ueniet


similiter radix .100. rerum minus radice census $\frac{1}{2}$ 1., quod erat .10. similiter : vnde si utrique parti addatur radix census $\frac{1}{2}$ 1., erit .10., et radix census $\frac{1}{3}$ 1. equales radici .100. rerum: multiplica itaque 10., et radicem census $\frac{1}{3}$ 1. in se, erunt .100., et census $\frac{1}{3}$ 1., et radix censuum $\frac{1}{3}$ 533., que | equantur .100. rebus, scilicet multiplicationi radicis .100. rerum in se. Reduc modo omnia que habes ad censum, quod est ut ducas omnia que habes in $\frac{2}{4}$ dragmę, uenient census, et 75, et radix .300. censuum equales .75. rebus : abice itaque ab utraque parte radicem .300. censuum, remanebunt census, et .75. dragme, que equantur .75. rebus, diminuta ex eis radice .300. censuum: multiplica medietatem radicem in se, que sunt $\frac{1}{2}$ 37. minus radice .75., uenient $\frac{1}{4}$ 1481. , diminutis inde .75. radicibus de 75.; de quibus tolle .75., que sunt cum censu, remanebunt $\frac{1}{4}$ 1406. minus radice 481875; quarum radicem abice ex medietate radicem, scilicet ex $\frac{1}{2}$ 37., minus radice 75., residuum erit res minor, scilicet quadratum lineę .hi.; quod quadratum est circa $\frac{1}{6}$ 1., et eius radix est circa $\frac{2}{3}$ 1; et hec est longitudo lineę .hi.: quam si multiplicauerimus in .hl., que est circa $\frac{2}{3}$ 8., nimirum uenient .10. pro quadrilatero .hikl.; et hoc uolebamus. Similiter si super $\frac{1}{2}$ 37. minus radice .75. addiderimus radicem differentię, que est inter 421875., et dragmas $\frac{1}{4}$ 1406., habebimus quadratum maioris rei, scilicet lineę .cd.; quod quadratum est circa $\frac{1}{4}$ 56., et eius radix, que est linea .cd., est circa $\frac{1}{2}$ 7.; qua multiplicata in lineam .cf., que est circa $\frac{1}{2}$ 1., uenient .10. pro quadrilatero .cdef., ut oportet. Aliter quia inuenimus superius quadratum lateris .cf., quod cum res esse 50 minus radice $\frac{1}{3}$ 133., et radice differentię, que est inter radicem $\frac{1}{3}$ 133333., et 2500. dragmas; et quadratum ex .am. fuit $\frac{3}{4}$ rei; si acceperimus $\frac{3}{4}$ ex predictis, que sunt res, habebimus quadratum lineę .am. Nam $\frac{3}{4}$ de 50. sunt $\frac{1}{2}$ 37., et $\frac{3}{4}$ radicis de $\frac{1}{3}$ 133 diminutę habebuntur, si multiplicauerimus quadratum de $\frac{3}{4}$, quod est $\frac{9}{16}$, in $\frac{1}{3}$ 133.; et ex hoc quod prouenerit, acceperimus radicem; ex qua multiplicatione prouenit radix .75. diminuta. Similiter acceperimus $\frac{9}{16}$ de 2500., et $\frac{81}{256}$ de $\frac{1}{3}$ 133333., et uenient $\frac{1}{4}$ 1406. minus radice 421875., accepta inde radice; et sic pro quadrato lineę .am. habentur $\frac{1}{2}$ 37., diminuta radice .752., minus radice differentię, que est inter radicem 421875. et $\frac{1}{4}$ 1406.; quorum radicem extrahe ex tota .ao., que est radix .75., remanebit pro .mo., hoc est pro .cd., $\frac{1}{2}$ 7., et secunda .25.; et .cf. est circa $\frac{1}{2}$ 1. minus secundis $\frac{2}{3}$ 4.: Et si super $\frac{1}{2}$ 37., minus radice 75., addatur radix differentię, que est inter radicem 421875 et $\frac{1}{4}$ 1406., quod prouenerit, erit quadratum catheti .an.; quorum radix si auferatur ex .ac., remanebit pro linea .no., hoc est pro linea .hi., circa $\frac{1}{6}$ 1. Rursus in triangulo .abg., cuius unumquodque latus est .10., protractum sit quadrilaterum .cbef. habens angulos .cfe. rectos; et sit mensura ipsius quadrilateri .10.; et uolo scire quantitatem lateris .fe. protraham primum in triangulo .abg. cathetos .ah.: et .ci., et erunt trianguli .bic. et .gef. | similes triangulo .ahb. Quare erit sicut quadratum lateris .bh. ad quadratum lateris .ha., ita quadratum lateris .bi. ad quadratum lateris .ic., et quadratum lateris .ge. ad quadratum lateris .ef. Est enim quadratum lateris .bh. tertia pars ex quadrato lateris .ha.; erit ergo quadratum lateris .bi. $\frac{1}{3}$ ex quadrato .ic.; et quadratum lateris .ge. ex quadrato lateris .ef. erit similiter $\frac{1}{3}$; et quia mensura quadranguli .cbef. colligitur ex multiplicatione .ef. in medietatem laterum .cf. et .bc., ponam latus .ef. radicem rei; quare .eg. erit una radix $\frac{1}{3}$ rei; qua subtracta ex tota linea .bg., rema-

fol. 143 verso.

a radice 481875 $\frac{1}{2}$ 7.; qua s (fol. 143 verso, lin. 7, 8-15; pag. 221, lin. 11-18).



a primum in et .gef. s (fol. 143 verso, lin. ultima e margine inferiore; pag. 221, lin. 36).



fol. 144 recto.


nebit pro linea .be. 10. minus radice $\frac{1}{2}$ rei: et quia anguli .cfe. et .feb. sunt recti, erit linea .cf. equidistans lineæ .be.: sunt enim .ci. et .fe. sibi inuicem equidistantes; quare .cf. et .ie. sibi inuicem sunt equales, nec non et recta .ei. recte .fe. equalis est: vnde si tollatur .cf., scilicet .ie., ex tota .bg., que est .10., remanebunt pro linea .cf. 10. minus duabus radicibus $\frac{1}{2}$ rei; quibus additis cum mensura lateris .be., que est .10. minus radice $\frac{1}{2}$ rei, egredientur .20., diminutis tribus radicibus $\frac{1}{2}$ rei, pro quantitate laterum .cf. et .be.; quorum medietatem, que est .10. minus radice $\frac{3}{4}$ rei, si multiplicauerimus in lineam .fe., que est radix rei, ueniet radix .100. rerum minus radice $\frac{3}{4}$ census, que equantur .10.: adde utrique parti radicem census $\frac{3}{4}$, et erunt .10. dragme, et radix $\frac{3}{4}$ census, que equantur radici .100. rerum: multiplicemus ergo .10., et radicem $\frac{3}{4}$ census in se, uenient uenient (sic) 100., et $\frac{3}{4}$ census, et radix .300. censuum, que equantur .100. rebus, scilicet multiplicationi radicis .100. rerum in se: reduce hec

fol. 144 verso

omnia ad censum, quod est ut multiplices omnia que habes per .31., et erunt census, et dragme $\frac{1}{3}$ 133, et radix censuum $\frac{1}{3}$ 533. equales rebus $\frac{1}{3}$ 133.: abice ab utraque parte radicem censuum $\frac{1}{3}$ 533., remanebunt census, et dragme $\frac{1}{3}$ 133. equales rebus $\frac{1}{3}$ 133., diminuta ex eis radice censuum $\frac{1}{3}$ 533.: dimidia ergo radices, erunt $\frac{2}{3}$ 66. minus radice dragmarum $\frac{1}{3}$ 133.; quas duc in se, uenient $\frac{1}{9}$ 4444., et radix $\frac{13}{9}$ 2370370.; quorum radicem habice ex medietate radicum, scilicet ex $\frac{2}{3}$ 66. minus radice $\frac{1}{3}$ 133., residuum erit res, scilicet quadratum lateris .ef.; que sic fiunt: radicem $\frac{1}{2}$ 2270370, que est circa .1539., et minuta .26., et secunda .2., et tertia 35., abice $\frac{1}{9}$ 4444., remanebunt .2904., et minuta .50., et secunda .37., et tertia .25.; quorum radicem, que est .53., et minuta .53., et secunda .47., et tertia .46., adde cum radice de $\frac{1}{3}$ 133., que est .11., et minuta .32., et secunda .49., et tertia .23., erunt .63., et minuta .26., et secunda .36., et tertia .50.; que tolle ex $\frac{2}{3}$ 66, remanebit .1., et minuta .13., et secunda .23., et tertia pro quantitate rei; quorum | radix, que est circa .1., et minuta .6., et secunda .21., et tertia .20., erit linea .ef.; et hoc uolui demonstrare. Et si uis habere notitiam laterum .cf. et .be., dupliciter ea inuenire poteris: primum secundum propinquitatem accipe $\frac{1}{2}$ rei, scilicet de .1., et minutis 13, et secundis 23, et tertia, uenient minuta .22., et secunda .7., et tertia .6., et quarta .40. pro quadrato lineæ .eg.; quorum radicem, que est minuta 38., et secunda .18., et tertia .42., tolle ex tota .bg., remanebit .be. nota: et si duplum de minutis .38., et secundis 18, et tertijs 42. tolles ex .10., quod remanebit, erit latus .cf. Et si uis habere notitiam lateris .cb., multiplica .ci. et .ib. in se, ueniet res $\frac{1}{9}$ 1. pro quadrato lineæ .cb. Quare multiplica .1., et minuta .13., et secunda 23, et tertia .1. per $\frac{1}{9}$ 1.; et eius quod prouenerit radicem accipe, et habebis latus .cb.: est enim medietas laterum .cf. et .de. 9., et minuta .2., et secunda .31., et tertia .57.; que ducta in .cf., scilicet in .1., et minuta 6, et secunda .21., et tertia .20., uenient .10. et parum plus, uidelicet tertia .2., et quarta 43., et quinta .36. Aliter quia quadratum lineæ .eg. est $\frac{1}{9}$ quadrati lineæ .ef.; et quadratum lineæ .ef. est $\frac{1}{9}$ 66. minus radice $\frac{1}{9}$ 133, et radice differentie, que est inter radicem $\frac{13}{9}$ 2370370. et $\frac{4}{9}$ 4444., accipe $\frac{1}{9}$ de $\frac{2}{3}$ 66, et de radicibus suprascriptis, et habebis pro quadrato lineæ .eg. $\frac{2}{9}$ 22. minus radice $\frac{13}{9}$ 14., et minus radice differentie, que est inter $\frac{1}{9}$ radicis de $\frac{13}{9}$ 2370370 et $\frac{1}{9}$ de $\frac{4}{9}$ 4444., hoc est inter radicem $\frac{13472}{9}$ 9263 et $\frac{47}{9}$ 493.: et cum ex his acceperis radicem, habebis .3999. pro linea .eg. circa minuta .38., et secunda .27., et tertia .42.:


fol. 144 verso.

remanebit .be. ... quæsta 43. s. fol. 144 verso, lin. 6, 7-13, 14; pag. 222, lin. 30-37).




et quia est sicut *ab.* ad *bh.*, ita *cb.* ad *bi.*, erit *cb.* duplum minorum .38., et secundorum .27., et tertiorum .42.; quod duplum est .1., et minuta .16., et secunda .53., et tertia .24.; quibus extractis ex tota *ab.*, remanebit pro quantitate lineę *ac.*, hoc est pro *cf.* 8., et minuta .43., et secunda .4., et tertia .36.: est enim triangulus *acf.* equilaterus, cum sit similis triangulo *abg.*; et si ex *bc.*, hoc est ex .10., auferantur minuta .33., et secunda .27., remanebunt pro linea *be.* 9., et minuta .21., et secunda .32., et tertia .18. Rursus in triangulo *abg.* equilatero, cuius unumquodque latus est .10., et eius perpendicularis est *ad.*, protractum est quadrilaterum *adcf.*, cuius mensura est .10.; et queratur quanta sit longitudo lineę *cf.*; primum quidem manifestum est, quod mensura trianguli *adg.* est radix de $\frac{3}{4}$ 478., que provenit ex ductu *ad.* in dimidium *dg.*; de qua radice si auferantur .10., scilicet quadrilaterum *adcf.*, residuum erit triangulus *gcf.*, qui est similis triangulo *gda.* Vnde quadratum lineę *cf.* triplum est quadrati lineę *gc.*: ponas ideo pro quadrato lateris *cf.* rem. Quare quadratum lateris *cg.* erit $\frac{1}{3}$ rei; et multiplicabo *cf.* in dimidium *cg.*, hoc est radicem rei in radicem $\frac{1}{12}$ rei, ueniet radix $\frac{1}{12}$ census; qua radice addita cum quadrilatero *adcf.*, ueniet .10., et radix $\frac{1}{12}$ census, que equantur radici $\frac{3}{4}$ 478.: multiplica ergo .10., et radicem $\frac{1}{12}$ census in se, uenient 100., et $\frac{1}{12}$ census, et radix censuum $\frac{1}{3}$ 33., que equantur dragmis $\frac{3}{4}$ 478.: abice ergo ab utraque parte .100., et multiplica omnia que remanent per .12., ut reintegretur census, exhibit census, et radix .4800. censuum, que equantur dragmis .4425.: dimidia ergo radices, que sunt cum censu, et multiplica medietatem in se, erunt .1200.; cum quibus adde .4425., uenient .5625.; de quarum radice, que est .75., abice radicem de .1200., remanebunt pro quantitate rei, scilicet lineę *gf.* 75. minus radice .1200.; quorum tertia pars, que est .25., minus radice $\frac{1}{3}$ 133., est quadratum lineę *cg.*; quorum radix si extrahatur ex *dg.*, que est .5., remanebit pro linea *dc.* circa $\frac{1}{3}$ 1.; et *cf.* secundum propinquitatem est $\frac{1}{3}$ 6.; et linea *ad.* est $\frac{2}{3}$ 8.; quibus et medietas laterum *cf.* et *da.* est $\frac{1}{2}$ 7.; quibus ductis in *de.*, scilicet in $\frac{1}{3}$ 1., uenient .10. pro mensura quadrati lateris *adcf.*; et hoc uolui demonstrare. Item in triangulo equilatero *abc.*, cuius unumquodque latus est .10., protractum est quadratum *defg.* equilaterum et equiangulum; et uolo habere notitiam laterum ipsius quadrati. Quia latera ipsius quadrati sibi inuicem sunt equalia, erit latus *dg.* equidistans lateri *bc.*; quare triangulus *adg.* equilaterus est: quibus intellectis, ponam latus *dg.*, hoc est latus *ad.* radicem rei; et auferam *ad.* ex *ab.*, remanebunt pro linea *db.* 10. minus radice rei; que ducam in se, uenient .100., et res minus radice 400 rerum pro quadrato lineę *db.*: deinde ducam *de.* in se, ueniet res; et ducam *eb.* in se, ueniet $\frac{1}{3}$ rei; et sic res $\frac{1}{3}$ equatur .100. dragmis, et rei minus radice .400. rerum: tolle ab utraque parte rem, et $\frac{1}{3}$ rei, et adde utrique parti radicem .400. rerum, et erunt 100 minus $\frac{1}{3}$ rei equales radici .400. rerum: multiplica unumquodque latus in se, erunt .10000, et $\frac{1}{9}$ census minus rebus $\frac{2}{3}$ 66. equales .400. rebus: adde utrique parti res $\frac{2}{3}$ 66., et multiplica per .9. omnia que habes, ueniet census, et 90000. dragme equales rebus .4200.: dimidia ergo res, erunt .2100.; que multiplica in se, erunt .4410000.; de quibus abice .90000., remanebunt .4320000.; quorum radicem, que est .2078., et minuta .27., et secunda .48. parum minus extrahe de .2100., remanebunt parum plus de .21., et minutis 32., et secundis .30. pro quantitate rei, hoc est pro qua-

* lineę .gc. lateris a (fol. 144 verso, lin. ultima, e margine inferiore; pag. 223, lin. 13 e 14).




fol. 145 recto.

* propinquitatem remanebunt a (fol. 145 recto, lin. 13-20, 21; pag. 223, lin. 25-33).



fol. 145 verso.

in *be.* ... $\frac{1}{5}$ census » (fol. 145 verso, lin. 4-10; pag. 224, lin. 6-13).



fol. 146 recto.

drato *de.*; quorum radix, que est circa .4., et minuta .38., et secunda et tertia est unumquodque laterum ipsius quadrati. Et est etiam secundum hoc in triangulo *abc.* equilatero, cuius unum constitutum pentagonum equilaterum *adefg.*, cuius unumquodque latus, per ea que diximus, erit notum. Aliter protraham cathetum *ai.*, et ducam *ai.* in *bi.*, hoc est radicem de .75. in .5., ueniet radix .1875. dragmarum pro area totius trianguli *abc.* Deinde ducam *de.*, scilicet radicem rei, in *be.*, hoc est in radicem $\frac{1}{5}$ rei, exibat radix $\frac{1}{5}$ census pro area triangulorum *deb.* et *gfc.*: et ducam etiam *de.* in se, et ueniet res pro area quadrati *defg.* Et ducam rursus *ad.* in se, et ueniet res; de qua tollam quadratum lineę *dh.*, quod $\frac{1}{4}$ rei est, remanebunt $\frac{3}{4}$ rei pro quadrato catheti *ah.*: et ducam *ah.* in *dh.*, et ueniet radix $\frac{3}{16}$ census pro area trianguli *adg.*: deinde addam radicem $\frac{3}{16}$ census cum radice $\frac{1}{5}$ census; que additio sic fit: multiplicetur radix $\frac{1}{5}$ census in se, et radix $\frac{3}{16}$ census in se, ueniet $\frac{1}{25}$ census et $\frac{9}{16}$, hoc est $\frac{25}{48}$ census; et radix $\frac{1}{5}$ census in radicem $\frac{3}{16}$ census, et prouenit radix $\frac{1}{16}$ census census, hoc est $\frac{1}{4}$ census, cuius duplum est $\frac{1}{2}$ census; quod additur cum $\frac{25}{48}$ census, egreditur census $\frac{1}{48}$ 1., cuius radix est area triangulorum *deb.* et *feg.* et *adg.* Quam aream inueniam aliter. Quia trigona *deb.* et *ahd.* sibi inuicem sunt similia, habebunt circa equales angulos latera proportionalia. Quare erit sicut *bd.* ad *de.*, hoc est ad *da.*, ita *da.* ad *ah.*: recte quidem *bd.* et *da.* et *ah.* continue proportionales sunt. Quare est sicut *bd.* prima ad *ah.* tertiam, ita triangulus *dbe.* ad triangulum *adh.* Sed sicut *bd.* ad *ah.*, ita quadratum lineę *bd.* ad quadratum lineę *da.*: est enim quadratum lineę *bd.* res $\frac{1}{5}$ 1.; et quadratum lineę *da.* est res; ergo est sicut $\frac{1}{5}$ 1. ad 1., hoc est sicut .4. ad .3., ita triangulus *dbe.* ad triangulum *adh.* Sed est sicut triangulus *dbe.* ad triangulum *adh.*, ita duplum trianguli *dbe.*, hoc est trianguli *dbe.* et *gef.* ad duplum trianguli *adh.*, hoc est ad triangulum *adg.*: ergo est sicut .4. ad .3., ita trianguli *dbe.* et *def.* ad triangulum *adg.* Quare erit sicut .4. ad coniunctum de 4. et .3., hoc est ad .7., ita trianguli *dbe.* et *gef.*, qui sunt radix $\frac{1}{5}$ census ex his tribus triangulis. Quare si multiplicauerimus radicem $\frac{1}{5}$ census per .7., et summam diuiserimus per .4., ueniet radix census $\frac{1}{48}$ 1 pro area triangulorum *dbe.* et *gef.* et *adg.*: cum qua si addiderimus quadratum *df.*, quod est res, habebantur radix census $\frac{1}{48}$ 1, et res pro area trianguli *abc.* Quam aream inuenimus superius esse radicem de .1875: ergo res, et radix census $\frac{1}{48}$ 1. equatur radici 1875.: tollamus ab utraque parte rem, et erit radix .1875. minus re equales radici census $\frac{1}{48}$ 1. Duc ergo utrumque latus in se, et erunt census, et dragme .1875., minus radice 7500. censuum, equales censibus $\frac{1}{48}$ 1.: adde ergo utrique parti radicem .7500. censuum, et tolle ab utraque parte censum, remanebunt $\frac{1}{48}$ census, et radix .7500. censuum equales dragmis .1875. Reduc ergo omnia que habes ad censum, quod est ut multiplices ea per .48., et uenient census, et radix .17280000. equales 90000. dragmis: dimidia ergo radicem, que est cum censu, ueniet radix 4320000; quam duc in se, uenient .4320000.; super que adde .90000., erunt .4410000.; de quorum radice, que est .2100., abice radicem de 4320000., que est .2078., et minuta .27., et secunda .40., et tertia, secundum propinquitatem, remanebunt .21., et minuta .32., et secunda .20., et tertia pro quantitate rei; quorum radix, ut supra diximus, est unumquodque ex lateribus pentagoni *adefg.*, siue quadrati *defg.*; et hoc uolui demonstrare.

Explicit etc.

OPUSCOLI


DI

LEONARDO PISANO

SECONDO LA LEZIONE

DI UN CODICE DELLA BIBLIOTECA AMBROSIANA DI MILANO

contrassegnato E. 75, Parte Superiore.



INCIPIT *flos Leonardi bigolli pisani super solutionibus quarundam questionum ad numerum et ad geometriam, uel ad utrumque pertinentium.*

fol. 1 recto.

INTELLECTO, beate pater et domine uenerande .R. dei gratia Sce. Mar. In Cosmidin diac. Cardinalis dignissime, quod meorum operum copiam non preceptiue saltim, quod uos magis decebat, sed simpliciter petere fuistis per litteras uestre sanctitatis dignati; nihilominus tamen petitionem ipsam reuerenter suscipiens in mandatis, non solum parere uoto uestro sattegi deuotius in hac parte, verum etiam de quarundam solutionibus questionum à quibusdam philosophis serenissimi domini mei Cæsaris, et alijs per tempora mihi oppositarum, et plurium que subtilius quam in libro maiori de numero, quem composui, sunt solute, ac de multis, quas ipse met ad inueni, ex diffusa quidem multitudine compilans hunc libellum ad laudem et gloriam nominis uestri compositum florem ideo uolui titulari; quia illa nobis florida clericorum elegantia radiantibus dictaui, atque etiam quia ibi nonnullæ sunt floride quamquam nodose apposite questiones, tanque geometricæ quam arismetrice indagatione uigili sic probabiliter enodate, ut ne dum non solum floreat in se ipsis, immo et quod per eas, uelut ex radicibus plantule emergunt innumere questiones, quibus interdum uacare sidignabimini, poteritis, si placebit, inter curas et occupationes uestras ab otiositate illa, que uirtutum est nouerca, uacando sub exercitatione ingenij, solatia etiam nec sterilia, sed officiosa captare. Si autem hoc nouero à uestræ clementiæ benignitate acceptari; quicquid amene subtilitatis uel utilitatis ulterius adinuenero, eidem operi, ut uestram merear gratiam adipisci, obnoxius cumulabo, eadem et me ipsum correctioni dominationis uestre affectuosius supponendo.

Explicit prologus; incipit tractatus eiusdem.

CVM coram maiestate uestra, gloriosissime princeps Frederice, magister Iohannes panormitanus, phylosophus uester, pisis mecum multa de numeris contulisset, interque duas questiones, que non minus ad geometriam quam ad numerum pertinent, proposuit. Quarum prima fuit ut inueniretur quadratus numerus aliquis, cui addito uel diminuto quinario | numero, egrediatur quadratus numerus; quem quadratum numerum, ut eidem magistro Iohanni retuli, inueni esse hunc numerum, undecim et duas tertias et centesimam quadragesimam quartam unius. Cuius numeri radix est ternarius et quarta et vi^a. unius. Cui quadrato numero si addantur quinque, prouenient .xvi. et due tertie et una centesima quadragesima quarta; qui numerus est quadratus. Cuius radix est quatuor et una duodemima. Item si auferantur .v. ab eodem quadrato numero, remanebunt vi. et due tertie et una centesima quadragesima quarta; qui numerus etiam quadratus est. Cuius radix est duo et tertia et quarta unius. Et cum diutius cogitassem unde oriebatur predictæ questionis solutio, inueni ipsam habere originem ex multis accidentibus, que accidunt quadratis numeris, et inter quadratos numeros: quare hinc sumens materiam, libellum incepti componere ad uestræ maiestatis celsitudinis gloriam; quem libellum quadratorum intitulaui, in quo continebuntur rationes et probationes, geometricæ solutiones questionis predictæ, et multarum aliarum questionum solutiones, quem habere poterit uestra immensitas, si celsitudini uestræ placuerit.

fol. 1 verso.

quadratorum liber

Altera uero questio á predicto magistro Iohanne proposita fuit, vt inueniretur quidam cubus numerus, qui cum suis duobus quadratis et decem radicibus in unum collectis essent uiginti: super hoc meditando putauí huius questionis solutionem egredi ex his que continentur in .x.^o lib.^o Euclidis; et ob hoc super ipso .x.^o Euclidis accuratius studui, adeo quod sui teorematata ipsius memorie commendauí, et ipsarum intellectum comprehendi. Et quia difficilior est antecedentium et quorundam sequentium librorum Euclidis, ideo ipsum x^m librum glosare incepti, reducens intellectum ipsius ad numerum, qui in eo per lineas et superficies demonstratur; qui liber .x.^o tractat de diuersitatibus xv. linearum rectarum, quarum .xv. linearum due uocantur rite, seu ratiocinate.


L.^o XV.

Relique. xiiij. dicuntur aloge, siue iratiocinate. Ex his duobus ritis una dicitur riti, seu ratiocinata longitudine et potentia. Alia uero potentia solum. Per primam ex his duabus intelligitur numerus, qui potest numerari, vt unus, duo, tres et ceteri, uel partes unitatis, ut medietas: tertia et quarta et cetera fractiones; qui omnes sunt radices | quadratorum numerorum. Per secundam intelliguntur radices numerorum ratiocinatorum non quadratorum. Vnde potentia earum radicum numeratur, et ipse radices numerari non possunt. Et ideo uocantur numeri surdi. Et ex xiiij.^o predictis lineis prima est simplex, que uocatur media, per quam intelligitur radix radices numeri non quadrati. Et ex reliquis sex sunt radices numerorum binomiorum, hoc est duorum nominum. Relique sunt radices recisorum. Ex duobus quidem nominibus sunt numeri compositi ex numero et radice, uel ex duabus radicibus; que compositio fit sex modis. Recisus quidem numerus dicitur residuum, quod est inter numerum et radicem, uel inter duas radices; quod etiam fit sex alijs modis, ut Euclides dicit.

fol. 2 recto.

xiiij. 112

cui applicetur ... ex numeris » (fol. 2 recto, lin. 16-35 e margine inferiore; pag. 228, lin. 29 — pag. 229, lin. 2).



Et cum studiose super hos quindecim numeros, et super eorum diuersitates cogitarem, inueni nullum ipsorum congruere posse uní ex .x. radicibus supradictis, que cum duobus quadratis et cubo sint .xx., ut in sequentibus geometrice demonstratur.

ADiaceat quidem linea .ab. pro una ex dictis decem radicibus, cui applicetur superficies recti angula .bd. latitudinem faciens rectam .dg., que sit .x. Et recte quidem .bg. aplicetur superficies rectiangula .eg. equalis cubo, qui fit a numero .ab.

Rursus recte .ez. aplicetur paralilogramum (sic) orthogonium .iz. equale duobus quadratis, qui fiunt a numero .ab.; erit ergo tota .at. superficies rectiangula et equalis .xx.: sunt enim anguli .abg. et .gbe. recti. Quare indirecto est linea .be. linee .ba. Similiter demonstrabitur indirecto esse linea .ei. linee .eb. Quare tota .ai. linea recta est et continua. Similiter et linea .dt. est recta; paralilogramum ergo est superficies .at., et est orthogonium, cum omnes anguli ipsius sint recti. Et est .x. una queque linearum .ad. .bg. .ez. .it. Verum quoniam linea .ab. est una ex suprascriptis .x. radicibus, erit superficies .ag. equalis .x. radicibus predictis, cum linea .bg. sit .x. Siquidem et superficies .bz. est equalis cubo, qui fit á radice .ab.; et superficies itaque .et. est equalis duobus quadratis, quorum unusquisque fit ab eadem radice .ab. Ergo tota superficies .at. continetur ex uno cubo et ex duobus quadratis et x radicibus; qui omnes coniuncti esse .xx. proponuntur. Quare superficies .at. est .xx. Et quoniam


unumquodque laterum $.ad.$ et $.it.$ est $.x.$, erit unumquodque laterum $.ai.$ et $.dt.$ duo. Cum superficies $at.$ sit $.xx.$ Dico primum itaque radicem $.ab.$ esse non posse ex numeris |
 ratiocinatis, neque ex radicibus ratiocinatorum, uel ex radicibus radicum ratiocinatorum, |
 seu ex sex numeris coniunctis, aut ex sex numeris residuis suprascriptis, neque ex ra-
 dicibus coniunctorum uel recisorum. Et si possibile est, esto primum radix $.ab.$ ex nu-
 meris, qui sunt ratiocinati longitudine et potentia. Et quoniam tota $.ai.$ est duo, et
 $.ab.$ minor est quam $.ai.$; ergo radix $.ab.$ minus est binario. Et quia positum est, ipsam
 $ab.$ esse ex numeris ratiocinatis; aut enim est integer numerus $.ab.$ aut fractus: esto
 prius integer, si est possibile. Et quoniam nullus numerus integer est minor binario
 nisi unitas, erit ergo radix $.ab.$ unum. Quare superficies $bd.$ erit $.x.$; et cubus, qui fit
 ab unitate $.ab.$, scilicet superficies $.dz.$ erit unum. Item et duo quadrati, qui sunt ab
 unitate $.ab.$, scilicet superficies $.iz.$ erit duo: quare tota superficies $.at.$ erit $.xiii.$ tan-
 tum; sed superficies $.at.$ est $.xx.$ Non ergo radix $.ab.$ est numerus integer.

Similiter ostendetur quod numerus $.ab.$ non est fractus. Si fractus enim est numerus
 $.ab.$, cum cubicatus, egrediuntur ex illa cubicatione fractiones et fractiones fractionis
 et fractiones fractionis fractionis: et cum multiplicatur in se numerus $.ab.$, si est fractus,
 egreditur ex duplo multiplicationis eius fractio fractionis uel fractiones fractionis. Et
 cum multiplicatur idem numerus ruptus, scilicet $.ab.$ in $.bg.$, scilicet in $.x.$, egredietur
 quandoque fractio uel fractiones tantum, et quandoque egredietur numerus integer ex
 ipsa multiplicatione. Cum itaque multiplicatur $.ab.$ in $.bg.$, prouenit numerus $.bd.$ Et
 cum cubicatur numerus $.ab.$, prouenit numerus $.bz.$ Et cum duplicatur multiplicatio
 numeri $.ab.$ in se, prouenit numerus $.et.$ Ergo si fractus est numerus $.ab.$, occurrit
 quandoque in numero $.bd.$ fractio aliqua uel fractiones tantum; et in numero qui-
 dem $.bz.$ occurrunt fractiones et fractiones fractionis et fractiones fractionis fractionis;
 et in numero quoque $.et.$ occurrunt fractiones et fractiones fractionis tantum. Vnde
 si coniungantur fractiones, que sunt in numeris $.bd.$ et $.bz.$ et $.zi.$, nunquam ex ipso-
 rum coniunctione poterit numerus integer procreari. Quare si fractus est numerus
 $.ab.$, fractus erit numerus $.di.$, qui est $.xx.$; quod est inconueniens. Et si numerus $.bd.$
 est sine fractione, reliquus $.bt.$ erit similiter sine fractione, cum totus numerus $.ai.$
 sit $.xx.$; quod non proueniet, cum in numero $.et.$ sint fractiones et fractiones fra-
 ctionis, et in numero $.bz.$ sint fractiones et fractiones fractionis et fractiones fra-
 ctionis fractionis. Non ergo fractus est numerus $.ab.$, neque integer.

Ostendam rursus impossibile esse quod numerus $.ab.$ sit radix alicuius numeri ra-
 tiocinati. Ducatur quidem $.ab.$ in se, et proueniat numerus $.bk.$; et ex $.bk.$ in $.ba.$
 prouenit superficies rectiangula $.ak.$; que superficies est equalis cubo, qui fit a nu-
 mero $.ab.$ Quare superficies $.ka.$ equalis est superficiei $.bz.$ Equalium uero et unum
 uni equalem habentium angulum parallilogramorum contrarie potiuntur latera, que
 circa equales angulos subtenduntur, ut in $.vi.$ ^{to} Euclidis reperitur. Ergo est sicut
 $.gb.$ ad $.bk.$, ita $.ab.$ ad $.bc.$ Et cum quatuor quidem quantitates proportionales sunt,
 fueritque sicut prima ad secundam, ita tertia ad quartam; et prima fuerit secunde
 commensurabilis, et tertia quarte commensurabilis erit, ut in $.x.$ ^o Euclidis reperitur.
 Est enim recta $.ab.$ radix numeri. Quare quadratus, qui fit ab ea, scilicet numerus
 $.bk.$, est ratiocinatus; et $.gb.$ est decem, qui est ratiocinatus; ergo primus numerus

fol. 2 verso.

Ostendam rursus ... $.ab.$ in se (fol. 3 recto, lin. 1-33 e margine superior- ed inferiore; pag. 229, lin. 33 — pag. 230, lin. 17).



fol. 3 recto.


g.b. commensurabilis est secundo *bk.* Quare et *ab* numerus numero *be* commensurabilis est. Est enim *ab* radix numeri ratiocinati. Quare et *be.* est radix numeri ratiocinati. Et quia *ab.* commensurabilis est *be;* erit ergo *ab.* toti *ae.* commensurabilis. Quare *ae.* est radix numeri ratiocinati, et est commensurabilis potentia solum toti *ai.* numero, scilicet binario. Quare si a binario *ai.* auferatur radix *ae.,* qui sunt potentia solum ratiocinati, remanebit *ei.* abscisio, siue recisum; quod inratiocinatum esse ab Euclide in *x.*^o demonstratur. Sed quia ex ductu *ab.* inse provenit numerus ratiocinatus, scilicet dimidium superficiei *et.;* erit ergo tota superficies *et.* ratiocinata, cuius unum latus *ez.* est ratiocinatum, quod est decem. Quare latus *ei.* est ratiocinatum; quod superius ostensum est esse inratiocinatum. Vnde impossibile est quod radix *ab.* sit radix numeri ratiocinati, ut predixi.

Aliter quia linea *ae.* est radix numeri ratiocinati, ut ostensum est; et linea *ez.* est numerus ratiocinatus, erit superficies *de.* radix numeri; et superficies *et.* est numerus ratiocinatus. Quare tota superficies *di.* constat ex numero in ratiocinato et ratiocinato; quod est inconueniens, cum superficies *di.* sit *xx.* Amplius dico quod radix *ab.* non est radix radice alicuius numeri; sed si possibile est. Esto *ab.* radix radice alicuius numeri ratiocinati; et ex ductu item *ab.* inse proveniat *bk.;* et ex *ab.* in *bk.* provenit superficies *ka.,* que est equalis superficiei *bz.,* hoc est cubo, qui fit a radice *ab.* Quare est sicut *gb.* ad *bk.,* ita et *ab.* ad *be.* Et quoniam *ab.* est radix radice numeri ratiocinati; erit ergo *bk.* radix radice numeri ratiocinati. Quare *gb* et *bk* numeri commensurabiles sunt potentia solum; et *ab* et *be* commensurabiles sunt similiter potentia tantum. Media enim est linea *ab,* hoc est radix radice numeri ratiocinati. Media ergo erit et linea *be.,* et incommensurabilis linee *ba.* longitudine. Quare tota *ae* sit ex duabus medijs potentia solum commensurabilibus; ergo *ae.* est una ex duabus bimedialibus lineis, scilicet radix unius ex compositis numeris supradictis. Item ex ductu *ab.* inse provenit dimidium superficiei *et.,* scilicet superficies *li.;* que superficies applicata est linee ratiocinate *le.,* que est quinque. Et quia quod a media secundum ritim et ductum latitudinem facit ritim et incommensura-

bilem ei cui adiacet longitudine. Riti ergo est recta *ei.,* et incommensurabilis recte *le.* longitudine; ergo radix numeri ratiocinati est linea *ei.,* et est incommensurabilis linee *ai.* longitudine; potentia enim solum sunt commensurabiles. Quare reliquum *ae.* recisum est, hoc est abscisio. Nulla enim abscisio est binomia, ut in eodem *x.*^o reperitur. Quare cum superius ostensa sit linea *ae.* esse bimedialis, que modo inuenta est abscisio; et quia nullum recisum bimediale constat, lineam *ab.* non posse esse radicem radice numeri ratiocinati; quod oportebat ostendere. Ostendam rursus, unam ex predictis radicibus, scilicet lineam *ab.,* esse non posse aliquam ex lineis compositis uel depositis, nec ex earum radicibus. Sed antequam ad huius rei ^{primam} probationem perueniam, uolo proprietates ipsarum linearum denotare. Per primam quidem ex sex lineis compositis intelligitur compositum ex numero et radice, cuius numeri potentia superhabundat potentiam radice secundum quantitatem alicuius numeri quadrati: ut si componatur quaternarius cum radice septenarij, potentia quaternarij est *xvi.,* et potentia radice de *.vij.* est *.vii.;* et sic potentia quaternarij addit *.viii.* super potentia radice de *.vii.;* qui nouenarius quadratus est, et eius radix

fol. 3 verso.

• proveniat *bk.* quaternarij • (fol. 3 verso, lin. 1-31 e 32; pag. 230, lin. 47-42).



est .iii. Per secundam uero intelligitur compositio | radicis et numeri, cuius radicis quadratus potest super quadratum ipsius numeri secundum quantitatem alicuius numeri habentis proportionem ad quadratum ipsius radicis, eam quam habet quadratus numerus ad quadratum numerum: ut si maius nomen sit radix de .cxii., minus sit .vii., tunc residuum quod est á quadrato septenarij, scilicet á xl. viii. in .c.xii., idest lxiii., habet proportionem ad .cxii., sicut quadratus numerus .viii. ad quadratum numerum .xvi. Per tertiam quoque intelligitur compositio duarum radicum diuersorum numerorum non habentium proportionem adinuicem sicut quadratus numerus ad quadratum numerum; et maius nomen potest plus minore, quod a commensurabili sibi longitudine, hoc est quod differentia, que est inter utrumque quadratum ipsarum radicum, habeat proportionem ad quadratum maioris radicis, sicuti quadratus numerus ad quadratum numerum: ut si primum nomen fuerit radix de .xviii., secundum de .x., differentia, que est a .xviii. usque in .x., scilicet .viii., habet proportionem ad xviii., eam quam habet quadratus numerus .iiii. ad quadratum numerum .xviii.

Per quartam siquidem intelligitur compositum ex numero et radice, qui numerus potest plus ipsa radice, eo quod ab incommensurabili sibi longitudine, hoc est quod differentia, que est inter quadratum ipsius numeri et quadratum radicis, non sit quadratus numerus, ut accidit de quaternario et radice sexnarij. Per quintum autem intelligitur compositum ex radice alicuius numeri non quadrati, et ex aliquo numero, in quo quadratus radicis potest plus quadrato illius numeri secundum quantitatem numeri non habentis proportionem ad quadratum radicis, sicuti quadratus numerus ad quadratum numerum, ut compositum ex radice sexnarij et ex binario. Per sextum namque intelligitur compositum ex duabus radicibus diuersis, quarum maior potest plus minore secundum quantitatem numeri non habentis proportionem ad quadratum maioris radicis, sicuti quadratus numerus ad quadratum numerum, ut est compositum ex radice octonarij et radice quinarij: horum quippe sex binomiorum radices habentur ex ordine sic. Primi quidem binomij radix est aliqua ex predictis sex lineis binomij; quia cum multiplicatur numerus binomialis inse, nimirum ex ipsa multiplicatione primum binomium surgit. Radix quippe secundi binomij dicitur bimedialis prima, que componitur ex duabus radicibus radicis potentia solum commensurabilibus | numerum continentibus: hoc est cum multiplicatur una earum in aliam, prouenit inde numerus ratiocinatus: ut si prima fuerit radix radicis de .viii., et alia radix radicis duorum, prouenit ex earum multiplicatione radix radicis de .xvi., scilicet ii. Tertij autem binomij radix est linea, que dicitur bimedialis secunda, que componitur ex duabus radicibus radicis potentia solum commensurabilibus medium, scilicet radicem numeri continentibus; hoc est cum multiplicatur una earum in aliam, id quod prouenit, est radix numeri non quadrati: ut si prima fuerit radix radicis .xii. Secunda radix radicis trium, ex quarum multiplicatione surgit in radicem sexnarij, scilicet in radicem radicis de .xxxvi. Quarti quoque binomij radix est linea, que dicitur maior, que componitur ex duabus lineis potentia incommensurabilibus, quarum quadrati insimul coniuncti faciunt numerum ratiocinatum; et ex multiplicatione unius in aliam prouenit numerus inratiocinatus, scilicet radix numeri. Vt si prima fuerit radix de .iiii. et ex radice de .xiii., et alia fuerit radix de .iiii. minus radice de xiii. Quinti siquidem binomij radix

3^a4^a5^a

.vi.

.R² p¹ Bino¹2¹ .B. R²

fol. 4 verso.

.Bi. 3¹ R².Bi. 4¹ R²
L² Maiorlis. 2
Bime plis. 2
Bime

est linea, que dicitur riton et medium potens, hoc est super ratiocinatum et inratiocinatum numerum, que componitur ex duabus lineis potentia incommensurabilibus, quarum quadrati insimul iuncti faciunt radicem numeri; et ex multiplicatione unius in aliam prouenit numerus ratiocinatus. Vt si prima fuerit radix radicis de .xx. et ex duobus, et alia fuerit radix de .xx. minus .ii. Sexti autem binomij radix est linea, que dicitur potens super duos inratiocinatos numeros, que componitur ex duabus lineis potentia incommensurabilibus, quarum quadrati insimul iuncti faciunt numerum inratiocinatum; et ex multiplicatione unius in aliam surgit similiter numerus inratiocinatus: vt si prima fuerit radix radicis de xxiii. et de radice de vii., et alia fiat radix radicis de xxiii. minus radice de .vii., hoc est cum multiplicatur prima ipsarum duarum linearum inse, prouenit radix de xxiii. et radix de vii.; et cum multiplicatur secunda inse, prouenit radix de xxiii. minus radice de .vii.

Similiter .vi. numeri, qui dicuntur recisi seu apothami, imitantur seriem sex binomiorum suprascriptorum ordinate. Nam primum recisum constat ex numero minus radice. Secundum ex radice minus numero. Tertium ex radice minus radice. Quartum constat ex nominibus primi. Quintum ex nominibus secundi. Sextum ex nominibus tertij. Sed in tribus prioribus recisis maiora nomina possunt plus minoribus eo, quod a commensurabili ipsis longitudine in reliquis quod ab incommensurabilibus.


Nam radix primi recisi est aliquod suprascriptorum recisorum. Radix uero secundi est recisum bimedialis prime, hoc est radix radicis minus radice radicis, ex quarum multiplicatione prouenit numerus ratiocinatus.

Tertij autem radix est recisum bimedialis secundi, hoc est radix radicis minus radice radicis, ex quarum multiplicatione prouenit numerus inratiocinatus. Quarti quoque recisi radix est, que constat ex residuo, quod est inter duas lineas, que sunt potentia incommensurabiles, ex quibus componitur linea maior. Quinti itaque recisi radix est, que constat ex residuo, quod est inter duas lineas potentia incommensurabiles, ex quibus componitur linea potens super ratiocinatum et inratiocinatum.

Sexti namque recisi radix est, que constat ex residuo, quod est inter duas lineas potentia incommensurabiles, ex quibus componitur linea potens super inratiocinatum et inratiocinatum: his omnibus terminatis dico, nullum ex predictis numeris posse congrui uni ex .x. radicibus suprascriptis. Ad que demonstranda reiterabo figuram. Et si possibile est, numerus .ab., qui est una ex .x. radicibus suprascriptis, sit unum ex .iiii.^{or} binomijs, qui componuntur ex numero ratiocinato et radice numeri non quadrati; et diuidatur numerus .ab. in nomina, et sit .bc. numerus, et .ca. sit radix numeri. Et multiplicetur .ba. inse, et proueniat .bk.; et ex .ab. in .bk. prouenit superficies .ak., que est equalis superficiei .bz., scilicet cubo, qui fit á linea .ab. Comuniter addatur superficies .db., erit tota superficies .de. equalis superficiei .dk.; que superficies continetur ex numero et radice tantum, ut insequentibus demonstratur. Quoniam linea .ba. diuisa in duo in puncto .c., erunt duo quadrati linearum .bc. et .ca. cum duplo .bc. in .ca. equales quadrato totius .ba. Quadrati enim .bc. et .ca. sunt ratiocinati, cum .bc. sit numerus, et .ca. sit radix numeri ratiocinati. Quare ipsi duo quadrati sunt numerus qui fit .bf. Ergo ex duplo .bc. in .ca. prouenit .fk., cum .bk. proueniat ex .ba. inse: et quia ex duplo .bc. in .ca. prouenit .fk.; et .bc. est numerus. Est proportio

fol. 5 recto.

* Tertij autem linea .fo. * (fol. 5 recto, lin. 7-36 e margine inferiore; pag. 232, lin. 22 — pag. 233, lin. 3).




$.fk.$ ad $.ca.$, sicut numerus ad numerum. Quare commensurabilis est $.fk.$ linee $.ca.$ Dividatur itaque superficies $.dk.$ in quatuor superficies rectiangularas $.go.$ et $.ol.$ et $.do.$ et $ok.$ Et quia $.gb.$ et $.bf.$ sunt numeri; numerus est ergo tota $.gf.$ Est enim et linea $.fo.$ numerus, cum sit equalis linee $.bc.$ Quare superficies $.go.$ est ratiocinata: et quia $.fk.$ est commensurabilis linee $.ca.$; et linea $.op.$ commensurabilis est linee $.ca.$, cum sit equalis linee $.fk.$ Quare superficies $.ol.$ est ratiocinata. Numerus ergo sunt superficies $.go.$ et $.ol.$ Rursus quia numeri sunt $.no.$ et $.of.$; et $.fk.$ est commensurabilis $.ca.$ Commensurabiles sunt superficies $.do.$ et $ok.$ Quare superficies $.do.$ et $ok.$ constant ex radicibus sibi inuicem commensurabilibus, cum numeri sint $.no.$ et $.of.$, et possunt congregari et reduci ad radicem unam; quia cum congregantur radices sibi inuicem commensurabiles, progreditur ex eorum congregazione (*sic*) radix numeri tantum: ergo tota superficies $.dk.$ constat ex numero et radice; cui superficiei equalis est superficies $.de.$, cum equalis sit superficies $.zb.$ superficiei $.bl.$ Ergo et superficies $.de.$ constat ex numero et radice: similiter et superficies $.et.$ constat ex numero et radice, cum sit duplum numeri $.bk.$ Quare tota superficies $.di.$ constat ex numero et radicibus; ergo non est numerus spatium $.di.$, cum sit duarum (*sic*) uel plurium nominum. Non ergo linea $ab.$ est ex m^{or} binomialibus compositis ex numero et radice. Sed si possibile est, esto rursus linea $ab.$ binomialis tertia uel sexta, scilicet composita ex duabus radicibus diuersis, cuius nomina sint item $bc.$ et $ca.$ Quare et ex $ba.$ inse prouenit binomium primum, quod est $.bk.$; quo ducto in $ba.$ prouenit spatium $.bl.$, quod est equale cubo $.bz.$ Quare tota superficies $.dk.$, scilicet superficies $.da.$ $.eg.$, constat ex ducto $.gk.$ in $.kl.$, hoc est ex ducto numero et radice in duabus radicibus diuersis. Nam $.kl.$ equalis est linee $.bca.$ Sed cum multiplicatur numerus et radix in radicibus diuersis, nimirum diuerse radices proueniunt. Quare tota superficies $.de.$ constat ex radicibus diuersis. Sed superficies $.et.$ constat ex numero et radice, scilicet ex duplo $.bk.$ Quare tota superficies $.di.$ constat ex numero et radicibus; quod est inconueniens, cum superficies $.di.$ sit $.xx.$ Non ergo linea $ab.$ est binomia. Similiter demonstrabitur, non esse aliquod ex sex recisis supradictis. Quia si recisum esset linea $ab.$, eisdem demonstrationibus que demonstrata sunt in binomij, ostendetur, tota superficies $.di.$ constare aut ex numero minus radicibus, aut ex radicibus minus numero, ex quibus nunquam poterit $.xx.$ procreari. Dico rursus, linea $ba.$ esse non posse ex radicibus binomiorum uel recisorum: ostensum est enim, linea $ab.$ esse non posse binomium uel recisum. Quare $ab.$ non erit radix primi binomij uel primi recisi, cum radix primi binomij sit binomium, et radix primi recisi sit recisum.

Sed si possibile est, linea $ba.$ esto radix secundi binomij. Ergo erit bimedialis prima; cuius nomina sint iterum $bc.$ et $ca.$, et proueniat iterum ex ductu $ab.$ inse numerus $bk.$, qui est binomium secundum, cuius minus nomen sit $bh.$, quod est numerus. Quare tota $gk.$ constat ex numero et radice. Ergo cum multiplicatur $gk.$ in $kl.$, hoc est in $ba.$, unde prouenit superficies $.de.$, que est equalis superficiei $.dk.$, tunc multiplicatur numerus et radix in radice numeri et radice; ex qua multiplicatione prouenit radix numeri et radice; et fit ipsa multiplicatio sic: multiplicatur tetragonum numeri $.gk.$ in numerum $.bk.$, cuius multiplicationis radix est quesitum. Ergo superficies $.de.$ est radix numeri et radice; et superficies $.et.$ constat constat (*sic*) ex

fol. 5. verso.

« numerus, cum demonstrata » (fol. 5 verso, lin. 1-32 e margine superiore: pag. 233, lin. 4-29).



fol. 6 recto.

numero et radice, cum sit duplum numeri bk . Ergo tota superficies di constat ex numero et radice, et ex radice numeri et radices (*sic*); ex quorum coniunctione nunquam poterit numerus ratiocinatus procreari.

Quare impossibile est, ab ^{linea} esse radix secundi binomij; nec etiam erit quarti uel quinti binomij; quod eisdem demonstrationibus demonstratur, cum ipsa binomia constant similiter ex numero et radice.

Sed si possibile est, esto linea ab radix tertij uel sexti binomij; et multiplicetur ab in se, et proueniat bk , quod est compositum ex radicibus duorum diuersorum numerorum. Quare tota gk est trium nominum; que multiplicata in kl , scilicet in radice numeri bk , proueniet radix radicis numeri et radicum pro superficie de : sed superficies et constat ex duabus radicibus. Quare tota superficies di est iratiocinata. Non ergo linea ab est radix alicuius binomij. Similiter eisdem demonstrationibus demonstrabitur, quod linea ab non est radix alicuius recisi; quia si esset radix secundi uel quarti aut quinti recisi, esset itaque superficies de radix numeri minus radice. Vel radix radicis minus numero, scilicet quod superficies de esset radix secundi uel quarti aut quinti recisi; et superficies et esset numerus minus radice, uel radix minus numero; qui insimul nequaquam faciunt numerum ratiocinatum. Similiter si linea ab esset radix tertij uel sexti recisi, esset itaque superficies de radix radicis numeri minus radice radicum. Vel esset radix radicis radicum minus radice numeri; ex qua cum superficie et nullatenus posset numerus ratiocinatus prouenire. Ergo linea ab , ut demonstratum est, non est aliqua ex quindecim lineis, de quibus fit mentio in x^o euclidis, ut predixi. Et quia hec questio solui non potuit in aliquo suprascriptorum, studui solutionem eius ad propinquitatem reducere. Et inueni unam ex x radicibus nominatis, scilicet numerum ab , secundum propinquitatem, esse unum et minuta $xxii$. et secunda vii . et tertia $xlvi$. et quarta $xxxiii$. et quinta $iiii$. et sexta xl .

fol. 6 verso.

De tribus hominibus pecuniam comunem habentibus.

TRES homines habebant pecuniam comunem, de qua medietas erat primi, tertia secundi. Sexta quoque pars tertij hominis; et cum eam in tutiori loco habere uoluissent, ex ea unusquisque cepit fortuitu; et cum totam ad tutiorem locum deportassent, primus, ex hoc quod cepit, posuit in comune medietatem, secundus tertiam, tertius sextam. Et cum ex hoc, quod in comune positum fuit, inter se equaliter diuisissent, suam unusquisque habuit portionem; queritur quanta fuit illa pecunia, et quot unusquisque ex ea cepit. Hec itaque questio, domine serenissime imperator, in palatio uestro pisis coram uestra maiestate á magistro Iohanne panormitano mihi fuit proposita. Super cuius questionis solutionem cogitans, tres modos in soluendo ipsam inueni, quos in libro uestro, quem de numero composui, patenter inserui.

Sed cum nuper solutionem eiusdem questionis intenderem. Alium nimis pulchrum modum inuenj, quem serenitati uestre pandere, de uestra benignitate confisus, curauj. Sed antequam ad eius solutionem ueniam, quedam introductoria uestre maiestati proponere dignum duxi. Videlicet cum de aliqua re medietas tollitur, illa medietas equalis est relique medietati que remanet. Similiter si de aliqua re tertia tollitur pars, ipsa tertia reliquarum duarum tertiarum que remanent, existit medietas. Rursus cum

de aliqua re tollitur sexta pars, illa sexta pars reliquarum quinque sextarum quinta pars est. His itaque denotatis, pro qualibet tertia parte quantitatis ab ipsis tribus hominibus posite in comuni, posui rem. Et quia proponitur, unusquisque, habita ipsa re, suam habuisse portionem, ex necessario sequitur post illud quod ipsi tres posuerunt in comuni, primo remansisse totius comunis pecunie medietatem minus ipsa re. Secundo tertiam minus eadem re. Tertio homini sextam eiusdem pecunie partem, eadem re diminuta. Et quia primus posuit in comune medietatem ex toto eo quod ceperat; et illa medietas fuit equalis residuo quod ei remansit; si duplicabitur ipsius residuum, scilicet medietas dictę pecunię minus re, habebitur pro toto eo, quod ipse primus homo cepit, tota pecunia semel minus duabus rebus. Item quia secundus homo posuit in comune tertiam partem ex hoc quod ceperit; et illa tertia pars fuit medietas eius quod ei remansit, scilicet de tertia parte totius pecunie minus re; si super ipsam tertiam partem dicte pecunie minus re addatur medietas eorum, scilicet sexta pars eiusdem pecunie minus medietate rei, egredietur pro toto hoc, quod cepit secundus homo, medietas totius pecunie, re una et dimidia diminuta. Adhuc quia tertius homo, ex hoc quod cepit, posuit in comune sextam partem; et illa sexta pars fuit quintum sui residui, scilicet sexte partis totius pecunie minus re; si super ipsam sextam partem minus re addatur quinta pars eorum, scilicet. $\frac{1}{5}$ pars pecunie minus quinta parte rei, habebitur pro hoc, quod cepit tertius homo, quinta pars dictę pecunię, re una et quinta rei diminuta. Quare si addatur tota pecunia minus duabus rebus, quam cepit primus, cum medietate eiusdem pecunię minus una re et dimidia, quam cepit secundus, et cum quinta parte eiusdem pecunie minus una re et quinta unius rei, quam cepit tertius, habebitur pro tota eorum pecunia semel eadem pecunia et septem decime eiusdem pecunie minus $\frac{1}{10}$ rebus et septem decimis unius rei. Quare patet quod septem $\frac{1}{10}$ totius pecunie equantur quatuor rebus et septem decimis rei. Et quia est sicut una quantitas ad aliam, ita quodlibet multiplex unius ad idem multiplex alterius. Erit ergo decuplum septem decimarum eiusdem pecunie, scilicet septuplum eiusdem pecunie equale decuplo quatuor rerum et septem decimarum, scilicet rebus XLVII. Vnde si ponatur, rem esse .VII., tota pecunia erit .XLVII.; quia septuplum ipsius pecunie, scilicet de XLVII., equabitur .XLVII. rebus, scilicet multiplicationi de XLVII. in .VII. Nam septies XLVII. sunt quantum XLVII. vicibus .VII. : et quia primus cepit totam pecuniam minus duabus rebus; si de tota pecunia, que est .XLVII., auferantur 2 res, scilicet .XIII., remanebunt .XXXIII. pro eo quod cepit primus homo. Item quia secundus cepit medietatem eiusdem pecunie minus una re et dimidia; si de medietate pecunie, que est $\frac{1}{2}$.XLVII. auferatur res una et dimidia, scilicet $\frac{1}{2}$.XIII., remanebunt .XIII. pro eo quod cepit secundus homo. Rursum quia tertius homo cepit quintam partem dictę pecunie minus re una et quinta. Si de quinta parte totius pecunie, que est $\frac{1}{5}$.XLVII., auferatur res et quinta pars rei, scilicet $\frac{1}{5}$.XXXIII., remanebit .III. pro eo quod cepit tertius homo. Additis ergo .XXXIII., que cepit primus homo, cum .XIII., que cepit secundus, et cum uno, quod cepit tertius, erunt 47., ut pro tota pecunia inuentum fuit. Verbi gratia : de 33, que cepit primus, posuit in comune medietatem, scilicet $\frac{1}{2}$ 16., et remanserunt ei alia $\frac{1}{2}$ 16. Secundus uero homo de suis .13., que cepit, posuit in comune tertiam partem, scilicet

fol. 7 recto.

2^{us} hō3^{us} hō

s. fca eq.^{one}
 Decu.^{lū} $\frac{7}{10}$ ē
 Sep.^{lū} toti^{us}

2 re.^s 14

fol. 7 verso.

$\frac{1}{2}$ 4, et remanserunt ei $\frac{2}{3}$ s. Tertius namque homo, de uno quod cepit, posuit in comune sextam partem, scilicet $\frac{1}{6}$ unius, et remanserunt ei $\frac{5}{6}$ unius. Additis ergo $\frac{1}{2}$ 16, que posuit primus homo in comuni, et $\frac{1}{3}$ 4, que posuit secundus, et $\frac{1}{6}$ unius, quam posuit tertius, egredientur pro tota summa .21.; quorum tertia pars, que est .7., si addantur cum $\frac{1}{2}$ 16., que remanserunt primo, et cum $\frac{2}{3}$ 8, que remanserunt secundo, et cum $\frac{5}{6}$ unius, que remanserunt tertio, habebit primus homo medietatem totius pecunie, scilicet $\frac{1}{2}$ 23. Et secundus homo habebit tertiam partem eiusdem pecunie, scilicet $\frac{2}{3}$ 15. Et tertius homo habebit sextam partem eiusdem pecunie, scilicet $\frac{5}{6}$ 7. Et sic, secundum hunc modum, solutiones similium questionum de facili haberi possunt.

De quinque numeris reperiendis ex proportionibus datis.

SOLVAM etiam per consimilem modum utramque questionem, quas per robertinum aggiū (sic) domnicellum uestrum uestre maiestati transmisi; quarum prima fuit de quinque numeris, ex quibus primus cum medietate secundi et tertij et quarti facit quantum secundus cum tertia parte tertij et quartj et quinti numeri, et quantum tertius cum quarta parte quartj et quintj et primj numeri, nec non et quantum quartus cum quinta parte quintj et primj et secundi numeri, et adhuc quantum quintus numerus cum sexta parte primj et secundi et tertij numeri. Ad hoc itaque inveniendum, posui pro primo numero causam, et pro quinto rem, et pro numero, in quo, subscriptis conditionibus, sibi inuicem equantur numeri predicti, fortuito posui .17. Et quia primus numerus, quem causam esse posui, cum medietate secundi et tertij et quarti numeri surgit in .17., oportet inter secundum et quartum numerum esse duplum de .17. minus causa, scilicet .34. minus duabus causis; quia medietas de 34, minus duabus causis, est .17. minus causa: que si addantur cause, scilicet primo numero, faciunt .17: deinde super .34 minus duabus causis, que sunt summa secundi et tertij et quarti numeri, addidi rem, scilicet quintum numerum, et fuerunt in summa 34 et res minus duabus causis; de quibus extraxi dragmas .17., scilicet quantitatem secundi numeri et tertie partis tertij et quarti et quinti numeri, remanserunt pro duabus tertijs tertij et quarti et quinti numeri dragme .17. et res una minus duabus causis. Et quia cum de aliqua quantitate aufertur tertia pars, illa tertia pars | est medietas residuj; quare super .17. et rem minus duabus causis addidi medietatem eorum, scilicet $\frac{1}{2}$ 8, et medietatem rei minus una causa; et fuit totum illud quod concretum est $\frac{1}{2}$ 25 et res una et dimidia minus tribus causis; et hec est summa tertij et quarti et quinti numeri, quam extraxisti ex summa secundi et tertij et quarti et quinti numeri, scilicet de dragmis 34 et re una minus duabus causis; et fuit illud quod remansit pro quantitate secundi numeri dragme $\frac{1}{2}$ 8 et causa una minus medietate rei. Deinde cum summa tertij et quarti et quinti numeri, scilicet cum dragmis $\frac{1}{2}$ 25 et re una et dimidia minus tribus causis, addidi primum numerum, scilicet causam, et habui dragmam $\frac{1}{2}$ 25 et rem unam et dimidiam minus duabus causis pro quantitate tertij et quarti et quinti et primi numeri: de qua quantitate extraxi dragmas .17., scilicet tertium numerum, et quartam partem quarti et quinti et primi numeri, et remanserunt pro tribus quartis quarti et quinti et primi numeri dragme $\frac{1}{2}$ 8 et res una et dimidia minus duabus causis. Et quia cum de aliqua quantitate tollitur quarta pars, illud quod tollitur est tertia pars ex eo quod remanet; quare super $\frac{1}{2}$ 8 et re

una et dimidia minus duabus causis addidi tertiam partem eorum; et sic habuit pro summa quarti et quinti et primi numeri dragmas $\frac{1}{3}$ 11 et duas res minus causis $\frac{2}{3}$ 2; quam summam extraxi de summa tertij et quarti et quinti et primij numeri, scilicet de $\frac{1}{3}$ 25 et re una et dimidia minus duabus causis, et remanserunt pro quantitate tertij numeri dragme $\frac{1}{6}$ 14 et due tertie unius cause minus medietate unius rei. Deinde ex summa quarti et quinti et primij numeri, scilicet de dragmis $\frac{1}{3}$ 11 et duabus rebus minus causis $\frac{2}{3}$ 2, et extraxi quintum et primum numerum, scilicet unam rem et unam causam, et remanserunt pro quantitate quarti numeri dragme $\frac{1}{3}$ 11 et res una minus causis $\frac{2}{3}$ 3. Et quia quartus numerus cum quinta parte quinti et primi et secundi numeri facit dragmas .17. Aggregavi quintum et primum et secundum numerum, scilicet rem et causam et dragmas $\frac{1}{2}$ 8 et causam unam minus medietate unius rei; et sic pro summa quinti et primi et secundi numeri habui dragmas $\frac{1}{2}$ 8 et duas causas et medietatem rei: de quibus omnibus accepi quintam partem, scilicet dragmas $\frac{7}{10}$ 1, et $\frac{2}{5}$ unius cause et decimam partem unius rei, et aggregavi hoc super quantitatem quarti numeri, scilicet super $\frac{1}{3}$ 11 et re una minus causis $\frac{2}{3}$ 3; et fuit hoc totum dragme $\frac{1}{30}$ 13 et res una et decima minus causis $\frac{1}{15}$ 3., que equantur dragmis .17.: | et quia cum equalibus equalia adduntur, omnia fiunt equalia; si utrique parti addantur cause $\frac{4}{15}$ 3, erunt dragme $\frac{1}{30}$ 13 et $\frac{11}{10}$ unius rei equales causis $\frac{1}{15}$ 3 et dragmis .17.: et quia cum ab equalibus equalia auferuntur, que remanent, sunt equalia; si ab utraque parte auferuntur dragme $\frac{1}{30}$ 13, remanebunt $\frac{11}{10}$ unius rei equales causis $\frac{1}{15}$ 3 et dragmis 4 minus xxx^a unius dragme. Quare ut reducerem hec in equalitatem unius rei tantum, multiplicavi causas $\frac{1}{15}$ 3, dragmas 4 minus xxx^a per .10., et diuisi utramque multiplicationem per .11., et inueni quod res una equatur causis 3 minus xxx^a tertia parte unius cause et dragmis $\frac{20}{33}$ 3: seruavi hec, et addidi primum numerum cum secundo et tertio, scilicet causam unam cum dragmis $\frac{1}{2}$ 8, et causa una minus medietate rei, et cum dragmis $\frac{1}{6}$ 14 et duabus tertijs unius cause minus medietate unius rei, et habui dragmas $\frac{2}{3}$ 22 et causas $\frac{2}{3}$ 2 et minus una res: de quibus omnibus accepi sextam partem, et addidi eam super quintum numerum, scilicet super rem, et fuit totum illud, quod inde aggregatum est, $\frac{5}{6}$ unius rei et $\frac{1}{9}$ unius cause et dragme $\frac{7}{9}$ 3., que equantur dragmis .17.: quare ab utraque parte extraxi dragmas $\frac{7}{9}$ 3, et remanserunt $\frac{5}{6}$ unius rei et $\frac{1}{9}$ unius cause, que equantur dragmis $\frac{2}{9}$ 13: que ut reducerem ad equalitatem unius rei, multiplicavi per 6 $\frac{1}{9}$ unius cause, et dragmas $\frac{2}{9}$ 13 per 6; et quod ex utraque multiplicatione peruenit, diuisi per .5., et habui quod res una et $\frac{8}{15}$ unius cause equantur dragmis $\frac{13}{15}$ 15. Superius enim inueni quod res una equatur tribus causis minus xxx^a tertia parte unius cause et dragmis $\frac{20}{33}$ 3: quare cause 3 minus $\frac{1}{33}$ et $\frac{8}{15}$ unius cause et dragme $\frac{20}{33}$ 3 equantur dragmis $\frac{13}{15}$ 15. Nam cause 3 minus $\frac{1}{33}$ unius cause et $\frac{1}{15}$ eiusdem cause sunt in summa cause $\frac{83}{165}$ 3. Ergo cause $\frac{83}{165}$ 3 et dragme $\frac{20}{33}$ 2 equantur dragmis $\frac{13}{15}$ 15: unde si comuniter auferantur dragme $\frac{20}{33}$ 3, remanebunt cause $\frac{83}{165}$ 3 equales dragmis $\frac{13}{165}$ 12: unde hec omnia multiplicavi per 165, et habui quod cause 578 equantur dragmis 2023.: quare diuisi 2023 per 578, et prouenient pro quantitate unius cause, scilicet pro quantitate primi numeri, $\frac{1}{2}$ 3. Quem numerum ut reducerem in integrum, duplicavi omnes numeros suprascriptos, et habui pro primo numero .7., pro secundo .17. et unam causam minus medietate unius rei, et pro tertio $\frac{1}{2}$ 28 et duas tertias

unius cause minus medietate unius rei, et pro quarto numero habui $\frac{2}{3}$ 22 et rem unam minus causis $\frac{2}{3}$ 3.; et pro quinto numero habui tantum rem. Et quia inueni, rem equalem tribus esse causis | minus una xxx^a tertia et dragmis $\frac{20}{33}$ 3, duplicaui iterum has dragmas, et peruenerunt dragme $\frac{7}{33}$ 7; et sic res una equatur tribus causis minus $\frac{1}{33}$ unius cause et dragmis $\frac{7}{33}$ 7. Quare multiplicaui causas .3. minus $\frac{1}{33}$ unius cause per numerum unius cause, scilicet per .7., et addidi illud quod prouenit cum dragmis $\frac{7}{33}$ 7, et habui 28 pro quantitate rei, hoc est pro quantitate quinti numeri. De inde quia secundus numerus est .17. et causa una minus medietate rei, addidi .17. cum causa una, et fuerunt 24; de quibus extraxi medietatem rei, scilicet 14, remanserunt .10. pro secundo numero. Rursus quia tertius numerus est $\frac{1}{3}$ 28 et $\frac{2}{3}$ unius cause minus medietate rei, addidi duas tertias unius cause, scilicet de .7. cum $\frac{1}{3}$ 28, et habui .33.; de quibus eieci medietatem rei scilicet .14, remanserunt pro tertio numero .19. Item quia quartus numerus est $\frac{2}{3}$ 22 et res una minus tribus causis et $\frac{2}{3}$ unius cause, addidi rem, scilicet .28 cum $\frac{2}{3}$ 22, et prouenerunt $\frac{2}{3}$ 50; de quibus eieci causas $\frac{2}{3}$ 3, scilicet $\frac{2}{3}$ 25., remanserunt pro quarto numero 25. Et sic, ut uestre serenissime maiestati transmisi, primus numerus est .7., secundus .10., tertius 19. Quartus .25. Quintus .28.; et numerus, in quo equantur ipsi numeri, est 34.

De quatuor hominibus et bursa ab eis reperta, questio notabilis.

Secunda uero questio fuit de quatuor hominibus bizantios habentibus, qui bursam bizantium inuenerunt, ex quibus primus cum bursa excedit secundum et tertium hominem in duplo. Secundus tertium et quartum in triplo. Tertius quartum et primum in quadruplo. Quartus uero homo cum bursa excedit primum et secundum in quincuplo: hanc quidem questionem insolubilem esse monstrabo, nisi concedatur, primum hominem habere debitum: ad quod demonstrandum, ponam pro bizantijs primj hominis dragmam; qua addita cum bursa egredietur dragma una et bursa una, que sunt duplum bizantium secundi et tertij hominis: quare inter secundum et tertium hominem habetur equale medietatis burse et unius dragme; de qua medietate ponam, secundum hominem habere rem, remanet ergo pro bizantijs tertij hominis medietas burse et unius dragme minus una re: de inde addam bursam cum quantitate secundi hominis; et erit illud quod aggregabitur bursa una et res una, quorum tertia pars est equalis quantitatis bizantium tertij et quarti hominis. Ergo inter tertium et quartum hominem habent tertiam burse et unius rei; de qua tertia, si auferatur quantitas bizantium tertij hominis, scilicet medietas burse et unius dragme minus re una, remanebunt pro quantitate bizantium quarti hominis quatuor tertie unius rei minus sexta unius burse et medietate unius dragme: super que addam dragmam, scilicet quantitatem primi hominis, et habebunt inter quartum et primum hominem quatuor tertias unius rei et medietatem dragme | minus sexta parte unius burse: quod totum quadruplicabo, et prouenient quinque res et tertia et dragme .2. et minus $\frac{2}{3}$ unius burse, que equantur coniuncto quantitatis tertij hominis et burse. Nam tertius homo habet, ut superius inuenctum est, medietatem burse et unius dragme, re una diminuta: quibus si addatur bursa, erit bursa una et dimidia et medietas dragme minus una re, que equantur rebus $\frac{1}{3}$ 5 et dragmis 2. minus $\frac{2}{3}$ unius burse: quare si communiter addantur $\frac{2}{3}$ unius burse $\frac{1}{3}$ et res una, erunt burse $\frac{1}{3}$ 2 et medietas dragme, que equantur rebus

$\frac{4}{3}$ 6 et dragmis 2. Quare si communiter auferatur medietas dragme, remanebunt $\frac{43}{6}$ unius burse, que equantur rebus $\frac{4}{3}$ 6 et dragme $\frac{4}{2}$ 1. Quare ut redigantur hec ad quantitatem unius burse, multiplicabo res $\frac{4}{3}$ 6 et dragmam $\frac{4}{2}$ 1 per .6., et egredientur 38 res et dragme .9. diuidende per 13., exhibunt res 3 minus $\frac{4}{13}$ et $\frac{9}{13}$ unius dragme, que equantur uni burse: seruabo hec, et addam bursam cum quantitate quarti hominis, scilicet cum $\frac{4}{3}$ unius rei minus $\frac{4}{6}$ unius burse et medietate unius dragme, et habebō $\frac{4}{3}$ unius rei et $\frac{5}{6}$ unius burse minus medietate unius dragme, que equantur quincuplo quantitatis primi et secundi hominis, qui habent dragmam et rem; ex quorum quincuplo proueniunt quinque res et quinque dragme: ergo $\frac{4}{3}$ unius rei et $\frac{5}{6}$ unius burse minus medietate unius dragme equantur quinque rebus et quinque dragmis. Quare si communiter addatur medietas dragme, erunt $\frac{4}{3}$ unius rei et $\frac{5}{6}$ unius burse equales quinque rebus et dragmis $\frac{4}{2}$ 5. Quare si communiter auferatur $\frac{4}{3}$ unius rei, remanebunt res $\frac{2}{3}$ 3 et dragme $\frac{1}{2}$ 5, que equantur $\frac{5}{6}$ unius burse: quare ut redigam hec ad bursam unam, multiplicabo res $\frac{2}{3}$ 3 et dragmas $\frac{1}{2}$ 5 per 6, et egredientur res .22. et dragme .33.: quas diuidam per .5., et uenient res $\frac{2}{5}$ 4 et dragme $\frac{3}{5}$ 6, que equantur burse. Inuentum est superius quod tres res minus $\frac{4}{13}$ unius rei et $\frac{9}{13}$ unius dragme equari (sic) uni burse; ergo res $\frac{2}{5}$ 4 et dragme $\frac{3}{5}$ 6 equantur tribus rebus minus $\frac{4}{13}$ unius rei et $\frac{9}{13}$ unius dragme; quod est impossibile. Quia res $\frac{2}{5}$ 4 sunt plures rebus $\frac{42}{13}$ 2, et dragme $\frac{3}{5}$ 6 sunt plures de $\frac{9}{13}$ unius dragme. Vnde si concedatur, primum hominem habere debitum, inuenietur, secundum hanc inuestigationem, quod res $\frac{2}{5}$ 4 minus dragmis $\frac{3}{5}$ 6 equantur rebus $\frac{42}{13}$ 2 minus $\frac{9}{13}$ unius dragme. Vnde si communiter auferantur $\frac{9}{13}$ unius dragme, remanebunt res $\frac{42}{13}$ 2, que equantur rebus $\frac{2}{5}$ 4 minus dragmis $\frac{59}{63}$ 5. Quare si communiter addantur dragme $\frac{59}{63}$ 5, remanebunt res $\frac{2}{5}$ 4, que equantur rebus $\frac{42}{13}$ 2 et dragmis $\frac{59}{63}$ 5. Quare si communiter auferantur res $\frac{42}{13}$ 2, remanebunt res $\frac{84}{63}$ 1, que equantur dragmis $\frac{59}{63}$ 5. Et ut hec habeantur in integris numeris, multiplicabo utrumque numerum per 63, et egredientur res 96, que equantur dragmis 384. Ergo proportio rerum ad dragmas est sicut 96 ad 384; que proportio in minoribus numeris est sicut .1. ad 4.; ergo res una equatur quatuor dragmis. Vnde si ponam, rem esse .4., scilicet quantitatem secundi hominis, erit debitum primi biz. 1. Et quia inuenimus superius quod bursa equatur rebus $\frac{2}{5}$ 4 minus dragmis $\frac{3}{5}$ 6; si de rebus $\frac{2}{5}$ 4, que sunt biz. $\frac{3}{5}$ 17, auferantur dragme $\frac{3}{5}$ 6., hoc est biz. $\frac{3}{5}$ 6, remanebunt .11. pro bizantijs burse: et quia tertius homo habet medietatem burse minus medietate dragme et re una; si de medietate burse, scilicet de $\frac{4}{2}$ 5., auferatur res una et medietas dragme, scilicet $\frac{4}{2}$ 4, remanebit biz. 1 pro quantitate tertij hominis. Rursus quia quartus homo habet $\frac{4}{3}$ unius rei et medietatem unius dragme minus sexta parte unius burse; si de $\frac{4}{3}$ unius rei, et de medietate unius dragme, scilicet de $\frac{5}{6}$ 5, auferatur sexta unius burse, scilicet biz. $\frac{5}{6}$ 1, remanebunt 4. pro bizantijs quarti hominis.

De eadem re.

SVPER similes quidem quatuor hominum questiones, in quibus multiplicia, que habent cum bursa, ponuntur ex ordine super quantitatem, quam habent super duos homines sibi inuicem sequentes, inueni hanc generalem, uidelicet ut pro radice quantitatis secundi hominis habeantur .2., et pro radice burse habeatur .1.; deinde numerus multiplici-
 titatis primi et burse, quam habent super secundum et tertium hominem, addatur super radicem secundi hominis, et habebitur quantitas eius; et quartus homo habebit

4. ^{us}

totidem; et tertius homo habebit semper .4.; et debitum primi erit .4. semper: deinde quot unitates sunt in multiplicitate predicta, tot numeros pares, á quaternario incipiendo, addantur simul ex ordine; et quot inde prouenient, addatur super radicem burse, scilicet super .4., et habebitur quantitas burse. Verbi gratia: habeat primus cum bursa quadruplum secundi et tertij; secundus uero habeat quincuplum tertij et quarti. Tertius namque sexuplum habeat quarti et primi. Quartus quoque habeat cum bursa septuplum primi et secundi. Quia numerus multiplicatis, quam habet primus cum bursa super secundum et tertium hominem, est .4., addam .4. super radicem secundi hominis, scilicet super 2, et egredientur .6. pro quantitate quam habet unus quisque secundi et quarti hominis: deinde pro eodem quadruplo colligam .iiii.^{or} numeros pares secundum quod sunt in ordine numerorum, incipiendo a .4., uidelicet .4 et 6 et 8 et 10, et erunt .29.; quos addam super radicem burse, scilicet super .4., et egredientur .29. pro bizantijs burse; et sic procedendum est in omnibus similibus quatuor hominum questionibus. |

fol. 10 verso.

ITEM de modo predicto extraxi hanc regulam super inuentionem trium numerorum, quorum primus cum tertia parte reliquorum numerorum surgat in .14. Secundus uero cum quarta parte reliquorum surgit in .17. Tertius namque cum $\frac{1}{5}$ primi et secundi numeri surgit in .19. Pateat quidem serenitati uestre hanc questionem á me solutam esse in tertio decimo capitulo libri mei dupliciter. Sed quia huius solutionis inuentio placet mihi preceteris modis, uolui eam uestre pandere maiestati: posui primum in ordine $\frac{1}{5} \frac{1}{4} \frac{1}{3}$, et extraxi unum quodque ipsorum de uno integro, remanserunt $\frac{2}{3}$ sub $\frac{1}{5}$, et $\frac{2}{4}$ sub $\frac{1}{4}$, et $\frac{2}{3}$ sub $\frac{1}{3}$: post hoc de 14 et 17 et de 19 extraxi .14., remansit .0. super .14., et 3 super 17, et 5 super .19., ut in questione cernitur. Deinde incepti ad $\frac{2}{3}$, et multiplicauimus 2 per 3, et quod prouenit, diuisi per multiplicationem de 3 in 2, et prouenit .4., quod posui sub $\frac{2}{3}$; et multiplicauimus iterum eadem .2. per 4, que sunt sub uirga de $\frac{2}{3}$, et summam diuisi per 3, que sunt sub uirga, et per 3, que sunt super .4., et prouenerunt $\frac{8}{9}$ sub $\frac{2}{3}$. Rursus multiplicauimus eadem 2 per 5, que sunt sub uirga de $\frac{2}{3}$, et diuisi summam per 3, que sunt sub uirga de $\frac{2}{3}$, et per 4, que sunt super uirga de $\frac{2}{3}$, et prouenerunt $\frac{5}{6}$ sub $\frac{2}{3}$: de inde multiplicauimus 3, que sunt sub uirga de $\frac{2}{3}$ per .0., quod est super 14, et diuisi per 2, et prouenit .0. super ipsum .0. Item multiplicauimus .4., que sunt sub uirga de $\frac{2}{3}$ per 3, que sunt super .17., et diuisi per 3, que sunt super .4., et prouenerunt .4. super ipsis tribus. Adhuc multiplicauimus .5., que sunt sub uirga de $\frac{2}{3}$ per 5, que sunt super 19, et diuisi per 4, que sunt super .5., et prouenerunt $\frac{1}{4}$ 6., que seruauimus super 19, ut in figura cernitur. Post hoc collegi .4. et $\frac{8}{9}$ et $\frac{5}{6}$ in unum, et fuerunt $\frac{44}{18}$. Similiter addidi $\frac{1}{4}$ 6 et 4 et 0, et fuerunt $\frac{1}{4}$ 10; que omnia diuisi per 1 minus multitudinem numerorum positorum, scilicet per 2, et prouenerunt $\frac{49}{36}$ et $\frac{1}{3}$ 5. Addidi $\frac{1}{3}$ 5 cum 14, fuerunt $\frac{1}{3}$ 19; et extraxi unum integrum de $\frac{49}{36}$, remanserunt pro quantitate primi numeri $\frac{13}{36}$ cuiusdam summe; que suma (sic) est quantitas secundi et tertij numeri. Cum quibus $\frac{13}{36}$ addidi tertiam eiusdem summe, scilicet $\frac{13}{36}$, fuerunt $\frac{25}{36}$. Quare multiplicauimus $\frac{1}{3}$ 19 per 36, et diuisi summam per 25, et prouenerunt $\frac{27}{50}$ 27 pro quantitate secundi et tertij numeri. De quibus accepi tertiam partem, que est $\frac{9}{50}$ 9, et extraxi ipsam de 14, remanserunt $\frac{44}{50}$ 4 pro quantitate primj numeri: deinde accepi $\frac{8}{9}$ de $\frac{27}{50}$ 27, que sunt $\frac{12}{25}$ 24; | et extraxi inde primum numerum, scilicet $\frac{44}{50}$ 4, remanserunt $\frac{22}{50}$ 19,

fol. 11 recto.

posui primum ... multiplicauimus (fol. 40 verso, lin. 8-18; pag. 240, lin. 20-29).

$\frac{1}{4}$	6	4	0
	5	3	0
	19	17	14
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	
$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{3}$	
$\frac{5}{9}$	$\frac{8}{9}$	1	

de quibus abiecti 4 pro ipsis .4., que sunt super 17, remanserunt $\frac{22}{50}$ 15 pro quantitate tertij numeri; que extraxi de $\frac{27}{50}$ 27, remanserunt $\frac{41}{50}$ 11 pro secundo numero. Ad demonstrandum siquidem qualiter talis inuentio siue regula proueniat ex modo supra-scripto trium hominum. Ponam secundum et tertium numerum esse rem, de qua abiecta tertia parte sui, cum qua primus numerus surgit in .14., remanebunt $\frac{2}{3}$ eiusdem rei: et quia, ut dictum est, cum de quacumque re tollitur $\frac{1}{3}$, illud quod tollitur, est medietas eius quod remanet; vnde si super $\frac{2}{3}$ rei addatur medietas eius, redibit res predicta; quod etiam habetur, si multiplicentur $\frac{2}{3}$ dictę rei per .3.; et quod prouenerit, diuidatur per .2.; et est illud idem quando multiplicauimus superius 3 per 2, et diuisi per 2 uicibus .3., et habui tunc rem positam pro secundo et tertio numero, pro qua posui .1. sub $\frac{2}{3}$; de qua re accepi tertiam partem, et abiecti de 14, remanserunt 14. minus tertia rei pro quantitate primi numeri: quibus additis cum secundo numero et tertio, scilicet cum re una, erit tota suma (*sic*) ipsorum trium numerorum nihil amplius de 14 et de $\frac{2}{3}$ unius rei: et propter hoc posui .9. super 14., et $\frac{2}{3}$ sub $\frac{1}{3}$: et quia secundus numerus cum $\frac{1}{3}$ tertij et primi numeri surgit in .17., et extraxi .17. de suma (*sic*) ipsorum trium numerorum, scilicet de 14 et de $\frac{2}{3}$ unius rei, et remanserunt $\frac{3}{4}$ primi et secundi numeri, et $\frac{2}{3}$ unius rei minus .3.; et ideo posui 3 super 17 et $\frac{3}{4}$ sub $\frac{1}{4}$: et quia cum de aliqua quantitate extrahitur quarta pars, illud quod tollitur est tertia pars residui.

Addidi super $\frac{2}{3}$ unius rei minus tertiam partem eorum; quod fit cum multiplicentur 2 que sunt super 2, et per 4 que sunt sub uirga de $\frac{3}{4}$, et diuiditur per 3 que sunt sub uirga de $\frac{2}{3}$, et per 3 que sunt super uirga de $\frac{3}{4}$; et cum multiplicentur .4., que sunt sub uirga de $\frac{3}{4}$, per 3 posita super .17., et suma (*sic*) diuiditur per 3 que sunt super 4.; quia cum super aliqua quantitate additur tertia pars, et fit inde aliqua quantitas, erit proportio primę quantitatis ad secundam, sicut .3 est ad .4.: quare multiplicande sunt $\frac{2}{3}$ unius rei minus 3 per 4., et suma (*sic*) diuidenda est per 3. Nam ex multiplicatione de 4 in $\frac{2}{3}$ unius rei minus .3. ueniunt $\frac{8}{3}$ unius rei minus 12; quibus diuisis per 3, ueniunt $\frac{8}{9}$ unius rei minus .4; et ideo posui $\frac{8}{9}$ sub $\frac{8}{9}$, et 4 super 3 positus super .17. Rursus quia tertius numerus cum quinta parte primi et secundi numeri surgit in .19.; si de $\frac{2}{3}$ unius rei et de 14. auferantur 19, remanebunt pro $\frac{4}{5}$ primi et secundi numeri $\frac{2}{3}$ unius rei minus .5.; et ideo super 19 posui .5., et sub $\frac{4}{5}$ posui $\frac{4}{5}$. Et quia cum de aliqua quantitate extrahitur quinta pars, illud quod extrahitur est quarta pars residui. Ideo super $\frac{2}{3}$ unius rei minus .5. addenda est quarta pars eorum super ipsas; quod fit cum $\frac{2}{3}$ unius rei minus 5 multiplicentur per 5, et summa diuiditur per .4.; et sic habuimus $\frac{5}{6}$ rei minus $\frac{1}{4}$ 6 pro quantitate primi et secundi numeri; que $\frac{1}{4}$ 6 posite sunt superius super 19, et $\frac{5}{6}$ sub $\frac{4}{5}$; et sic ex hac inuentione habui pro secundo et tertio numero rem; et pro tertio et primo habui $\frac{8}{9}$ unius rei minus .4.; et pro primo et secundo numero $\frac{5}{6}$ minus $\frac{1}{4}$ 6: quibus omnibus in unum congregaui superius, et habui $\frac{49}{18}$ unius rei minus $\frac{1}{4}$ 10, quod fuit equale duplo sumę (*sic*) ipsorum trium numerorum, cum in ipsa congregatione unusquisque ipsorum trium numerorum bis computatus sit; et ideo mediaui prescripta $\frac{49}{18}$ unius rei minus $\frac{1}{4}$ 10, et habui $\frac{49}{18}$ unius rei minus $\frac{1}{3}$ 5. pro quantitate ipsorum trium numerorum; de quibus abiecti integrum unum pro re una, remanserunt $\frac{13}{36}$ unius rei, que est quantitas secundi et tertij numeri minus $\frac{1}{3}$ 5 pro quantitate primi numeri. Super quod addidi tertiam partem

fol. 11 verso.

rei, et habui $\frac{23}{36}$ unius rei minus $\frac{1}{3}$ 5, que equantur .14: addidi ergo $\frac{1}{3}$ 5 super .14., et prouenerunt $\frac{23}{36}$ unius rei, que equantur $\frac{1}{3}$ 19. Quare multiplicauit 36 per $\frac{1}{3}$ 19, et summam diuisi per 25, et habui $\frac{27}{50}$ 27 pro quantitate unius rei, scilicet pro suma (*sic*) secundi et tertij numeri; de qua suma (*sic*) accepi tertiam partem, et extraxi eam de 14.; et quod remansit, scilicet $\frac{41}{50}$ 4, fuit quantitas primj numeri. Et quia quantitas primi et tertij numeri fuit $\frac{8}{9}$ unius rei minus .4.; de $\frac{8}{9}$ rei minus 4, scilicet de $\frac{42}{50}$ 20, extraxi primum numerum, scilicet $\frac{41}{50}$ 4, remanserunt $\frac{33}{50}$ 15 pro quantitate tertij numeri: quem numerum extraxi de suma (*sic*) secundi et tertij numeri, scilicet de $\frac{27}{50}$ 27, remanserunt $\frac{44}{50}$ 11 pro quantitate secundi numeri.

De quatuor hominibus bizantios habentibus.

Posui hanc aliam questionem similem suprascripte questionis, sancte et uenerande pater domine Ranerij dignissime cardinalis, ut que in prescripta questione dicta sunt, melius clementia uestra intendere ualeat. Sunt enim Quatuor homines bizantios habentes, ex quibus primus cum medietate bizantium reliquorum trium hominum habeat .33. Secundus cum tertia parte bizantium reliquorum trium habeat .35. Tertius quoque cum $\frac{1}{4}$ bizantium reliquorum habeat .36. Quartus uero cum $\frac{1}{5}$ bizantium primi et secundi et tertij hominis habeat .37; queritur quot unusquisque habuit. Posui quidem hos numeros studiose, ut solutio huius questionis cadat in integris numeris; et ostendam, hanc insolubilem esse sub posita conditione. Ad quod demonstrandum ponam, secundum et tertium et quartum hominem habere rem, cuius rei medietas si addatur super bizantios primi, nimirum surgent in .33, ut propositum est. Quare patet manifeste, primum hominem habere .33. minus medietate rei, que addita cum bizantijs secundi et tertij et quarti hominis, scilicet cum re, uenient 33 et medietas rei pro tota suma (*sic*) bizantium quatuor hominum: de qua summa secundus cum $\frac{1}{5}$ bizantium reliquorum trium hominum proponitur habuisse 35. Quare si auferantur 35 de bizantijs 33 et de medietate rei, remanebit pro $\frac{2}{5}$ bizantium ipsorum, scilicet tertij et quarti et primi hominis, medietas rei minus bizantijs .2. Et quia cum de aliqua quantitate tollitur tertia pars, id quod tollitur est medietas eius quod remanet. Si super medietate rei minus 2. addatur medietas eius, uenient $\frac{3}{4}$ rei minus bizantijs .3. pro quantitate bizantium tertij et quarti et primi hominis. Ad que etiam ueniemus, si multiplicauerimus medietatem rei minus 2 per 3, et diuiserimus per 2. Rursus quia proponitur, tertium hominem cum $\frac{1}{4}$ bizantium quarti et secundi et primj hominis habere 36.; si de tota suma (*sic*), scilicet ex 33 et medietate rei, tollamus .36., remanebit pro $\frac{3}{4}$ bizantium quarti et primj et secundi hominis medietas rei minus bizantijs 3. Et quia cum de aliqua quantitate tollitur $\frac{1}{4}$, illud quod tollitur est $\frac{1}{4}$ eius quod remanet; si super $\frac{1}{4}$ rei minus 3. addatur tertia eius, hoc est quod multiplicetur $\frac{1}{2}$ rei minus 3 per 4; et suma (*sic*) diuidatur per 3., uenient $\frac{2}{3}$ rei minus 4 pro quantitate bizantium eorundem quarti et primi et secundi hominis. Item quia quartus homo cum $\frac{1}{5}$ bizantium primi et secundi et tertij hominis habet .37.; si de tota suma (*sic*) eorum .111.^{or} hominum tollantur .37., remanebit pro $\frac{4}{5}$ bizantium primi et secundi et tertij hominis medietas rei minus bizantijs .4: quam si multiplicauerimus per 5, que sunt sub uirga de $\frac{4}{5}$; et que prouenerint, diuiserimus per .4., que sunt super uirga, habebimus $\frac{3}{5}$ rei minus bizantijs .5. pro quantitate bizantium primi et secundi et tertij

hominis. Addamus ergo rem, quam habent inter secundum et tertium et quartum hominem, cum $\frac{3}{4}$ rei minus .3., que habent inter tertium et quartum et primum hominem, et cum $\frac{2}{3}$ rei minus .4., que habent inter quartum et primum et secundum hominem. Et cum $\frac{5}{8}$ rei minus .5., que habent inter primum et secundum et tertium hominem, uenient res $\frac{1}{24}$ 3 minus bizantijs 12 pro triplo bizantium *iii.*^{or} hominum, cum in prescriptis partibus unusquisque ter computatus sit. Quare si diuiserimus res $\frac{1}{24}$ 3 minus bizantijs 12 per 3., habebimus rem $\frac{1}{72}$ 1 minus bizantijs .4. pro quantitate bizantium *iii.*^{or} hominum: de qua suma (*sic*) si auferatur res, quam habent inter secundum et tertium et quartum hominem, remanebit $\frac{1}{72}$ rei minus .4. pro quantitate bizantium primi hominis: super quam si addiderimus medietatem rei, scilicet $\frac{1}{2}$ bizantium secundi et tertij et quarti hominis, erunt $\frac{37}{72}$ minus bizantijs .4., que equantur bizantijs 33. Comuniter si addiderimus bizantios .4., erunt $\frac{37}{72}$ rei equales de bizantijs 37. Vnde ut ueniamus ad notitiam unius rei, multiplicanda sunt 72 per bizantios .37., et suma (*sic*) diuidenda est per 37., que sunt super uirga; | uel diuidantur bizantij 37 per 37; et .4. quod prouenit ex diuisione, ducatur in .72, et uenient bizantij 72 pro quantitate rei; et tot habent inter secundum et tertium et quartum hominem. Et quia proponitur, primum hominem cum medietate bizantium secundi et tertij et quarti hominis habere .33; et predictorum 72 bizantium medietas est plus de .33. Colligitur inde, hanc questionem insolubilem esse, cum non possit dici: quatuor homines habent bizantios, cum primus non habeat aliquid, immo habet debitum. Quare si uoluerimus concedere, ipsum habere debitum, erit questio solubilis. Et erit debitum ipsius .3., scilicet differentia, que est a 33 usque in .36. predictis: quod debitum si extrahatur ex bizantijs secundi et tertij et quarti hominis, remanebunt .69 pro suma (*sic*) bizantium *iii.*^{or} hominum; ex quibus si extrahantur $\frac{3}{4}$ rei minus bizantijs .3., scilicet bizantij 31., remanebunt bizantij secundi hominis .18. Item extractis $\frac{2}{3}$ rei minus bizantijs 4, que habent inter quartum et primum et secundum hominem, hoc bizantij (*sic*) 44 de 69, remanent .25 pro bizantijs tertij hominis: quibus additis cum bizantijs secundi hominis, scilicet cum 18, erunt .43.; quibus extractis ex bizantijs secundi et tertij et quarti hominis, scilicet de bizantijs 72, remanebunt pro bizantijs quarti hominis 29. Vel aliter: de 69 predictis extrahantur $\frac{5}{8}$ rei minus bizantijs 5, que habent inter primum et secundum et tertium hominem, remanebunt similiter quarto homini 29. Et si dicemus, primum hominem habere cum sua petitione 181. Secundum 183. Tertium 184. Quartum 185. Inueniemus, suprascriptis dispositis, primum hominem habere .1. Secundum 94. Tertium 125. Quartum 141.

De quatuor hominibus qui inuenerunt bizantios.

QUATUOR homines inuenerunt bizantios aliquot, de quibus unusquisque sumpsit aliquam quantitatem fortuitu. Et cum uellent, ipsos bizantios inter se equaliter diuidere, primus duplicauit secundo bizantios quos ceperat. Post hoc secundus triplicauit tertio homini totum id quod sumpserat. Quo facto, tertius homo quadruplicauit quarto homini bizantios suos. Et quartus post hoc quincuplauit primo homini bizantios quos ei remanserunt post duplicationem quam fecerat secundo homini; et sic unusquisque de inuentis bizantijs suam habuit portionem, scilicet quartam partem. Queritur, que fuit summa inuentorum bizantium, et quot ex ipsis unusquisque cepit: ponam,

secundum hominem habuisse rem, quam cum ei duplicasset, primus homo habuit duas res, et primo homini remansit quinta pars quartę partis totius summe, cum ex quincuplo eius quod ei remanserat, habuit quartam partem summe. Vnde si de quarta parte sume (*sic*) auferatur $\frac{1}{20}$ eiusdem, remanebunt $\frac{4}{20}$, hoc est $\frac{1}{5}$, pro eo quod quartus homo dedit primo homini; que quinta si addatur super $\frac{1}{5}$, summa que remansit quarto homini post dationem quam fecit primo, erunt $\frac{9}{20}$ totius summe; et tantum habuit quartus homo cum quadruplicatione sibi facta á tertio homine. Quare quarta pars de $\frac{9}{20}$, scilicet $\frac{9}{80}$ totius summe (*sic*), fuit illud quod cepit quartus homo; et triplum eius, quod est $\frac{27}{80}$, est illud quod accepit á tertio homine: quibus $\frac{27}{80}$ additis cum quarta parte, scilicet cum $\frac{9}{80}$ totius summe, faciunt $\frac{47}{80}$ eiusdem summe; et tantum habuit tertius homo cum triplicatione sibi facta a secundo homine. Quare tertia pars, scilicet $\frac{47}{240}$ totius summe, fuit illud quod cepit tertius homo; et duplum de $\frac{47}{240}$, hoc est $\frac{47}{120}$, acceperat á secundo homine; quibus $\frac{94}{240}$ additis cum quarta parte sume (*sic*) que remanserat secundo homini, reddunt $\frac{154}{240}$ pro eo quod habuit secundus homo cum duplicatione sibi facta á primo homine, que equantur duabus rebus. Quare medietas eorum, scilicet $\frac{77}{240}$ totius summe, est id quod cepit secundus homo, et alias $\frac{77}{240}$ habuerat á primo: quibus $\frac{77}{240}$ additis cum $\frac{1}{20}$ summe que remanserat primo homini post duplicationem quam fecerat secundo, erunt $\frac{89}{240}$ pro eo quod cepit primus homo. Vnde si summam ponimus esse 240, erit illud quod sumpsit primus 89; et illud quod cepit secundus .77; et illud quod cepit tertius 47; et illud quod cepit quartus .27., scilicet $\frac{9}{80}$ de bizantijs 240. Et si dictum fuerit quod primus homo, de hoc quod cepit, duplicavit omnes quantitates aliorum trium. Et secundus post ipsam duplicationem tri-

plicavit omnia que habebant reliqui tres; et post ipsam triplicationem quartus (*sic*) quadruplicavit ea que habebant reliqui tres homines. Et ad extremum quartus homo quincuplicavit omnes quantitates quas habebant reliqui tres; et sic habuit unusquisque quartam partem totius summe. Ponam rem esse residuum quod remansit primo homini post duplicationem quam fecit reliquis; et triplicabo illam rem pro triplicatione quas sibi fecit secundus homo, et erunt res tres, quas quadruplicabo pro quadruplicatione quam fecit ei tertius homo, uenient res .12.; quibus et multiplicatis per 5 pro quincuplacione quam fecit quartus homo, erunt res .60., que sunt quarta totius summe, cum proponatur, unum quemque habuisse post predictas multiplicitates quartam partem. Quare multiplicabo 60 res per 4, et habebo res .240 pro summa bizantium III.^{or} hominum: deinde ponam ad libitum, rem esse bizantios .2.; et erit tota summa 480; de quibus extraham bizantios .2. prescriptos, remanebunt bizantij .478., qui sunt duplum bizantium secundi et tertij et quarti hominis; et medietatem eorum habuerunt ex duplicatione quam fecerat eis primus homo. Quare si medietatem de 478, que est 239, addamus super bizantios .2. qui remanserunt primo homini, habebo 241 pro quantitate bizantium primi hominis: deinde ponam rem pro quantitate que remansit secundo homini post triplicationem quam fecit reliquis tribus; et quadruplicabo ipsam rem; et illud quadruplum quincuplabo, et habebo 20 res pro quarta parte totius summe. Ergo 20 res equantur bizantijs 480: unde si diuidantur 480 per 20, uenient bizantij 6 pro quantitate rei; quibus bizantijs 6 extractis de 480, remaneant 474 pro triplo bizantium tertij et quarti et primj hominis. Quare tertia pars erat quantitas

fol. 13 recto.

fol. 13 verso.

bizantium ipsorum; et due tertie de 474, scilicet 316, fuerunt id quod acceperant á secundo homine: quibus bizantijs 316 additis cum bizantijs 6., qui remanserunt ipsi secundo, erunt bizantij 322; et tot habuit secundus homo post duplicationem sibi factam á primo homine. Ergo medietas de 322, que est 161, fuit quantitas bizantium secundi hominis.

Rursus ponam rem pro eo quod remansit tertio homini post quadruplicationem quam fecerat alijs, et quincuplabo ipsam rem, et erunt quinque res equales quarti summe, scilicet de 120. Quare res erit bizantij 24; quibus extractis de 480, remanent 456 pro quadruplo bizantium quarti et primi et secundi hominis, ex quibus habuerunt tres quartas, scilicet 342, a tertio homine; quibus bizantijs 342 additis cum bizantijs 24 predictis, erunt bizantij 366.; et tot habuit tertius homo post duplicationem et triplicationem sibi factas á primo et á secundo homine: de quibus si accepero medietatem tertie partis, scilicet sextam, uenient bizantij 61 pro quantitate tertij hominis. Extractis ergo bizantijs 241 primi hominis, et 161 secundi, et 61 tertij de tota suma (*sic*), remanebunt 17 pro bizantijs quarti hominis.

Aliter quia omne duplicatum ex suo duplicante existit medietas; et triplicatum ex triplicante est tertia; et quadruplicatum ex quadruplicante sit quarta; et quincuplatum ex suo quincuplante quintam obtinet partem. Ponam in ordinem $\frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{2}$, ut in margine cernitur; et multiplicabo 2 per 3 uicibus 4, uicibus .5. que sunt sub uirgis, erunt 120, que sunt quantitas quarte partis omnium bizantium inuentorum; quibus multiplicatis per 4, reddunt 480 pro tota summa: deinde tollam 1, quod est super 2, de 2, et 1 quod remanet, ducam in 3 uicibus 4, uicibus 5, erunt 60; quibus etiam ductis in numerum hominum, scilicet in 4, erunt 240: quibus si addatur 1 quod prouenit ex ducto .1, quod est super 2, in 1 quod est super 3; quod in 1 quod est super 4; quod in 1 quod est super 5, erunt 241, que sunt quantitas bizantium primj. Rursus extraham 1, quod est super 3, de 3, remanent 2; quibus ductis in 4. uicibus 5, uicibus 2 que sunt sub uirgis, et in numerum hominum, erunt 320; quibus addam 2, que proueniunt ex 2. quod est sub prima uirga, in 1 quod est super 3; quod in 1 quod est super 4; quod in 1 quod est super 5, erunt 322. | que sunt duplum bizantium secundi. Quare ducam 322 in 1 quod est super 2; et diuidam per 2., uenient 161 pro bizantijs secundi hominis. Item extraham 1. quod est super 4, de 4, remanent 3; que ducam in 5 uicibus 2, uicibus 3 que sunt sub alijs uirgis, erunt 90; que ducam in 4, et superaddam .6., que proueniunt ex ductis 2 in 3, que sunt sub uirgis; quod in 1 quod est super 4; quod in 1 quod est super .5., erunt 366; et tot habuit tertius homo post duplicationem et triplicationem sibi factas á primo et secundo homine. Vnde si de 366 acceperimus medietatem tertie partis ipsorum, scilicet sextam, uenient 61 pro bizantijs tertij hominis. Ad ultimum quippe extraham 1, quod est super 5, de 5, remanent 4.; quibus ductis in 2 uicibus 3, uicibus 4 que sunt sub uirgis; et illud totum per 4, scilicet per numerum hominum, erunt 384; quibus addam 24, que proueniunt ex multiplicatione de 2 uicibus 3, uicibus 4 que sunt sub uirgis, ducta in 1 quod est super 5., erunt 408; et tot habuit quartus homo post duplicationem et triplicationem et quadruplicationem sibi factas á primo et secundo et tertio homine. Quare si de 408 acceperimus medietatem tertie quarte partis, hoc est $\frac{1}{24}$, uenient 17 pro quantitate bizan-

 $\frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{2}$

tiorum quos cepit quartus homo, ut superius inuentum est. Aliter positis $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$ per ordinem, et inuentis bizantijs 480 pro summa bizantium ipsorum quatuor hominum, extraham $\frac{1}{2}$ de uno integro; et pro $\frac{1}{2}$ quod remanet, accipiam medietatem de 480, et superaddam 1 quod prouenit ex ducto 1 in 1, quod in 1., que unitates sunt super III^{or} uirgis, erunt 241; et tot cepit ex ipsa suma (sic) primus homo.

Rursus extraham $\frac{1}{3}$ de uno integro, remanent $\frac{2}{3}$; de quibus accipiam medietatem, ueniet $\frac{1}{3}$; pro quo accipiam $\frac{1}{3}$ de 480, et superaddam 1 quod prouenit ex ductione dictarum unitatum inse, et habebō 161; et tot cepit secundus homo. Item tollam $\frac{1}{4}$ de uno integro, remanebunt $\frac{3}{4}$; de quibus accipiam medietatem tertie partis ipsarum, ueniet $\frac{1}{4}$; pro quo accipiam octauam partem de 480., et addam similiter 1., et habebō 61 pro bizantijs tertij hominis. Adhuc demam $\frac{1}{5}$ de uno integro, remanent $\frac{4}{5}$; de quibus accipiam medietatem tertie quartę partis ipsorum 5, ueniet $\frac{1}{5}$; pro quo accipiam trigesimam partem de 480, et superaddam 1, et habebō 17. pro bizantijs quarti hominis.

Questio similis suprascripte de tribus hominibus.

ITEM Tres homines habebant bizantios; et cum primus duplicauerit bizantios reliquorum, nec non et addiderit eis medietatem omnium que habebant; et secundus triplicauerit | bizantios tertij et primi hominis, et addiderit eis tertiam bizantium ipsorum; et Tertius quadruplicauit bizantios reliquorum, et addiderit eis quartam bizantium ipsorum, et habuit unusquisque suam portionem, scilicet tertiam.

fol. 14 verso.

Sciendum est primum, quod quando aliqua res duplicatur, et additur super eam medietas eius, tunc illa res sui dupli et dimidij est $\frac{2}{3}$. Similiter cum aliqua res triplicatur, et additur ei tertia pars sui, tunc illa res sui tripli et tertie eius est $\frac{3}{4}$. Eodemque modo cum aliqua res quadruplicatur, et additur ei quarta ipsius rei, tunc illa res ex quadrupli sui et quarte est $\frac{4}{5}$: quare ponam in ordine $\frac{4}{17}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{2}{5}$, et imitabor primam ultimam regulam predictam; hoc est cum multiplicabo 5 uicibus 10, uicibus 17, que sunt sub uirgis, uenient 850. pro tertia parte totius summe eorum; quos multiplicabo per 3 propter homines qui sunt tres, et erunt bizantij 2550. pro tota summa: et extraham $\frac{2}{3}$ de uno integro, remanebunt $\frac{1}{3}$; pro quibus accipiam $\frac{2}{3}$ de 2550., et superaddam bizantios 24, qui proueniunt ex 2 uicibus 3, uicibus 4., que sunt super uirgis, erunt 1554; et tot habuit primus. Et extraham $\frac{3}{10}$ de uno integro, remanebunt $\frac{7}{10}$; pro quibus accipiam $\frac{7}{10}$ de 2550, et superaddam 60, que proueniunt ex multiplicatione de 5 que sunt sub uirga, uicibus 3, uicibus 4 que sunt super uirgis, erunt 1845; de quibus accipiam $\frac{2}{5}$, hoc est multiplicabo 1845 per 2, et diuidam per 5.; uel quintam de 1845, que est 369, multiplicabo per 2, quod est pulchrius, uenient 738; et tot habuit secundus. Rursus extraham $\frac{4}{17}$ de uno integro, remanebunt $\frac{13}{17}$; pro quibus accipiam $\frac{13}{17}$ de 2550, hoc est diuidam 2550 per 17; et quod prouenerit, multiplicabo per 13, uenient 1950: super que addam 200, que proueniunt ex 5 uicibus 40 que sunt sub uirgis, uicibus 4 que sunt super uirga, erunt 2150; et tot habuit tertius homo quando quadruplicauit bizantios reliquorum, et addidit ei quartam partem. Vnde si de bizantijs 2150 acceperimus $\frac{2}{5}$ ex tribus decimis eorum, hoc est $\frac{2}{5}$ ipsorum, uenient 258; et tot habuit tertius homo. Est enim hic modus similis secundo; quia cum hoc per secundum modum facere uoluimus, extrahemus 2 de 5; et 3 que restant, multiplicabo per 10 uicibus 17, uicibus 3, et habebō 1530; et hoc est accipere $\frac{2}{5}$ de

$\frac{4}{17}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{2}{5}$

1530 (*sic*); et addam postea 24 super 1530, et habeo similiter pro bizantijs primj hominis 1554. Item extraham 3 de 10., et 7 que remanent, ducam in 17 uicibus 5, uicibus 3, et habeo $\frac{7}{10}$ de 2550; et sic possumus eodem modo in similibus operarj.

Et quia quatuor inuenti numeri sunt sibi inuicem comunicantes; et est senarius comunis eorum mensura; si diuiderimus unumquemque eorum per 6, habebitur solutio huius questionis in minoribus numeris; et summa eorum erit 425, et bizantijs primi erunt 259. Secundi 123. Tertij .43.

*Epistola suprascripti Leonardi ad Magistrum Theodorum
phylosophum domini Imperatoris.*

ASSIDUIS rogaminibus et postulationibus á quodam mihi amicissimo inuitatus; ut modum sibi componerem soluendi subscriptas auium et similium questiones; quia ipse tanquam nouiter in hoc magisterio educatus, fortiora pabula in libro meo numeri apposita pauescebat, lac sibi, uelut nouiter genito filio, suauitatis preparans, ut robustius effectus capere ualeat artiora, presentem sibi modum inueni, per quem non solum similes questiones soluuntur, verum et omnes diuersitates consolaminum monetarum. Et quia ipsum in illa scientia prestantiorem et utilem elegi, uobis, reuerende pater domine Theodore, imperialis aule sume (*sic*) phylosophe, mictendum decreui, ut ipso perlecto, que utilia sunt, uestre celsitudinis probitas, resecatis superfluis, reconseruet.

De auibus emendis secundum proportionem datam.

QUIDAM emit passeret 3 pro uno denario, et turtures 2 pro uno denario, et columbam 1 pro denarijs 2, et ex his tribus generibus auium habuit aues 30. pro denarijs 30. Queritur, quot aues emit ex uno quoque genere: posui primum passeret 30 pro 10 denarijs, et seruauit denarios .20., qui sunt differentia, que est á 10 denarijs usque in 30; et mutauit unum ex passeribus in turturem, et fuit augmentum in ipsa mutatione $\frac{4}{5}$ unius denarij; quia passer ualebat $\frac{1}{3}$ unius denarij, et turtur ualebat $\frac{1}{2}$ unius denarij, scilicet $\frac{1}{6}$ unius denarij plus pretio passeris: et mutauit iterum unum ex passeribus in columbam, et melioratus sum in ipsa mutatione denarij $\frac{2}{3}$ 1, scilicet differentia que est á $\frac{1}{3}$ unius denarij usque in denarios 2; et feci sextas ex ipso denario $\frac{2}{3}$ 1, et fuerunt sexte .10.: et secundum hoc oportuit me mutare passeret in turtures et columbas, donec ex ipsa mutatione proueniant illi denarij 20, quos superius seruauit: quare ex ipsis feci sextas, et fuerunt sexte 120; quas diuisi in duas partes, quarum una posset diuidi per 10. integraliter, et alia per 1; et suma (*sic*) utriusque diuisionis non ascenderet in 30; et fuit prima pars 110, et alia 10: et diuisi primam partem, scilicet 110 per 10, et secundam per 1, et habui columbas 11 et turtures 10.: quibus extractis de auibus 30, remanserunt 9 pro numero passerum; qui passeret ualent denarii 3, et turtures 10 ualent denarii 5, et columbe .11. ualent denarii .22; et sic ex istis tribus generibus auium habebuntur aues 30 pro 30 denarijs, ut quesitum est.

De eodem.

Et si uolumus habere aues 29 pro denarijs 29, eodem modo possumus operari, uidelicet pretium 29 passerum, qui sunt aues uiliores, extrahemus de denarijs 29, et de reliquis faciemus sextas, et erunt sexte 116; quas diuidemus iterum in duas partes, quarum una diuidatur integraliter per 10, et altera per 1; et summa utriusque diuisionis non ascendat in 29.; que partes dupliciter fieri possunt: primum ut prima pars

fol. 13 recto.

fol. 15 verso.

sit 110, secunda 6; et diuidantur 110 per 10, uenient columbe .11.; et 6 diuidantur per 1, uenient turtures .6.; quibus extractis de 29, remanent 12 pro numero passerum: uel 116 diuidemus in 100 et in 16; et diuidemus 100 per 10, et 16 per 1, et habebimus columbas .10 et turtures 16; relique, que sunt usque in 29., scilicet 3, erunt passeress; et sic soluta est hec questio dupliciter.

Item de auibus.

Et si uolumus habere aues 15 pro denarijs 15, hoc esse non posse sine fractione auium demonstrabo. Verbi gratia: si extraxero pretium 15 passerum de denarijs 15; et de residuis denarijs faciam sextas, que sunt 60, non poterunt diuidj in duas partes, quarum una diuisa per 10, et altera per 1, ueniat numerus integer ex ipsis duabus diuisionibus, qui sit minor de 15.: exempli causa: si diuisero 60 in 50 et in 10; et diuisero 50 per 10, et 10 per 1, ueniente (sic) ex ipsis duabus diuisionibus 5 et 10; quibus insimul iunctis faciunt 15, scilicet summa omnium auium; et sic non caderet aliquis passer in hac emptione; quia columbe 5 ualent denarios 10, et turtures 10 ualent denarios 5; et sic ex his duobus generibus auium tantum habentur aues 15 pro denarijs 15; et nec est numerus aliquis alius infra 60 maior quam 50, qui integraliter diuidatur per 10; et minor eo hic locum non habet; quia si poneremus 40 pro una parte, remanent pro alia parte 20: unde si 40 diuidantur per 10, et 20 per 1, egredierentur ex infrascriptis duabus diuisionibus 24 aues; que locum non habent, cum debeant esse 15. Sed si uolemus frangere aues, diuidemus 60 supradicta in 55 et in 5, et diuidemus 55 per 10, uenient columbe $\frac{1}{2}$ 5; et diuidemus 5 per 1, uenient turtures 5. Extractis itaque columbis $\frac{1}{2}$ 5 et turturibus 5 de auibus | 15, remanebunt passeress $\frac{1}{2}$ 4, quorum pretium est denarius 1 et semis; et pretium 5 turturum est denarij $\frac{1}{2}$ 2; et pretium columbarum $\frac{1}{2}$ 5 est denarij 11; et sic ex his tribus generibus auium habentur aues 15 pro denarijs .15.

fol. 16 recto.

Et si uolumus habere aues 15 pro denarijs 16, hoc integraliter poterit; quia extractis denarijs 5, scilicet pretium passerum 15, de denarijs 16, remanent denarij 11, qui sunt sexte 66; quibus diuisis in 60 et in 6, diuidetur 60 integraliter per 10, et 6 per 1; et ex ipsis diuisionibus uenient columbe 6 et turtures 6.; relique que sunt usque in 15, scilicet 3, sunt passeress; et sic possumus in omnibus similibus operari. Sed ut ea que dixi liquidius sapientia uestra intelligat, aliam huiusmodi proponam questionem. Videlicet ut passeress 3 dentur pro uno denario; et columba ualeat denarios 2; et perdix ualeat denarios 3; et uolo ex his tribus generibus auium aues 30 pro denarijs 30 habere. Extraham quidem supradicto modo de denarijs 30 pretium passerum 30, quod est .10., remanebunt denarij 20, quos seruabo; et mutabo unum ex passeribus in columbam, et erit melioratio denarius $\frac{2}{3}$ 1, scilicet 5 tertie unius denarij; et mutabo iterum alium passerem in perdicem, et erit melioratio eius denarii $\frac{2}{3}$ 2, hoc est tertie 8, que sunt differentia, que est á pretio unius passeris usque in pretium unius perdicis; et faciam tertias ex denarijs 20 seruatis, et erunt tertie 60; quas diuidam in duas partes, quarum una diuidatur integraliter per 8, et alia per 5; et que ex utraque diuisione peruenerit, non ascendant in 30; eritque una illarum duarum partium 40, et altera 20: et diuidam 40 per 8, uenient perdices .5; et diuidam 20 per 5, uenient columbe 4; relique, que sunt usque in 30, scilicet 21, sunt passeress.

ITEM passeris 5 ualent denarium 1, et turtures 3 dentur pro uno denario, et columba ualeat denarios 2, et perdix ualeat denarios 3; et uolo ex his quatuor generibus auium habere aues 24 pro denarijs 24: ponam pretia uniuscuiusque generis auium in ordine, uidelicet $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{3}$ et 2 et 3, ut in margine cernitur; et extraham pretium unius passeris de pretio cuiusque reliquorum trium generum, scilicet $\frac{1}{3}$ de $\frac{1}{3}$ et de 2 et de 3; et residua ponam super ipsa pretia per ordinem, et habebō $\frac{2}{15}$ super $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{3}$ 1, scilicet $\frac{27}{15}$ super 2, et $\frac{4}{3}$ 2, scilicet $\frac{42}{15}$ super 3: deinde pretium 24 passerum extraham de denarijs 24, remanebunt denarij $\frac{1}{3}$ 19; quos multiplicabo per 15, ut faciam ex eis quindecimas, sicut sunt differentie suprascripte, erunt $\frac{6}{15}$ 288; quas diuidam in tres partes, quarum una integraliter diuidatur per 42, et altera per 27, et tertia per 2; quia melioratio mutationis unius passeris in perdicem est $\frac{42}{15}$, et melioratio mutationis passeris in columbam est $\frac{27}{15}$; et melioratio mutationis passeris in turturem est $\frac{2}{15}$: et ideo diuidende sunt $\frac{6}{15}$ 288 in tres partes, quarum una diuidatur integraliter per 42, secunda per 27, tertia per 2; et quod ex ipsis tribus diuisionibus prouenerit, cadat infra numerum auium emptarum, scilicet infra 24; quod poterit fieri dupliciter: primum de 288 extraham quadruplum de 42 et de 27, scilicet 168 et 108, que sunt in summa 276; et remanebunt pro tertia parte 12: et diuidam 168 per 42, et 108 per 27, et 12 per 2, uenient perdices .4., et columbe 4., et turtures .6., que sunt in summa aues 14.; relique que sunt usque in 24, scilicet 10, erunt passeris. Vel aliter: ponam pro prima parte quincuplum de 42, pro quo habebuntur perdices 5; et pro secunda parte ponam duplum de 27, pro quo habebuntur columbe 2; et ex ipsis 288 remanebunt 24, que sunt duodecuplum de 2, pro quo duodecuplo habebuntur turtures .12; relique uero que sunt usque in 24 aues, scilicet 5, erunt passeris; et sic possumus in similibus etiam et in consolamine monetarum et bizantium operari; quod quandocumque vel placuerit dominationi uestre liquidius declarabo.

De compositione pentagonj equilateri in triangulum equicrurium datum.


LIBET etiam solutionem subscriptę questionis, quam nuper inueni lumine uestre correctionis transmittere. Videlicet cum in triangulo equicrurio noto protractum sit pentagonum equilaterum, qualiter inueniatur longitudo ipsius lateris, demonstrabo. Esto trigonum .abc., cuius unum quodque latus .ab et .ac sit 10, mensura et basis .bc. sit 12, et in ipso trigono protractum sit pentagonum equilaterum .a. d. e. f. g.; et uolo inuenire longitudinem unius cuiusque lateris pentagonj: protraham primum in triangulo .abc. perpendicularem .ah., que erit nota, cum nota sint latera .ab et .bh; et erit longitudo eius 8; et a puncto d super latus .bc. protraham cathetum .di., que equidistabit catheto .ah.; quare triangulus .dbi. similis est triangulo .abh.: quare proportio .ib. ad .bd est sicut proportio .hb. ad .ba., nec non et proportio .id. ad .db. est sicut proportio .ha. ad .ab.; sed .ha. ex .ab. est $\frac{4}{5}$, quare et .id. est $\frac{4}{5}$ ex .db. Et est .bh. ex .ba. $\frac{2}{5}$, cum .ba. sit 10, et .bh. sit .6., scilicet medietas | ex .bc., erit et .ib. ex .bd. $\frac{2}{5}$. Et quia latera pentagonj .ad et .ag sunt sibi inuicem equalia, si auferatur .ad. ex .ab., et .ag. ex .ac., remanebunt recte .db. et .gc. sibi inuicem equalia: sunt enim .gf. et .de. equalia; due ergo recte .gc. et .gf. duabus .bd. et .de. sunt equalia; et angulus .fcg. angulo .ebd. est equalis, cum equicrurium sit trigonum .abc.; quare basis .be. basi .cf. est equalis: est enim .bh. equalis .ch.: unde si ex .bh. auferatur

et columba ... $\frac{1}{3}$ 19; quos » (fol. 16 recto, lin. 27-34; pag. 249, lin. 4-8).

perdix.	columba.	turtures.	passeres
$\frac{42}{15}$	$\frac{27}{15}$	$\frac{2}{15}$	0
3 .	2 .	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
4 .	4 .	6 .	11
5 .	2 .	12	15

fol. 16 verso.

.d.b. Et est ... scilicet medietas » (fol. 16 verso, lin. ultima e margine inferiore; pag. 249, lin. 37-38).



fol. 17 recto.


.be., et ex *ch* auferatur *cf*., remanebit *fh*. equalis *he*: his itaque omnibus intellectis, ponam unum quodque latus pentagoni rem, et erit *eh*. medietas rei; quare *be*. erit .6 minus medietate rei; et auferam *ad* ex *ab*, scilicet rem de .10., remanebit *db*. 10 minus rei; de quibus accipiam $\frac{4}{5}$, et habebō pro catheto *di*. 8 minus $\frac{4}{5}$ rei. Et accipiam rursus $\frac{2}{5}$ ex *db*, et habebō .6 minus $\frac{2}{5}$ rei pro linea *bi*.; est enim et *be*. 6 minus medietate rei: quare si auferamus *bi* ex *be*, remanebit *ie*. $\frac{4}{10}$ rei; et sic erunt latera trianguli *d.e.i.* nota: et quia angulus *d.i.e* est rectus, erunt quadrata laterum *di* et *ie* equalia quadrato lineae *de*.; quod quadratum est census, cum *de* sit res: quare multiplicabo *di*, scilicet 8 minus $\frac{4}{5}$ rei, in se, uenient dragme 64 et $\frac{46}{25}$ census minus rebus $\frac{4}{5}$ 12; et multiplicabo *ie*., scilicet $\frac{4}{10}$ rei, in se, et ueniet $\frac{4}{100}$ census; quam addam super $\frac{46}{25}$ census et dragmis 64, diminutis rebus $\frac{4}{5}$ 12, et habebō $\frac{43}{20}$ census et dragmas 64, diminutis rebus $\frac{4}{5}$ 12, que equantur censui, scilicet quadrato lateris *de*.: unde si addidero utrique parti res $\frac{4}{5}$ 12, et tollam ab utraque parte $\frac{43}{20}$ census, remanebunt $\frac{7}{20}$ census et res $\frac{4}{5}$ 12, que equantur dragmis 64. Et ut hec reducantur ad censum unum, multiplicanda sunt omnia que habentur per $\frac{6}{7}$ 2, et erit census et res $\frac{4}{7}$ 36, que equantur dragmis $\frac{6}{7}$ 182; et sic reducta est questio ad unam ex regulis algebre. Vnde si ad solutionem quesiti liquidius uenire uolumus, ponam pro censu quadratum *k.l.m.n.*, cuius unumquodque latus sit equale lateri pentagoni supradicti; et ducam secundum rectitudinem latera *kn*. et *lm* in puncta *po*; et fit unaqueque rectarum *np*. et *mo*. $\frac{4}{7}$ 36; et diuidatur recta *mo*. ad punctum *q*. in duo equa, et erit *mq*. $\frac{2}{7}$ 18; et quoniam quadratum *km* est census, erit latus *mn*. res; et unumquodque laterum *np* et *mo*. est $\frac{4}{7}$ 36; quare tota superficies *no*. est res $\frac{4}{7}$ 36: cui superficiei, si addatur quadratum *km*, erit tota superficies rectiangula *ko*. | census et res $\frac{4}{7}$ 36; que, ut superius inuenctum est, equantur dragmis $\frac{6}{7}$ 182; ergo superficies *ko* est dragme $\frac{6}{7}$ 182.; que superficies prouenit ex *kl* in *lo*; sed *kl* equalis est recte *lm*.; ergo ex ductu *lm*. in *lo*. proueniunt $\frac{6}{7}$ 182; quibus si addatur multiplicatio ex *mq*. in se, hoc est ex $\frac{2}{7}$ 18, egredientur $\frac{14}{49}$ 517 pro quadrato lineae *lq*.; de quorum radice, que est secundum propinquitatem 22 et minuta 44 et secunda 33 et tertia 15 et quarta 7, si auferatur linea *mq*., scilicet $\frac{2}{7}$ 18, remanebunt pro quantitate rei *lm*., hoc est pro quantitate unius cuiusque lateris pentagoni, 4 et minuta 27 et secunda 24 et tertia 40 et quarta 50. Inueni etiam his diebus alias solutiones super similibus questionibus, quas dominationi uestre, quandocumque placuerit, destinabo.

Modus alius soluendi similes questiones.

Irem pono solutionem sequentis questionis per quemdam pulchrum modum. Nam questio talis est. Quinque homines denarios habent, ex quibus primus cum medietate denariorum secundi habet 12. Secundus cum $\frac{1}{3}$ denariorum tertij hominis habet 15. Tertius cum $\frac{1}{4}$ denariorum quartj habet 18. Quartus cum $\frac{1}{5}$ denariorum quinti habet 20. Quintus cum $\frac{1}{6}$ denariorum primj habet 23: ponam hos quinque homines in ordinem, et sub unoquoque ponam suam petitionem, ut hic cernitur.

15760	11268	10161	7428	4938
23	20	18	15	12
Quintus	Quartus	Tertius	Secundus	primus
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{11}{7} \frac{88}{102} 21$	$\frac{5}{7} \frac{64}{102} 15$	$\frac{4}{7} \frac{9}{102} 14$	$\frac{3}{7} \frac{31}{102} 10$	$\frac{2}{7} \frac{37}{102} 6$

* addatur ... rectiangula *ko*. (fol. 17 recto, lin. 36, 37 e margine inferiore; pag. 250, lin. 23).



fol. 17 verso.

Et incipiam á 2, qui sunt sub uirga primi hominis, et multiplicabo 2 per 12, qui sunt super ipsum primum, erunt 24; de quibus tollam multiplicationem de 1, quod est super 2, in 15, remanebunt 9.; que multiplicabo per 3, que sunt sub uirga secundi hominis, erunt 27; quibus addam multiplicationem de 1, quod est super 2, in 1, quod est super 3 ductam in 18., que sunt super tertium hominem, erunt 45.; que ducam in 4, que sunt sub uirga eiusdem tertij hominis, erunt 180; de quibus tollam id quod prouenit ex ducto 1, quod est super 2, in 1 quod est super 3, in 1 quod est super 4, quod in 20, remanebunt 160; que ducam in 5, que sunt sub uirga quarti hominis, erunt 800; quibus addam 23, que proueniunt ex ducto 1, quod est super 2, in 1 quod est super 3, | quod in 1 quod est super 4, quod in 1 quod est super 5, quod in 23, erunt 823; que multiplicabo per 6, que sub uirga quintj hominis, erunt 4938, que seruabo super primum hominem. Et operabor similiter in reliquis quatuor hominibus, uidelicet multiplicabo 3, que sunt sub uirga, per 15, et tollam semel 18, et residuum multiplicabo per 4, erunt 108.; quibus addam multiplicationem de 1 quod est super 3, in 1 quod est super 4, ductam in 20., erunt 128; que ducam in 5, et tollam 23, que ueniunt ex uno quod est super 4, quod in 1 quod est super 5, quod in 23, remanebunt 617; que ducam in 6, que sunt sub uirga quinti hominis, erunt 3702; quibus addam 12., que proueniunt ex 1 quod est super 3, in 1 quod est super 4, quod in 1 quod est super 5, quod in 1 quod est super 6, quod in 12, erunt 3714; que ducam in 2 que sunt sub uirga primj hominis, erunt 7428, que seruabo super secundum hominem. Rursus multiplicabo 4, que sunt sub uirga, per 18, et tollam semel 20, residuum multiplicabo per 5, et addam 23, que proueniunt ex 1 quod est super 4, in 1 quod est super 5, quod in 23; et totum illud multiplicabo per 6 que sunt sub uirga, erunt 1698; de quibus tollam 12, que proueniunt ex 1 quod est super 4, in 1 quod est super 5, quod in 1 quod est super 6, quod in 12, remanebunt 1686; que ducam in 2 que sunt sub uirga, erunt 3372; quibus addam 15, que proueniunt ex 1 quod est super 4, in 1 quod est super 5, quod in 1 quod est super 6, quod in 1 quod est super 6, quod in 1 quod est super 2, quod in 15, quod in 15 (*sic*), erunt 3387; que ducam in 3 que sunt sub uirga, erunt 10161, que seruabo super tertium hominem. Et cum eodem modo operatus fuero in inuentione quartj et quintj numeri, habebó super quartum hominem 11268, et super quintum 15760: deinde multiplicabo 2 per 3, que per 4, que per 5, que per 6 que sunt sub uirgulis, erunt 520; et multiplicabo .1. quod est super 2, in 1 quod est super 3, quod in 1 quod est super 4, quod in 1 quod est super 5, quod in 1 quod est super 6, uenient 1; quod addam cum 720, cum propositorum hominum numerus sit impar; quia si esset par, tolleretur, et erunt 721; in quorum regula, que est $\frac{1}{7}$ de 103, diuidendi sunt suprascripti numeri per ordinem, et habebó quantitates uniuscuiusque eorum, ut superius in questione cernitur.

Inuestigatio unde procedat inuentio suprascripta.

Et si unde talis inuentio procedat | habere uolueritis, uobis illud, tanquam domino uenerando mittere procurabo. Soluuntur etiam similes questiones aliter, ut in libro meo denominato uestra sapientia poterit inuenire. Et si super denarios unius cuiusque adderetur eadem pars denariorum reliquorum quatuor hominum, que ad-

fol. 18 recto.

fol. 18 verso.

ditur in dicta questione unicuique de suo consequente, et haberet primus 12, Secundus 15, et cetera ut supra, tunc questio esset insolubilis, nisi concederetur, primum habere debitum; quod debitum esset $\frac{97}{197}$ 13. Et Secundus haberet $\frac{1}{2} \frac{118}{197}$ 3. Tertius $\frac{99}{197}$ 11. Quartus $\frac{1}{2} \frac{123}{197}$ 15. Quintus $\frac{20}{197}$ 20.

Incipit liber quadratorum compositus à leonardo pisano.

fol. 19 recto.

Anni. M. CC. XXV.

Cum Magister dominicus pedibus celsitudinis uestre, princeps gloriosissime domine .F., me pisis duceret presentandum, occurrens Magister Johannes panormitanus, questionem mihi proposuit infrascriptam, non minus ad geometriam quam ad numerum pertinentem; vt inuenirem numerum quadratum, cui quinque additis uel diminutis, semper inde quadratus numerus oriretur: super cuius questionis solutione à me iam inuenta considerans, uidi quod habebat originem solutio ipsa ex multis que quadratis et inter quadratos numeros accidunt. Nuper autem cum relationibus pisis positis, et aliorum reddeuntium ab imperiali curia, intellexerim quod dignatur uestra sublimitas maiestas legere super librum quem composui de numero, et quod placet uobis audire aliquotiens subtilitates ad geometriam et numerum contingentes; rememorans in uestra curia et a uestro phylosopho suprascriptam mihi propositam questionem, ab ea sumpsi materiam, et opus incepti ad uestrum honorem condere infrascriptum, quod uocari librum uolui quadratorum, ueniam postulans patienter, si quid in eodem plus uel minus iusto uel necessario continetur, cum omnium habere memoriam, et in nullo peccare sit diuinitatis potius quam humanitatis; et nemo sit uitio carens et undique circumspectus.

CONSIDERAUI super originem omnium quadratorum numerorum, et inueni, ipsam egredi ex ordinata imparium ascensione. Nam unitas quadrata est, et ex ipsa efficitur primus quadratus, scilicet unum; cui unitati addito ternario facit secundum quadratum, scilicet .4., cuius radix est 2.; cui etiam additioni, si addatur tertius impar numerus, scilicet 5, tertius quadratus procreabitur, scilicet 9, cuius radix est 3.; et sic semper per ordinatam imparium collectionem ordinata consurgit et series quadratorum. Vnde cum uolumus .ii.^{os} quadratos numeros inuenire, quorum additio faciat quadratum numerum, accipiam qualem uoluerò quadratum imparem, et habebo ipsum pro uno ex duobus dictis quadratis; reliquum inueniam ex collectione omnium imparium, qui sunt ab unitate usque ad ipsum quadratum imparem. Verbi gratia: accipiam 9 pro uno ex dictis duobus quadratis, reliquus habebitur ex collectione omnium imparium, qui sunt sub .9., scilicet de 1 et 3 et 5 et 7., quorum summa est 16, qui est quadratus; quo addito cum 9. egredientur 25., qui numerus est quadratus. Et si geometrica uti uolumus demonstratione, adiaceant quocumque numeri impares ab unitate per ordinem

Item aliter . . . sit par * (fol. 19 recto, lin. ultima e margine inferiore) pag. 254, lin. 5).

a	b	c	d	e	f
---	---	---	---	---	---

(fol. 19 verso.)

additionis . . . quadratus excedit * (fol. 19 verso, lin. 19, 20 e 21; pag. 254, lin. 23-24).

a	b	d	g
---	---	---	---

ad inveniendum plures quadratos numeros.

Ex hac regula de collectione duorum numerorum quadratorum possumus recolligere plures numeros quadratos; et ut hec aperte videamus, volumus colligere 5 quadratos numeros, quorum primus et secundus simul iuncti faciunt quadratum numerum; et super eorum, tertio addito, eueniat quadratus numerus; et etiam super additionem predictorum trium, quarto numero addito, fiat quadratus numerus, et superaddito quinto fiat quadratus numerus. Ita exerceamus: ponamus primus numerus eorum 9, et per dictam regulam inuenimus secundum numerum isto modo; quod colligemus omnes impares numeros qui sunt ab 1 usque in 9; qui numeri impares sunt isti .1. 3. 5. 7, et omnes insimul additi faciunt 16 pro secundo quadrato; ita quod si addideris eum 9, habebis 25; et per superscriptum modum potest inueniri tertius quadratus, quod ponemus in margine omnes quatuor impares numeros, qui sunt ab 1 usque in 25, qui sunt 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23; et omnes additi faciunt 144. pro tertio numero quadrato; et adde eum summa predictorum duorum quadratorum, que est 25, habebis 169 pro summa trium quadratorum; et isto modo inuenies quartum quadratum, ponendo omnes impares, qui sunt ab 1 usque in 169, et inuenies quartum quadratum esse 7056; et summa predictorum trium numerorum superaddita, que est 169, erit eorum summa 7225; et isto modo, et ex predicta summa (sic) potest inueniri quintus quadratus, ponendo omnes impares numeros, qui sunt ab 1 usque in 7225, et inuenies pro quinto quadrato eorum 13046444; cui quinto numero, si addideris summam predictorum quatuor, habebis pro summa omnium 5 numerorum quadratorum 13052769; et isto modo poteris plures quadratos numeros inuenire.

ascendendo, donec extremus eorum quadratus fiat, et sint $.ab.$ $.bc.$ $.cd.$ $.de.$ $.ef.$; et sit $.ef.$ quadratus: et quoniam $ef.$ est quadratus, et $.ae.$ est quadratus, cum procreetur ex ordinata collectione imparium $.ab.$ et $.bc.$ et $.cd.$ et $be.$; et totus $.af.$ numerus est similiter quadratus; et sic ex duobus quadratis ae et $ef.$ fit quadratus $.af.$ Item aliter accipiam aliquem quadratum parem, cuius medietas sit par | ut 36, cuius medietas est 18; et auferam ab eo, et addam eidem .1., egredientur 17 et 19, qui sunt impares numeri et continui, cum nullus impar numerus cadat inter eos: ex horum quoque additione progreatur (sic) 36, qui est quadratus; et ex additione reliquorum imparium, qui sunt ab uno usque in 15, procreatur 64; ex quibus duobus quadratis procreatur 100, qui est quadratus, et procreatur ex collectione imparium numerorum, qui sunt ab uno usque in 19. Vel accipiam quadratum numerum imparem, cuius tertia pars sit integra, ut 81., cuius tertia est 27; et accipiam ipsum 27 cum duobus imparibus numeris, quibus ipse est medius, scilicet 25 et 29; et hi tres numeri coniuncti faciunt .81., qui est quadratus; et ex alijs, qui sunt ab uno usque in 23, egredientur 144, cuius radix est 12: additis ergo 144 cum 81 exit summa collectionis imparium numerorum, qui sunt ab uno usque in 29, scilicet 225; qui numerus est quadratus, et est eius radix 15. Simili quoque modo possunt inueniri quatuor et plures continui impares numeri, ex quorum collectione procreatur quadratus numerus; et ex reliquis, qui sunt sub ipsis usque ad unitatem, procreabitur alius quadratus; et ipsi duo quadrati facient semper quadratum numerum. Similiter inuenij, unum quemque quadratum excedere ipsum quadratum, qui ante eum est immediate, secundum quantitatem additionis radicem ipsorum. Verbi gratia: 121, cuius radix est .11., excedit 100, cuius radix est 10, secundum quantitatem additionis de 10 et 11, scilicet radicem ipsorum. Quare unus quisque quadratus excedit secundum quadratum ante ipsum, secundum quantitatem quadrupli radicis quadrati, qui est in medio eorum, ut 127 qui excedit 81 in quadruplum de 10; et sic possunt inueniri differentie que sunt inter quadratos per distantiam radicem ipsorum. Et quando due continue radices aggregate faciunt quadratum numerum, tunc quadratus maioris radicis equabitur duobus quadratis. Similiter quando quadruplum alicuius radicis est quadratus, tunc quadratus sequentis radicis equabitur duobus quadratis, quorum unus erit ille qui creatus est ex quadruplo predicto, et alius est, cuius radix est uno minus radice quadruplicata. Ut si quadruplicetur 9, egredietur .36. Ergo 100, cuius radix est .10., equatur 64, cuius radix est 8. et 36 qui fuit quadruplum de 9. Et nota, quia ex quadruplicatione alicuius numeri non egredietur quadratus nisi ipse fuerit quadratus quia, ut, Euclides ostendit, cum proportio numeri ad numerum est sicut proportio quadratorum; tunc factus ex multiplicatione eorum quadratus eorum; et quia .4. quadratus est, oportet ut fiat quadratus ille numerus quem multiplicat, ut factus ex eis sit quadratus. Et sic possumus multimode tres quadratos numeros inuenire, quorum unus semper equabitur reliquis ag-

gregatis. Sed unde oriatur, omnem quadratum excedere | quadratum antecedentem sibi, secundum quantitatem additionis radicum ipsorum, ut diximus, patebit si radices eorum ponamus in lineas ab et bg . Et quoniam ab et bg sunt numeri continui, erit unus eorum maior alio. Sit ergo bg uno plus quam ab , et auferatur ex bg unitas dg , remanebit bd . equalis ba : et quoniam bg numerus diuisus est in duo, scilicet in bd et dg , erit multiplicatio bd in se cum dg in se et cum duplo dg in bd . equalis multiplicationi bg in se. Sed multiplicatio bd in se equatur multiplicationi ab in se. Ergo quadratus qui fit á numero bg superhabundat eum, qui fit a numero ab , secundum quantitatem multiplicationis gd in se et dupli gd in bd . Sed multiplicatio dg in se est unus, qui est equalis unitati dg , uel est eadem; et multiplicatio dupli dg in bd facit duplum ex bd , cum dg sit 1.; ergo duplum bd est ad ; ergo quadratus, qui fit á numero bg , excedit quadratum qui fit á numero ab , secundum quantitatem additionis radicum eorum, que sunt ab et bg ; quod oportebat ostendere.


Aliter quoniam bd numerus equatur numero ba , erit totus ad diuisus in duo equa super punctum b , cui addita est unitas dg ; erit ergo multiplicatio dg in ag cum quadrato qui fit á radice ab equalis quadrato qui fit á radice bg : quare quadratus, qui fit á numero bg , excedit quadratum qui fit á numero ab , secundum id quod fit ex ductu dg in ag . Sed dg in ag facit numerum ag , cum dg sit unum. Ergo quadratus bg excedit quadratum, qui fit ab ab , secundum additionem radicum ipsorum; que additio est numerus ag . Similiter ostendetur, omnem quadratum excedere omnem quadratum minorem sui, secundum multiplicationem superhabundantig radicum ipsorum in additionem utriusque radicis. Verbi gratia: sint due radices duorum quorumlibet quadratorum ag et gb ; et sit gb maior quam ag , secundum numerum db . Quare multiplicatio ag in se cum db in ab equatur multiplicationi gb in se; ergo quadratus, qui fit á numero gb , excedit quadratum qui fit ab ag in id quod radix gb excedit radicem ag ductum in utramque radicem, scilicet in hoc quod fit ex ductu db in ab ; quod oportebat ostendere.

Est enim alius modus inueniendi duos quadratos fatientes coniunctum ex eis numerum quadratum, qui in x^o euclidis reperitur. Adiaceant duo quadrati numeri simul pares uel impares ab bg ; quare conpositum ex eis ag erit par; et esto ab maior quam bg , et diuidatur ag in duo equa secundum d . Numerus ergo integer est ad , cum sit medietas numeri ag . Et extracto ad ex ab numero, remanebit db numerus integer. Et quoniam ag numerus diuisus est equaliter | et inequaliter in db , erit multiplicatio ab in bg cum quadrato qui fit á numero db , equalis quadrato qui fit á numero dg ; sed id quod fit ex ductu ab in bg quadratus est, cum quadrati sint numeri ab et bg , quadratus est etiam id quod fit á numero db ; et sic inuenti sunt duo quadrati facientes coniunctum ex eis quadratum numerum, ipsum uidelicet qui fit á numero dg ; quod oportebat facere.

Volo demonstrare quare ex ordinata imparium collectione, ab uno incipiendo in infitum. egrediatur ordinata series quadratorum: adiaceant numeri continui ab unitate A . quotcumque bg gd de ez zi , et componatur bg cum A unitate, et egrediatur numerus t : similiter componatur unusquisque numerus cum suo antecedente

fol. 20 recto.

* erit multiplicatio . . . superhabundat eum * (fol. 20 recto, lin. 6-8; pag. 255, lin. 6-8).



* superhabundantig . . . radicis * (fol. 20 recto, lin. 24 e 25; pag. 255, lin. 22-23).

a g d b

* db numerus . . . est equaliter * (fol. 20 recto, lin. ultima e margine inferiore; pag. 255, lin. 33 e 34).

a d b g

fol. 20 verso.

et cum suo sequente, et sit compositus numerorum $bg.$ et $gd.$ numerus $k.$; numerorum uero gd et de numerus $L.$; numerorum autem de et eo numerus $M.$, ipsorum videlicet qui sunt ez et zi numerus $N.$: dico primum, numeros $t.k.l.m.n.$ impares esse et continuos ab unitate; numerus enim $zi.$ aut par est aut impar: si par est numerus $zi.$, impar est numerus $ez.$; et si impar est numerus $zi.$, par est numerus $ez.$; continui enim sunt. Quare compositus numerorum $ez. zi.$, scilicet $n.$, est impar. Similiter ostendemus, compositum numerorum $de. ez.$, scilicet $m.$, imparem esse. Eodemque modo numeros $l.k.t$ impares esse monstrabuntur: dico quidem, continuos impares esse numeros $t.k.l.m.n.$ Ex coniuncto quidem ez cum zi factus est numerus $n.$; et ex coniuncto de cum ez factus est numerus $m.$ Quot ergo superhabundat numerus $zi.$ numerum $de.$, tot superhabundat numerus $n.$ numerum $m.$ Superhabundat enim $zi.$ numerum ez in uno, in quo etiam numerus $ez.$ superhabundat numerum $de.$ Ergo numerus $zi.$ superhabundat numerum $de.$ in duobus. Quare numerus $n.$ superhabundat numerum $m.$ similiter in duobus, in quibus etiam inuenietur eodem modo, numerum $m.$ superhabundare numerum $l.$, et numerum $l.$ numerum $k.$, et numerum $k.$ numerum $t.$, et numerum $t.$ unitatem $A.$: continui ergo impares sunt ab unitate numeri $t. k. l. m. n.$, ut prediximus.


Et ut ostensum est superius, quadratus qui fit a numero $zi.$ excedit quadratum qui fit a numero $ez.$ in numero qui fit ex coniuncto $ez. zi.$, hoc est in numero $n.$ Similiter ostendetur, quadratus qui fit a numero $ez.$ superhabundare quadratum qui fit a numero $de.$ in coniuncta numerorum $de. ez.$, hoc est in numerum $m.$ Et quadratus, qui fit a numero $de.$, superhabundat quadratum qui fit a numero $gd.$, secundum numerum $l.$ Et quadratus, qui fit a numero $gd.$, superhabundat quadratum qui fit a numero $bg.$, secundum $k.$; et quadratus a numero $bg.$ superhabundat quadratum unitatis, secundum numerum $t.$: est enim $t.$ ternarius, et $bg.$ est binarius; ergo si super quadratum unitatis, hoc est super $t.$, addatur numerus $t.$, in quo quadratus numeri $bg.$ superhabundat quadratum unitatis, ueniet quadratus numeri $bg.$; super quem, addito numero $k.$, ueniet quadratus numeri $gd.$; super quem quadratum, si addatur numerus $l.$, ueniet quadratus numeri $de.$; super quem quadratum, si addatur numerus $m.$, ueniet quadratus numeri $ez.$; super quem iterum, si addatur numerus $n.$, in quo quadratus numeri $zi.$ superhabundat quadratum numeri $ez.$, manifeste ueniet quadratus numeri $zi.$ Sunt enim numeri $A. bg. gd. de. ez. zi.$ continui, et eorum quadrati surgunt ex collectione continua impari numerorum $a. t. k. l. m. n.$, ut oportebat ostendere.

Inuenire duos numeros, quorum quadrati insimul iuncti faciunt quadratum factum ex coniunctione quadratorum duorum aliorum numerorum datorum: sint dati duo numeri a et $b.$, quorum quadrati insimul iuncti faciunt quadratum numerum g : oportet duos alios numeros inuenire, quorum quadrati insimul coniuncti faciunt equale numero $g.$ quadrato. Inueniantur alij duo numeri, quorum quadrati insimul iuncti faciunt quadratum numerum, ex mensura quorum faciant recte $de. ez.$, et componantur facientes angulum rectum, ipsum videlicet qui est sub $dez.$; latus quoque dz potest super latera $de.$ et ez : quadratum quidem, qui fit a recta $dz.$, aut est equalis numero $g.$ aut non: esto prius equalis; inuencti sunt ergo duo alij numeri, quorum qua-

numero $k.$ quem quadratum » (fol. 20 verso, lin. ultima e margine inferiori pag. 256, lin. 28).

fol. 21 recto.

duo numeri maior; et » (fol. 21 recto, lin. 12-19; pag. 256, lin. 39 — pag. 257, lin. 4).




dratj coniuncti faciunt quadratum numerum equalem numero .g., quorum unus est equalis recte .de., alter est equalis recte .ez. Si autem quadratus qui fit á recta .dz, hoc est á numero .dz., non est equalis numero .g., erunt itaque maior ipso uel minor: esto prius maior; et quoniam quadratus, qui fit á numero .dz., maior est numero .g., erit numerus .dz. maior radice .g.: accipiatur ergo radix numeri .g., que sit .i. numerus, et accipiatur equalis .I. á numero .dz., fitque .tz.; et á puncto .t. super rectam .ez. cathetus protrahatur .tk.; equidistans ergo est .tk. recte .de. Quare triangulus .tkz similis est triangulo .dez.; est ergo sicut .zd. ad .zt., ita .de. ad .tk. Sed proportio .zd. ad .zt. est nota; ratiocinate enim sunt ambe. Quare et proportio .de. ad .tk. erit similiter nota. Et cum .de. sit ratiocinata. Quare erit et recta .tk. etiam numerata. Similiter ostenditur, rectam .zh. esse ratiocinatam, cum proportio eius sit ad .ze. sicut .zt. ad .zd.; numerate ergo sunt .tk. et .kz., quorum quadrati insimul coniuncti faciunt quadratum, qui fit á recta .tz. Sed numerus quadratus qui fit á numero .tz. equalis est ei qui fit á numero .I, radix enim est numerus .I. numeri .g. Ergo quadratus, qui fit á .tz., equalis est numero .g; inuenti sunt enim duo numeri .tk. et .kz., quorum quadrati insimul coniuncti faciunt equale quadrato numero .g. Rursus sit minor .dz. quam .I., et protra|hatur recta .zd. usque ad .l., ut sit .zl. equalis numero .I. Similiter protrahetur .ze. in .m., et copuletur .lm., et fit equidistans .lm. recte .de., quoniam similis est triangulus .dez. triangulo .lmz., et est nota proportio .zd. ad .zl.; erunt ergo noti numeri .zm. et .ml.: inuenti ergo sunt duo numeri .lm. et .mz., quorum quadrati coniuncti faciunt quadratum equalem numero .g., cum .lz. sit equalis radici eius; quod oportebat facere.


Et ut hec in numeris habeantur, sit .a. 5, et .b. 12; quare .g, qui est coniunctum ex quadratis numerorum .a.b., est 169., et eius radix, scilicet .I., est 13.; et adiaceant due linee .de. et .ez. angulum rectum continentis, qui est .dez.; et sit recta .de. 15, et .ez. 8.; quare .dz. erunt 17., et sumpta est in recta .dz. recta .zt. equalis .I.; est ergo .zt. 13, et producta est recta .tk. equidistans recte .de.; quare est sicut .zd. ad .zt., ita .de. ad .tk.: multiplicabis ergo .zt. in .de., hoc est 13 per 15, et diuides summam per .dz., hoc est per 17, exibat numerus .tk. $\frac{9}{17}$ 11. Similiter si multiplicaueris .zt. per .ze., et diuiseris per .zd., exibat .kz. $\frac{2}{17}$ 6.; et sic inuenti sunt duo numeri, scilicet .tk. et .kz., quorum quadrati coniuncti faciunt numerum .g., hoc est quadratum qui fit á .zt. Similiter ostendetur, si numerus .dz. fuerit minor .I., ut in alia figura, in qua ponemus ut sit .de. 4 et .ez. 3. Quare .dz. est 5.; et protracta est .zd. in .l., et est .zl. equalis .I., scilicet 13.; et est sicut .zd. ad .zl., ita .de. ad .lm. Quare multiplicabis .zl. in .de., et diuides per .zd., exibat .lm. $\frac{2}{5}$ 10. Similiter diuisa multiplicatione ex .zl. in .ze. per .zd., scilicet 39 per 5, exibat .mz. $\frac{1}{5}$ 7; et sic inuenti sunt alij duo numeri facientes compositum ex quadratis ipsorum 169., qui sunt $\frac{2}{5}$ 10 et $\frac{1}{5}$ 7; et sic ostenditur, hoc posse fieri in infinitis modis.

Si quatuor numeri non proportionales proponuntur, et sit primus minor secundo, et tertius minor quarto, et agregatus ex quadratis primj et secundi multiplicetur per agregatum quadratorum tertij et quarti, et neuter ex agregatis quadratus fuerit, egredietur numerus, qui duobus modis equabitur duobus quadratis numeris: et si unus tantum ex agregatis fuerit quadratus, tunc equabitur egressus numerus duobus quadratis tripliciter: et si ambo compositi quadrati fuerint, tunc egressus equabitur duo-


« quoniam quadratus Quare et » (fol. 21 recto, lin. 20-25; pag. 257, lin. 4-9).




« faciunt equale . . . et protrahatur » (fol. 21 recto, lin. ultima, margine inferiore, fol. 21 verso, lin. 1; pag. 257, lin. 16 e 17).



« quorum quadrati . . . numerus tk. » (fol. 21 verso, lin. 5-13; pag. 257, lin. 20-29).



« kz. $\frac{2}{17}$ 6.; . . . hoc posse » (fol. 21 verso, lin. 15-23; pag. 257, lin. 30-38).



bus quadratis quadrupliciter; et hec intelligantur sine fractione. Sint $iii.$ ^{or} numeri non proportionales $a. b. g. d.$, et sit autem $a.$ minor $b.$, et $g.$ minor $d.$; et si compositus quadratorum ex numeris $a.b.$ numerus est $e.$, compositus quidem ex quadratis | numerorum $.g.d.$ esto $.z.$; et multiplicetur $e.$ per $.z.$, egrediatur numerus $.ef.$, et non sit quadratus aliquis numerorum $.e.z.$; dico quod numerus $.cf.$ equatur duobus quadratis, duobus numeris etiam duobus modis: multiplicatur primum $a.$ per $g.$, et egrediatur numerus $.tk.$, et ex $b.$ in $d.$ egrediatur $.kl.$, et ex $a.$ in $d.$ egrediatur $.mn.$, et ex $b.$ in $g.$ egrediatur $.no.$ Et quoniam numeri $a.b.g.d.$ proportionales non sunt, et est minor $a.$ quam $b.$, et $g.$ quam $d.$, multiplicationes supradictas inaequales esse necesse est; et est minor tk quam $kl.$, quod sit $n.kl.$: ex kl summatur $.kp.$ equalis $.tk.$ Similiter numerorum $.m.n.n.o$ sit maior $.no.$ quam $.mn.$, et adiaceat $nq.$ equalis $.mn.$; dico quod numerus $.cf.$ equatur coniunctioni quadratorum qui fiunt á numeris $tl.$ et $qo.$, et á numeris $.ma.$ et $pl.$; quoniam ex ductu $e.$ in $.z.$ provenit $.cf.$, et est $e.$ summa duorum quadratorum qui fiunt á numeris $a.b.$ Ergo $.cf.$ provenit ex multiplicatione quadrati qui fit á numero $a.$ in $.z.$, et á numero $b.$ in $.z.$ Sit ergo $.ci.$ id quod egreditur ex multiplicatione eius qui fit ab $a.$ in se, scilicet quadrati ipsius $a.$ in $.z.$; remanebit ergo $.if.$ pro numero qui fit ex ductu quadrati numeri $b.$ in $.z.$ Sed $.z.$ est coniunctio quadratorum qui fiunt á numeris $.gd.$ Quare multiplicatio quadrati, qui fit á numero $a.$ in $.z.$, equatur multiplicationibus duabus, videlicet quadrati qui fit ab $d.$ in quadratum qui fit á numero $g.$, et in quadratum qui fit á numero $d.$ Sit ergo $.ch.$ id quod egreditur ex multiplicatione quadrati, qui fit ab $a.$, in quadratum qui fit á numero $g.$; erit ergo $hi.$ id quod egreditur ex multiplicatione quadrati qui fit á numero $a.$ in eum qui fit á numero $d.$ Item $.ir.$ sit multiplicatio eius qui fit á numero $d.$ in eum qui fit á numero $g.$; remanebit ergo $.rf.$ illud quod fit ex ductu quadrati qui fit á numero $b.$ in eum qui fit á numero $d.$: diuisus est ergo totus numerus $.cf.$ in $iii.$ ^{or} numeris qui sunt $ch.hi.ir.rf.$; et est quadratus unusquisque eorum, cum factus sit ex multiplicatione quadrati numeri in quadratum numerum, quorum radices esse ostendam $tk.kl.mn.no.$: primum quidem ostendam, quadratum, qui fit á numero $tk.$, equalem esse numero $ch.$; est enim ch factus ex multiplicatione quadrati qui fit á numero $a.$, in quadratum qui fit á numero $g.$ Sed tk factus est ex multiplicatione $a.$ in $g.$; quare quadratus, qui fit á numero tk , equatur quadrato qui fit ab eo ex $g.$ Similiter ostendetur, quadratum, qui fit ex $a.$ in eum qui fit ex $d.$, equari quadrato quod fit á numero $mn.$, idest equari numero $hi.$, et quadratum qui fit á numero $kl.$ numero $ir.rf.$; et adhuc quadratus, qui fit á numero $no.$, equatur numero $ir.rf.$: demonstrandum quidem restat, duos quadratos, qui fiunt á numeris $tl.$ et $qo.$, vel fiunt á numeris $.mo.$ et $pl.$, equales esse $iii.$ ^{or} quadratis qui fiunt á numeris $tk.kl.mn.no.$: quibus ostendam primum equales esse illj | qui fiunt á numeris tl et $qo.$; quadratus quidem, qui fit á numero $tl.$, equatur duobus ex predictis quatuor quadratis, eis qui fiunt á numeris $tk.kl.$, et duplo multiplicationis tk in $kl.$ Quare restat demonstrandum quod duplum multiplicationis tk in $kl.$ cum quadrato qui fit á numero $qo.$, faciant equalem duobus reliquis quadratis, eis videlicet qui fiunt á numeris $mn.no.$ Ostendam primum quod tk in $kl.$ equatur $mn.$ in $no.$ Est enim tk id quod fit ex $a.$ in $g.$, et $kl.$ est factus ex $b.$ in

fol. 22 recto.

* numeris ... egrediatur * (fol. 22 recto, lin. 3 e 4; pag. 258, lin. 6 e 7).

$$\frac{r}{k} \quad \frac{p}{l}$$
* quam $d.$... sit $n.kl.$ * (fol. 22 recto, lin. 6; pag. 258, lin. 9 e 10).
$$\frac{m}{n} \quad \frac{q}{o}$$

* quadratorum ... remanebit * (fol. 22 recto, lin. 10, 11-13; pag. 258, lin. 14-17).

$$\frac{a}{b} \quad \frac{g}{d}$$

$$\frac{c}{e} \quad \frac{z}{f}$$
* $a.$ in $.z.$... quadratum * (fol. 22 recto, lin. 16; pag. 258, lin. 19 e 20).
$$\frac{e}{h} \quad \frac{i}{r} \quad \frac{f}{f}$$

fol. 22 verso.

* $no.$ Ostendam ... Est enim * (fol. 22 verso, lin. 6; pag. 258, lin. 42 e 43).
$$\frac{a}{a}$$

.d. Ergo multiplicatio *.tk.* in *kl* egreditur ex multiplicatione *.a.* in *.g* ducta in multiplicationem ex *b.* in *d.* Similiter multiplicatio *.mn.* in *.no.* surgit ex multiplicatione *.a.* in *.d.* ducta in multiplicationem *.b* in *g.* Quare *mn.* in *.no.* est sicut *.tk* in *kl.* Ergo oportet demonstrare, duplum *mn.* in *.no.* cum quadrato qui fit á numero *.qo.*, equalem esse quadratis qui fiunt á numeris *mn.* et *.no.*: est enim *.nq.* equalis *.nm.*; quare quadratus, qui fit á numero *.mn.*, equatur multiplicationi *mn.* in *.nq.*; est enim plus *mn.* in *.no.* quam *mn.* in *.nq.*, secundum illud quod est ex *mn.* in *.qo.* Ergo superficies *mn.* in *no.* superhabundat (*sic*) quadratum qui fit á numero *mn.* in superficie *.qo.* in *.mn.*, hoc est *.qo.* in *.qn.* Et quoniam numero *mn.* equalis est numerus *.qn.*, comunis adiaceat *.qo.* Erit ergo totus *no.* equalis numeris *mn* et *qo.* Quare quadratus, qui fit á numero *.no.*, equatur duabus multiplicationibus que fiunt á numero *.on.* in *.nm.*, et ab *.on.* in *oq.* Ergo quadratus, qui fit á numero *.no.*, superhabundat superficiem *.on.* in *.nm.* in superficie *qo* in *on.* Sed superficies *mn.* in *.no.* superhabundat quadratum, qui fit á numero *mn.*, in superficie *.nq.* in *qo.* Sed quadratus, qui fit á numero *.no.*, superhabundat eandem superficiem *mn.* in *.no.* in hoc quod fit ex *no.* in *.oq.* Sed superficies *.no.* *qo.* superhabundat superficiem *.oq.* *qn.* in id quod fit á numero *qo.* in se. Ergo quadrati, qui fiunt á numeris *mn.* et *.no.*, superhabundant duplum superficiei *mn.* in *.no.*, hoc est *.tk.* in *kl.* in quadrato numeri *.qo.* Sed duplum multiplicationis *.tk.* in *kl.* cum quadrato qui fit á numero *.qo.* equatur duobus quadratis qui fiunt á numeris *mn.* *no.* Quare quadrati, qui fiunt á numeris *.tl.* et *.qo.*, equantur quatuor quadratis qui fiunt á numeris *.tk.* *kl.* *mn.* *no.*, hoc est numero *cf.*; quod oportebat ostendere.

Ex hoc quidem manifestum est quod quando duo numeri inaequales proponuntur, duplum multiplicationis unius in alium cum quadrato numeri in quo maior numerus superhabundat minorem, equatur quadratis qui fiunt ab ipsis numeris. Quare multiplicatio $|tk$ in kl , hoc est $mn.$ in $no.$ cum quadrato qui fit a numero $.pl.$, equatur quadratis qui fiunt á numeris $tk.$ $kl.$ Quare si comuniter addantur duo quadrati qui fiunt á numeris $mn.$ $no.$, erunt duplum superficiei, que est ex $mn.$ in $no.$, cum tribus quadratis qui fiunt á numeris $.pl.$ $mn.$ $no.$, equales im.^{or} quadratis qui fiunt á numeris $.tk.$ $kl.$ $mn.$ $no.$, hoc est numero $.cf.$ Sed duplo superficiei, que est ex $mn.$ in no et duobus quadratis, qui sunt ex $mn.$ $no.$, equalis est quadratus qui fit á numero $.m.o.$ Ergo duo quadrati, qui fiunt á numeris mo et $pl.$, equantur numero $.cf.$, ut oportebat ostendere.

fol. 23 recto.

Sed sit unus ex numeris $.e.z.$ quadratus, et primo numerus $.e.$; dico esse possibile inuenire alios duos quadratos numeros, qui equantur numero $.cf.$, quorum unus est ipse qui egreditur ex multiplicatione numeri $e.$ in quadratum qui fit á numero $.g$, et alius egreditur ex ductu $.e.$ in eum qui fit á numero $.d.$, quoniam quadratus est numerus $.e.$; si multiplicatur per quadratum numerum, factus ex multiplicatione quadratus erit. Quare quadrati sunt qui fiunt ex ductu $.e.$ in quadratos qui fiunt a numeris $.g.d.$ Sed coniunctus ex quadratis numerorum $.g.d.$ est $.z.$; et ex $.e.$ in $.z.$ provenit $.cf.$; quod oportebat ostendere.

Similiter si numeri $.e.z.$ quadrati fuerint, erunt duo alij numeri quadrati, qui coniuncti facerent numerum $.cf.$; et sunt illi qui egrederentur ex ductu $.z.$ in qua-

dratis, qui fiunt a numeris $.ab.$, et ex ductu $.e$ in quadratis qui fiunt á numeris $.g.d.$: et, sicut dixi, si unus ex numeris $.e.z.$ quadratus fuerit, equatur numerus $.cf.$ ter duobus diuersis quadratis; et si ambo quadrati fuerint, equabitur numerus $.cf.$ quater duobus diuersis quadratis.

Inuenire alio modo quadratum numerum, qui duobus quadratis numeris equatur: adiaceant .iii.^{or} numeri proportionales $.ab.g.d.$, ut $.a.$ quidem ad $.b.$, ita $.g.$ ad $.d.$; et compositus ex quadratis numerorum $.a.b.$ esto $.e.$, numerorum quoque $.g.d.$ esto $.z.$; et multiplicetur $.e.$ in $.z.$, et proueniet $.cf.$; dico quoniam $.cf.$ est quadratus et equalis coniunctio ex duobus quadratis; quod sic probatur: ex $.a.$ quidem in $.g.$ proueniat $.tk.$, et ex $.b.$ in $.d.$ proueniat $.kl.$, et ex $.a.$ in $.d.$ proueniat $.mn.$, et ex $.b.$ in $.g.$ proueniat $.no.$; dico primum quod numerus $.mn.$ numero $.no.$ est equalis: sunt enim proportionales numeri $.a.b.g.d.$ in ea quam habet $.a.$ ad $.b.$ proportione. Quare multiplicatio ex $.a.$ in $.d.$ equatur multiplicationi ex $.b.$ in $.g.$, hoc est numerus $.mn.$ numero $.no.$: reliquos uero duos numeros inequales esse demonstrabo, scilicet $.tk.$ et $.kl.$: quare est sicut $.a.$ ad $.b.$, ita $.g.$ ad $.d.$; per equale ergo erit ut $.a.$ ad $.g.$, ita $.b.$ ad $.d.$. Quare si $.b.$ est maior quam $.a.$, erit $.d.$ maior $.g.$; et si minor est $.b.$ quam $.a.$, minor itaque esset $.d.$ quam $.g.$. Quare numeri $.ag.$ aut | ambo sunt minores, aut ambo maiores numeris $.b.d.$, equales quidem esse non possunt; quia si equales essent, iam numeri $.a.g.b.d.$ non essent .iii.^{or}.

Sint ergo $.ag$ minores; quare factus ex eis, scilicet $.tk$, minor est factus ex $.db.$, hoc est quam $.kl$: et quoniam est ut $.a.$ ad $.g.$, ita quadratus, qui fit ab $.a.$ ad numerum qui fit ex a in $.g.$, hoc est ad numerum $.tk$. Rursus quoniam est sicut $.a.$ ad $.g.$, ita $.b.$ ad $.d.$. Sed sicut $.b.$ ad $.d.$, ita quadratus, qui fit á numero $.b.$, ad numerum qui fit ex $b.$ in $.d.$, hoc est ad numerum $.kl$. Per equale ergo est ut $.a.$ ad $.g.$, ita quadratus, qui fit á numero $.b.$, est ad numerum $.kl$. Sed sicut $.a.$ ad $.g.$, ita fuit quadratus qui fit ab $.a.$ ad numerum $.tk.$: quare et compositi et proportionales erunt, hoc est ut $.a.$ ad $.g.$, ita compositus quadratorum, qui fiunt á numeris $.a.b.$, est ad compositum duorum numerorum $.tk.$ et $.kl.$, hoc est numerus $.e.$ ad numerum $.tl.$ Similiter ostendetur quod sicut $.a.$ ad $.g.$, ita $.tl.$ ad $.z.$. Quare est sicut $.e.$ ad $.tl.$, ita $.tl.$ ad numerum $.z.$. Ergo numerus $.tl.$ medius proportionalis est numerorum $.e.z.$. Quare quadratus, qui fit á numero $.tl.$, equatur superficiei retriangulj, qui fit ex numeris $.ez.$. Sed superficies numerorum, que fit á numeris $.e.z.$, est numerus $.cf.$. Quare $.cf.$ est quadratus, cuius radix est $.tl.$ Aliter quoniam ostensum est, numerum $.cf.$ in superiori demonstratione equari .iii.^{or} quadratis qui fiunt á numeris $.tk.kl.mn.no.$, demonstrabo quidem, quadratum, qui fit á numero $.tl.$, equarij eisdem .iii.^{or} quadratis hoc modo. Quadratus quidem, qui fit á numero $.tl.$, equatur duobus quadratis qui fiunt á numeris $.tk$ et $.kl.$, et duplo superficiei ex $.tk$ in $.kl.$ Sed superius demonstraui, superficiem, que fit ex $.tk$ in $.kl.$, equalem esse superficiei, que fit ex $.mn.$ in $.no.$. Sed superficies, que fit ex $.mn.$ in $.no.$, est ex equalibus numeris. Quare $.mn.$ in $.no.$ est sicut $.mn.$ in se, uel sicut $.no.$ in se. Quare duplum ex ductu $.tk$ in $.kl.$ equatur duobus quadratis qui fiunt á numeris $.mn.no.$; quare demonstratum est, quadratum, qui fit á numero $.tl.$, equalem esse eis qui fiunt á numeris $.tk.kl.mn.no.$, hoc est numero $.cf.$, ut oportebat ostendere.

ad $.d.$. . . $.mn.$ et $.z.$ (fol. 23 recto, lin. 24—27; pag. 260, lin. 6—10).

$$\frac{a}{b} = \frac{g}{d} = \frac{e}{z}$$

equalis sunt . . . ad $.b.$ (fol. 23 recto, lin. 29; pag. 260, lin. 11 e 12).

$$\frac{c}{f}$$

demonstrabo . . . ut $.a.$ (fol. 23 recto, lin. 31—32; pag. 260, lin. 14 e 15).

$$\frac{t}{k} = \frac{p}{l}$$

minor est $.b.$. . . $.ag.$ aut (fol. 23 recto, lin. ultima; pag. 260, lin. 16 e 17).

$$\frac{m}{n} = \frac{o}{z}$$

fol. 23 verso.

ET quoniam minor est numerus $.tk.$ numero $.kl.$, accipiatur ex $.lk.$ numerus $.kp.$ equalis numero $.tk.$; et, ut superius diximus, inuenientur quadrati qui fiunt á numeris $.mo.$ et $.pl.$, equarj numero $.cf.$

POSSUNT etiam duo quadrati inuenirj, quorum aggregatio erit quadratus numerus per quoslibet duos numeros datos. Verbi gratia: dentur duo numeri $.a.$ et $.b.$ prout libuerit: sit tamen $.b.$ maior; et auferatur á quadrato numeri $.b.$ quadratus numeri $.a.$, et residuum erit radix unius quadratorum inueniendorum: deinde accipiatur duplum eius quod prouenit ex ductu $.a.$ in $.b.$, quod erit etiam radix alterius quadrati; quod probatur per precedentem proximam demonstrationem. Sic ponam quod sit proportio $.g.$ ad $.d.$, sicut $.a.$ ad $.b.$; et sit $.g.$ equalis $.a.$, et $.d.$ equalis $.b.$; et erit id quod fit ex a in se equale ei quod fit ex $a.$ in $.g.$; et fuit id $.tk.$; et illud quod fit á $.b.$ equale ei quod fit á $.b.$ in $.d.$, scilicet $.kl.$: vnde si auferatur $.tk.$ ex $.kl.$, hoc est $.kp.$, remanebit $.pl.$, que est una ex radicibus.

Item duplum superficiei $.a.$ in $.b.$ equabitur eis qui fiunt ex $.a.$ in $.d.$ et ex $.g.$ in $.b.$, scilicet numero $.mo.$, qui est alia radix.

INVENIRE duos numeros, quorum quadrati insimul iuncti faciant numerum non quadratum factum ex compositione duorum quadratorum factorum ex numeris datis.

SINT duo dati numeri $.gd.$, quorum quadrati simul coniuncti fiant numerum $.z.$ non quadratum: uolo duos alios numeros inuenire, quorum quadrati insimul iuncti faciant numerum $.z.$ Adiaceant duo numeri $.a.$ et $.b.$, quorum quadrati coniuncti faciant numerum $.e.$ quadratum, non sit sicut g ad $.d.$, ita $.a.$ ad $.b.$; et multiplicetur $e.$ per $z.$, egrediatur numerus $.i.$; et inueniantur duo numeri, quorum quadrati insimul coniuncti faciant numerum $.I.$ Sintque $.p.q.$, in quorum mensura ponantur recte $.kl. lm.$ facientes angulum rectum, ipsum scilicet qui sub klm copuletur $.km.$ Erit ergo $km.$ radix numeri $.I.$; et accipiatur ex $.km$ recta $.mn.$ equalis radici numeri $.z.$; et protrahatur secundum rectum angulum linea $.no$ et $.om.$, sunt recte rationales facientes compositum ex quadratis ipsorum equalem numero $.z.$ Quoniam quidem quadratus recte $.km.$ est equalis numero $.I.$; et numerus $.I.$ est factus ex $.e.$ in $z.$; ergo si multiplicauerimus radicem numeri $.e.$ per radicem numeri $.g.$, habebitur radix numeri $.I.$, hoc est $.mk.$ Et quia radix numeri $.e.$ est rationalis, quotiens unitas est in ipsa radice, totiens radix numeri $.g.$, hoc est $.mn.$, est in recta $.mk.$ Sic ergo $.f.$ radix numeri $.e.$ Quare est sicut unitas ad numerum $.f.$, ita $.m.n.$ ad $.mk.$; et sicut $.mn.$ est ad $.mk.$, ita $.no.$ est ad $.kl.$, et $.om$ ad $.lm.$: per equale ergo ut unitas ad numerum $.f.$, ita $.no$ ad $.kl.$, et $.mo.$ ad $.ml.$ Quare si diuiserimus $.kl.$ per numerum $.f.$, egredietur numerus $.no.$ rationalis. Similiter si diuiserimus $.ml.$ per $.f.$, ueniet $.om.$ Inuencti sunt ergo duo numeri $.no.$ et $.om.$, quorum quadrati coniuncti faciunt non quadratum numerum $.mn.$, hoc est numerum $.z.$; qui z est compositus ex quadratis numerorum $.g.d.$; quod oportebat ostendere.


ET ut hec in numeris demonstrantur, sit numerus $.g.$ $.4.$, et numerus $.d.$ $.5.$; quare compositus ex quadratis ipsorum, scilicet $.z.$, est $.41$; et ex adiacentibus numeris $.a.$ sit $.3.$, et $.b.$ sit $.4.$, quorum quadrati coniuncti faciunt $.25.$, scilicet numerum $.e.$: multiplicatio quidem ex $.e.$ in $.z.$, scilicet de 25 in $.41$, surgit in $1025.$; et est possibile inuenire duos alios numeros dupliciter, quorum quadrati coniuncti faciunt $.1025.$, quorum unus est

fol. 24 recto.

INVENIRE ... recte $.kl.$ (fol. 24 recto lin. 10—17; pag. 261, lin. 15—23).

a	g
b	d
e	z
f	
z	
p	q

$km.$ radix ... ad $.mk.$; et (fol. 24 recto, lin. 19—26; pag. 261, lin. 25—32).



fol. 24 verso.

.32., alter .4.; uel unus est 31, et alius .8.: sit ergo *kl*. 32 aut 31, et *lm* sit .4. uel 8; et accipiatur radix de 25., scilicet numerus *f*., et diuidantur per ipsum numeri *kl* et *lm*., et habebimus *no*. et *om*.; uidelicet si *kl* est 32, et *lm*. est .4., erit *no* $\frac{2}{3}$ 6, et *om*. erit tantum $\frac{1}{3}$ unius. Inuencti sunt ergo duo numeri, scilicet $\frac{2}{3}$ 6. et $\frac{1}{3}$, quorum quadrati equantur .41., scilicet numero .z.: et si *kl* fuerit .31., et *lm*. fuerit .8., erit *no*. $\frac{1}{3}$ 6, et *om* erit $\frac{2}{3}$ 1; et sic inuencti sunt duo alij numeri, quorum quadrati insimul coniuncti faciant similiter 41.; quod oportebat facere.

Si Ab unitate numeri quot cumque continui, pares uidelicet et impares ordinate disponantur, numerus solidus, qui fit ab ultimo et á sequente et ab eorum aggregato, equatur sexcuplo summe collectionis omnium quadratorum, qui fiunt ab omnibus numeris, uidelicet qui fiunt ab unitate et á dispositis numeris: disponantur quidem ab unitate *ab*. numeri continui pares et impares quocumque ordinate *bg.gd.de.ez*.; et sit *zi*. numerus sequens numerum *ez*. in ordine numerorum, hoc est quod sit uno plus eo, dico, numerum solidum qui fit á numeris *ez*. *zi*. et *ei*., hoc est id quod fit ex ductu *ez*. in *zi*., et productum in coniunctum ipsorum, scilicet *ie*., equari sexcuplo omnium quadratorum, qui fiunt ab unitate *ab*. et á numeris dispositis *bg.gd.de.ez*. Accipiatur quidem ex numero *zi*. numerus *zt*. equalis numero *ez*., remanebit *ti*. unum. Item ex *zt*. auferatur *kz*. equalis numero *de*., remanebit similiter *kt* unum, in quo superhabundat numerus *ez*. numerum *de*.; equalis enim *zt*. numero *ez*. Erit ergo numerus *ki* duplum unius, scilicet 2. Solidus ergo numerus, qui fit á numeris *ez*. *zk*. et *ek*., equatur solido qui fit a numeris *ze*. *ed*. *dz*.: sed solidus qui fit á numeris *ez*. *zk*. *ek*. cum solido qui fit á numeris *ez*. *zk*. *ki*., et cum solido qui fit á numeris *ez*. *ki*. *ei*., equatur solido qui fit á numeris *ez*. *zi*. *ei*.: demonstrabimus quidem, solidos *ez*. *zk*. *ki*. et *ez*. *ki*. *ei*. equales esse sexcuplo quadrati qui fit á numero *ez*. Ponam itaque numerum *ez*. radicem. Erit ergo *zk*. radix, uno diminuto. Quare totus *ei*. duabus radicibus et unitati equatur: multiplicatio quidem *ez*. in *zk*. facit quadratum, excepta radice. Multiplicatio quidem unius quadrati, excepta radice, in numerum *kI*., scilicet in duo, facit duos quadratos, duabus radicibus exceptis. Ergo solidus, qui fit á numeris *ez*. *zk*. *kI*., equatur duobus quadratis qui fiunt á numero *ez*., duabus radicibus exceptis. Rursus ex *ez*. in *ki*. due radices proueniunt; quibus multiplicatis in duas radices et in unum, scilicet in numerum *ei*., faciunt iii^{or} quadratos et duas radices. Ergo solidum, quod fit á numeris *ez*. *ki*. *ei*., equatur iii^{or} quadratis et duabus radicibus, quorum unusquisque quadratus fit á numero *ez*.

Additis ergo supradictis duobus quadratis, duabus radicibus exceptis, cum iii^{or} quadratis et duabus radicibus additis, faciunt sex quadratos, quorum unusquisque fit a numero *ez*. Ergo solidum, quod fit á numeris *ez*. *zi*. *ei*., equatur solido qui fit á numero *ez*. *zk*. *ek*., et sexcuplo quadrati qui fit á numero *ez*.

Sed solido, quod fit á numeris *ez*. *zk*. *ek*., equatur solidum *de*. *ez*. *dz*. Ergo solidum, quod fit á numeris *ez*. *zi*. *ei*., equatur solido quod fit á numeris *de*. *ez*. *dz*, et sexcuplo quadrati á numero *ez*. Similiter ostenditur, Solidum, quod fit á numeris *de*. *ez*. *dz*., equale esse solido qui fit a numeris *gd*. *de*. *ge*., et sexcuplo quadrati qui fit á numero *de*. Ergo Solidum, quod fit á numeris *ez*. *zi*. *ei*., equatur solido quod

* equatur ... Multiplicatio * (fol. 24 verso, lin. ultima, margine inferiore, e fol. 25 recto, lin. 1; pag. 262, lin. 26 e 27)

a b g d e z k t q

fol. 25 recto.

fit á numeris $.gd. de. ge.$, et sexcuplo quadratorum qui fiunt á numeris $.de. ez.$: ostenditur, solidum rursus, quod fit á numeris $.gd. de. ge.$, equale esse solido quod fit á numeris $.bg. gd. bd.$, et sexcuplo quadrati qui fit á numero $.gd.$ Ergo solidum, quod fit á numeris $.ez. zi. ei.$, equatur solido quod fit á numeris $.bg. gd. db.$, et sexcuplo quadratorum qui fiunt á numeris $.gd. de. ez.$

Similiter, supradictis dispositis, ostendetur, solidum quod fit á numeris $.bg. gd. bd.$, equale esse solido quod fit ab unitate $.ab.$, et á numeris $.bg. ag.$, et sexcuplo quadrati qui fit á numero $.bg.$ Ergo solidum, quod fit á numeris $.ez. zi. ei.$, equatur solido quod fit ab unitate $.ab.$, et numeris $.bg. ag.$, et sexcuplo quadratorum qui fiunt á numeris $.bg. gd. de. ef.$ Sed solidum, quod fit ab unitate $.ab.$ et á numeris $.bg. ag.$, equatur sexcuplo quadrati qui fit ab unitate $.ab.$ Est enim $.bg. 2.$, et $ag. 3.$ Ergo solidum, quod fit á numeris $.ez. zi. ei.$, equatur sexcuplo quadratorum qui fiunt ab unitate $.ab.$ et á numeris $.bg. gd. de. ez.$; quod oportebat ostendere. Est enim alius modus, per quem possumus ad idem deuenire; qui in sequentibus ostendetur.

Si ab unitate numeri impares ordinate quotcumque disponantur, Solidum, quod fit á maximo eorum et á sequente impari et ab eorum composito, equatur duplo sexcupli omnium quadratorum, qui fiunt ab unitate et á dispositis numeris. Sint quidem ab unitate $ab.$ numeri quotcumque dispositi impares ordinate $.bg. gd. de.$, et sequens impar esto $.ez.$; dico quidem, solidum, quod fit á numeris $.de. ez.$ et ab eorum composito $.dz.$, equari duplo sexcupli, hoc est duodecuplo summe quadratorum, qui fiunt ab unitate $.ab.$ et á dispositis numeris $.bg. gd. de.$ Summatur (sic) quidem ex numero $.ez.$ numerus $.ei.$ equalis numero $.de.$; erit ergo numerus $.iz.$ duo. Ostendam prius, solidum quod fit á numeris $.gd. de.$ et eorum composito $.ge.$ cum duodecuplo quadrati qui fit á numero $.de.$, equale esse solido quod fit á numeris $.de. ez. dz.$ Sit itaque numerus $.de.$ radix; erit ergo numerus $.gd.$ radix minus duobus; et totus cum $e.$ erit due radices minus duobus. Quare ex ductu $.gd.$ in $.de.$ prouenit quadratus, duabus radicibus exceptis; quod totum, si ducatur in numerum $.ge.$, hoc est in duas radices, duabus unitatibus diminutis, prouenient duo cubi numeri et $iii.$ radices minus sex quadratis; quibus si addatur duodecuplum quadrati, qui fit á radice $.de.$, erunt duo cubi et sex quadrati et $iii.$ radices. Rursus quoniam $.de.$ est radix, erit numerus $.ei.$ similiter radix. Quare totus $.ez.$ erit radix, et duabus unitatibus additis, que sunt $.iz.$, et compositus ex eis $.dz.$ erunt due radices et due unitates. Ex ductu quidem $.de.$ in $.ez.$ prouenit quadratus et due radices. Ex ductu quidem horum in numerum $.dz.$, hoc est in duas radices et in duo, proueniunt similiter duo cubi et sex quadrati et $iii.$ radices. Quare ostensum est, solidum quod fit á numeris $.gd. de. ge.$, et duodecuplum quadrati, quod fit á numero $.de.$, equale esse solido quod fit á numeris $.de. ez. dz.$ Eodemque modo ostendetur, solidum quod fit á numeris $.bg. gd. bd.$ cum duodecuplo quadrati qui fit á numero $.gd.$, equari solido quod fit á numeris $.gd. de. ge.$ Ergo solidum, quod fit á numeris $.de. ez. dz.$, equatur solido quod fit á numeris $.bg. gd. bd.$, et duodecuplo quadratorum qui fuerint á numeris $.gd. de.$ Rursus etiam supradictis dispositis ostendetur, solidum, quod fit á numeris $.bg. gd. bd.$, equale esse solido quod fit ab unitate $.ab.$, et numeris $.bg. ag.$, et duodecuplo quadrati qui fit á numero $.bg.$ Sed solidum, quod fit ab unitate $.ab.$, et á

* quod ... ostendere * fol. 25 verso, lin. ultima e margine inferiore; pag. 264 lin. 4).

a b c d e f z

fol. 26 recto.

numeris $.bg$ et $ag.$, est duodecuplum quadrati qui fit ab unitate $.a.b.$; ternarius est numerus $.bg.$, quaternarius quoque numerus $.ag.$ Ergo solidum, quod fit a numeris $.de. ez. dz.$, equatur duodecuplum omnium quadratorum, qui fiunt á subiacentibus, scilicet ab unitate $.ab.$ et á numeris $.bg. gd. de.$; quod oportebat ostendere. |

Simili quoque modo si à binario disponantur pares numeri quotcumque per ordinem, inuenietur, solidum, quod erit ab ultimo eorum et á sequente et ab eorum composito, equari duodecuplo omnium quadratorum, qui fiunt á dispositis paribus numeris.

Eademque uia et modo inuenietur rursus si á ternario dispositj fuerint numeri quotcumque ascendentes per ternarium ordinate; solidum, quod fit ab ultimo eorum et á sequente et á coniuncto, equari sexcupli triplo omnium quadratorum qui fiunt ab ipsis numeris ascendentibus per ternarium: et quando ascendunt per binarium, ut fit in paribus, tunc ultimum solidum equatur duplo sexcupli omnium quadratorum adiacentium numerorum: et quando ascendunt per unitatem, ut fit in numeris continuis, tunc suprascriptum solidum equatur simplo sexcupli quadratorum adiacentium numerorum, ut in suprascriptis demonstrauius; que intelligas in quadratis, qui fiunt á numeris qui ascendunt ordinate per quaternarium a III.^{or} uel á V.^{mo} per quinarium uel per ascensionem reliquorum numerorum.

Si duo numeri primi componantur ad se inuicem, feceritque compositus ex eis numerum parem; si solidus numerus, qui fit ab ipsis et ab eorum composito, multiplicetur per numerum, in quo maior numerus excedit minorem, egredietur numerus, cuius vigesima quarta pars erit integra. Sint duo numeri $.ab.$ et $.bg.$ primi ad se inuicem, facientes compositum ex eis $.ag.$ numerum parem, hoc est quod sint minimj in ipsa proportione quam habet numerus $.ab.$ ad numerum $.bg.$, et numerus $.bg.$ maior; et summatur (*sic*) ex numero $.bg.$ numerus $.bd.$ equalis numero $.ab.$ Erit ergo numerus $.dg.$ id in quo numerus $.bg.$ superhabundat numerum $.ab.$ Dico quidem quod si numerus $.ab.$ multiplicetur in numerum $.bg.$, et quod proueniet ducatur in $.ag.$, et hoc totum producat in numerum $.dg.$, egredietur numerus, cuius uigesima quarta pars, hoc est tertia octaue uel quarta sexte partis erit integra. Numeri quidem $ab.$ et $bg.$ ambo impares sunt; quia si non essent impares, compositus ex eis non esset par, nec ambo sunt pares; qui si pares essent ambo, iam non essent primj ad se inuicem. Ergo impares sunt numeri $.ab.$ et $bg.$ Et quoniam numerus bd equalis est numero $.ab.$; duplus est ergo numerus $.ad.$ numero $.ab.$ Ergo par est numerus $.ad.$ Ergo reliquus $dg.$ est par; quia si par numerus auferatur á parj, par remanet; et quia numerus $.dg.$ est par, erit ergo medietas eius aut par aut impar. Esto prius impar; medietas quidem numeri $.ad.$, scilicet $.ab.$, est impar. Quare addita medietate numeri $ad.$ cum medietate numeri $.dg.$, scilicet additis duobus imparibus parem facient numerum; ergo medietas numeri $.ag.$ est par. Quare totus $.ag.$ est pariter par. Vnde quarta eius pars est integra. Quare ex ductu $| ag.$ in $.gd.$ surgit numerus, cuius octaua pars est integra. Sed si medietas numeri $.gd.$ par, erit ergo quarta eius integra; quare ex ductu $.dg.$ in $.ag.$ ueniet numerus, cuius octaua pars est similiter integra. Quare si quod fit ex ductu $.ag.$ ducatur in $.bg.$, et hoc totum producat in $.ab.$, proueniet numerus, cuius octaua pars erit integra. Et quoniam numeri $.ab.$ $.bg.$ sunt impares, aut tertia pars unius est integra aut non. Esto prius integra.

* Quare totus ... ex ductu * (fol. 26 recto, lin. ultima e margine inferiore; pag. 264, lin. 37 e 38).

a b d e
fol. 26 verso.

* medietas ... ductu $.dg.$ * (fol. 26 verso, lin. 1 e 2; pag. 264, lin. 39 e 40).

a b d e

* $ab.$ proueniet ... Et quoniam * (fol. 26 verso, lin. 5; pag. 264, lin. 42).

k

Quare ex ductu solidi, quod fit á numeris *ab. bg. ag.*, in numerum *dg.*, egrediatur numerus *k.*, cuius tertia pars est integra, et cuius etiam octava pars inuenta est integra. Ergo uigesima quarta pars eius erit integra, ut prediximus. Et si tertia pars numeri *ab* .uel. *bg.* non est integra, si unusquisque eorum diuidatur per *.3.*, remanebit aut equaliter aut inequaliter: ex utroque remaneat primum equaliter; quare numerus *gd.* diuiditur integraliter per *.3.* Quare ex ductu solidi supradicti in numerum *dg.* egreditur numerus, cuius tertia pars est integra. Sed non remaneat equaliter ex numeris *ab. bg.*, cum diuiduntur per *.3.*, remanebit ex aliquo ipsorum *.1.*, et ex alio *.2.* Quare ex coniunctione ipsorum, scilicet ex numero *ag.*, tertia pars erit integra. Vnde solidi, qui fuit á numeris *ab. bg. ag.*, tertia pars eius erit integra. Quare ex ductu ipsius solidi in numerum *dg.* egreditur numerus, cuius tertia pars est integra: et quoniam eius octava pars inuenta est similiter integra; erit ergo uigesima quarta pars eius integra, ut oportebat ostendere. Et hoc idem erit, si numeri *ab.* et *bg.* non fuerint primj ad se ad inuicem.

Et si unus ex numeris *ab. bg.* fuerit par, coniunctus ex eis erit impar; tunc ostendetur similiter si solidum, quod fit á duplo unius cuiusque et ab eorum coniuncto *ag.*, ducatur in numerum *dg.*, surgere in numerum, cuius etiam uigesima quarta pars erit integra, siue numeri sint primj inter se, siue non; et factus numerus, uidelicet cuius uigesima quarta pars est integra, congruum appellauj.

Si circa aliquem numerum adiaceant numeri quocumque minores et maiores eo, et sit multitudo minorum equalis multitudinj maiorum; et quot unusquisque ex maioribus superhabundat ipsum numerum, tot ipse numerus superhabundet minores, erit summa adiacentium ex ductu ipsius numeri in numerum multitudinis ipsorum. Circa numerum *d.* adiaceant numeri *a. b. g. e. z. I.*, et sit minor eorum numerus *a.*, maximus numerus *I.*; equot superhabundit (sic) | numerus *I.* numerum *d.*, tot superhabundat numerus *d.* numerum *a.* Similiter quot superhabundat numerus *z.* numerum *d.*, tot superhabundet numerus *d.* numerum *b.* Rursus quot superhabundat numerus *e.* numerum *d.*, tot superhabundet numerus *d.* numerum *g.* Dico, si ducatur *d.* in numerum multitudinis numerorum *a. b. g. e. z. i.*, proueniet summa ipsorum omnium numerorum; quod sic probatur: minyam quidem ex numero *I.* superhabundantiam quam habet ad numerum *d.*, addamque eam numero *a.*, erit unusquisque numerorum *a. I.* equalis numero *d.*; quod etiam faciam ex numeris *zb.* et *eg.*, et erit unusquisque eorum equalis numero *d.* Quare quot sunt numeri *a. b. g. e. z. i.*, tot numeri equales numero *d.* sunt in summa coniunctionis numerorum *a. b. g. e. z. i.*; quod oportebat ostendere.

INVENIRE numerum, quo addito super quadratum numerum, et diminuto ab ipso faciat semper quadratum numerum; et sic oportet, tres quadratos et unum numerum inuenire, quo numero addito super minorem quadratum facit quadratum secundum. Super quem si addatur idem numerus, facit quadratum tertium, hoc est maiorem. Et sic addito ipso numero super secundum quadratum, et diminuto ipso ab eodem, facit semper quadratum. Quoniam quadrati numeri omnes ordinate ascendunt per continuam ascensionem imparium numerorum, erit minor quadratus summa aliqua imparium numerorum ab unitate acceptorum; super quem quadratum proponitur addere

* superhabundat . . . superhabundit *
(fol. 26 verso, lin. 20 e 31—33 e
margine inferiore; pag. 265 lin. 22-25).



fol. 27 recto.

Congruus

fol. 27 verso.

numerum, et fieri quadratum secundum; qui quadratus rursus constat et (*sic*) aliqua multitudine imparium ab unitate ordinate disposita; super quem etiam secundum quadratum, si addatur numerus idem qui uocetur congruum, quia congruit his, facit maiorem quadratum; qui etiam maior quadratus egreditur ex aliqua multitudine imparium, similiter ab unitate accepta, in qua multitudine tota est multitudo imparium facientium primum quadratum: et alia multitudo facientium congruum idem: et alia multitudo facientium eundem congruum. Quare multitudo imparium facientium maiorem quadratum diuidenda est in tres partes predictas. Sed multitudo imparium facientium primum congruum est in aliqua proportione cum multitudine facientium secundum: plures enim numeri impares sunt in multitudine facientium primum congruum, quam multitudine facientium secundum, cum minores numeri sint in ipsa propter ordinem numerorum; quia in ipsa sunt antecedentes impares, et in alia sunt consequentes. Vnde qualiter congruum inueniatur in aliqua data proportione, in qua esse poterit, ostendere procurabimus. Adiaceant duo quilibet numeri *.ab. bg.*; compositus quidem ex ipsis est *.ag.*; et sit *.bg.* maior quam *.ab.*, secundum quantitatem numeri *.dg.* Si numerus quidem *.bg.* ad numerum *.ab.* minorem proportionem habuerit quam numerus *.ag.* ad numerum *.dg.*, tunc possibile erit inuenire congruum ex una multitudine imparium habente proportionem ad multitudinem sequentium imparium, eam uidelicet quam habet numerus *.gb.* ad numerum *.ab.*: et si maior fuerit proportio numeri *.bg.* ad numerum *.ba.* quam numeri *.ag.* ad numerum *.dg.*, tunc impossibile erit inuenire duas multitudes imparium numerorum continuas in proportione quam habet numerus *.ag.* ad numerum *.dg.*; tunc possibile erunt (*sic*) inuenire duas multitudes imparium numerorum continuas in proportione quam habet numerus *.ag.* ad numerum *.dg.*; et est (*sic*) summa uniuscuiusque multitudinis egredietur congruum.

Esto prius proportio, quam habet numerus *.bg.* ad numerum *.ab.*, minor ea quam habet numerus *.ag.* ad numerum *.dg.*; oportet ergo inuenire duas multitudes imparium immediate in proportione quam habet numerus *.bg.* ad numerum *.ab.*; et summa unitatum utriusque multitudinis sit eadem: coniunctio quidem ex numeris *.ab.* et *.bg.*, scilicet *.ag.*, aut est par, aut impar. Esto prius par. Quare numerus *.ad.*, scilicet duplus ad *.ab.*, par est. Vnde residuum *.dg.* parem esse necesse est. Ex ductu quidem *.dg.* in *.bg.* proueniat numerus *.ez.*, et ex ductu *.dg.* in *.ab.* proueniat *.zi.* Est ergo sicut *.gb.* ad *.ba.*, ita numerus *.ez.* ad numerum *.zi.*; et sunt numeri *.ez. zi.* pares.

Rursus ex ductu *.ag.* in numeris *.gb.* et *.ba.* proueniant pares numeri *.km. kl.* Est ergo sicut *.gb.* ad *.ba.*, ita *.km.* ad *.kl.* Sed sicut *.gb.* ad *.ba.*, ita *.ez.* ad *.zi.*; ergo sicut *.ez.* ad *.zi.*, ita *.km.* ad *.kl.*: denique ducatur *.ez.* in *.kl.*, proueniat *.op.*; et ex ductu *.zi.* in *.km.* proueniat *.pq.* Et quoniam est sicut *.ez.* ad *.zi.*, ita *.km.* ad *.kl.* Ergo id quod fit ex ductu *.ez.* in *.kl.* equale est ei quod fit ex ductu *.zi.* in *.km.*; quare equalis est numerus *.op.* numero *.pq.*: ostendam, utrumque ipsorum esse congruum. Quoniam ex ductu *.ez.* in *.kl.* prouenit *.op.*, quot unitates sunt in numero *.ez.*, tot numeri equales numero *.kl.* sunt in numero *.op.* Sed quot numeri equales numero *.kl.* sunt in numero *.op.*, tot continui numeri impares existentes circa numerum *.kl.* sunt in eodem *.op.* Ergo quot unitates sunt in numero *.ez.*, et tot

* sicut *.gb.* ... impares existentes (fol. 27 verso, lin. 22—29 e 30; pag. 266 lin. 35—42).

$a \quad bb \quad \dots \quad d \quad f \quad \dots \quad g$

$i \quad \dots \quad s \quad \dots \quad t$

$k \quad \dots \quad h \quad l \quad n \quad m \quad \dots \quad d$

$k \quad \dots \quad o \quad p \quad \dots \quad q$

numeri impares continui existunt circa numerum $.kl.$; ita quod medietas eorum sint minores numero $.kl.$, et alia medietas sint maiores; qui omnes faciunt numerum equalem $.op.$ Similiter ostendetur quod quot | unitates sunt in numero $.zi.$, tot numeri impares existentes circa numerum $.km.$ sunt in numero $.pq.$ Ergo sicut numerus $.ez.$ est ad $.zi.$, ita multitudo imparium facientium numerum $.op.$ est ad multitudinem imparium facientium numerum $.pq.$, qui ostensus est equalis numero $.op.$: dico etiam continuam esse utramque multitudinem. Quia ex ductu $ag.$ in $.bg.$ provenit $.km.$, et est $.bg.$ equalis numeris $.gd.$ et $.db.$; ergo ex ductu $ag.$ in numeris $.dg.$ et $.db.$ provenit $.km.$ Sed ex ductu $ag.$ in $.bd.$, hoc in $.ab.$ provenit $.kl.$; reliquus ergo $.lm.$ provenit ex $ag.$ in $.dg.$: sed ei numero, qui provenit ex $ag.$ in $.dg.$, equales sunt numeri qui proveniunt ex $gd.$ in $gb.$ et in $.ba.$, hoc est numeri $.ez.$ $.zi.$ Quare equalis est numerus $.lm.$ numero $.ei.$ Accipiatur itaque ex numero $.lm.$ numerus $.ln.$ equalis numero $.ez.$ Reliquus ergo $.nm.$ reliquo $.zi.$ est equalis. Item ostendendum est, numerum $.kl.$ maiorem esse numero $.ez.$, quoniam proportio $.gb.$ ad $.ba.$ est minor proportione numeri $.ag.$ ad $.gd.$ Ergo aliquis numerus minor numero $.ag.$ ad numerum $.gd.$ habet eandem proportionem quam numerus $.gb.$ ad $.ba.$: sitque numerus $.af.$; et quoniam est ut $gb.$ ad $.ba.$, ita $.af.$ ad $.dg.$; multiplicatio ergo $.af.$ in $.ba.$ equatur multiplicationi $bg.$ in $.dg.$, hoc est numero $.ez.$ Sed multiplicatio $ag.$ in $.ab.$, hoc est numerus $.kl.$, maior est multiplicatione $.af.$ in $.ab.$, hoc est numero $.ez.$ Accipiatur quidem ex numero $.kl.$ numerus $.lh.$ equalis numero $.ln.$, hoc est $.ez.$, erit totus $.hn.$ duplus numero $.ez.$ Rursus super numerum $.km.$ addatur numerus $.mc.$ equalis numero $.mn.$, hoc est $.zi.$; duplus ergo est $.nc.$ numero $.zi.$ Et quoniam par est numerus $.kl.$, si auferatur ab eo numerus $.lh.$, hoc est $.ez.$, qui est par, remanebit numerus $.kh.$ par. Similiter si super $.kl.$ addatur $.ln.$ erit totus $.kn.$ par. Verum et numerus $.nc.$ est par; quare totus $.kc.$ est par. Et quoniam $.kh.$ est par, quot unitates sunt in medietate eius, tot impare (sic) numeri intercidunt ab unitate usque ad numerum $.kh.$, quorum imparium suma (sic) facit quadratum numerum, qui provenit ex multiplicatione medietatis numeri $.kh.$ in se: sit ille quadratus numerus $.ro.$ Item quot unitates sunt in numero $.hn.$, tot numeri numerantur ordinate inter numerum $.kh.$ et numerum $.kn.$, quorum multitudo est par, cum numerus $.hn.$ sit par. Sed dimidium numeri $.hn.$ est $.ez.$ Ergo quot unitates sunt in numero $.ez.$, tot impares numeri intercidunt inter numeros $.kh.$ et $.kl.$; ex quorum multitudine ostensum est provenire numerum $.op.$, cum sint circa numerum $.kl.$, medietas quorum intercidunt inter numeros $.kh.$ et $.kl.$, et alia medietas | inter $.kl.$ et $.kn.$; ergo ex omnibus imparibus, qui sunt ab unitate usque in numerum $.kn.$, provenit $.rp.$, et est quadratus, cuius radix est medietas numeri $.kn.$ Rursus quot unitates sunt in numero $.no.$, tot numeri intercidunt inter numeros $.kn.$ et $.kc.$, quorum medietas est ex imparibus numeris; ergo quot unitates sunt in numero $.mn.$, hoc est in $.zi.$, tot numeri impares intercidunt inter numeros $.kn.$ et $.kc.$; et sunt continui cum imparibus qui sunt inter $.kh.$ et $.kn.$, ut prediximus. Sed ex numeris imparibus, qui sunt inter $.kn.$ et $.kc.$, colligitur numerus $.pq.$, cum sit circa numerum $.km.$ Ergo ex omnibus imparibus, qui sunt ab unitate usque in numerum $.kc.$, provenit numerus $.rq.$; ergo quadratus est numerus $.rq.$, et est eius radix medietas

fol. 28 recto.


fol. 28 verso.

numeri $.kc$. Ergo congruum est unusquisque numerorum op . et pq ., ut prediximus. Inuentus quidem numerus est, scilicet pq ., quo addito super quadratum, scilicet super rp ., facit quadratum numerum, qui est rq .; et diminuto ipso, scilicet pq ., hoc est op ., ex eodem quadrato, scilicet ex rp , remanet quadratus, scilicet ro .; quod oportebat facere. Que etiam ut clarius uideantur, ponam numerum ab . 3., numerum quoque bg . 5.; quare totus ag . erit 8.; residuum quoque dg . est 2.: pares enim sunt numeri ag . et dg .: ex ductu quidem dg . in bg . prouenit 10.; et ex ductu dg . in ab . prouenit 6.; ergo ez . est 10. et zi . est 6. Est ergo sicut bg . ad ga , ita ez . ad zi ., hoc est sicut 5. ad 3., ita 10 ad 6.; et 10 est numerus prime multitudinis imparium facientium congruum, et 6. est numerus secundę multitudinis facientium idem. Item ex ductu ag . in gb . et in ba ., hoc est ex 8. in 5. et in 3 proueniunt km . 40. et kl 24.; residuum lm . est 16., que equatur numeris ez . zi . Addantur quidem super kl . numerus ln . equalis numero ez ., scilicet 10., erit kn . 34.; et super km . addatur nm ., scilicet zi ., qui est 6. exit (sic) kc . 46.; et auferatur ex kl numerus kl equalis ln ., scilicet 10, remanebit kh . 14; et ducatur ez ., hoc est ln . in kl ., scilicet 10 in 24., prouenit po . 240., qui est congruum; et summa decem numerorum imparium existentium circa 24., qui sunt inter numeros kh et kn ., hoc est inter 14. et 34.

Item ex ductu zi . in km ., hoc est de 6. in 40., prouenit 240., hoc est pq . est summa sex imparium existentium circa 40., qui sunt inter kn . et kc ., hoc est inter 34. et 46. Ex numeris quidem imparibus, qui sunt ab uno usque in numerum kh ., scilicet in 14, prouenit ro .; et est 49., quia ab uno usque in 14. sunt septem numeri impares, et sunt circa septenarium; quare ex ductu 7. in 7. prouenit summa imparium, qui sunt ab uno usque in 14. Ergo ro . est quadratus. Ex multitudine quidem imparium, qui sunt inter kh . et kn ., prouenit op . Ergo ex multitudine imparium, qui sunt ab uno usque in kn ., scilicet in 34., prouenit numerus rp .; et sunt illi numeri impares 17., quorum summa surgit ex ductu 17. in se; ergo rp . est quadratus, et est 289. Nam addito ro cum op ., scilicet 49. cum 240., faciunt 289., quorum radix est 17., scilicet dimidium kn . Item ex multitudine numerorum, qui sunt inter kn et kc ., prouenit numerus pq ., qui est equalis numero op . Est enim 240. Ergo ex multitudine imparium, qui sunt ab uno usque in 46., prouenit numerus rq ., et est quadratus, cuius radix est dimidium numeri kc ., scilicet 23. Nam addito pq . super rp ., scilicet 240. cum 289, faciunt 529., quorum radix est 23.

Sed si proportio gb . ad ba . maior proportione ag . ad gd .; et sit iterum numerus ag . par, dico possibile esse inuenire duas multitudes imparium continuas facientes congruum in proportione quam habet numerus ag . ad numerum gd .: et ut liquidius appareat, sit ab . 1., et bg . 3; quare ag . est 4., et dg . est 2.; et multiplicetur ag . in ab ., proueniat ez .; et ex ab . in dg . proueniat zi .; est ergo ut ag . ad dg ., ita ez . ad zi .: et quia ab est 1., numeri ez . zi sunt equales numeris ag . dg .; ergo ez . est 4., et zi . est 2. Item ex ductu bg . in ag . proueniat km ., et ex ductu bg . in gd proueniat kl .; est ergo km . 12., et kl . est 6.: est ergo sicut ez . ad zi ., hoc est sicut ag . ad dg ., ita km ad kl .; et ex ductu ez . in kl . proueniat op .; et ex ductu zi . in km proueniat pq . Equales etenim

in 14. ... ex ductu » (fol. 28 verso, lin. ultima e margine inferiore; pag. 268, lin. 22 e 23).




fol. 29 recto.

sunt $.op.$ et $.pq.$ Vnusquisque eorum est $.24.$ Nam $.op.$ constat ex $iii.$ imparibus, qui sunt circa $.kl.$ $6.$, hoc circa $.kl.$ propter ez qui est $.4.$; quibus $.4.$ additis super $.kl.$ faciat $.kn.$; ergo $.kn.$ est $.10.$; similiter extractis $.4.$ ex $.kl.$ remaneat $.kh.$; ergo $.kh.$ est $.2.$ Rursus addito numero $.zi.$, scilicet $.2.$ super $.km.$, faciat $.kc.$; ergo $.kc.$ est $.11.$, et $.nc.$ est $.4.$, in quibus sunt duo impares, scilicet $.11.$ et $.13.$; et sunt circa numerum $.km.$, scilicet circa $.12.$, qui faciunt numerum $.pq.$ Ergo primus quadratus, scilicet $.ro.$, est $.4.$, cuius radix est dimidium numeri $.kh.$, scilicet $.1.$ Secundus uero quadratus, scilicet $.rp.$, est $.25.$, cuius radix est dimidium numeri $.kn.$, quod est $.4.$ Tertius quidem quadratus, scilicet $.rq.$, est $.49.$, cuius radix est dimidium numeri $.kc.$, quod est $.7.$ Et notum quia $.24.$ est primum congruum, cum sit minor numerus, cuius $20.$ pars sit integra; et oriatur ex duobus minoribus numeris parem numerum facientibus, scilicet ex uno et $3.$ Rursus ex numeris ab et bg coniunctus sit impar, et auferatur ab ex $bg.$, et sit residuum eorum numerus $gd.$ Et sit proportio numeri $gb.$ ad $ba.$ minor proportione $ag.$ ad $gd.$ Inueniam rursus duas multitudines continuas imparium in proportione quam habet $gb.$ ad $ba.$, ex una quoque multitudine procreabitur congruum unitatum idem: adiaceat itaque numerus $t.$ duplus numeri $bg.$, et numerus $s.$ duplus numeri $ba.$; coniunctus quidem ex numeris $ts.$ par est; et est $t.$ ad $s.$, sicut $bg.$ ad $ba.$: et ducatur $gd.$ in numeris $ts.$, et proueniant numeri $ez.$ et $zi.$ Est ergo sicut $t.$ ad $s.$, hoc est sicut $gb.$ ad $ba.$, ita $ez.$ ad $zi.$: et ducatur iterum numerus $ag.$ in numeris $ts.$, et proueniant $km.$ et $kl.$ Est ergo ut $t.$ ad $s.$, hoc est ut $ez.$ ad $zi.$, ita $km.$ ad $kl.$; et quoniam pares sunt numeri $ts.$, pares sunt numeri $km.$ et $kl.$: et ostendetur per premissam ea que dicta sunt in numeris $kh.$ $hl.$ $ln.$ $nm.$ et $mc.$; et in reliquis etiam $ro.$ $op.$ $pq.$: est ergo congruum $op.$ uel $pq.$ etc. Que etiam ostendemus cum numeris. Sit ita ut $bg.$ $2.$, et $ba.$ sit $.1.$, erit $ag.$ $3.$ et $gd.$ $1.$ et $t.$ $4.$ et $s.$ $2.$ et $ez.$ $4.$ et $zi.$ $2.$ et $km.$ $12.$ et $kl.$ $6.$ et $hn.$ $8.$ et $nc.$ $4.$ et $kh.$ $2.$ et quadratus $ro.$ unum congruum $op.$, uel $pq.$ $24.$ Quare quadratus $rp.$ est $25.$, et quadratus $rq.$ $49.$; que oportebant *(sic)* ostendere.

Et quoniam numeri bg et $ba.$, scilicet unum et due sunt minores qui sint in numeris; et ex coniunctione eorum prouenit impar numerus; et cum ipsis habuimus $24.$ per congruum, sicuti habuimus superius ex positione ternarij et unitatis, qui sunt minores numeri qui esse possint facientium parem numerum. Ideo manifestum est, $24.$ esse minus, et primum congruum quod cadat in tribus quadratis, qui sint ex integris numeris; sed cum fractionibus possunt inueniri minores eo, ut insequentibus demonstrabimus.

SED sit proportio $gb.$ ad $ba.$ maior proportione $ag.$ ad $gd.$, tunc erunt multitudo imparium primj congrui ad multitudinem secundi, sicut $ag.$ ad $gd.$; et sit iterum $ag.$ impar: que ut liquidius demonstrantur, sit $gb.$ $5.$, et $ba.$ $2.$; erunt ergo $ag.$ $7.$ et $gd.$ $3.$: duplum quidem ex $gb.$ est $10.$, et ex $ba.$ est $4.$; et ducatur $4.$ in numeris $ag.$ et $gd.$, et ueniet pro multitudine imparium primi congrui $23.$, et pro multitudine secundi $12.$: et multiplica unumquemque numerorum $ag.$ et $gd.$ per duplum $bg.$, et habebis $.70$ pro numero, circa quem sunt 12 impares numeri facientes secundum congruum, et $30.$, circa quem erunt 23 impares facientes primum. Quare extractis $28.$ de $30.$ remanent $.2.$, quorum medietas, scilicet unum, est radix primi quadrati; et adde

fol. 29 verso.


* uno et 3 $.ts.$, pares (fol. 29 verso, lin. 3-13; pag. 269, lin. 12-22).

fol. 30 recto.

28 cum .30., erunt .58., cuius medietas, scilicet 29, est radix secundi quadrati. Item adde .12. cum .70. faciunt 82, quorum medietas, scilicet .41., est radix tertij quadrati; et ex ductu .28. in .30., uel 12 in .70., habentur 840 pro congruo. Egreditur autem idem .840. ex alijs duobus adiacentibus numeris, scilicet ex septenario et quinario; quia si solidum, quod fit ab eis et ab eorum coniuncto, ducatur in binarium, scilicet id in quo .7. excedit .5., proueniet .840. Egreditur enim multitudo prima imparium facientium ipsum ex ducto binario in septenarium. Quare ipsi impares numeri sunt 14., et sunt circa 60, qui egreditur ex quinario ducto in 12.: multitudo quidem secunda prouenit ex binario ducto in quinarium; et est illa multitudo circa .84., qui prouenit ex septenario ducto in .12. Nam decies 84., uel sexagesies .14. equantur solido, qui fit a 5 et 7 et 12. ducto in binarium. Vnde cuiuslibet congrui vigesima quarta pars est integra, ut superius ostensum est: et est .24 primus congruum, quod inueniri potest cum integris quadratis numeris; et ab ipso 24 generantur omnia congrua. Quotiens enim .24. multiplicabitur per quadratum numerum, totiens congruum procreabitur, et erunt minor quadratus ex tribus quadratis, quibus congruit ipse ille, per quem multiplicabitur .24. Medius autem quadratus erit numerus, qui procreabitur ex ipso quadrato ducto in .25. Tertius quidem quadratus erit numerus, qui proueniet ex eodem primo quadrato ducto in .49., cuius numeri radix erit numerus factus ex multiplicatione radice primij quadrati in .7., qui est radix de .49.; et erunt multitudo prima imparium facientium congruum dupla multitudinis facientium idem. Similiter egredietur congruum si multiplicabitur 24 per aliquam summam quadratorum, qui sunt ab ordinatis numeris ab unitate ascendentes per impares et pares, uel per impares tantum, uel ipsa res tantum, aut per eos qui ascendunt per ternarium, seu per quaternarium, uel per reliquos numeros, quorum quadratorum summas superius inuenire docuimus; et erunt proportio imparium facientium secundum congruum ad impares facientium primum, sicut radix ultimi quadrati est ad radicem sequentis quadrati in ordine assumpte collectionis. Verbi gratia: summa quadratorum trium imparium numerorum, scilicet unius et nouem et xxv., est 35.; quibus ductis per 24 faciunt 840., qui est congruum; prouenit etiam ex quinario et septenario adiacentibus: quare proportio prime multitudinis imparium ad multitudinem secundam est sicut .7. ad .5., ut superius ostensum est.

Si congruum aliquod cum suis quadratis multiplicetur per aliquem quadratum, numerus factus ex multiplicatione congrui in quadratum congruum erit; reliqui quadrati erunt congruentes, facto congruo. Sit .*ab.* quadratus, et *bg.* sit congruum, et .*gd.* sit equalis numero .*bg.*; quadrati ergo erunt numeri .*ag.* et .*ad.*: et adiaceat quidam quadratus numerus .*e.* Dico quod id, quod fit ex .*e.* in congruo .*bg.*, congruum erit; et numeri, qui fient ex .*e.* in quadratis .*ab. ag. ad.*, quadrati erunt congruentes, congruo facto ex .*e.* in .*bg.* Ex ductu quidem ex .*e.* in .*ab.* proueniat .*zi.*; et ex ductu .*e.* in .*ag.* proueniat .*zt.*, et ex .*e.* in .*ad.* proueniat *zk.* Et quoniam ex .*e.* quadrato in .*ag.* quadratum prouenit .*zt.* quadratus. Est ergo etiam *zt.* et est .*zi.* equalis duobus numeris, qui fiunt ex quadrato .*e.* in quadratum *ab.*, et congruum *bg.* Sed id quod fit ex quadrato .*e.* in quadratum .*ab.* est numerus *zi.* Reliquus ergo .*it.* procreatur ex .*e.* in congruum .*bg.* Et quoniam quadrati sunt numeri .*e.* et .*ab.*, factus ex eis quadratus est; quadratus est ergo numerus .*zi.* Rursus quoniam ex quadrato .*e.*


in .70.14. equantur » (fol. 30 recto, lin. 7-14; pag. 210, lin. 3-10).



¶ uel ex multitudine

fol. 30 verso.

quidam quadratus ... est numerus » (fol. 30 verso, lin. 7-13; pag. 270 lin. 35-41).



in quadratum *ad.* factus est numerus *zk.*; quadratus ergo est *zk.*, et est equalis duobus numeris, qui fiunt ex ductu *e.* in numeris *ag.* et *gd.* Sed ex *e.* in *ag.* factus est quadratus *zt.* Reliquus ergo *zk.* fit ex *e.* in *gd.* Et quoniam equalis est numerus *bg.* numero *gd.*, equalis erunt factus ex *e.* in *bg.* factus ex *e.* in *gd.*: factus autem ex *e.* in *bg.* est *it.* Ergo *it.* equalis est numero *tk.*: si super quadratum autem *zt.* addatur numerus *tk.*, faciet quadratum *zk.*; et si á *zt.* quadrato auferatur *tk.*, hoc est *ti.*, remanebit *zi.* quadratus; ergo congruum est *it.*, et congruunt ei tres quadrati, qui sunt *zi.* et *zt.* et *zk.*; que oportebat ostendere. Similiter ostendetur provenire idem, si aliquod congruum cum suis quadratis diuidatur per aliquem quadratum numerum.

Volo inuenire congruum, cuius quinta pars sit integra: sit unus ex adiacentibus numeris *.5.*, alter sit numerus quadratus facientes coniunctum ex eis numerum quadratum; et extracto minore ex maiore remaneat quadratus numerus. Erit itaque ille quadratus *.4.*; quo addito cum quinario facit *.9.*, qui est quadratus; et extracto *.4.* de *.5.* remanet *.1.*, qui est etiam quadratus; dico ex his numeris adiacentibus egredi congruum, cuius quinta pars erit quadrata: provenit enim congruum ex his numeris ex ducta *.1.* in duplo quinario; quod totum multiplicatur per duplum quaternarij; et illud quod egreditur ducitur per nouenarium, | hoc est multiplicare superficiem, que fit ab uno in duplo quinario, in superficiem que fit á duplo quaternarij, in *.9.*, hoc est *.10.* in *.72*; sed ex ductu quaternarij in nouenarium provenit quadratus numerus, cum ambo sint quadrati. Ergo ex ducto duplo quaternarij in *.9.* facit duplum quadrati; et ex ductu dupli quadrati in duplo quinario provenit quadruplum quadrati ductum in quinario. Sed quadruplum quadrati facit quadratum numerum; ergo quadruplum quadrati ductum in *.5.* facit quincuplum quadrati, et ductu quincuplo dicti quadrati ducto in *.1.* qui est quadratus, facit iterum quincuplum quadrati. Ergo congruum, quod fit ab his, quinta pars erit quadrata.

Hec questio predicta in prologo libri huius.


Volo inuenire quadratum, cui addito *.5.* uel diminuto faciat quadratum numerum. Adiaceat congruum, cui quinta pars sit quadrata, eritque *720.*, cuius quinta pars est *.144.*; in quo diuide quadratos congruentes eidem *.720.*, quorum primus est *.961.*, secundus est *.1681.*, tertius autem est *.2401.*; et est radix primi quadrati *.31.* Secundi *.41.*, tertij *.49.*, exhibit pro primo quadrato $\frac{97}{144} 6$, cuius radix est $\frac{7}{12} 2$, que provenit ex diuisione *.31.* in radicem de *.144.*, hoc est in *.12.*; et pro secundo, hoc est pro quesito quadrato, ueniet $\frac{97}{144} 11$, cuius radix est $\frac{5}{12} 3$, que provenit ex diuisione *.41.* in *.12.*; et pro ultimo quadrato ueniet $\frac{97}{144} 16$, cuius radix est $\frac{1}{12} 4$.

Si duo quilibet numeri componantur facientes compositum ex his parem numerum, proportio compositi ad residuum, in quo maior excedit minorem, non erunt eadem quam habet maior numerus ad minorem. Adiaceant duo numeri *ab.* et *bg.*; et sit *gd.* id in quo maior *gb.* excedit minorem *ba.*; et sit par numerus *ag.*; dico non esse ut *gb.* ad *ba.*, ita *ag.* ad *gd.* Sed si possibile est, esto *ag.* ad *gd.*, sicut *gb.* ad *ba.*; crit ergo *d.* superficies, que fit ex *bg.* in *gd.*, equalis superficiem que fit ex *ag.* in *ba.* Sit ergo *ze.* numerus superficialis qui fit ex *bg.* in *gd.*; et numerus *kl.* proveniat ex *ag.* in *ba.*; equalis est ergo numerus *ze.* numero *kl.*: ex ductu autem


fol. 31 recto.

f. uel dictum

* quadratum ... in .12. et * (fol. 31 recto, lin. 10, 11-17; pag. 271, lin. 28-34).



* *bg.* et sit ... *gd.* numerus; * (fol. 31 recto, lin. 22-29; pag. 271, lin. 33 — pag. 272, lin. 2).



.ze. in *.kl.* proueniat *.op.*; numerus ergo *.op.* equalis est numero qui fit ex ducta *.ba.* in *.gd.* in ductum ex *ag.* in *.bg.* Sit ergo ductus *.ab.* in *gd.* numerus *.zi.*; et ductus *ag.* in *.bg.* esto *.km.*; maior est enim *.km.* quam *.kl.*, cum maior sit numerus *.gb.* quam *.ba.*; ergo *.op.* equalis est numero qui fit ex *.zi.* in *.km.* Esto itaque numerus *.pq.* factus ex *.zi.* in *.km.*; ergo numerus *.op.* equalis est numero *.pq.* Sed *op.* quadratus est, cum sit factus á duobus equalibus numeris, qui sunt *.ez.* *.kl.* | Ergo et *pq.* quadratus est. Ostensum est superius in primo congruo inueniendo, numerum *.lm.* equalem esse numero *.ei*; maior est enim *.ei* quam *.ez.*; ergo maior est *lm.* quam *ez.*: accipiatur ergo ex numero *.lm.* numerus *.ln* equalis numero *.ez.*, hoc est numero *.kl.* Reliquus *.nm* equalis est numero *.zi.*: addatur itaque super *km.* numerus *mc.* equalis numero *.m.n.*; et quoniam *.kn.* duplus est numero *.kl.*, par erit *kn.* Ex multitudine quidem imparium, qui sunt ab uno usque in *.kn.*, prouenit quadratus *.op.*; sunt enim circa numerum *.kl.*: quare *kl.* est radix numeri *op.* Rursus quoniam ex *zi.* in *km.* prouenit quadratus *.pq.* Sed quot unitates sunt in numero *.zi.*, tot impares numeri sunt inter numerum *kn.* et numerum *.kc.*; duplus est enim *.nc.* numeri *.zi.*; ergo quadratus *.pq.* constat ex imparibus, qui sunt inter *kn.* et *km.* Ergo duo quadrati *.op.* et *.pq.* constant ex omnibus imparibus, qui sunt ab unitate usque in numerum *.kc.*; ergo numerus *.oq.* quadratus est, et est duplus quadrati *.op.*: proportio ergo quadrati *oq.* ad quadratum *op.* est sicut *.2.* ad *.1.*, hoc est sicut numeri non quadrati ad numerum quadratum; quod est inconueniens. Non ergo proportio coniuncti *.a.g.* ad residuum *dg.* est sicut *.gb.* ad *.ba.*; quod oportebat ostendere.

Hoc idem demonstraretur, si numerus *.ag.* esset impar; quia que proportio est numeri *bg.* ad *.ba.*, eadem dupli *gb.* ad duplum *.ba.* Vnde numerus *.ez.* ostenderetur equalis numero *.kl.* etc. Ex hoc enim ostendetur quod nullus quadratus numerus potest esse congruum; quia si possibile esset, etiam esset proportio coniuncti duorum adiacentium numerorum ad residuum, sicut maior eorum ad minorem.

Quare subintelligitur, multos numeros esse qui congruum esse non possunt; sed omnis numerus potest esse congruum, si ex diuisione alicuius congrui per ipsum proueniat numerus quadratus; uel si ipse fuerit unus ex *iii.* adiacentibus, et reliqui tres fiant quadrati: ut si ponamus *.9.* et *.16.* qui sunt quadrati; et coniunctus ex eis, scilicet *.25.*, est quadratus; et auferatur *9* de *16*, remanent *.7.*; qui *.7.* potest esse congruum: multiplicatio quidem dupli de *.9.* in duplum de *.16.* facit quadratum numerum, scilicet *.576.*; qui si multiplicetur per *25.*, faciet iterum quadratum numerum; qui si ducatur per *.7.*, faciet congruum; ergo *.7.* eius pars erit quadrata.

Volo inuenire numerum quadratum, cui addita radice ipsius faciat quadratum numerum; et si ipsa radix auferatur ab eo, remaneat similiter numerus quadratus.

Adiaceat congruum similiter cum suis tribus quadratis, qui sunt numeri *ab.* *ag.* *ad.* Quare congruum erit numerus *bg.* et *gd.*; et diuidatur unusquisque quadratorum | *ab.* *ag.* *ad.* per congruum *.bg.*, et proueniant numeri *.ez.* *.ei.* *.eh.*; et constituatur super *.ei.* tetragonum *.ek.*, et compleatur superficies *.lh.*; et à puncto *.z.* equidistans rectis *.ik.* et *.el.* protrahatur recta *.zt.*; et quoniam numerus *.ez.* prouenit ex diuisione numeri *.ab.* per *bg.*; et numerus *.ei.* prouenit ex diuisione numeri *.ag.* in congruum *.bg.*; numerus quidem *zi.* prouenit ex diuisione *.bg.* in se. Ergo *.zi.* est *1*: similiter

quia diuiso $.ad.$ per congruum $.gd.$, hoc est per $.bg.$, prouenit numerus $.eh.$, et ex diuisione $ag.$ in $.gd.$ prouenit $.ei.$ Ergo $.ih.$ proueniet ex diuisione $.gd.$ in se. Quare $.ih.$ est similiter $.i.$; equalis est ergo $.hi.$ recte $.iz.$: et quoniam super rectam $.ei.$ constitutum est tetragonum $.ek.$, et $.hi.$ est $.i.$; superficies itaque $.kh.$, uel $.kz.$ est radix tetragonj $.ek.$ Ergo super tetragonum $.ek.$ addatur eius radix, scilicet superficies $.kh.$, proueniet superficies $.lh.$; et si ex quadrato $.ek$ auferatur eius radix, que est $.kz.$, remanebit superficies $.zl.$; et quoniam ex diuisione numerorum $.ab.$ et $.ag.$ et $.ad.$ in aliquem numerum, scilicet in $.bg.$, prouenerunt numeri $.ez.$ $.ei.$ $.eh.$ Est ergo sicut $.ab.$ ad $.ag.$, ita $.ez.$ ad $.ei.$; sunt enim quadrati numeri $.ab.$ et $.ag.$: ergo proportio numeri $.ez.$ ad $.ei.$ est sicut proportio quadrati numeri ad quadratum numerum. Quare ex ductu $.ez.$ in $.ei.$ proueniet quadratus numerus. Sed $.ei.$ recte equalis est recta $.zt.$, cum sit equalis recte $.ik.$; tetragonum enim est superficies $.ek.$; ergo superficies $.et.$ est quadratus numerus.


Similiter quoniam proportio $.ei.$ ad $.eh.$, hoc est $.le.$ ad $.eh.$, est sicut quadrati numeri ad quadratum numerum, factus quidem ex numeris $.eh.$ $.le.$ quadratus erit, hoc est superficies $.lh.$ Inuenctus est enim quadratus numerus $.ek.$, cui addita radice, que est $.kh.$, prouenit quadratus numerus $.lh.$; et si ex quadrato $.ek.$ auferatur eius radix, remanebit quadratus numerus $.et.$; quod oportebat facere.

Smiliter si oportuerit inuenire quadratum numerum, cui additis duabus radicibus, uel diminutis ab eo, fiat semper quadratus numerus: diuidantur tunc adiacentes quadrati $.ab.$ $.ag.$ $.ad.$ per dimidium congrui $.bg.$, et proueniant numeri $.ez.$ $.ei.$ $.eh.$, et erit numerus $.zi.$ $.z.$, cui equabitur numerus $.ih.$: quare unaqueque superficierum $.kh.$ et $.kz.$ erit equalis duabus radicibus quadrati numeri $.k.$; et erit similiter proportio $.ez.$ ad $.zt.$, sicut quadrati $.ab.$ ad quadratum $.ag.$ Quare numerus qui fit ex $.ez.$ in $.zt.$, hoc est superficies $.et.$, quadratus est; propter eandem et superficies, scilicet numerus $.lh.$, est quadratus: inuentus est ergo quadratus $.ek.$, cui additis duabus radicibus, scilicet $.kh.$, prouenit quadratus numerus $.lh.$; et demptis ab eodem $.ek.$ duabus radicibus, scilicet $.kz.$, remanet quadratus numerus $.zl.$: hoc idem intelligas de tribus, uel pluribus radicibus additis uel diminutis.

Et ut hec in numeris habeantur, quadratus $.ab.$ sit $.1.$, et quadratus $.ag.$ sit $.25.$; quadratus quoque $.ad.$ sit $.49.$; erunt ergo congruum $.bg.$ uel $.gd.$ $.24.$, in quo diuidantur 1 et 25 et 49 , proueniet $.ez.$ $\frac{1}{24}$, et $.ei.$ erit $\frac{1}{24}$ 1 ; numerus quoque $.eh.$ erit $\frac{1}{24}$ $2.$: ex ductu quidem $.ei.$ in se prouenit quadratum $.ek.$, quod est $\frac{6}{5} \frac{2}{7} \frac{5}{6}$; cui si addatur id quod fit ex $.ki.$ in $.ih.$, scilicet $\frac{1}{24}$ 1 , proueniet $\frac{13}{5} \frac{2}{7} \frac{5}{6}$, cuius radix est $\frac{35}{24}$, hoc est $\frac{11}{24}$ 1 : similiter si auferatur $\frac{1}{24}$ 1 , hoc est $\frac{6}{5} \frac{0}{7} \frac{0}{6}$ ex $\frac{6}{5} \frac{2}{7} \frac{5}{6}$, hoc est numerus $.kz.$ ex numero $.ke.$, remanebit pro superficie $.et.$ $\frac{25}{576}$, quorum radix est $\frac{5}{24}$: et si super quadratum aliquem proponatur addi et diminui duas radices, duplicabis quidem numeros $.ez.$ $.ei.$ $.eh.$, prouenient $\frac{1}{12}$ et $\frac{1}{12}$ 2 et $\frac{1}{12}$ $4.$; qui etiam prouenient si diuidatur $.1.$ et 25 et 49 per dimidium congruum, scilicet per $12.$; et sic radix quesiti quadrati erit $\frac{1}{12}$ $2.$; et sic intelligas de tribus uel pluribus radicibus additis et diminutis.

Omnium trium quadratorum, qui sunt continui impares, maior quadratus addit super medium octo plus quam medius super minorem. Adiaceant tres radices $.ab.$ $.bg.$ $.gd.$ trium datorum quadratorum, qui sunt impares et continui; et sit radix $.ab.$ minor

« duabus radicibus, ... idem intelligas »
(fol. 32 recto, lin. ultima e margine inferiore; pag. 273, lin. 27 e 28):



fol. 32 verso.

quam $.bg.$, et bg minor quam $.dg.$; dico quadratum, qui fit á numero $.gd.$, addere octo plus super quadratum, qui fit á numero $bg.$, quam addat quadratus, qui fit á numero $.bg.$ super quadratum, qui fit á numero $.ad.$

Quare numeri $.ab. bg. gd.$ sunt radices trium continuorum quadratorum imparium; impares quidem sunt et continui. Quare $bg.$ superhabundat $.ab.$ in duobus, et in tot superhabundat numerus $.gd.$ numerum $.bg.$ Auferantur ergo duo á numero $.bg.$, remaneatque ex eo numerus $b.$; propter eandem si a numero $.gd.$ auferantur duo, scilicet numerus $.cd.$, remanebit $.gc.$ equalis numero $.bg.$ Rursus si á numero $.cg.$ auferatur numerus $.gf.$ equalis utrique numerorum $.ab. be.$, remanebunt duo pro numero $.fc.$; quare totus $.fd.$ est 4. Et quoniam numerus $.ge.$ est id in quo numerus bg superhabundat numerum $ab.$; et est $.eg.$ duo; addit ergo quadratus, qui fit á numero $.bg.$, super quadratum, qui fit á numero $.ab.$, duplum numerorum $.ab. bg.$, hoc numeri $.ag.$ Similiter et quadratus, qui fit á numero $.gd.$, addit super quadratum $bg.$ duplum numerorum $.bg. gd.$; ergo quot excedit duplum numerorum $bg. gd.$, duplum numerorum $.ab. bg.$, tot excedit numerus qui est inter quadratos, qui fiunt á numeris $.gd. gb.$, numerum qui est inter quadratos, qui fiunt á numeris $.gb. ba.$; comuniter auferatur duplum numeri $.bg.$, quot ergo superhabundat duplum numeri $.gd.$ duplum numeri $.ab.$, tot superhabundat numerus qui est inter quadratos, qui fiunt á numeris $.dg. gb.$, numerum qui est inter quadratos, qui fiunt á numeris $.gb. ba.$ Sed duplum numeri $.ab.$ est sicut duplum numeri $.gf.$; ergo duplum numeri $.gd.$ superhabundat duplum numeri $.ab.$, hoc est duplum numeri $.gf.$ in duplo numeri $.fd.$ Sed duplum numeri $.fd.$ est octo; quaternarius est enim $.fd.$; ergo quadratus, qui fit á numero $.gd.$, addit octo super quadratum, qui fit á numero $.bg.$, plus quam addat quadratus, qui fit á numero $.bg.$ super quadratum, qui fit á numero $.ba.$, ut oportebat ostendere.

Et quoniam secundus quadratus impar, scilicet $.9.$, addit unum octonarium super primum quadratum imparem, scilicet super $1.$, inuenietur ex his tertium quadratum imparem, scilicet $.25.$, addere duos octonarios super secundum quadratum imparem; et sic semper inuenietur ordinata ascensio quadratorum imparium ascendere per ascensionem numerorum, qui ascendunt per octonarium: hoc idem accidit in quadratis parium numerorum preter ascensionem secundi quadrati paris, scilicet $.16.$, qui addit $.12.$ super primum quadratum parem, scilicet super $.4.$; deinde pares quadrati ascendunt per octonarios in infinitum numerando supra $.12.$ Vel secundus quadratus par addit super primum quadratum parem tres quaternarios; et tertius super secundum addit quinque quaternarios; et quartus super tertium septem quaternarios; et quintus super quartum nouem; et sic semper adduntur duo quaternarij per ascensionem imparium numerorum usque in infinitum secundum hanc proportionem. Vel primus quadratus parium, scilicet $.4.$, constat ex uno quaternario. Secundus super primum addit tres quaternarios. Tertius super secundum quinque; et sic inuenitur, pares quadratos ascendere per ascensionem quaternariorum, que ascendit per impares numeros ordinate. Similiter inueni quadratos numerorum qui ascendunt per ternarium ordinate, ascendere per ascensionem nouenariorum, qui ascendunt similiter per impares numeros. Verbi gratia: quadratus ternarij est semel $.9.$ Sexnarij addit super primum tres nouenarios, cum sit $.36.$; super quem quadratus nouenarij addit quinque nouenarios. Sequens uero, scilicet qua-

qui sunt ... $bg.$, quot a (fol. 32 verso)
lin. ultima e margine inferiore; pag.
274, lin. 16 e 17).

a b e f c d

fol. 33 recto.

dratus duodenarij, addit .7. nouenarios super quadratum nouenarij; et sic deinceps illud idem inuenj ex ascensione quadratorum, qui sunt á numeris ascendentibus per quaternarium, et per alios numeros in infinitum; ex quibus omnibus collegi solutiones quarundam sequentium questionum. |

Volo inuenire in data proportione duas differentias trium quadratorum. Esto data proportio numeri .a. ad numerum .b., et sint numeri .a.b. primj ad se inuicem; numeri quidem .a.b. aut sunt continui aut non. Sint primum continui, et esto numerus .b. maior quam .a.; et adiacet unitas .c.; et ab unitate .c. in ordine disponantur tot numeri impares, quot sunt unitates in numero .b. maiori, qui sunt .d.e.f.g.; et accipiantur quadrati numerorum .e.f.g., qui sint numeri .h.i.k.; dico quod proportio differentie que est inter quadratum .h. et quadratum .i., ad differentiam que est inter quadratos .i.k., est sicut numerus .a. ad numerum .b.; quod ita probatur: quoniam unitas est .c., et ab ipsa depositi sunt numeri impares ordinate .d.e.f.g., erit .d. 3. et .e. 5. et .f. 7. et .g. 9.; et quadratus, qui fit á numero .e., scilicet numerus .h., est 25.; et quadratus, qui fit a numero .f., scilicet numerus .i., est .49.; et quadratus, qui fit á numero .g., scilicet numerus .k., est 81.: et quia numeri .d.e.f.g. sunt secundum quantitatem unitatum, que sunt in numero .b.; et numeri .d.e.f.g. sunt .iiii^{or.}, erit manifestum quod numerus .b. est .4., et numerus .a. est .3.; et manifestum quod quadratus, qui fit á numero .d., scilicet á ternario, addit super quadratum, qui fit ab unitate .c. unum octonarium; et quadratus, qui fit á numero .e., addit super quadratum numeri .d. duos octonarios. Et quadratus, qui fit á numero .f., scilicet numerus .i., addit super quadratum, qui fit á numero .e., hoc est super numerum .h. tres octonarios, videlicet secundum quantitatem unitatum, que sunt á numero .a.; nec non et quadratus, qui fit á numero .g., addit super quadratum, qui fit á numero .f., scilicet super quadratum .i., quatuor octonarios, scilicet secundum quantitatem unitatum, que sunt in numero .b.: quare proportio differentie, que est inter quadratos .h.i., ad differentiam, que est inter quadratos .i.k., est sicut .a. ad .b., hoc est sicut 3. ad 4. Et si numerus .a. esset .10., et .b. 11., secundum ea que dicta sunt, addendi essent simul 10 et 11. et 21, que inde proueniunt, essent radix medianj quadrati: quare .19. erit radix minoris quadrati, et 23 erit radix maioris. Sunt enim 19. et 21 et 23 continui impares; et est .21. decimus numerus impar ab unitate. Quare quadratus, qui fit ab ipso .21., scilicet .441., addit super quadratum, qui fit á .19., scilicet super .361., decem octonarios. Et quadratus, qui fit á 23., cum sit undecimus numerus impar ab unitate, addit super quadratum, qui fit á 21, scilicet 529 super 441, undecim octonarios: quare differentia, que est inter 361 et 441., scilicet .80., est ad differentiam, que est inter 441 et 529., | scilicet ad 88., sicut .10. ad 11. Nam quam proportionem habet .80. ad 88., eandem habet $\frac{1}{8}$ de 80. ad $\frac{1}{8}$ de 88., scilicet 10 ad 11; quod oportebat ostendere.

Et si non sunt numeri .a.b. continui, erunt ipsi numeri aut impares collaterales, aut non. Sint primum collaterales impares; et quoniam quadrati, qui sunt á paribus numeris, ordinate ascendunt per quadruplicatam ascensionem imparium numerorum, ut 4., qui est quadratus binarij, scilicet primj paris numeri, qui ascendit per quantitatem unius quaternarij; et 16., qui est quadratus secundi paris numeri, scilicet quaternarij, qui surgit per quadruplicatam ascensionem duorum imparium numerorum, scilicet de .1. et 3., erit manifestum quod unusquisque quadratus par addit duos quaternarios plus

fol. 33 verso.

^a Volo inuenireb. maiore; (fol. 33 verso, lin. 4—5 et 6; e margine superiore; pag. 275, lin. 5—9).

$$\begin{array}{r} \frac{a}{c} \quad \frac{b}{e} \\ \hline \frac{d}{f} \quad \frac{g}{k} \\ \hline \frac{h}{i} \quad \frac{j}{l} \end{array}$$

fol. 34 recto.

^a numerorumascendit; (fol. 34 recto, lin. 6; pag. 275, lin. 39—40).

$$\frac{a}{c} \quad \frac{b}{e}$$

super antecedente quadratum parem super quaternarios, quos addit ipse antecedens quadratus super suum antecedentem quadratum; hoc quod tertius quadratus par addit super secundum quadratum parem quinque quaternarios, cum secundus quadratus par addit super primum tres quaternarios, scilicet .16. super .4.; et quartus quadratus par addit super tertium quadratum septem quaternarios; et ita accidit omnibus per ordinem. Vnde cum uolumus inuenire duas differentias inter tres quadratos numeros, quarum proportio sit sicut duo numeri impares collaterales, ut dicamus sicut 11. est ad 13. Accipiemus inter pares quadratos continuos, quorum medianus quadratus addat super antecedentem quadratum parem .11. quaternarios. Qui tres quadrati ita possunt inueniri. Addantur .11. cum .13. erunt .24.; quorum quarta pars multiplicetur per .2. scilicet per radicem primj paris quadrati, erit .12., qui sunt radix medianj quadratj; et 10 erit radix primj quadratj, et 14 erit radix secundi quadratj: possumus etiam hoc idem inuenire inter quadratos, qui fiunt á numeris ascendentibus per ternarium. Verbi gratia: uolumus inuenire duas differentias inter tres quadratos numeros, quarum proportio sit sicut 19. est ad .21., qui sunt collaterales impares; addemus .19. cum .21., et 40. que proueniunt, diuidemus per 4.; et 10 que inde proueniunt, multiplicabimus per 3, scilicet per radicem primj quadratj ipsius ordinis, erunt .30., que erunt radix medianj quadratj. Quare radix minoris quadrati erit .27, et radix maioris erit .33. Nam quadratus qui fit á 30., scilicet 900., addit super quadratum qui fit ad 27., scilicet super 729, nouenarios .19.; et quadratus qui fit á .33., scilicet .1089., addit super .900. nouenarios .21.; et sic proportio differentie, que est inter 729 et 900., scilicet 171., est ad differentiam que est inter 900 et 1089, scilicet ad 189, sicut 19 ad 21; hoc uolumus: quod etiam inuenietur inter quadratos, qui fiunt á numeris áscendentibus per quaternarium, uel quinarium, uel per alium quemlibet numerum.

fol. 34 verso.

Et si proportio duarum differentiarum, que sunt inter tres quadratos, fuerit sicut aliquis quadratus .a. ad aliquem quadratum .b., uolueró ipsos tres quadratos inuenire. Ponam numerum .c. medium inter .a.b. in proportione continua cum possibile. Quia, ut in Euclide habetur, inter duos quadratos numeros unus medius intercidit numerus, et procreabitur numerus .c. ex multiplicatione radicis numeri .a. in radicem numeri .b.; et erit sicut .a. ad .c., ita .c. ad .b.; et sicut .c. est ad .b., ita .b. sit ad .d.; et erunt numeri .a.c.b.d. continue proportionales: quare erit sicut .a. ad .b., ita .c. ad .d.; et sit quadratus numeri .a. numerus .ef., et quadratus numeri .c. numerus .eg. Insuper et quadratus numeri .b. numerus .eh.; dico, differentias que sunt inter quadratos .ef. et .eg. et .eh., scilicet numeri .fg. et .gh., proportionem habere ad se inuicem, eam quam habet quadratus numerus .a. ad quadratum numerum .b.; quod sic probatur. Quoniam numeri .a. c. b. continuo proportionales sunt, est sicut .a. primus ad .b. tertium, ita quadratus numeri .a. primj ad quadratum numeri .c. secundi, ut in geometria aperte monstratum est. Est enim quadratus numeri .a. numerus .ef., et quadratus numeri .c. numerus .eg.; ergo est sicut .a. ad .b., ita numerus .ef. ad numerum .eg. Rursus quoniam numeri .c. b. d. continue proportionales, est sicut .c. ad .d., ita quadratus numeri .c., scilicet numerus .eg., ad quadratum numeri .b., scilicet ad numerum .eh. Sed sicut .c. est ad .d., ita fuit .a. ad .b.; ergo sicut .a. ad .b., ita numerus .eg. ad numerum .eh.; fuit etiam sicut .a. ad .b., ita .ef. ad numerum .eg.

* radicis numeri ... ita .c. ad .b. » (fol. 34 verso, lin. 9; pag. 276, lin. 29 e 30)

$$\frac{16}{a} \quad \frac{20}{c} \quad \frac{25}{b} \quad d$$

* eam quam ... probatur. Quoniam » (fol. 34, verso, lin. 15; pag. 276, lin. 34 e 35).

$$\frac{e}{f} \quad \frac{g}{h}$$

Numeri ergo *ef.* et *eg.* et *eh.* continue proportionales sunt. Et quoniam est sicut *ef.* ad *eg.*, ita *eg.* ad *eh.*: disiunctim ergo erit sicut *ef.* ad *fg.*, ita *eg.* ad *gh.*: permutatim ergo sicut *ef.* ad *eg.*, ita *fg.* ad *gh.*; sed *ef.* ad *eg.* est sicut *a.* ad *b.*; ergo sicut *a.* ad *b.*, ita *fg.*, scilicet differentia que est inter quadratos *ef.* et *eg.* est ad *gh.*, scilicet ad differentiam que est inter quadratos *eg.* et *eh.*: que etiam ostendantur cum numeris. Esto quidem numerus *a.* 16., et numerus *b.* 25.; quare numerus *e.* erit 20., qui procreatur ex ductu radicis de 16 in radicem de 25; et est sicut 16. ad 20, ita 20 ad 25.; et erit quadratus numeri *a.*, scilicet numerus *ef.*, 256.; et quadratus numeri *c.*, scilicet numerus *eg.*, 400.; et quadratus numeri *b.*, hoc est numerus *eh.*, | est 625: unde si ex *eg.* auferatur *ef.*, remanebunt 144. pro numero *fg.*; et si auferatur quadratus *eg.* ex quadrato *eh.*, scilicet 400. de 625., remanebunt 225. pro numero *gh.*: sunt enim 144. ad 225. sicut 16. sunt ad 25.; et hoc uolui demonstrare.

fol. 35 recto.

ET Si data proportio duarum differentiarum cadentium inter tres quadratos non fuerit aliqua suprascriptarum, videlicet ex continuis, uel ex imparibus collateralibus numeris, aut ex duobus quadratis. Solutionem quarum ex ascensione octonariorum cadentem inter quadratos impares, que fit ex numeris continue ascendentes ab unitate, ex ascensione quaternariorum cadente inter pares quadratos numeros, que fit ex numeris ab unitate ascendentes per impares numeros. Inueniemus hoc ordine. Ponamus ut proportio duarum differentiarum cadentium inter tres quadratos numeros fiat sicut 2 est ad 9.

Accipiam primum quadratum qui fit á quinario, qui addit super quadratum sibi antecedentem imparem duos octonarios. Et habebó ipsum pro primo quadrato, si possibile fuerit; et proportionabo ipsos duos octonarios cum octonarijs, quos addit sequens quadratus impar super quadratum quinarium, scilicet cum 3. octonarijs: et quia proportio de 2. ad 3. non est sicut 2. ad 9, super tres octonarios addam quatuor octonarios, quos addit quadratus nouenarium super quadratum septenarium, et erunt septem octonarij; et erit proportio duorum octonariorum ad septem octonarios sicut 2. ad 7. Sed proportio de 2. ad 7. est maior proportione quam habet 2. ad 9. Quare super 7. octonarijs addam multitudinem octonariorum additionis sequentis imparis quadrati, eius videlicet qui fuit ab 11, erunt octonarij 12.; ad quem numerum, cum duo habeant minorem proportionem quam ad 9., duplicabo numeros proportionis, scilicet 2. et 9., et habebó 4. et 18. Et considerabo proportionem quam habet 4. ad sequentem sibi numerum, scilicet ad 5., uel ad duos sequentes numeros, scilicet ad 5. et ad 6., uel ad tres sequentes numeros, donec inueniam inde proportionem quam habet 4. ad 18.; et hoc erit cum accepero á quaternario tres sequentes numeros, scilicet 5. et 6. et 7., qui faciunt 18.; ad quem numerum 4. habet proportionem, eam quam habet 2. ad 9.: et propter hoc inuenta est solutio questionis, et habebó pro maiorj quadrato ipsum qui est á 15., scilicet 225.; que 15. habentur ex duplo de 7., uno addito; et est quadratus, qui fit á 15., addens super quadratum, qui fit ad 13, septem octonarios; | et quadratus, qui fit á 13, addit super quadratum qui fit ab 11. sex octonarios; et quadratus, qui fit ab 11, addit super quadratum qui fit á 9 quinque octonarios; et sic quadratus, qui fit ad 15, addit super quadratum qui fit á 9, octonarios 18.; et quadratus,

fol. 35 verso.

qui fit á 9, addit super quadratum qui fit á 7, quatuor octonarios; et sic proportio differentię, que est inter quadratum qui fit á 7, et quadratum qui fit á 9., scilicet inter 49. et 81., erit ad differentiam, que est inter 81 et 225, sicut .2. ad 9; et hoc est quod uoluj demonstrare.

Soluuntur etiam omnes suprascriptę questiones et eorum consimiles in quadratis qui fiunt á duplo uel á triplo uel á quolibet alio multiplice numerorum, á quibus fiunt quadratj suprascriptorum (*sic*) inuentionum. Verbi gratia: fuerunt quadrati suprascriptę questionis á 7 et á 9 et a 15. Quare si dupricauimus hos tres numeros, habebimus pro radice minoris quadrati 14., et pro radice medianj 18., et pro radice maioris 30.; et erit similiter proportio differentiarum, que sunt inter quadratos, qui fiunt ab ipsis numeris, sicut 2 ad 9.; quod ostendam in lineis: sit linea *ab.* 49., scilicet quadratus septenarij; et *ac.* sit 81., scilicet quadratus nouerarij; et *ad.* sit quadratus qui fit 15.; et *ez.* sit quadratus qui fit á 14.; et *ei.* sit quadratus qui fit a 18; et *et.* sit quadratus qui fit á 30. Et quoniam numeri, á quibus fiunt quadratj *ez. ei. et.*, dupli sunt numerorum, á quibus fiunt quadrati *ab. ac. ad.*, erit unusquisque quadratorum *ez. ei. et.* quadruplus sui similis, scilicet *ez.* ex *ab.* et *ei.* ex *ac.* et *et.* ex *ad.* Et quoniam totus *ei.* ex toto *ac.* quadruplus est, et *ez.* ex *ab.* similiter est quadruplus, reliquus *zi.* ex reliquo *bc.* quadruplus est. Similiter ostendetur, *it.* quadruplus esse ex *cd.*; quare est sicut *bc.* ad *cd.*, ita *zi.* ad *it.* Est enim *bc.* ad *cd.* sicut 2 ad 9.; et *zi.* ad *it.* est similiter sicut 2 ad 9. Similiter si numeri, á quibus essent quadratj *ez. ei. et.*, essent tripli numerorum, á quibus quadratj *ab. ac. ad.*, esset unusquisque quadratorum *ez. ei. et.* nonuplus sui similiter; quare differentia *zi.* esset nonupla ex differentia *bc.*, et differentia *it.* ex differentia *cd.*; quare esset sicut *bc.* ad *cd.*, ita *zi.* ad *it.*; et hoc uoluj demonstrare.

ET si proportio dvarum differentiarum, que sunt in tres quadratos, fuerit sicut .11. est ad 43, erit primus quadratus .25. Secundus 729. Tertius 3481.; quos hoc ordine inuenj. Posui primum pro mediano quadrato quadratum | qui fit á 23, cum ipse addat 11 octonarios super quadratum qui fit á 21.; et inuestigauj proportionem quam habet .11. ad primum sequentem sibi numerum, uel ad duos, uel ad plures, et non inuenj cum ipsis numeris proportionem quam habet 11. ad 43.; quia si addatur 12 et 13 et 14, qui secuntur 11. in ordine numerorum, non faciunt ultra 39.; ad quem numerum .11. habet maiorem proportionem quam ad 43.; et si cum ipsis 39. addatur sequens numerus, scilicet .45., ueniunt 54.; ad quem numerum .11. habet minorem proportionem quam ad 43; et propter hoc duplicauj .11. et 43, et triplicauj etiam, et per unumquemque numerorum, qui sunt usque in .7., multiplicauj eos, et non inuenj inter continuos numeros proportionem quam querebam: ad extremum octuplicauj .11. et .43., et habui 88. et 344.; et diuisi .88 per .11., et prouenerunt .8.; circa quem posui decem numeros sibi continuos, et fuit 8. medius inter eos; et fuerunt .11. numeri, qui insimul aggregatj faciunt .88., ex quibus minor numerus est .3., maior .13.; et duplicauj 13., et addidj .1., et prouenerunt .27., cuius quadratus addit octonarios. 13. super quadratum qui fit á 23; et quadratus, qui fit á 25, addit 12 octonarios super quadratum qui fit a 23; et sic inuestigando inuenj, quadratum, qui fit á 27, addere super quadratum qui fit a

^a sit linea . . . quadratus *a* (fol. 35 verso, lin. 16—17; pag. 278, lin. 11—12).

a *b* *c* *d*

^a et *ei.* ex *ac.* . . . quadruplus *a* (fol. 35 verso, lin. 22—23; pag. 278, lin. 17).

e *z* *i* *t*

5, octonarios .88., qui proueniunt ex aggregatione numerorum, qui sunt á 13 usque in .3., scilicet ex undecim numeris ordinatis.

Deinde accepi .14. cum suis sequentibus numeris usque in 29, et aggregauj eos, et habui .344., scilicet octuplum de 43.; et super duplum de 29. addidj .1., et habui .59. pro radice maioris quadratj, scilicet de 3481, qui addidit octonarios .29. super quadratum sibi antecedentem imparem, scilicet super eum qui fit á .57.; qui quadratus addit super quadratum, qui fit á 55., octonarios 28.; et sic addendo omnes octonarios, quos addunt antecedentes quadratj, qui sunt á quadrato, qui fit á 59. vsque ad quadratum qui fit á 27, super suos consequentes, collegj, quadratum, qui fit á 59., addere super quadratum, qui fit á .27., octonarios 344.: quare proportio differentie, que est inter quadratum qui fit á quinario, et quadratum qui fit á 27, est ad differentiam que est inter quadratum qui fit á 27., et quadratum qui fit á 59, sicut .11. ad 43; que etiam proportio inuenietur in quadratis, qui sunt á duplo uel ab alio quolibet multiple radicum inuentarum.

fol. 36 verso.


Volo inuenire tres quadratos numeros, ut additio primj et secundi, nec non ipsorum trium numerorum faciat quadratum numerum. Inueniam primum duos quadratos numeros, ex quorum additione proueniat quadratus numerus, et fiant á numeris primus ad se inuicem. Sintque 9 et 16, ex quorum additione proueniunt 25., qui est quadratus numerus: et accipiam quadratum, qui colligitur ex aggregatione omnium imparium numerorum, qui sunt infra .25.; qui quadratus est .144., cuius radix est medietas duorum extremorum ipsorum imparium numerorum, scilicet de .1. et .23. Ex aggregatione quidem de 144 et 25 proueniunt .169., qui numerus quadratus est; et sic inuenti sunt tres numeri quadratj, quorum duo, nec non et omnes simul aggregatj faciunt quadratum numerum: super quem etiam quadratum si addatur quadratus numerus, qui colligitur ex omnibus imparibus numeris, qui sunt ab uno usque in 167., cuius quadrati radix est .84., scilicet medietas de 169, proueniunt 7225, qui numerus est quadratus, et eius radix est .85.; et sic inuenti sunt quatuor quadratj, quorum duo uel tres, nec non et omnes simul coniuncti faciunt quadratum numerum: super quibus etiam 7225. possumus tres quadratos diuersos addere, et cum unoquoque ipsorum faciet quadratum numerum, ex quibus primus est quadratus proueniens ex omnibus imparibus numeris, qui sunt infra .7225., cuius radix est: 3612. Secundus uero quadratus prouenit ex aggregatione omnium imparium numerorum, qui sunt sub quinta parte de .7225., detractis inde duobus imparibus eidem quinte parti collateralibus, cuius quadrati radix est 720. Tertius quidem quadratus prouenit ex imparibus omnibus, qui sunt sub $\frac{1}{25}$ de, 7225, dentis ex eis duodecim imparibus ipsius $\frac{1}{25}$ partis collateralibus, cuius quadratj radix est 132.; et sic possunt infinitj quadratj numeri inueniri, qui disiuncti et simul agregatj, secundum istum ordinem, facient numerum quadratum.

*Questio mihi proposita a magistro Theodoro
domini imperatoris phylosopho.*

Volo inuenire tres numeros, qui insimul aggregati cum quadrato primj numeri faciant quadratum numerum. Super quem quadratum, si addatur quadratus secundi, egrediatur inde quadratus numerus; cum quo quadrato, addito quadrato tertij, similiter quadratus numerus inde proueniat. Inueniendi sunt primj tres numeri quadratj, quo-

fol. 37 recto.

* ra[dice] ... similibus * (fol. 37 recto, lin. 2, 4—9; pag. 280 lin. 4—9).




rum duo simul aggregatj faciant quadratum | ex aggregatione ipsorum trium ueniat item quadratus numerus. Et minor eorum sit plus radicibus reliquorum duorum quadratorum. Sintque 36 et 64 et 576, et erit radix secundj numeri .8., tertij .24.; que radices habeantur pro secundo et tertio numero quesitorum trium numerorum. Et Ponam pro primo numero radicem, et aggregabo hos tres numeros simul, et habebō 32 et radicem; super quem addam quadratum radice, et habebō 32 et quadratum et radicem; que omnia uolo ut equentur primo posito quadrato, scilicet .36.; et auferam ab utraque parte 32, et remanebunt quadratus et radix equales iii^or unitatibus. Vnde qualiter in similibus operandum sit, ponam pro quadrato quadratum .ac., cuius unumquodque latus sit equale posite radice; et addam ei superficiem .de. rectiangularam, que sit una radix quadratj .ac.; quare .ce. erit .1., et .dc. est radix, cum sit unum ex lateribus quadrati .ae.; et dimidiabo .ce. super .f., et erit unaqueque sectionum .cf. et .fe. medietas unius.

Et quia inuenimus, quadratum et radicem equarj iii^or unitatibus, erit manifestum quod superficies .ae. rectiangulara erit .4.; que superficies prouenit ex .ab. in .be, hoc est ex .bc. in .be.; et quia linea .ce. diuisa est in duo equa super .f., et in directo eius addita est quedam recta .cb., erit superficies .bc. in .be. cum quadrato lineę .cf. equalis quadrato lineę .bf. Sed ex .bc. in .be. proueniunt .4.; quibus si addatur quadratus numeri .cf., qui est $\frac{1}{4}$, habebuntur $\frac{1}{4}4$ pro quadrato numerj .bf.; qui numerus cum non habeat radicem, dicemus, numerum .bf. esse radicem de $\frac{1}{4}4$; de quo si auferatur numerus .cf., qui est $\frac{1}{2}$ unius, remanebit pro radice .bc. radix de $\frac{1}{4}4$ minus $\frac{1}{2}$ unius; qui numerus, quamuis sit inratiocinatus, habebitur pro primo numero quesito, et secundus erit .8., tertius 24. Verbi gratia : ex aggregatione quidem horum trium numerorum habentur $\frac{1}{2}31$ et radix de $\frac{1}{4}4$; super quam aggregationem si addamus quadratum primj numeri, qui est $\frac{1}{2}4$ minus radice de $\frac{1}{4}4$, habebuntur 36; qui numerus quadratus est. Super quem si addantur .64., scilicet quadratus secundj numeri, uenient 100.; qui numerus quadratus est, et radix eius est .10.; super quem quadratum si addantur 576., scilicet quadratus tertij numeri, habebuntur 676; qui numerus quadratus est, et radix eius est 26.; et hoc uolumus.

fol. 37 verso.

* contemptumbd. equalis * (fol. 37 verso, lin. 4, 2—6; pag. 280, lin. 32—36).



Et ut solutio questionis suprascriptę habeatur in numeris ratiocinatis, Ostendendum | est primum, quod quando quarta unius integrj additur super aliquem numerum contemptum sub duobus numeris ratiocinatis, quorum unus excedat alterum in .1., procreatur inde quadratus numerus; quod ostendatur in superficie .ag., que contineatur sub duobus numeris ratiocinatis, quorum maior excedat alterum in .1., qui sunt .ab. et .bg.; et maior eorum esto .bg., et auferatur á maiorj .bg. unitas .gd., remanebit numerus .bd. equalis numero .ab.; et diuidatur unitas .gd. in duo equa super .e., et erit .de. medietas unius integrj. Quare .de. medietas est ratiocinata. Est enim et numerus .bd. ratiocinatus. Quare totus .be. numerus ratiocinatus est; et quadratus, qui fit ab ipso, ratiocinatus est: cuj quadrato equatur superficies, que fit ex .bd. in .bg., hoc est ex .ab. in .bg. cum quadrato qui fit á .de. Sed quadratus, qui fit ex .de., est $\frac{1}{4}$ unius; et numerus, qui prouenit ex .ab. in .bg., est contemptus sub duobus numeris ratiocinatis, quorum unus excedit alium in 1. Ergo cum additur $\frac{1}{4}$ cum

numero facto á duobus numeris, quorum unus addat super alterum .1., prouenit inde quadratus numerus; et hoc uolui demonstrare.

ET notandum quod omnes numeri integri, qui fiunt á duobus collateralibus, scilicet continuis, proueniunt ex ordine ex ordinata parium numerorum aggregatione. Nam .2., qui prouenit ex unitate ducta in .2., habetur ex primo parj numero; et 6, qui fiunt ex ductis .2. in 3., habentur ex aggregatione primorum duorum parium numerorum; et .12., que ueniunt ex 3 ductis in 4., habentur ex aggregatione trium parium numerorum, scilicet de .2 et 4 et 6.; et hoc eodem ordine ex decem paribus numeris prouenit numerus factus ex 10 uicibus 11: quod idem intelligatur in omnibus reliquis numeris, qui fiunt á duobus continuis numeris integris. Et sciendum quod omnis impar numerus est aggregatio duorum numerorum continuorum. Vnde quilibet impar numerus potest diuidj in duos numeros continuos, ut 7. qui diuiditur in .3. et 4.

Nunc ostendere uolo quod quando de aliquo quadrato numero tolluntur aliquot radices eius, et numerus ipsarum radicum diuidatur in duas partes, quarum una addat super alteram .1.; et multiplicetur una ipsarum partium per aliam, et quod prouenerit, addatur cum residuo quod de quadrato remanet, radicibus dentis, ueniet inde numerus contemptus sub duobus numeris inequalibus, quorum maior addit .1. super minorem. Ad quod demonstrandum, Adiaceat | tetragonum .ag., et tollatur ex eo aliquot radices eius, que radices contineat (sic) superficiem .eg.; quare numerus fg. continet tot unitates quot radices ex quadrato .ag. sunt in superficie .eg.; et diuidatur numerus fg. in duas partes, quarum maior addat 1. super minorem, que sint f.i. i.g.; et maior earum sit .ig. Dico quod cum de quadrato .ag. tollitur superficies eg, residuum, scilicet superficies .af cum superficie que fit ex .if. in .ig., facit numerum factum ex duobus inequalibus numeris, quorum maior addit .1. super minorem; et hoc est de quadrato .ag. tollere superficies eg minus superficie que fit ex .if. in .ig. Ponamus siquidem numerum .gh. equalem numero .if., et remanebit .ih. unum; quod diuidatur in duas medietates, que sunt zi zh., et erit totus fg. diuisus in duo equalia super .z., et in duo inequalia super .i. Quare multiplicatio fi. in .ig. cum quadrato qui fit ab iz., equatur quadrato numeri fz. Rursus quoniam numerus fg. diuisus est in duo equa super .z., et ei additus est numerus .bf., erit multiplicatio .bg in bf., hoc est multiplicatio .ab. in .bf. cum quadrato numeri fz., equalis quadrato numeri .bz. Sed quadrato numeri fz. equalis est superficies fi. in .ig. cum quadrato qui fit ab iz medietate. Ergo multiplicatio .ab. in .bf., hoc est superficies af. cum multiplicatione fi in ig, et cum quadrato numeri .iz equatur quadrato numeri bz. Rursus quoniam ih unitas diuisa est in duo equa super punctum .zi., et ei additus est numerus .bi, erit multiplicatio bi. in bh cum quadrato .iz. equalis; sed quadrato bz. equales sunt superficies af, et superficies fi. in .ig. cum quadrato iz.; ergo superficies .bi. in bh cum quadrato: .iz. equalis est superficiebus .af. et fi. in .ig. et quadrato .iz. Communiter auferatur quadratus ex iz, remanebit superficies .af. cum superficie fi. in ig equalis superficiei .bi. in bh.: sed superficies bi. in bh fit ex duobus numeris, quorum unus addit .1. super alterum, qui sunt bi. et bh; est enim .ih. 1. Que etiam ostendatur cum numeris: quadratus quidem .ag sit 100, et erit unumquodque latus .10.; et auferantur á quadrato .ag. 7. radices eius minus multiplicatione fi. in

fol. 38 recto.

uenient ... in .7. Est » (fol. 38 re-
cto, lin. ultima e margine inferiore;
pag. 282, lin. 2—3).



huc usque est scriptus
quaternus domini .B.
cardinalis

fol. 39 recto.

.ig.; que radices sint superficies *.eg.*, remanebit superficies *.af.* 30; cum quibus si addatur multiplicatio *.fi.* in *.ig.*, hoc est de .3. in .4., uenient .42.; qui numerus surgit ex *bi.* in *.bh.*, hoc est de 6 in .7. Est enim totus *bg.* 10.; de quibus si auferatur *.fg* numerus, qui est .7., remanent .3. pro numero *.bf.*; quibus si addatur *.fi.*, qui est .3., erit .6. totus numerus *.bi.*; cui si addatur unitas *.ih.*, habebuntur .7. pro numero *.bh.* Er postquam hec omnia demonstrata sunt, redeamus ad questionem phylosophi, et procedamus predicto modo, donec habeamus quod census et radix et 32 equantur quadrato de 36.: deinde uideamus quot radices sunt 32 de 36., hoc est quod diuidamus 32 per radicem de 36., uenient radices $\frac{1}{3}$ 5; et propter hoc, ut inueniamus solutionem predictę questionis in posita proportione trium quadratorum supradictorum, scilicet de 36 et de 64 et de 576; oportet ut inueniamus quadratum aliquem, de quo extractis radicibus $\frac{1}{3}$ 5. ipsius remaneat numerus, qui procreatur ex multiplicatione dictorum numerorum inequalium, quorum maior addat .1. super minorem. Quod inueniemus si posuerimus numerum aliquot radicum superhabundantem predictas radices $\frac{1}{3}$ 5. Quod quidem possumus facere in infinitis modis. Vnde ponamus ad libitum radices .7., et diuidamus .7. in duas partes, quarum una addat .1. super alteram, eruntque 3 et 4.; et multiplicetur 3 per 4, faciunt .12.; et nos scimus, per ea que dicta sunt, quod quando de aliquo quadrato tolluntur .7. radices eius minus .12., remanebit de ipso quadrato numerus procreatus ex duobus numeris inequalibus, quorum maior addit .1. super minorem. Et nos uolumus inuenire quadratum, de quo extractis radicibus $\frac{1}{3}$ 5 ipsius, remaneat similiter numerus procreatus ex duobus numeris, quorum unus addat .1. super alium. Ergo radices $\frac{1}{3}$ 5 ipsius quadrati, quem querimus, equantur radicibus .7. eiusdem quadrati minus .12.: quare si addamus 12. utrique partj, erunt radices $\frac{1}{3}$ 5 et 12 dragme, que equantur .7. radicibus. Tollamus ergo ab utraque parte radices $\frac{1}{3}$ 5., remanebit radix $\frac{2}{3}$ 1, que equantur unitatibus .12. Triplicemus ergo hec omnia, et erunt quinque radices equales .36. Vnde si 36 diuiserimus per 5, habebimus $\frac{1}{5}$ 7. pro radice quesiti quadratj, scilicet primj: fuit quidem radix primj quadrati .6.; ergo proportionaliter est sicut .6. ad $\frac{1}{5}$ 7, ita 8 et 24 ad radicem secundj et tertij quadrati. Sed $\frac{1}{5}$ 7 addit super 6. quintam partem ipsius; quare si super 8 et super 24 addamus quintam eorum, habebimus pro radice secundi quadrati $\frac{2}{5}$ 9, et pro radice tertij $\frac{4}{5}$ 28; et erit $\frac{2}{5}$ 9 secundus numerus ex tribus quesitis numeris, et $\frac{4}{5}$ 28 erit tertius: et est adhuc primus numerus ignotus, qui cum fuerit additus cum secundo et tertio numero predictis et cum quadrato ipsius primj numeri, faciet quadratum de $\frac{1}{5}$ 7; qui quadratus est $\frac{1}{5}$ 4 51. Quare ponemus pro primo numero radicem, et addemus eam cum $\frac{2}{5}$ 9 et cum $\frac{4}{5}$ 28., et habebimus radicem et $\frac{2}{5}$ 38.; quibus addemus quadratum radice, et habebimus quadratum et radicem et $\frac{2}{5}$ 38., que equantur dragmis $\frac{1}{5}$ 4 51. Tollamus ergo ab utraque parte $\frac{2}{5}$ 38, remanebit census et radix, que equantur dragmis $\frac{1}{5}$ 13; super quem addamus $\frac{1}{4}$, scilicet quadratum medietatis radice, ut superius fecimus, et habebimus $\frac{9}{10}$ 6 13, que sunt centexime 1369.: diuidamus ergo radicem de 1369., scilicet 37, per radicem de 100., uenient $\frac{7}{10}$ 3; de quibus tollamus $\frac{1}{2}$ pro medietate radice, remanebunt $\frac{1}{5}$ 3 pro primo numero; et sic soluta est hec questio in numeris ratiocinatis; et secundum hunc modum potest solui infinitis modis.

Solui etiam hanc questionem in numeris integris, quorum primus fuit 35. Secun-

dus 144., tertius 360., quorum aggregatio surgit in 539.; super quibus addito quadrato primj numeri, scilicet 1225., veniunt 1764.; qui numerus quadratus est, et eius radix est 42.: super quo quadrato addito quadrato numeri secundi, qui est 20736, veniunt 22500.; qui numerus quadratus est, et radix eius est 150.: super quo quadrato addito quadrato tertij numeri, scilicet 129600., veniunt 152100.; qui numerus quadratus est, et radix eius est 390. Quos numeros inuenj ex positione horum trium quadratorum, scilicet de 49 et 576 et de 3600., quorum duo, nec non et ipsi tres simul additj faciunt quadratum numerum. Et aggregaui radices secundi et tertij, scilicet 24 et 60, fuerunt 84.; que diuisi per radicem primj quadrati, scilicet per 7., et uenerunt 12.: et propter hoc oportuit me inuenire quadratum numerum, de quo cum tollerem 12 radices eius, remaneret numerus factus ex duobus numeris inequalibus, quorum unus adderet 1. super alium. Vnde accepi 13., et diuisi ipsum in partes continuas, scilicet in 6. et 7.; que multiplicauimus insimul, et fuerunt 42.: et oportuit me inuenire quadratum, cuius 13. radices minus 42. dragmis equaretur 12 radicibus eiusdem; et processi postea predicto ordine, et habui numeros superscriptos; ex quibus etiam quadratis inuenj hos alios tres numeros, scilicet $\frac{2}{3}$ 10 et 64 et 160. Et non solum per hunc modum tres numeri diuersis modis possunt inueniri; sed etiam inuenientur quatuor cum quatuor numeris quadratis, quorum duo per ordinem et tres, nec non et omnes simul coniuncti fecerint quadratum numerum. Ergo autem cum his quatuor quadratis numeris, scilicet cum et et et (*) Inuenj hos quatuor numeros, quorum primus est 1295, Secundus $\frac{6}{7}$ 4566, Tertius $\frac{4}{7}$ 11417, Quartus uero est 79920.; et eorum aggregatio est 97199. Super quo numero, si addatur quadratus primj numeri, scilicet 1677025, venient 1774224; qui numerus quadratus est, et eius radix est 1332. Super quo etiam quadrato (**)

fol. 39 verso.

(*) Le quattro lacune indicate con punti nella linea 20 di questa pagina, trovansi nel rovescio della carta 39 del Codice Ambrosiano E. 75, Parte superiore.

(**) La parte scritta del rovescio della carta 39 del Codice Ambrosiano E. 75, Parte superiore, finisce in tronco alla parola *quadrato*, non contando che otto linee, l'ultima delle quali è incompleta. Il rimanente di questo Codice, è interamente bianco.

IMPRIMATUR

Fr. Hieron. Gigli Ord. Praed. S. P. A. Mag.

IMPRIMATUR

Fr. A. Ligi-Bussi Min. Conv. Archiep. Icon. Vicesg.



135663

BIBLIOTECA
Scuola Normale Superiore

