



OPUSCULA  
MATHEMATICA

DE POTENTIIS OBLIQUIS,  
DE PENDVLIS,  
DE VASIS,  
ET DE FLVMINIBVS.

IOANNIS CEVÆ

Mediolanensis.



MEDIOLANI

---

Ex Typographia Ludouici Montæ. 1682.

*Superiorum permissu.*

*Biblioth. Civica. Josephæ edicte Montis*

EMINENTISSIMO PRINCIPI  
MICHAELI ANGELO RICIO  
S. R. E. CARD.



Agno Patrono, ac Iudici, Tibi nimirum, *CARDINALIS AMPLISSIME*, hac mea qualiacunque, non sine ingenuo rubore subijcio. Minima sunt, & publicam lucem formidant & quantò magis splendorem purpure, atque aciem mentis tua? Adde, alijs curis, alijsque dudum altioribus studijs ac muneribus animum Tibi occupatum, ut laus exigua videri possit, si nomen clarissimi Mathematici obiecerim Tibi, & libellum tuum planè aureum de arcanis Algebra peritissimis, à te in lucem editum, in memoriam reuocauerim. Vicit tamen hac omnia humanitas tua singularis, nec non breuitas ipsa voluminis in quatuor exigua opuscula distributi. Noua sunt pleraque, & nonnulla hucusque desiderata; eaque perstringam paucis, ne, si quando per otium tibi licuerit, in eorum delectu sit laborandum. In primo tractatu de potentijs obliquis, mobilium varios effectus, iuxta multiplices virtutes, atque directiones, mechanicè prius demonstratos, geometricè subinde expendo. In secundo de pendulis, angulum incidentia equalem angulo reflexionis, cui principio nituntur uniuersa

catoptrica, obiter demonstro; dein quam sint momenta corporum, dum in descensu per plana ad horizontem inclinata, vel rotantur, vel eadem radunt; denique (quod institutum est) tempora, quibus vibrantur duo pendula eque inclinata ad suum perpendicularum, esse ut longitudines pendulorum, non verò in subduplicata ratione ipsarum. Sequitur tertius de vasis, in quo rationes, quas habent inuicem altitudines, tempora, & velocitates aquarum è luminibus erumpentium, afferuntur. Tandem agimus de fluminibus, atque obiter ostendimus, inequalitatem gravitatis specifica oriri precisè ex maiori, vel minori densitate corporum; docemus subindè penduli ope metiri in quocunque fluminis loco eiusdem velocitatem, & quantitatem.

Hæc succisus horis à me elaborata, amicorum hortatu in lucem dedi; quorum, si quidpiam arriserit Tibi, Mæcenas Eminentissime, fructum amplissimum horum studiorum capisse arbitrabor; animosque addes, ut usdem continuatis maiora etiam aggrediar. Faciant interim Superi immortales, ut bonæ artes te incolume diu fruantur, diuque suspiciat Roma atque Orbis, exemplar vitæ integerrimæ, Ærarium omnigenæ eruditionis præsertim sacræ, animumque maiorem ipsâmet purpurâ.

Eminentia Tua Reuerendissima

Humillimus, & obsequentissimus Seruus  
Ioannes Ceua Academiæ Physico-  
mathematicæ Romanæ Socius.

# DE POTENTIIS OBLIQUIS

## Tractatus Geometricomechanicus

### EXPLICATIO TERMINORVM.



VM dicimus ex. gr. mobile A esse affectum virtute AB; intelligimus ipsum mobile tale in se principium habere, vt feratur secundum lineam AB habens in principio motus, nempe cum est in A, potentiam ab ipsa AB linea dimensam.

Fig. 1.  
Tab. 1.

Quod si id ipsum mobile dicamus affectum pluribus virtutibus, hoc est AB, AC; Sensus erit quòd mobili in fine tale principium tendendi secundum vtranque lineam AB, AC; vid. per AB, operante virtute AB, & per AC virtute AC; quamuis si moueretur mediam inter vtranque lineam fulciperet viam, aliâ quadam virtute ab expositis resultante: hanc verò quomodo vestigare possimus docebimus infra.

#### A X I O M A I.

Si mobile fuerit affectum duabus virtutibus æqualibus in eadem recta linea impellentibus, sed ad partes oppositas, sistetur immotum.

#### A X I O M A II.

Si mobile fuerit affectum duabus, vel pluribus virtutibus in eadem recta linea operantibus, & ad eandem partem tendentibus, in hanc ipsam partem feretur mobile tantò potentia, quantum est aggregatum dictarum virtutum.

#### PROP. I. THEOR. I.

SI mobile sit affectum duabus virtutibus inæqualibus in eadem linea recta in oppositum tendentibus feretur illud ad partes maioris virtutis tantâ virtute, quanta est differentia datarum.

Fig. 2. Tab. 1.

A

Si

*De Potentijs Obliquis*

Sit mobile *A* affectum virtutibus *AB*, *AD*, inæqualibus, tendentibus in oppositas partes *BD*, sintque ambæ in eadẽ rectã *BAD*; & earum differentia sit *CD*. Dico mobile latum iri ad partes *D*, potentia *CD*.

Nam virtutes *AC*, *AB* sunt æquales in eadẽ rectã operantes, & in oppositas nitentes; ergo cum ponantur inseparabiles ab ipso mobili, necesse est mobile earum vi librari; Sed excessus *CD* non habet cum qua alia virtute pugnet, ergo debet ipsum mobile virtute *CD* moueri.

SCHOLIUM.

Hic lectorem monitum volo, quoties dicimus ex. gr. virtutem aliquam *AD*, sensum esse mobile *A* respectu huius virtutis tendere in *D*; quod si diceremus *DA*, tunc concipiendum esset idem mobile *A* tendens ad partes *B* virtute *DA*; quamobrem diligenter attendendum est; quoties enuntiamus virtutes, quãnam litteras primo, & quas secundo loco exprimamus.

PROP. II. THEOR. II.

Fig. 3. Tab. 1. **M**obile *A* tendat in *B* virtute *AB*, & super hanc lineam, tanquam hypotenusam sit triangulum rectangulum *ACB* ex infinitis, quæ poni possunt: Dico mobile affectum illius virtute, niti secundum *AC* virtute *AC*, & secundum lineam parallelam ipsi *CB* à puncto *A* deductam niti virtute *CB*.

Gal. de motu Proiec. & equ. pr. 2. Borellius de visper. enfl. pr. 14. Si enim concipiamus mobile *A* cucurrisse spatium *AB* æquabili motu; idem mobile percurrens distantiam *AC* eodem tempore, motuque æquabili, quare vt spatium *AB* ad spatium *AC*, ita velocitas per *AB* ad eam per *AC*; verum vt sunt velocitates inter se, ita virtutes motrices, cum igitur virtus per *BA* sit *BA*, illa per *AC* erit *AC*. Idem ostendemus respectu lineæ ductæ ex *A* parallelæ ipsi *CB*.

PROP. III. PROB. I.

**D**ato mobili affecto duabus virtutibus, reperire mediam viam per quam dirigatur, & potentiam motricem.

Fig. 4. & 5. Tab. 1.

Si virtutes sint in eadẽ rectã, vel tendent ad eadem partes, vel non;

*Tractatus Geometrico-mechanicus.* 3

non; si ad easdem partes, potentia erit aggregatum virtutum, & directio ipsa linea, in qua sunt virtutes suppositæ; si non tendant ad easdem partes, in oppositas spectabunt, cum sint in eadem linea; itaque vel sunt æquales, vel non; si æquales nulla erit directio, neque potentia; si inæquales, iam ostendimus in primo huius esse directionem, seu viam motus lineam illam in qua virtus maior, potentiam verò qua moueretur differentiam virtutum.

Sed non sint in eadem rectã; itaque mobile ponatur *A*, & virtutes, quibus est affectum exprimantur rectis lineis *AB*, *AC*. Iungatur *BC* quã diuisã bifariam in puncto *D* iungatur *AD*, & producatut indefinitè ad partes *D*; tum secetur *DE* æqualis *AD*; dico *AE*, seu duplam ipsius *AD* esse quæsitam potentiam, & viam quã dirigatur mobile sic affectum.

A puncto *A* cadat perpendicularis *AG* in lineam *BC*, eaque productã, sumatur *GF* æqualis *AG*, iunctã modo *EF*, erit parallela ipsi *DG*; est autem *DG* perpendicularis ipsi *AF*, ergo etiam *EF*.

Iam verò quoniam virtus *AB* producit duas virtutes *AG*, *GB*, & *AC* duas *AG*, *GC*; virtutes *AB*, *AC* resoluuntur in quatuor virtutes *AG* bis, & duas *GC*, *GB*; Sed in primo casu duæ virtutes *GC*, *GB* æquivalent differentia ipsarum, & in secundo earundem aggregato, nempe *FE*, quod quidem inferius lemmate ostendimus, ergo virtutes *AB*, *AC* proueniunt ex virtutibus *AF*, duplã ipsius *AG*, & *FE*; hæc autem duæ producunt *AE*; ergo *AE* est quæsitã potentia, & directio secundum quam ferri debet mobile sic affectum.

LEMMATA.

Quod verò assumpsimus, videlicet in quarta figura esse *FE* differentiam virtutum, seu linearum *GC*, *GB*; & in quinta figura, aggregatum earundem linearum, hoc modo fiet manifestum.

Quia in primo casu *BD* est æqualis *DC* ex constructione, erit *BG* maior ipsa *GC*, excessu *DG*, atque adeo ablata *DG* ex *DC* erit excessus lineæ *BG* supra *GC* dupla ipsius *DG*; sed *DG* ad *EF*, est vt *DA* ad *AE*, nempe vt 1 ad 2, ergo excessus, siue differentia ipsius *BG* supra *GC* erit æqualis *EF*.

In quinta verò figura, quia *BD*, *DC* sunt æquales, erunt tres lineæ *GB*, *GD*, *GC* arithmetice proportionales; idcirco dupla mediæ *GD* æqualis erit duabus simul lineis extremis *GB*, *GC*; verum

A 2

dupla

dupla eiusdem  $DG$ , vt superius diximus, est æqualis lineæ  $FE$ , ergo  $FE$  est æqualis aggregato linearum  $GC, GB$ , quod &c.

## COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, si iungantur  $BE, CE$ , esse  $BACE$  parallelogrammum, cum diametri  $BC, AE$  se inuicem bifariam secent; itaque si à punctis  $C, B$  nulla habita ratione diametrorum ducantur parallelæ vt impleant parallelogrammum  $BACE$ , datum erit punctum  $E$ , & consequenter alio artificio comperta erit quæsitæ potentia  $AE$ .

## PROP. IV. PROB. II.

**D**ato mobili tribus, seu quocunque virtutibus affecto, inuenire directionem mobilis sic affecti, nec non potentiam motricem. *Fig. 6. Tab. 1.*

Ex tribus virtutibus  $AB, AC, AD$  sumptis durabus quibuscunque  $AB, AC$ , ex antecedenti reperiatur potentia ex iisdem resultans  $AE$ . Iam mobile  $A$  est perinde ac si tantum durabus  $AE, AD$  virtutibus affectum esset; ideo fiat ex duabus  $AE, AD$  alia virtus  $AF$ , quæ resultabit ex tribus propositis  $AB, AC, AD$ ; ideoque  $AF$  erit directio, & potentia quæsitæ; quod si plures extiterint eodem artificio utemur.

## SCHOLIUM.

Hic licet considerare quomodo ex varia constructione reperiatur idem punctum  $F$ ; nam in hoc simplici casu possumus id præstare triplici constructione pro triplici combinatione duarum virtutum ex illis tribus ad libitum assumendarum; quod, si res ferret, possem geometricè ostendere, faciam tamen impofterum, vt veritates hæ mechanicæ in luce geometrica collocentur.

## PROP. V. PROB. III.

**I**nuenire potentiam cum tali directione, quæ valeat sistere quodam mobile affectum quocunque virtutibus. *Fig. 7. Tab. 1.*

Sit mobile  $A$  affectum virtutibus  $AG, AB, AC, AD$ , debemus reperire potentiam cum ea directione, quæ sistat mobile  $A$ .

Ex virtutibus  $AG, AB, AC, AD$  fiat ex antecedenti vnica  $AE$ , & productâ huiusmodi lineâ versus  $A$ , secetur  $AF$  æqualis ipsi  $AE$ ;

$AE$ ; dico inuentam virtutem  $AF$ , resistere in illa positione virtutibus  $AB, AC, AD, AG$ , ita vt sistat mobile  $A$ ; nam mobile  $A$  afficitur di&is virtutibus, perinde ac si afficeretur vnica  $AE$ , cui cum in eadem lineâ contranitur virtus  $AF$  æquali vi, necesse est, vt sequatur æquilibrium.

## AXIOMA III.

Si fuerit mobile quibusdam libratum virtutibus, quotlibet earum æquè reliquis obfistent.

## PROP. VI. THEOR. III.

**S**IT libratum mobile  $A$  affectum virtutibus  $AB, AC, AD$ , *Fig. 8. Tab. 1.* ductâ deinde vtcunque rectâ  $FAG$  per  $A$  transeunte, demittantur perpendiculares  $BF, CG, DE$ : dico  $AF, AE$  simul æquales esse rectæ  $AG$  ex altera parte: itemque duas perpendiculares  $BF, CG$  simul esse æquales constitutæ in alia parte perpendiculari  $DE$ .

Quoniam mobile  $A$  ponitur libratum virtutibus  $AB, AC, AD$ , si vnaquæque ipsarum, nempe  $AD$  statuatur pro vna parte æquilibrij, reliquæ efficient alteram partem; sed virtutes  $ED, AE$  possunt ipsam  $AD$ , item  $FB, AF$  producunt  $AB$ , & demum  $GC, AG$  tantundem pollent, ac ipsa  $AC$ ; ergo virtutes simul  $ED, AE$  æquè obfistent virtutibus simul  $FB, AF, GC, AG$ . Quia verò virtutes  $AE, AF, AG$  operantur in eadem lineâ  $FG$ , nec mobile secundum hanc mouetur, erunt virtutes  $AF, AE$  æquales virtuti  $AG$ , & lineæ pariter lineis. Deinde cum prædictum mobile nequeat moueri, nequè secundum perpendicularem ipsi  $FG$ ; hinc fit, vt virtus  $ED$  sit æqualis duabus virtutibus  $FB, GC$ , quod &c.

Si verò plures extiterint virtutes, quibus mobile libratum maneat, eodem modo ostendemus propositum.

## IDEM GEOMETRICE. PERICVLVM I.

**H**OC vt possumus geometricè ostendere, statuendum est si producat  $DA$ , fiatque  $AL$  æqualis  $AD$ ; lineam  $CB$ , & productam  $AL$  mutuò bifariam secari in  $H$ ; virtus enim  $AL$  fit ex duabus  $AC, AB$ . Agantur iam perpendiculares  $HMI, LK$ , &  $BMN$  parallela  $GF$ ; ostendendum est geometricè lineam  $ED$ ,

ED, hoc est LK esse æqualem duabus CG, BF; item AE, AF, seu AK, AF esse æquales simul ipsi AG. Est enim CB ad BH, ut NB ad MH; sed CB est dupla ipsius BH, ergo etiam NB dupla erit ipsius MH; quare BF superat eodem excessu HI, quo IH ipsam GC (nam æquales sunt tres GC, LM, FN inter se): cum igitur sint arithmetice proportionales prædictæ lineæ, erit dupla mediæ HI, hoc est LK, nempe ED æqualis duabus simul extremis CG, BF. Similiter, quia IG est æqualis IF, erit IA semidifferentia duarum AG, AF, quare KA dupla ipsius AI erit differentia duarum AG, AF, & propterea AF vnâ cum differentia KA, seu AE erit æqualis ipsi AG, quod &c.

## S C H O L I V M.

Vides quam bene respondeat mechanica hæc doctrina geometricis rationibus, cum ipsæ demonstrationes geometricæ accedant tanquam examina, ad id, quod mechanicè tradimus.

## PROP. VII. PROB. IV.

*Fig. 1. Tab. 2.* SIT mobile, aut graue A alligatum funiculis BA, DA, quorum beneficio pendeat ex libra recta BD, & ponamus EA esse directionem, seu perpendicularum eiusdem corporis A: quaeritur iam, quæ proportio sit virium dictorum funiculorum, librâ prius quiescente suspensa ex E (quiescet enim cum libra sic onusta BDA vicem gerat funependuli EA in perpendicularo constituti) Agantur à puncto E perpendiculares EF, EG in funiculos AD, AB, & imaginemur lineam GEF esse quandam inflexam libram, ex qua pendeat mobile in eodem, quo erat statu; certum est hanc quoque inflexam libram GEF suspensam ex E vnâ cum graui sic alligato fungi munere funependuli EA, ideoque suspensa omnia prorsus immota manere; ex quo sequitur id, quod inferius fiet notum, videlicet virtutem trahentem extremum F ad virtutem trahentem extremum G esse in eadem ratione, in qua reciprocè est radius EG ad radium EF; verum sublatâ librâ GEF, & substitutâ BED, virtus, quæ erat in F succedit in D; itemque illa, quæ in G transit in B (nam funiculi sunt iidem, eodemque modo sustinentes mobile A) ergo ut EG ad EF, ita virtus in D ad ipsam in B; hoc est, ita vis ad vim funiculorum.

LEM-

## L E M M A.

Quod verò assumpsimus, nimirum esse GE ad EF, ut vis in F ad vim in G hoc modo probatur.

Sit circa centrum E volubilis trochlea HG, cuius radius sit equalis EG, brachio videlicet libræ GEF, & ponamus ipsum brachium coherens eidem trochleæ, ita ut vnâ moueantur quoties fieri potest circa punctum E fixum. Protrahamus modò FE vsque ad circumferentiam trochleæ, ita ut FEH libram referat, & HI, GK funiculos, qui cum tangant circuli peripheriam, erunt perpendiculares ipsis HE, GE. Libra GEF supponitur in æquilibrio viribus existentibus perpendicularibus in F, & G; sed si eadem virtute, qua trahimus funiculum GK trahamus ipsum HI, non idcirco mouebitur punctum F (nam eadem vi resistimus potentia in F, siue atrahamus funiculum GK, siue ipsum HI) ergo cum eadem vi adhibita in H, quæ in G reddatur immobilis libram HEF circa centrum E, liquet esse HE ad EF, ut vis in F ad vim in H; est autem HE æqualis EG, & vis in H æqualis illi in G, nec non ambæ perpendiculares ad radios; ergo ut GE ad EF, ita vis in F ad vim in G, quod &c. *Fig. 2. Tab. 2.*

## S C H O L I V M.

Hinc liquet quo modo se habeat malleus extrahens clauos. Fit namque inflexa quædam libra, seu vectis, in quo resistentia clauis, & adhibita potentia in extremo manubrij sunt virtutes hinc inde in extremitatibus libræ, centrum verò, seu hypomoclion, ubi nititur malleus.

## GEOMETRICE PERICVLVM II.

Idem manentibus, quæ in fig. 1. Tab. 2., secetur vterius BD bifariam in L, & demittatur parallela ipsi EA occurrens BA in H, productâ si opus est. Dico BH ad DI esse ut EF ad EG; & insuper LI ad LH, ut BE ad ED. *Fig. 3. Tab. 2.*

Componitur EF ad EG ex rationibus EF ad EA, & EA ad EG; verum, ut EF ad EA, ita DN ad DI, & EA ad EG est ut BH ad BM, vel ad æqualem DN; ergo ex perturbata, erit ut EF ad EG, ita BH ad DI, quod erat primum.

Deinde BE ad ED fit ex rationibus BE ad EA ad ED; sed BE ad EA est ut BL ad LH; & EA ad ED, ut LI ad LD, seu ad æqualem BL; ergo rursus ex perturbata, erit BE ad ED ut IL ad LH, quod &c. PROP.

## PROP. VIII. THEOR. IV.

*Fig. 4. Tab. 2.* Idem manentibus ostendemus mechanicè secundam partem prædicti lemmatis, videlicet esse BE ad ED, vt reciprocè LI ad LH.

Intelligamus in E clauum circa quem conuertibilis sit libra BD; liquet ex sæpè dictis, hanc vnà cum graui A suspensio nullo modo moueri; nam omnia sic suspensa sunt loco penduli EA in perpendiculari quiescentis, quo posito, quia in prima parte præcedentis lemmatis demonstrauimus EF ad EG esse, vt BH ad DI, & in præcedenti septima propositione erat vis in B ad vim in D, vt EF ad EG, sequitur, vt vis in B ad vim in D sit vt BH ad DI; sunt autem BH, DI directiones virium funicularum, ergo ductis perpendicularibus IK, HM ad libram BD, sicut ex DI virtutes DK, DI, & ex BH duæ BM, MH; verùm perpendicularis vis KI est illa quæ operatur in D, & perpendicularis MH illa quæ agit in B; ergo, cum reliquæ duæ nitantur tantùm secundum longitudinem libræ, quibus resistit clauus in E, erit ob æquilibrium virtus KI ad virtutem MH, vt BE ad ED, quod &c.

## PROP. IX. THEOR. V.

*Fig. 4. 5. Tab. 2.* Idem positis fiat EO æqualis differentiæ duarum BM, KD (modo AE non sit perpendicularis ipsi BD; nam cum in illo casu nulla prorsus sit differentia, hæc propositio locum non haberet) dico lineam ON perpendicularem, videlicet inter O, & productam lineam AEN esse æqualem duabus simul perpendicularibus HM, IK.

Nam virtus, quæ in directione perpendiculari EA sistit libram sublato clauo ex E puncto debet producere talem horizontalem virtutem EO, vt vnà cum BM æquè pugnet cum contrapòsita DK, alioquin libra BD, quæ in æquilibrio supponitur, in alteram partem moueretur, quod est absurdum. Liquet ergo hanc horizontalem virtutem fore æqualem EO, & quia anguli NEO, NOE sunt simul minores duobus rectis (ponitur enim NED acutus) conuenient propterea duæ EN, ON: coeant in N. Quontiam igitur in directione AEN est virtus totalis, seu librans mobile A;

hæc

## Tractatus Geometricomechanicus. 9

hæc autem virtus, quæcunque sit, fit ex duabus, nempe ex data horizontali EO, & altera perpendiculari virtute erigenda ex O: operante tamen in E; tres autem hæc lineæ debent componere triangulum rectangulum, nempe ENO; idcirco virtus totalis librans erit EN, & virtus illa perpendicularis ON, quippe pugnans ex æquo cum duabus contrapòsitis virtutibus KI, MH, erit æqualis duabus KI, MH; hoc est linea ON æquabitur ipsis IK, MH, quod &c.

## GEOMETRICE PERICVLVM III.

Lebet modo eandem veritatem geometricè ostendere, videlicet ON esse æqualem duabus simul KI, MH.

Quoniam est analytico more  $HM + KI = ON$ ; erit etiam  $ML + KL = EO$ , & facta anthitesi cum  $+ BM$ ; erit  $BL + KL = EO + BM$ , sed ex constructione præcedentis est  $EO + BM = KD$ ; ergo  $BL + KL = KD$ , & rursus facta anthitesi cum  $- KL$ , relinquitur  $BL = LD$ .

Itaque componatur sic; quoniam BL est æqualis ipsi LD ex constructione, si additur communiter KL, erit BL plus KL æqualis KD; sed KD est æqualis duabus simul EO, MB; ergo BL cum K L erit æqualis ipsi EO cum BM, & dempta communi BM, erit ML cum KL æqualis EO; sed eadem est ratio duarum ML, KL simul ad EO (ob triangulorum similitudinem KIL, LMH, NEO) quæ duarum simul HM, KI ad ON, ergo sicuti prima, & secunda sunt inter se æquales, ita tertia, & quarta nempe HM cum KI æqualis erit ON, quod &c.

## COROLLARIVM I.

Hinc repertis duabus virtutibus BH, DI inuenitur totalis virtus, quæ librat mobile, ostendimus enim fuisse EN.

## COROLLARIVM II.

Similiter constat, quæ sint virtutes perpendiculares prementes in B, & D, fuerunt videlicet KI in D, & MH in B.

## COROLLARIVM III.

Item quæ virtutes transfuersales in iisdem punctis B, & D; namque in B fuit BM, in D verò DK.

## COROLLARIVM IV.

Cum verò puncta EL incidunt in idem punctum, constat, vt

B  
vi-



videre est in quinta figura, vires funicularum perpendiculares æquales esse.

## PROP. X. THEOR. VI.

*Fig. 6. Tab. 2.* **S**IT rursus mobile *A* pendens ex libra *DB* vi funicularum *DA*, *BA*; hæc libra si suspendatur ex *E* (quoniam *EA* perpendiculum ponitur) erit in æquilibrio. Producantur lineæ *DA*, *BA* ad partes *A*, fiatq; *AQ* æqualis virtuti *DI*, & *BH* virtus æqualis *AP*, iunctâ verò *QP*, producatu etiam *NEA*, vt occurrat iuncte *QP* in *R*. Ostendo iam totalem virtutem *EN* æqualem esse duplo virtutis *AR*; & præterea *QR* æqualem esse *RP*.

Quoniam mobile *A* habet in directione *DAQ* virtutem *DI*, seu *AQ*; simulque in directione *BAP* virtutem *BH*, seu *AP*, erit idem mobile affectum duabus virtutibus *AQ*, *AP*, est autem (vt ostendimus supra) *EN* virtus librans; ergo in ipsius directione *NEAR* erit virtus, quæ sit ex duabus *AQ*, *AP*; quæ cum bifariam debeat diuidere lineam *QP*, constat primum *QR* æqualem esse *RP*; deinde cum dupla *AR* sit virtus, quæ sit ex duabus *AQ*, *AP*; quæ verò sit ex his virtutibus, sit illa quæ producitur ex virtutibus *DI*, *BH*, quæ sunt æquales prioribus; erit ergo *EN* ex his proueniens dupla *AR*, quod &c.

## GEOMETRICE PERICVLVM IV.

*Fig. 6. Tab. 2.* **P**Rotabitur *ER*, & ex punctis *Q*, *P* agantur *PS*, *QT* parallele *BD*, secantes *ER* productam in *S*, *T*; inde analyticè; quoniam *QR* = *RP*; estq; *QR*:*RP* :: *QT*:*SP*, erit etiam *QT* = *SP*; verùm in triangulis similibus *BHL*, *PAS*, latus *PA* = *HB*; ergo erit *SP* = *BL*; item in duobus triangulis similibus *QAT*, *ILD* est *QA* = *ID*; ergo etiam *QT* = *LD*, quare *BL* = *LD*.

Iam sic componitur. Quoniam recta *BL* est æqualis ipsi *LD*; erit etiam *QT* æqualis *SP*; nam triangulum *APS* est æquale, & simile triangulo *BHL*; itemque *AQT* similiter æquale triangulo *LDI*, est autem vt *QT* ad *SP*, ita *QR* ad *RP* ob parallelas *QT*, *SP*; ergo *QR* est æqualis *RP*, quod &c.

Secundo. Cum triangulum *AQT* sit similiter æquale triangulo *LDI*; pariterque ipsum *A* *SP* ipsi *BHL*; erit *AT* = *LI*, &

*AS*

## Tractatus Geometricomechanicus. Pr

*AS* = *LH*, est autem & *RS* = *RT*; ergo sunt arithmeticè proportionales tres *AT*, *AR*, *AS*; & propterea dupla *AR*; hoc est ipsa *NE*, quæ est in quæstione erit æqualis duabus *AT*, *AS*, seu duabus *LI*, *LH*; sed *LI* + *LH*: *EN* :: *LK* + *LM*: *OE*; ergo vt *IL* + *LH* = *EN*, ita *LK* + *LM* = *OE*; id quod in periculo tertio ostendimus.

Compositio. Cum *LM* + *LK* sit æqualis ipsi *OE*; erit etiam *HL* + *IL* æqualis *EN*; sed ob similitudinem triangulorum, & æqualitatem, *LID*, *AQT*, *BHL*, *SAP*, est *LI* æqualis *AT*, & *AS* æqualis *LH*; ergo duæ simul *AT*, *AS* erunt æquales duabus simul *IL*, *LH*, hoc est ipsi *EN*, sunt autem *AT*, *AR*, *AS* arithmeticè proportionales, cum excessus *TR*, *RS* sint æquales; ergo dupla *AR* erit æqualis *AT*, *AS* simul, hoc est *EN*, quod &c.

## SCHOLIUM.

Ex ijs quæ hæctenus ostendimus agnoscere licet vitium communis stateræ; nam virtutes pendentium ponderum, quæ debent respondere ex aduerso longitudinibus stateræ, necesse est eidem stateræ insistant perpendiculariter; quod fieri non potest, cum tendant ad centrum Mundi.

## PROP. XI. PROB. V.

*Fig. 7. Tab. 2.* **P**endeat mobile *A* ex libra qualibet curua *BED* interpositis funiculis *BA*, *DA*; & *EA* sit directio virtutis librantis, hoc est sit perpendiculum; oportet iam inuenire funicularum vires, & deinde vim totalem librantem.

Ducatur *BD*, quam secemus bifariam in *G*, à quo puncto ducatur *GIK* æquidistans perpendiculo *EFA* secans funiculos in *I*, & *K*; dico virtutem funiculi *DA* esse *DK*, & illam funiculi *BA* esse *BI*; nam si putemus lineam *BD* esse quandam libram rectam suspensam ex *F*; in hoc statu quiescet, & erunt virtutes funicularum (ex prop. 7.) ipsæ *BI*, *DK*; ablata verò libra *BD*, & substituta curua *BED*, perseverant in funiculis eadem vires; ergo primum constat vires funicularum *DA*, *AB* esse *DK*, *BI*; Deinde si concipiamus mobile *A* affectum virtutibus *DK*, *BI*, & ex his producatu vnica virtus *EL*, hæc erit virtus sustinens se solâ mobile *A*, quod &c.

B 2

PROP.

## PROP. XII. THEOR. VII.

*Fig. 1. Tab. 3.* **S**IT rursus mobile *A* pendens ex libra *BFD* suspensâ, ac librata ex *E*; virtutes funicularum sint *DK, BI*; & cum mobile sic affectum duabus virtutibus *DK, BI*, inueniamus *EM* virtutem librantem, quæ nempe cadet in perpendiculum *EA*; tum ductis perpendicularibus *KG* ipsi *ED*, & *IF* ipsi *BF*, liquet virtutes funicularum *DK, BI*, hoc est virtutem *FM* fieri ex quatuor virtutibus *GK, DG, BF, FI*; dico virtutem *GK* ad virtutem *FI* esse vt est *EB* recta linea ad rectam *ED*; hoc est mechanicè esse rectam *GK* ad *FI*, vt *BE* ad *ED*.

Librentur duæ virtutes *BF, DG* virtute *EN*, quod vt præstamus debemus intelligere in *E* affectionem duarum virtutum *DG, BE*, librentur subinde duæ virtutes *EN, FM* virtute *FL*; cum ergo tres virtutes *FL, EN, FM* libratae inter se sint, constat duas *EN, FL* æquè reniti ipsi *EM*, hoc est omnibus *GK, DG, BF, FI*; Virtus verò *EN* est illa, quæ librat virtutes *BF, DG*; ergo reliqua *FL* erit ea, quæ librat reliquas duas virtutes *GK, FI* perpendiculariter operantes in punctis *D, B*. Eritque sic libra *BED*, cum ipsis virtutibus *GK, FI*, librata virtute *FL*; itaque, vt euenit in ponderibus, erit *GK* ad *FI*, vt reciprocè *BE* ad *DE*, quod &c.

## IDEM GEOMETRICE PERIC. V.

*Fig. 2. Tab. 3.* **R**ursus analyticè  $HM:IK::BE:ED$ , ergo  $HM \times ED = IK \times BE$ ; & sumptis medietatibus, erit triangulum *BEI* æquale triangulo *EHD*; facta modo anthitesî cum + triangulo *HIA*, quod est æquale triangulo *EHI* (sunt enim intra eandem parallelas, ac in eadem basi constituta) erit triangulum *BEI* + *IAH* = quadrilatero *EIHD*, & rursus facta anthitesî cum - triangulo *IAH*, erit quadrilaterum *EIAD* = triangulo *BEI*. Nunc si auferamus triangulum *EIA* ex quadrilatero *EIAD*, substituaturque ipsum *ALE* = *EIA* (vt pote inter easdem parallelas, & in eadem basi constituta), erit triangulum *EDA* + *ELA* = *EBI* triangulo; Sunt autem prædicta triangula simul *EDA* + *ELA* ad *EBI* vt summa illorum altitudinum, ad altitudinem huius; in qua ratione est recta *DL* ad *LB*; ergo  $BL = LD$ , id quod nempe construximus.

Si

Si igitur fiat compositio patebit propositum, quod &amp;c.

## COROLLARIUM.

Constat artificium inueniendi virtutem librantem duas virtutes *GK, FI*, vidimus enim esse *EL*.

## PROP. XIII. THEOR. VIII.

*Fig. 3. Tab. 3.* **S**IT rursus inflexa libra *BED*, & à punctis *D, B* excitentur perpendicularares infra ipsam *BED*, quæ coeant in *N*; Secetur deinde *ON* æqualis *MH*, & *PN* ipsi *KI*; tum iunctâ *PO*, itemque *NE*, dico mechanicè hanc secare *PO* bifariam in *Q*.

Quoniam virtus librans virtutes *MH, KI*, transit per *E*, similiter quæ librat duas virtutes *ON, PN* prouenit ab *N*; virtutes verò *MH, KI* sunt censendæ perpendiculariter eductæ à punctis *D, B*, ex quibus veniunt ipsæ virtutes *ON, PN* æquales, & similiter directæ duabus prædictis *MH, KI*, erit virtus, quæ fit ex duabus *ON, PN*, eadem ac illa, quæ prouenit ex duabus *MH, KI*; itaque hæc transibit per *E*, & *N*, eritque in directione *EN*; sed virtus, quæ fit ex duabus *ON, PN* diuidit *PO* in partes æquales; ergo hoc idem præstabit linea ipsa *NE*, quod &c.

## GEOMETRICE PERIC. VI.

*Fig. 3. Tab. 3.* **M**Anente eadem figura, ducantur præterea ad eandem *EN* perpendicularares *OS, PR*.

Analyticè. Quoniam  $PQ = QO$ , erit quoque  $PR = OS$ ; verum *NO* ad *NP* componitur ex rationibus *NO* ad *OS*, & *RP*, seu *OS* ad *PN*; estque *NO* ad *OS*, vt *EN* ad *ED*, & vt *RP* ad *PN*, ita *BE* ad *EN*; ergo ex perturbata erit vt *NO* ad *PN*; hoc est vt *HM* ad *IK*, ita *EB* ad *ED*; quod quidem viroque genere, mechanicè, ac geometricè conclusimus.

Compositio. Quia ostendimus esse *BE* ad *ED*, vt *HM* ad *IK*, seu vt *NO* ad *NP*; & componitur *NO* ad *NP* ex tribus rationibus *NO* ad *OS* ad *RP* ad *PN*; ipsa verò *EB* ad *ED*, ex tribus *EB* ad *EN* ad *EN* ad *ED*; ablati hinc inde similibus rationibus, nempe *NO* ad *OS*, & *RP* ad *PN* ex proportione *NO* ad *PN*; atque ex altera proportione *EB* ad *ED* demptis *EB* ad *NE*, & *NE* ad *ED*; restat proportio *OS* ad *RP* similis proportioni *NE* ad *ED*.

14 *De Potentijs Obliquis*  
 ad NE; æqualitatis nempe, quare OS æqualis erit RP; & ob  
 æquidistantes OS, RP; OQ erit æqualis PQ, quod &c.

PROP. XIV. THEOR. IX.

*Fig. 4.*  
*Tab. 3.* **S**IT quadrilaterum **ACLF**, cuius diameter **AL** secetur bifa-  
 riam in **K**, tum iungatur **FK**, quæ producta occurrat lateri  
**AC** in **M**. Iam acceptâ **MG** duplâ ipsius **KF** demittatur perpendi-  
 cularis **GB** in **AC**, & **FI** in **AL**; Dico esse **GB** ad **FI**, vt reci-  
 proçè **AL** ad **AM**.

Concipiamus **AL** quandam rectam libram, ex qua pendeat  
 mobile **F** interpositis funiculis **AF**, **LF**; sitque **MKF** perpendi-  
 culum, ex quo sequitur ipsam libram suspensam ex **K**, quiescere  
 debere in eodem statu, & cum **AK** sit æqualis **KL**; constat  
 satis ex dictis virtutes funiculorum commensurari longitudinibus  
 ipsorum; hoc est virtutem funiculi **LF** esse rectam **LF**, & virtu-  
 tem alterius funiculi esse longitudinem **AF**; Mobile igitur **F**, est  
 affectum virtutibus **LF**, **AF**; & quia **GM** dupla est ipsius **FK** diui-  
 dentis bifariam rectam **AL**; erit eadem **GM** virtus librans mobile  
 secundum directionem, seu perpendiculum **MF**; itaque si intelli-  
 gamus **MA** libram quandam inflexam, & suspendamus illam ex  
**M** virtute **GM**; hæc sanè virtus sistet dictam libram (nam mobile  
 ita suspensum, vt sæpè diximus, perinde est, ac si foret pendulum  
**MF**) quare in dicta libra operantur tres virtutes, **GM** rapiens  
 sursum extremum **M** radij **MA**; **LF** trahens deorsum extremum **L**  
 alterius radij **AL**; & tandem **AF** sistens libram **MA** ex centro  
**A**. His positis virtus **LF** producit ex duabus virtutibus **LI**, **IF**;  
 & virtus **GM** fit ex duabus **BM**, **GB**; quare virtus **A** librat qua-  
 tuor virtutes **IF**, **GB**, **LI**, **BM**; Ex duabus **LI**, **BM**, quarum affec-  
 tio est in **A**, fiat virtus easdem librans **AD**; & conceptâ in **E** affec-  
 tione duarum virtutum **AD**, **FA**; has item libremus, virtute  
 nempe **AE**; cum ergo tres virtutes **AD**, **AE**, **FA** in æquilibrio  
 ponantur; patet duas quaslibet virtutes **AD**, **AE** æquè pugnare  
 cum reliqua **FA**; & ideo **AD**, **AE** neglectis alijs, vicem gerere  
 ipsius **AF**; Hinc fit vt duæ virtutes **AD**, **AE** sistant libram inflexam  
 operantibus etiam virtutibus **IF**; **LI** in **L**, & **BM**, **GB** in **M**;  
 sed ex his quatuor, duæ **LI**, **BM**, librantur virtute **AD**; ergo reli-  
 qua **AE**, æquè pugnet cum duabus perpendicularibus virtutibus  
**IF**,

*Tractatus Geometricomechanicus. 15*

**IF**, **GB**; quare, ponderum more, erit **AM** ad **AL**, vt reciproçè  
**IF** ad **GB**. **SCHOLIUM.**

Idem ostendemus existente ex altera parte libra inflexa **ALM**,  
 si primum iungamus **ML**; inde in hanc demittamus à puncto **G**  
 perpendicularem: ostendemus inquam perpendicularem hinc ad  
**FL**, esse vt **LA** ad **LM**.

GEOMETRICE PERIC. VII.

**Q**uoniam ponimus **AM** : **AL** : : **IF** : **GB**; erit **AMXGB** ;  
**ALXIF**; & ipsorum dimidia, nempe triangulum **GAM**  
 = **ALF** triangulo, & facta anthitesi cum **AKF** triangu-  
 lo, erit triangulum **LKF** = **MAK** + **AFG** triangulis; hoc est  
 triangulum **LKF** = **AKF** triangulo; (nam **KM** + **GF** = **KF**)  
 ergo est **AK** = **KL**.

Compositio, satis patet cōuertendo id quod analyticè diximus.

PROP. XV. PROB. VI.

**P**endeat mobile **L** ex libra recta **AB** suspensum tribus funiculis *Fig. 5.*  
**BL**, **DL**, **AL**; & datis quibuscunque virtutibus, putâ com- *Tab. 3.*  
 mensuratis ab ipsius funiculorum longitudinibus oporteat inuenire  
 ex quo puncto, qua virtute, & qua directione debeat suspendi  
 prorsus immotum; ita vt datæ virtutes sint illæ funiculorum.

Quoniam mobile **L** ponitur esse affectum virtutibus **BL**, **DL**,  
**AL**; ex duabus **AL**, **DL** fiat **GL** (nempe diuisâ bifariam **AD** in  
**F**, & assumptâ **GL** duplâ ipsius **FL**) iungatur inde **GB**, eaq; bifa-  
 riam sectâ in **H**, sumatur **CI** dupla **HL**; His positis virtus **CI**  
 librabit duas virtutes **BL**, **GL**; idest tres virtutes **BL**, **DL**, **AL**;  
 idest mobile hisce virtutibus affectum; ex quo sequitur **CI** esse  
 mensuram, & directionem virtutis mobile librantis; Si igitur ex  
**C** suspendatur libra recta **AB** ipsa virtute sic directâ **CI**, eu-  
 manebit immota; & præterea, id quod proposuimus facere, vir-  
 tutes funiculorum erunt ipsæ longitudines.

COROLLARIUM I.

Sequitur. Si mobile **L** ponatur quoddam graue habere nos  
 artificium incundum, quo velligamus inclinationem prædictæ  
 libræ, quâ posita in æquilibrio, exerceant funiculi **BL**, **DL**, **AL**  
 qual-

quaslibet datas virtutes, nam datæ illæ virtutes funicularum libratae fuerunt virtute CI, cuius directio ICL si aptetur in perpendicularum Mundi, manebit quidem libra immota eo inclinationis angulo ICK, quem quærimus, cum perpendicularo ACL.

## COROLLARIUM II.

Et si plures extiterint funiculi, quam tres, non ab simili modo præstabimus intentum.

## PROP. XVI. THEOR. X.

**I**isdem manentibus cadant in eandem libram perpendiculares LE, IK; Dico vt BC ad CF, ita esse reciprocè duplam ipsius LE ad rectam LE; & CK cum AE æqualem esse duabus CF, BE simul.

Quoniam CI fit ex duabus virtutibus CK, KI; & AL ex duabus AE, EL; deinde DL ex duabus DE, EL, demum BL ex duabus BE, EL; Virtus verò CI ex æquo resistebat virtutibus BL, DL, AL; sequitur, vt virtutes KI, CK sistant eandem libram contrarijs virtutibus BE, DE, AF vnà cum triplici EL; cumq; ex istis omnibus, virtutes CK, AE, BE, DE nitantur secundum rectam AB, vt nec hinc, nec inde moueatur libra; sequitur, vt quæ restant virtutes inter se pugnent ex æquo, alioquin libra non quiesceret, quod est contra suppositum; cum igitur hoc ita sit, liquet primò virtutes simul CK, AE æquales esse duabus simul BE, DE; & deinde KI esse æqualem triplici EL. Præterea cum per F transeat directio duarum virtutum AL, DL; sequitur, vt F sit centrum virtutum censendarum in D, A perpendiculararium, nempe EL in D, & eiusdem EL in A; quare ponderum more, erit BC ad CF, vt duæ EL ad vnicam EL, hoc est vt 2 ad 1.

## GEOMETRICE PERIC. VIII.

**R**ursus dico, esse etiam geometricè BC duplam CF, & KI triplam LE; tandem duas CK, AE, simul fore æquales duabus simul DE, BE.

Primò quia ex statica nostra constructione, quam edidimus, est LGBC elementum primum, cuius centrum C; pondera verò B, G, L; erit ratio rectæ BC ad CF, hoc est ponderis F ad B compo-

sita

sita ex rationibus ponderum F ad G ad B, rectarum vi delictet GL ad LF, & BH ad HG; estque BH æqualis HG; ergo vt BC ad CF, ita LG ad LF, nempe vt 2 ad 1.

Secundò LF est æqualis FG; item BH ipsi HG; ergo linea FH quæ iungeretur esset parallela LB; quare vt BC ad CF, ita LC ad CH; fuit verò BC dupla ipsius CF; ergo & LC ipsius CH; & quia LC ad CI componitur ex rationibus rectarum CL ad LH ad CI; estque CL ad LH, vt 2 ad 3; & LH ad CI, vt 1 ad 2, siue 3 ad 6; ergo ex æquali vt 2 ad 6, siue vt 1 ad 3, ita LC ad CI; hoc est ita LE ad KI.

Tertiò analyticè, quia  $KC + AE$ , idest  $3 EC + AE$ , idest  $AC + 2 EC = BE + DE$ ; hoc est ipsi  $BC + 2 CE + DC$ ; videlicet  $2 CF + 2 CE + DC$ ; erit facta antithesi cum  $- 2 CE$ ,  $AC = 2 CF + CD$ , & rursus facta anthitesi cum  $- FC$ , erit  $AF = CF + CD$ , idest  $FD$ .

Cumque compositio satis cuique pateat; erit geometricè KC cum AE æqualis BE vnà cum DE, quoderat &c.

## PROP. XVII. PROB. VII.

**S**IT inflexa libra BDE, & ex ea pendeat mobile suspensum, funiculis BA, CA, EA; quærimus eam libræ positionem, in qua librata, vires EA, CA, BA funicularum sint datæ. Fig. 1.  
Tab. 4.

Ex virtutibus BA, CA, EA, fiat vnica AFG; iam constat GFA esse virtutem, ac directionem mobile librantem; & propterea suspensa libra ex C quiescet in eodem statu librata.

## COROLLARIUM.

Hinc manifestum est, si mobile A fuerit graue aliquod, libram verò eò vsquè vertamus quoad linea GA incidat in perpendicularum vniuersi, habere nos artificium libranti eo pacto graue, vt funiculi, quibus suspenditur, patiantur datas vires.

## PROP. XVIII. THEOR. XI.

**I**isdem positis iungatur FE, & agantur perpendiculares AK ad BF, & AI in FE. Dico vt duas simul AK ad vnicam AI, ita esse EF ad FL. Fig. 1.  
Tab. 4.

Libremus virtutes EI, BK, CK virtute FM, & perinde ac si esset  
C in

ip F affectio tantum virtutum FM, GA has item libremus virtute FN; cum igitur duæ virtutes DN, DM librent virtutem GA productam ex virtutibus EI, IA, CK, KA, BK, KA; duæ virtutes FM, DN sistent libram, operantibus ex aduerso virtutibus EI, IA, CK, KA, BK, KA; verum virtus FM librat tres virtutes EI, CK, BK: Reliqua igitur DN pugnabit æquè cum reliquis perpendicularibus IA, KA, KA, operantibus deinceps in punctis E, C, B; ac centrum duarum virtutum KA est in L (nam directio virtutis AH est perpendiculum ipsarum virtutum, & ideo L est centrum libræ BC (scorsim conceptæ) ergo vt FL ad FE, ita IA ad duplicem KA.

## GEOMETRICE PERICVLVM IX.

Quoniam analyticè FL: FE:: AI: 2 AK; erit FL  $\times$  2 AK = FE  $\times$  AI, & eorum dimidia videlicet triangulum AFH = AFE triangulo; est autem triangulum AHF ad ipsum AFE, vt eorum altitudines assumptæ AF vt basi communi; & vt istæ altitudines inter se, ita triangulum AHG ad triangulum GEA; ergo triangulum AHG = EGA triangulo, id quod manifestum est, etenim AHGE est parallelogrammum ex constructione. Compositio vnicuique; liquet; ergo est FL ad FE vt AI ad 2 AK.

## PROP. XIX. THEOR. XII.

*Fig. 6. Tab. 3.* SIT triangulum GEC, cuius centrum grauitatis A; ducanturque ab A ad angulos lineæ AE, AC, AG; dico, si in A statuatur mobile affectum virtutibus AE, AC, AG, earundem vi librari.

Producantur lineæ iunctæ, vt occurrant oppositis lateribus in punctis D, B, F; patet, ob centrum grauitatis, esse GA duplam ipsius AD, & ED æqualem ipsi DC; quare virtus AG librabit duas virtutes AE, AC; hoc est sistet ipsum mobile.

## COROLLARIVM.

Illud quoque deducitur esse GB æqualem BC; & EA duplam AB; nam AE librat duas virtutes AG, AC, & propterea sequitur, vt GB sit æqualis EC, & EA duplam ipsius AB; item GE sit æqualis FE, & CA dupla AF, quod &c.

Idem geometricè facillè demonstrabis.

PROP.

## PROP. XX. PROB. VIII.

*Fig. 2. Tab. 4.* Sint tres pali vicissim cohærentes in B, vt punctum B emineat supra solum, in quo puncta A, D, C: pendeat verò à vertice B graue alligatum funiculo BE, & pondus ipsius intelligatur recta BI; insuper vis resistentiæ pali BC, dum premitur à graui IE vnà cum alijs palis in concursu B, sit recta CB.

His datis volumus vestigare similes reliquorum palorum resistentias. Iam liquet virtutes resistentiarum palorum CB, DB, AB aduersus graue E, æquilibrari vnice virtuti BI; (nam omnia seruantur prorsus immota) ideoque duæ quæque CB, BI æquè pugnabunt cum reliquis virtutibus palorum AB, DB. Si igitur ex duabus CB, seu æquali BL, & BI fiat vnica BF; hæc opponetur ex æquo duabus palorum AB, DB resistentijs. Itaque cum datum sit punctum F; itemque positiones duarum virtutum palorum AB, DB; compleri poterit parallelogrammum BGFH; & consequenter BH erit virtus resistentiæ pali DB; & GB illa reliqui pali aduersus graue, quod &c.

## SCHOLIVM.

Cum dixi resistentias palorum, intellexi tantum illas virtutes, quibus ipsi pali verè vtuntur aduersus graue; quamquam nouerim, si consideretur etiam soli firmitas, à duabus tunc virtutibus agi, nempe à pondere premente, & solo resistente.

## PROP. XXI. THEOR. XIII.

*Fig. 4. Tab. 5.* Coeant simul in B duæ lineæ AB, DB; & DF perpendicularis sit ipsi AB; item AC ipsi BD: dico esse mechanicè AB ad BD, vt AC ad FD.

Concipiamus ABD libram inflexam, quam secundum directionem AD immotam duabus oppositis potentijs reddamus; iam liquet duas illas potentias inter se fore æquales, quia perinde est, ac si illa libram rectam DA impellerent secundum eius longitudinem; quapropter positæ virtute in D ipsa DA, erit virtus in A ipsa AD; cumque ex virtute DA resultent idem acilla operantes virtutes DC, CA; & ex virtute AD, virtutes idem ac illa præstantes FD, AF; nihilominus inflexa libra operantibus hisce quatuor virtutibus

C 2

bus

bus librata sistetur; quare si ex duabus virtutibus  $AF, DC$  vnica gignatur  $BE$ ; rursus inflexa libra erit immota operantibus virtutibus  $FD, CA, BE$ ; itaque erit vt virtus  $FD$  ad ipsam  $CA$ , ita reciprocè longitudo  $BD$  ad longitudinem  $BA$ , quod ostendisse oportuerat.

## GEOMETRICE PERICVLVM X.

**Q**uoniam ad  $F, C$  sunt anguli recti transibit circuli circumferentia per puncta  $A, F, C, D$ ; & idcirco angulus  $FDC$  æqualis erit angulo  $BAC$ ; cumque in duobus triangulis  $ABC, FBC$  angulus ad  $B$  communis sit; erunt duo triangula  $ABC, FBD$  similia, quare vt est  $BD$  ad  $AB$ , ita  $FD$  ad  $AC$ , quod &c.

## PROP. XXII. PROB. IX.

*Fig. 2. Tab. 3.* **S**IT grane  $C$  pendens ex  $H$ , quod fulciatur ab inclinato palo  $FA$  in parietem  $BA$  solo  $BF$  perpendiculararem. Quærimus virtutes, earumque directiones, quibus extremitates  $A, & F$  nituntur aduersus parietem, & contra solum.

Ponamus virtutem totalem grauis  $C$  prementis, esse rectam  $CH$ , quæ quidem in perpendiculari sit; & à puncto  $C$  ducatur perpendicularis  $CE$  ad longitudinem pali  $AEF$ . Liqueat primò virtutem  $HC$  fieri ex duabus virtutibus  $HE, EC$ ; itaque mobile librabitur virtutibus  $HC, CE, EH$ , tanquam in  $H$  esset affectu prædictis virtutibus. Fiat modo, vt  $FA$  ad  $AH$ , ita  $CE$  ad  $ED$ ; eritque diuidendo, vt  $FH$  ad  $HA$ , ita  $CD$  ad  $DE$ ; positisque  $CD$  in  $A$ , &  $DE$  in  $F$  perpendiculariter in longitudine pali operantibus; Rursus virtus  $CH$  librabitur ab oppositis virtutibus ex  $A, & F$  perpendiculariter vnà cum  $EH$ . Iam si ex virtutibus  $EH, DE$ , quibus affectio est in  $F$  producatur virtus  $GF$ ; erit hæc virtus sic directæ ea qua palus sustentatur à solo in  $F$ , &  $CD$  virtus ita directæ, qua palus à pariete in  $A$  libratur.

## PROP. XXIII. PROB. X.

*Fig. 3. Tab. 3.* **S**IT supra horizontem pyramis inuersa  $BHGF$ , cuius centrum grauitatis  $A$ , & cum ponatur inclinata ad eundem horizontem:

tem: oporteat secundum datam directionem  $DF$  inuenire potentiam in illo statu pyramidem sistentem, & simul vim operantem in  $B$  aduersus eandem pyramidem, positâ virtute  $CA$  totali, ac perpendiculari virtutum: necesse tamen est lineam directionis  $DF$  vnâ cum duabus  $AB, AC$  in eodem reperiri plano.

A puncto  $B$  agatur perpendicularis rectæ  $AB$ , quæ conueniat cum  $AC$ , putâ in  $C$ , & vt  $FB$  ad  $BA$ , ita fiat  $BC$  ad  $FE$  perpendiculararem ipsi  $FB$ ; tum à puncto  $E$  deducatur perpendicularis eidem  $FE$  occurrens directionis lineæ datæ in  $D$ ; protractâ demum  $FB$ , & assumptâ  $BK$  æquali  $DE$ , fiat modo (perinde ac si esset in  $B$  affectio duarum virtutum  $BA, BK$ ), vnica ex illis  $BI$ : Dico  $DF$  virtutem applicatam in  $F$  secundum directionem  $DF$ , &  $BI$  virtutem oppositam in  $B$ , esse quæsitâs potentias.

Quoniam  $AC$  ponitur virtus totalis pyramidis; sitque hæc ex duabus virtutibus  $AB, BC$ , librabitur  $AC$  duabus virtutibus contrariè nitentibus  $BA, CB$ , positâ videlicet affectione in puncto  $A$ . Itemque idem grane librabitur iisdem virtutibus, quamquam  $BA$  operetur in  $B$ , seruata tamen eadem directione. Est verò  $CB$  ad  $EF$ , vt  $BF$  ad  $BA$ ; si ergo loco virtutis  $CB$  operantis perpendiculariter in  $A$ , substituatur virtus  $EF$  nitens perpendiculariter in  $F$ ; nihilominus grane sistetur virtutibus  $BA, EF$ ; sed virtus  $DF$  producit duas virtutes  $EF, DE$ ; quarum  $DE$  renititur ex æquo virtuti  $BK$ ; cum æquales illæ sint inter se, & in eadem recta linea operantes; igitur pyramis sistetur virtutibus  $EF, DE$  affectione in  $F$ , vnâ cum virtutibus  $BK, BA$  affectione in  $B$ ; hoc est pyramis  $BHGF$  librabitur duabus virtutibus  $DF, BI$ , quod &c.


## PROP. XXIV. PROB. XI.

*Fig. 6. Tab. 3.* **G**raue  $ABD$  pendeat immotum ex duobus funiculis, nempè  $G$  ex  $GX$ , cui alligata est trochlea  $XH$  conuertibilis circa centrum suum  $X$ , & ex funiculo  $EQTSIHKL$  inflexo primum circa trochleam  $ZT$  parieti affixam, vel suspensam ex  $R$  conuertibiliter circa centrum  $Z$ ; inde circa alteram trochleam  $AX$  continuato, & firmato sursum in  $L$ . Data verò  $MV$  grauitate totali corporis suspensî, &  $MC$  perpendiculari per centrum grauitatis  $C$  transeunte, volumus inuestigare virtutem in  $E$  trahentis funiculi  $EQ$ , similiterque funiculi  $GX$ . Intelligentur producti funiculi  $LK$ ,

LK, EQ, IS, ita vt sibi mutuò occurrant in punctis F, R. Cader punctum F in funiculum XH productum, nam cum directiones virium funicularum KL, IS sint LKF, SIF concurrentes in F, necesse est vt per eundem concursum F, transeat directio XG virtutis librantis illas vires; idem dic de tribus lineis ISR, EQ, ZTR; nempe R fore illarum communem concursum. Nunc quia virtutes funicularum EQ, IS, KL librant virtutem MV totalem corporis; virtus quæ fit ex duabus funicularum KL, IS, vnà cum virtute funiculi EQ sistent idem graue ABD, hoc est librabunt virtutem MV; quare tres directiones GFX, CVM, EQ si producantur coibunt in eodem puncto, puta M; deinde si à puncto V ducatur VR parallela GM, & VO parallela EM; erunt virtutes OM, FM, MV inter se libratae (nam virtus MV fit ex duabus MO, MF) cumque virtus FM illa sit, quam exercet funiculus EQ in E, & OM illa, quam exercet funiculus GX in G, constat, quod facere proposuimus.

## SCHOLIUM.

Plurima huiusmodi Theoremata adijci possent, sed omittimus, ne prolixitate eiusdem materiae tedium afferamus. Verum ex dictis hactenus puto peritis mechanicorum facilem futuram cuiuscumque ferè problematis mechanici solutionem.



DE

## DE PENDVLIS

## TRACTATVS SECVNDVS.

## DEFINITIO.



LLA vis, quam habet pendulum extra perpendicularum positum, vt inde instituat vibrationem suam liberum ab omni obijce, dicatur naturalis penduli virtus in eo statu manentis.

## AXIOMA.

Si pendulum extra perpendicularum ponatur; ibique detineatur ab aliqua potentia perpendiculariter applicata longitudini eiusdem penduli, quæ centrum grauitatis suspensi corporis spectet: Huiusmodi potentia sic librans pendulum æquatur virtuti naturali eiusdem penduli.

Sit ex. gr. pendulum AC extra perpendicularum AB, potentia verò CD perpendicularis longitudini AC ducta ex centro corporis C libret idem pendulum AC; accipimus tanquã per se notum, esse CD mensuram virtutis naturalis, quam supra definiuimus. Fig. 7.  
Tab. 4.

## PROP. I. THEOR. I.

SIT pendulum CD efficiens cum perpendicularo CE quocumlibet acutum angulum DCE, ductã horizontali DE: dico vim funiculi CD in illo statu ad virtutem totalem grauis D; qua nempe liberum ab omni vinculo descenderet, esse vt perpendicularum CE ad longitudinem fili CD; vim verò naturalem penduli CD ad totalem dictam virtutem fore, vt est horizontalis linea ED ad prædictam longitudinem penduli. Fig. 3.  
Tab. 4.

Ducatur CB perpendicularis rectæ DC, occurrens DB parallelæ ipsi CE in B, & compleatur rectangulum BADC; iam si iungatur DB, hæc erit virtus librans mobile D affectum duabus virtutibus CD, DA; quare positã DB, vt virtute totali grauis D, constat esse CD virtutem naturalem penduli CD in illo statu, & DA virtutem quæ librat potentiam naturalem penduli CD, ex quibus, & ob similitudinem triangulorum BCD, CED manifestum.

rum est virtutem funiculi CD ad virtutem totalem grauis D, nempe CD ad DB esse vt CE ad CD; pariterque virtutem naturalem penduli CD ad virtutem totalem grauis, hoc est vt AD, siue BC ad DB, ita esse BE ad DC, quod &c.

## SCHOLIUM.

Manifestum est posse considerari longitudines pendulorum etiam inflexibiles, nec propterea deficiens erit allata demonstratio.

## DEFINITIO II.

Pendulum, cuius longitudo inflexibilis sit, si ita concipiatur, vt punctum circa quod conuertitur sit in aliquo subiecto plano, corpore in sublimi manente, inuersum dicitur.

## AXIOMA II.

Itaque si fuerit pendulum inuersum, ac inclinatum ad horizontem, ibidemque à potentia perpendiculari, vt diximus, libretur; hæc potentia erit mensura virtutis naturalis eiusdem penduli sic inclinati.

## PROP. II. THEOR. II.

*Fig. 4. Tab. 4.* SIT pendulum inuersum, & inclinatum, cuius longitudo sit DE, & pondus, pyramis ABCD habens centrum grauitatis in E, verticem verò nitentem supra horizontem FD in D, & ducatur perpendicularum EF: dico, vt in prioribus pendulis, virtutem quâ nititur longitudo ED in solum, ad virtutem totalem pyramidis, esse, vt perpendicularum EF ad longitudinem ED; & virtutem naturalem eiusdem inuersi penduli esse ad virtutem totalem, hoc est ad grauitatem pyramidis, vt est horizontalis FD ad prædictam penduli longitudinem.

Demonstratio similis est illi, quam in pendulis primi generis attulimus.

## COROLLARIUM.

Hinc deducitur qua arte possimus vestigare virtutem, qua corpus quodlibet super planum ad horizontem inclinatum rotationem suam institueret; item quâ virtute premeret idem planum. Nam possumus corpus illud imaginari pendulum quoddam, cuius longitudo sit linea cadens à centro grauitatis perpendiculariter super axem rotationis.

Verum quia sunt nonnulla corpora, quæ dum super plana inclinata descendunt, non rotantur, sed labuntur, videndum est, quare hoc, & quando accidat.

Prop-

Propterea sit planum AB inclinatum ad horizontem B, & super ipsum planum corpus oblongum, ac iacens DEC; quod contin- *Fig. 5. Tab. 6.* gat planum secundum superficiem DC. Centrum grauitatis eiusdem corporis sit E, & ab eo ducatur perpendicularum EG, quæ linea ponatur metiri virtutem totalem eiusdem corporis; descripto itaque super eandem EG semicirculo GFE, ducatur GF parallela longitudini plani AB, & iungatur FE, quæ cum sit perpendicularis ipsi GF, erit quoque perpendicularis ad planum inclinatum AB. His positis, virtus GE fit ex duabus GF, FE; quarum GF impellit mobile secundum directionem parallelam AB; & FE agit mobile perpendiculariter in planum AB. Itaque si superficies sese contingentes leuissimæ supponantur, puto nullo pacto virtutem FE, quamuis maximam, prohibeturam, quin omnimodâ virtute GF graue labatur; at contra si ipsæ superficies asperæ sint, poterit graue retineri, licet virtus GF maxima sit, etenim operante virtute FE, adeo insinuantur inuicem inæqualitates illæ, vt nisi abradantur à vehementi nisu virtutis GF mobile nullo modo descendere possit.

Sed redeamus ad institutum. Galilæi assumptum est, quod tempora vibrationum pendulorum, quorum sunt longitudines inæquales, sint in subduplicatâ ratione longitudinum. Nititur autem experimento, quod ipsemet edidit, nempe vibrationes eiusdem penduli, licet inæquales sint, eodem tempore absolui. At ego assertionem illam falsam demonstro; ex quo sequitur experimentum quoque, cui nititur, esse fallax. Fateor tamen me non sine quadam animi displicentia, viri clarissimi auctoritati, & communiter receptæ opinioni, quo ad hoc, aduersari. Quamobrem gratias habeo si quis fallaciam aperuerit, cum nihil mihi, & studioso cuiuslibet gratius esse debeat veritate. Ostendam igitur tempora vibrationum similibus duorum pendulorum esse inter se vt eorum longitudines; minimè verò in subduplicata ratione illarum.

## PETITIO II.

Posse nos assignare corpus quoddam, cuius grauitas specifica ad illam alterius corporis se habeat, vt aliqua quantitas ad aliam.

## SVP. II.

Ponimus vnumquodque mobile semel motum seruare semper eundem velocitatis gradum, nullo adueniente impedimento;

D

Quod



Quod si rursus alio ad eandem partem impulsu pellatur affici, priori vigente, nouo velocitatis gradu; atque adeo duobus simul iam gradibus moueri; & quanquam ab aeris medio eneruetur, ac tandem extinguatur vis illa mobili impressa, tamen in hac re libet abstrahere ab hoc impedimento, quippe ad modicum temporis ita parum obest, vt perinde sit ac si in vacuo operaremur.

Hoc posito non fuit difficile nonnullis authoribus ostendere, cur graue in præceptis demissum ad Mundi centrum properet, ita nec nobis arduum erit demonstrare, angulum incidentiæ æquari angulo reflexionis.

*Fig. 6. Tab. 4.* Sit ex. gr. Pila A iacens in quodam plano horizontali, quæ incidens in punctum C parietis BE, directione AC, reflectatur per CD; dico angulum DCE æqualem esse angulo ACB. Non consideramus grauitatem corporis A (est enim iacens in plano horizontali) feretur igitur pila æquabili motu per lineam AC, & posita AC mensurâ virtutis, quâ iacitur pila; producet hæc ex duabus virtutibus, perpendiculari nempe AB, & horizontali BC; verum quia pila eodem perpendiculari impetu AB, quo petit parietem in C eodem reuertitur (etenim alterum saltem corpus percussiens, vel percussum non supponitur omnino durum, sed aliquantisper cedens, & in eundem se statum restituens post percussionem) & similiter horizontalis virtus BC eadem viget etiam in reflexione; hinc fit vt eodem tempore, iisdemq; virtutibus, ac directionibus affecta, licet in contrariam partem feratur, describat ipsa pila lineam reflexionis æqualem lineæ incidentiæ, ac æquè inclinatam ad parietem, vt est illa incidentiæ.

Vides ergo hinc demonstratum, quod plures nequidquam hæc sensus tentauerunt, sed accedamus ad assumptum.

#### LEMMA I.

*Fig. 8. Tab. 4.* Sit pendulum AG, cui sit appensum pondus G: dico eodem tempore eandem vibrationem peragi, ac si loco corporis G alligatum fuisset pondus B, minus quidem mole, sed specie priori æquale.

Si fieri potest maiori, vel minori tempore conficiatur vibratio penduli AG, quam ipsius AB; & primam minus exigat tempus, hoc est velocius feratur pendulum AG ob maiorem grauitatem ponderis G; si ergo ex velociore pendulo AG, & pendulo AB tardiori vnicum concipiatur AGB, hoc pendulum sic compositum seigniori cursu vibrabitur, quam antea simplex, propter adnexam

inoram

inoram penduli tardioris, ergo accessione grauitatis, & ponderis fiet tardius, quod est contra hypothesim. Itaque admittatur alia positio; sitque ratione maioris ponderis seignior vibratio penduli AG, quam sit illa penduli AB; ergo pendulum ex duobus ponderibus G, B compositum velocius feretur propter adnexum stimulum ponderis B velocioris; & ita accessione ponderis fiet velocius. Quod similiter est contra hypothesim: pari igitur velocitate feruntur, quod &c.

#### LEMMA II.

Sint duo pendula BA, DC æquiangula cum perpendicularibus BF, DE; & corpus A ad corpus C sit specie, vt longitudo BA ad longitudinem DC: dico eodem tempore vtranque semiuibrationem absolui.

Secetur BD æqualis DC. Quia velocitas in A ad velocitatem in D, dum nempe pendulum incipit moueri, est vt AB ad BD; virtus etiam naturalis penduli in A ad virtutem naturalem in D (concipitur enim BD pendulum quoddam) erit vt AB ad BD, seu ad DC; est autem vt AB ad DC, ita grauitas specifica corporis A ad grauitatem specificam corporis C, hoc est, cum pendula sint æquiangula, vt virtus naturalis penduli BA ad virtutem naturalem penduli DC; ergo vt virtus naturalis penduli BA ad virtutem naturalem in D, ita virtus naturalis eiusdem penduli BA ad virtutem naturalem penduli DC, propterea virtutes naturales in D, & penduli DC erunt æquales, suntque anguli CDE, DBG, item longitudines DC, BD inter se æquales; ergo eodem tempore vibrabitur punctum C per arcum DG, ac pendulum DC per arcum æqualem CE, (nam sic pendula DC, BD patiuntur iisdem instantibus temporis similia decrementa, vel incrementa virtutum) at absoluitur semiuibratio AF eodem tempore, ac semiuibratio DG; ergo etiam eodem tempore pendulum BA vibrabitur per arcum AH, ac pendulum DC per arcum CE, quod &c.

#### LEMMA III.

Mobile I percurrat spatium IO virtute V tempore AB, inde transeat ab O in P virtute X, tempore BC, & à Pin Q feratur virtute Z, tempore CD: pariterque mobile K percurrat spatium KL virtute R, tempore EF; deinde feratur per spatium LM virtute S, tempore FG, & demum ab M in N feratur virtute T, tempore GH; sintque præterea spatia IO, OP, PQ deinceps æqualia

D 2

spatijs

spatijs KL, LM, MN, & virtus V ad R sit vt X ad S, & Z ad T: dico tempus AD ad tempus EH esse reciproce vt est virtus R ad virtutem V.

Pr. 3.  
de motu  
æqu  
Gal.

Quia mobilia I, K percurrunt spatia æqualia IO, KL temporibus AB, EF, virtutibusque V, R; erit reciproce virtus V ad R, vt tempus EF ad tempus AB; similiter quia virtute X, tempore BC peragitur spatium OP æquale spatio KL, quod nempe curritur ab altero mobili virtute R, tempore EF; erit reciproce virtus X ad S, vt tempus FG ad BC; est autem X ad S, seu V ad R, vt tempus EF ad AB; ergo vt FG ad BC, ita EF ad AB, & componendo EG ad AC, vt EF ad AB. Tandem quia etiam virtus Z ad virtutem T, est reciproce vt tempus GH ad tempus CD; & est Z ad T vt V ad R, seu vt tempus EF ad tempus AB, videlicet vt EG ad AC; erit GH ad CD, vt EG ad AC; & componendo totum tempus EH ad totum tempus AD, erit vt tempus GH ad tempus CD; siue vt virtus Z ad T, hoc est vt V ad R, quod &c.

#### SCHOLIUM.

Hinc accipimus, si spatia KN, IQ inter se æqualia, concipiantur subdivisa in partes, singulas minores quilibet proposita magnitudine; ipsique partibus respondeant totidem virtutes, ac tempora, quibus peraguntur à mobilibus dicta spatia; accipimus inquam tempus EH ad AD esse reciproce, vt virtus V ad R.

#### LEMMA IV.

Fig. 3.  
Tab. 5.

Sint duo pendula GF, BE longitudine æqualia, & æquiangula cum perpendicularibus FH, ED; specie verò corpus G non sit æquè graue ac corpus B: dico semivibrationis tempus penduli GF ad tempus semivibrationis penduli EB esse reciproce, vt est grauitas specifica vnus corporis ad specificam alterius.

Secetur bifariam arcus GH in I; & rursus bifariam arcus IH in L; & sic deinceps, quoad LH minor sit proposita quacunque magnitudine Q, & notentur in arcu GOILH reliquæ partes singule æquales parti LH; eadem etiam partes notentur in alio æquali arcu BNKMD; itaq, erunt BN, NK, KM, MD, non solum inter se æquales; sed etiam deinceps ipsis GO, OI, IL, LH, eumque virtus in B ad virtutem in G, seu primus gradus velocitatis in B ad primum gradum velocitatis in G, se habeat vt gradus in N (quemque sit) ad gradum in O (nam cum arcus BN, GO sint æquales, erunt etiam in eadem inclinatione ipsa pendula perducta in N, & O);

O); verum vt virtus in B ad virtutem in G, ita grauitas specifica corporis B ad grauitatem specificam corporis G; ergo vt grauitas specifica corporis B ad grauitatem specificam corporis G, ita gradus velocitatis in N ad gradum velocitatis in O, seu virtus in N ad virtutem in O; simili ratione probaueris singulas virtutes in reliquis punctis K, M, D, &c. ad singulas virtutes in correspondentibus punctis L, H &c. esse, vt est eadem grauitas specifica corporis B ad grauitatem specificam corporis G; proptereaque esse inter se proportionales; suntque ita spatia, quæ percurruntur ipsis virtutibus, arcus nempe BN, NK, KM, MD &c. æquales arcibus, siue spatijs GO, OI, IL, IH &c. ergo tempus semivibrationis BD, erit vt grauitas specifica corporis B ad grauitatem specificam corporis G, quod &c.

LEM. 3.  
en 110  
Schoo.

#### PROP. III. THEOR. III.

SI fuerint duo pendula æquè inclinata, & eorum corpora suspensa æquè graui specie; tempora vibrationum erunt homologè, vt pendulorum longitudines. Fig. 4.  
Tab. 5.

Sint duo pendula AI maius, & BE minus; anguli verò CIA, DEB cum perpendicularibus æquales: dico tempus vibrationis penduli IA ad tempus vibrationis penduli EB esse vt IA ad EB.


Intelligatur pendulum FG æquiangulum, & æquilongum, ac pendulum EB; præterea sit vt longitudo AI ad GF, ita grauitas specifica corporis A ad illam specificam corporis G.

Componitur tempus semivibrationis penduli AI ad semivibrationis tempus penduli BE, ex ratione temporis penduli IA, ad tempus penduli FG, & ex ratione temporis penduli FG ad rationem temporis penduli BE; est autem tempus penduli GF æquale tempori penduli AI; ergo tempus, quo absoluitur semivibratio AI ad tempus, quo perficitur semivibratio penduli BE est vt tempus GF ad tempus penduli BE; verum tempus penduli GF ad tempus penduli BE est reciproce vt grauitas specifica corporis B, hoc est corporis A ad specificam grauitatem corporis G, nempe vt linea AI ad GF, seu BE; ergo semivibrationes similes pendulorum IA, EB absoluntur temporibus homologè cum longitudinibus pendulorum proportionalibus; sed cum tempora reliquarum semivibrationum sint in eadem ratione cum temporibus

bas priorum semiuibrationum; patet & integras vibrationes esse in eadem ratione longitudinum pendulorum.

## SCHOLIUM.

Non erit iniucundum scire cur vibrationes eiusdem penduli in ascensu non nihil deficiant, eoque defectu in singulis vibrationibus repetito paulatim minores, & minores fiant, donec languescant, atque ultimo euanescant. Mobile in suo descensu acquirit successiue gradus velocitatis diuersos respondentes virtutibus naturalibus, qui tamen non in eodem vigore perseverant, sed vnusquisque decrescit singulis instantibus in eadem semper ratione defectuum. Ex quo fit vt pendulum minimè quiescat in suo perpendiculari, vrgentibus videlicet gradibus in descensu acquisitis, diminutis quidem, vt diximus, sed nondum consumptis. Hinc reliquam semiuibrationem conficit, sed minorem, quia in ascensu virtutes naturales contrariæ potentiores sunt gradibus illis in descensu acquisitis, quippe imminutis. Cæterum si integri perseverarent, pugnarent ex æquo singuli cum virtutibus naturalibus contrarijs respondentibus, essetque non minor ascensus, quam descensus.



DE

# DE AQUIS<sup>31</sup>

## ET PRIMVM DE VASIS.

## TRACTATUS TERTIVS.

## DEFINITIONES.



**R**ima. Solidum illud quod fit ex cadente aqua, dum adhuc est in aere Cadentem voco.

Secunda. Si ipsam cadentem imaginemur resectam plano horizonti parallelo, eam sectionem, cadentis sectionem appellabimus.

Tertia. Illa verò cadentis portio inter initium cadentis, eiusque aliam sectionem, cadentis truncus dicitur.

## PETITIONES.

Prima. Vt possimus in quolibet vase perforato seruare aquam in quacumque altitudine, beneficio canalis influentis.

Secunda. Vt possimus cuiuscumque cadentis propositæ, quemuis truncum determinare.

Tertia. Possit assignari vas, cuius cauitas sit cuilibet cadentis trunco similis; & hoc ipsum vas posse conseruari plenum aqua.

## SVPPPOSITIONES.

Prima. Amplitudo luminis, seu foraminis in base vasis, nolumus in præsens vt excedat magnitudinem cuiuscumque sectionis eiusdem vasis, eodem pacto ibi conceptæ ac in cadente.

Secunda. Duarum cadentium æquè ab earum initijs remotas sectiones, etiam æquè veloces supponimus.

Tertia. Velocitates duarum sectionum eiusdem cadentis sunt homologè in subduplicata ratione altitudinum à cadentis initio; sunt enim singulæ aquæ partes quemadmodum corpora liberè cadentia.

Quarta. Si in duobus vasis, aqua æqualem seruet altitudinem erunt velocitates ex luminibus æquales.

Quinta. Iuxta petitionem tertiam suppono aerem instar vasis conformari, & ambire aquam per ipsum descendentem.

LEM.

Si in vase perforato aqua, beneficio influentis canalís, in eadem altitudine perseveret, quantum aquæ ingeritur, tantundem eodem tempore effluet.

Nam si plus aquæ immittitur, quam quæ eodem tempore ex vase defluit, progressu temporis vas redundabit; Si verò minus, deficiet. Vtrunque est contra hypothésim, ergo &c.

## LEMMA II.

Est vas AB; cadentis truncus EF eiusdem altitudinis; aqua quæ ab hac cadente effunditur, sic impleat vas illud, ut nec redundet, nec deficiat: dico magnitudinem, seu sectionem luminis B, æqualem, & æquè velocem esse, ac est sectio Ftrunci FE.

Intelligatur vas CD, in quo aqua perseveret in eadem scilicet altitudine, ac vasis, & cadentis propositæ. Eius cavitatis sit prorsus similis, & æqualis trunco cadentis EF, eritq; sectio luminis D æqualis, & æquè velox sectioni F; quare eadem aquæ quantitas, quam egerit sectio D eodem tempore transmittetur à cadente EF. Quoniam verò cadens EF ipsa est, quæ suppeditat aquam vasi semper pleno AB; eadem propterea aquæ copia quæ eodem tem-

poris spatio emittitur à cadente EF, defluet quoque ex luminis sectione B; hæc itaque sectio tantundem aquæ exhauriet, quantum eodem tempore sectio D, & cum æquè altum sit vas CD ac truncus cadentis EF, videlicet quam AB vas, erit velocitas sectionis B æqualis velocitati sectionis D, & ideo sectio quoque luminis B æqualis erit sectioni luminis D; at ostensum est eandem sectionem D æqualem esse magnitudine, ac velocitate sectioni F; ergo sectio luminis B æquè distans ab A, quam ab E sectio F, erit huic æqualis, tum magnitudine, cum velocitate, quod &c.

## LEMMA III.

Sint duarum cadentium AC, ED sectiones C, D: dico velocitatem sectionis C ad illam sectionis D esse in subduplicata ratione altitudinis AC ad altitudinem ED.

Abscindatur ex cadente AC truncus AB, cuius altitudo BA æqualis sit altitudini ED. Velocitas in C ad illam in B, seu in D est in subduplicata ratione altitudinum AC ad AB, hoc est ad DE, quod &c.

PROP.

## PROP. I. THEOR. I.

SI fuerint duo vasa vnico lumine in basibus perforata, semperq; plena, erunt velocitates aquarum ex luminibus exeuntium in subduplicata ratione altitudinum vasorum.

Sint vasa AB, HI, quorum lumina B, I, cadens DE suppeditet aquam vasi AB, & cadens GF vasi HI, ita vt plena semper sint absque eo quod redundant: dico velocitatem fluentis aquæ ex B ad velocitatem ex I, fore in subduplicata ratione altitudinis vasis AB ad altitudinem vasis HI.

Secetur truncus ED æquè altus, ac vas AB. Item fiat truncus GF in eadem altitudine, in qua est alterum vas HI; erunt iam sectiones B, D æquales, & æquè veloces: eadem prorsus ratione æquales, & æquè veloces erunt sectiones I, F; est igitur velocitas per B ad velocitatem per D, vt illa per I ad illam per F, & permutando vt velocitas per B ad velocitatem per I, sic illa per D ad eam per F; sed velocitas per D ad illam per F, est in subduplicata ratione altitudinis ED ad GF, seu altitudinis vasis AB ad illam vasis HI; ergo in hac eadem ratione subduplicata erit velocitas per B ad velocitatem per I, quod &c.

## SCHOLIUM.

Hanc propositionem arduam, & perutilem, cæteri vt principium supponunt, nos verò demonstrauimus.

Poterit fortasse quis dubitare, an aqua, quæ est in vase, vniuersa moueatur dum erumpit ex aliquo foramine; vel tantum cylindrus ille aqueus descendat qui foramini incumbit, quippe carens veluti basis fulcimento quo sustineatur. Quia verò in hac secunda sententia sunt auctores nonnulli Ballianus, P. de Chales &c. libuit hoc in loco paululum immorari. Experientiam afferam à me pluries diligentissimè repetitam. Cadum oblongum in basi perforatum, foramine stупpa obstructo, aqua impleui. Superficiem eiusdem aquæ leuiter atramento infeci; permissoq; exitu, optima in luce obseruavi, num post descensum cylindri prædicti aqua nigresceret, quod necessarium erat in illa sententia. At nulla, ne leuis quidem macula, vnquam visa est, donec atramentum vnà cum libella descendens imas vasis partes obtinuit. Hinc censeo aquam illam prius erumpere quæ est in imo, & postremo illam

E

quæ

quæ est in summitate. Rei huius causam sic explio. Si vas plenum aqua, seu potius aqua contenta vase rueret suo pleno iure, omnes eiusdem aquæ partes æquè velociter, & suâ sponte tenderent ad Mundi centrum, nec vlllo modo partes subiectæ à superioribus premerentur, sed tantum leui contactu sibi cohærent. Contra dum eadem aqua immobiliter vas occupat, vnaquæque partium subiectarum premitur à superioribus desuper omnimodâ suâ grauitate insistentibus; qua pressione dilataretur, atque explicaretur aqua, nisi à lateribus vasis coereretur. Illud quoque manifestum puto, quod si eadem aqua nec penitus quiescat, nec liberè omnino deorsum feratur, pro ratione maioris, vel minoris motus debere etiam partes subiectas magis, vel minus premi ab incumbentibus. His positis; si concipiamus aquam ex aliquo quiescenti vase erumpere, foramine sub basî constituto, non est dubium quin primo instanti cylindrus aquæ foramini insistent nitatur descendere; itaque nihil, vel saltem minus virium habebit vt lateraliter nitatur, quam habeat contra eundem cylindrum circumiecta aqua, quippe quæ descensu prohibita, totum suum conatum lateraliter exerceat. Verum quia leges æquilibrîi non admittunt in fluido hanc momentorum inæqualitatem, vt vires proinde æquentur, necesse est, facto veluti quodam temperamento, vniuersam aquam simul descendere, eo momento quod habuisset ille cylindrus si liberè omnino ruisset.

## PROP. II. THEOR. II.

*Fig. 3. Tab. 6.* SIT vas *ADMI* plenum aqua vsque ad libellam *ABCD*; & peruium foramine *KL*; accepto modo hoc foramine vt basî, intelligatur cylindrus erectus *KBCL*; & detur quelibet sectio *EFGH*, horizonti æquidistans: dico esse idem momentum totius aquæ *ADMI* in descensu aperto foramine *KL*; ac illud solius aquæ *BCLK* si seorsim flueret ex aliquo canali *BL*.

*Pr. 29. Borel. de vi percussio-* Diximus sectionē *BC* suo momento rapere sectionem *AD*, quare virtus ipsius *BC* expanditur (ex Borellij doctrina de vi percussio- nis) per vniuersam sectionem *AD*; proptereaque erit reciproçè velocitas ipsius *BC* ad velocitatem sectionis *AD*, vt sectio *AD* ad sectionem *CB*; sed in loco sectionum dictarum intelliguntur illæ partes aquæ, quæ ipsas sectiones occupant; ergo momentum

mentum sectionis, seu aquæ *AD* momento sectionis, seu aquæ *BC* est æquale: idem dic de sectionibus *EH*, *FG*; & demum de omnibus componentibus vniuersam aquam vasis, & tubi *BCLK*; quare momentum omnium sectionum aquæ vasis æquale erit momento omnium sectionum aquæ tubi *BL*; hoc est momentum vniuersæ aquæ vasis, æquale momento aquæ cylindrici incumbentis foramini *KL*, si hæc tamen in tubulo seposito descenderet, quod &c.

Sed quia aliquis possit obijcere, non ritè applicari illam Borellij propositionem in præsentî materia, quippè quòd illic agatur de corporibus se inuicem percutientibus; hic verò de illis, quorum alterum rapit aliud; satisfaciendum est illi alia circa idem demonstratione; sed tamen sciendum est, attentis principijs eiusdem ingenij de vi percussiois, ad hunc quoque casum aptari posse illam veritatem. Manentibus iisdem, quia vasis semper plenis eadem quantitas aquæ funditur à vase *ADMI* aperto osculo *KL*, ac eodem tempore à tubo *BCLK*; eadem aqua quæ transit per sectionem *FG* transibit per sectionem *EH*: quare rursus vt velocitas per *FG* ad velocitatem per *EH*, ita reciproçè sectio *EH* ad sectionem *FG*, & propterea idem momentum vtriusque sectionis erit; sed cum idem dicatur de omnibus alijs possibilibus sectionibus; liquet, ob artificium indiuisibilem Cauallerij, esse momentum totius aquæ vasis, cui pateat osculum *KL*, æquale momento aquæ *BCLK*, si hæc flueret seorsim ex aliqua fistula eiusdem altitudinis, & amplitudinis cylindrici *BCLK*, quod &c.

## PROP. III. THEOR. III.

*Fig. 4. Tab. 6.* Modo res postulat, vt ostendamus, quomodo, si fuerint duo vasa communicantia diuersæ figuræ, ac amplitudinis; aqua in ipsis quiescat in eadem libella; & hoc faciendum est non vt constet id, quod omnibus obuium est trita experientia; sed vt eductus huius scientiæ principia, vel data firmemus.

Esto vas *BADC* communicans cum ipso *IHGK* per vas *DEFG*; apertis luminibus *DC*, *HG*; ostendendum est quare aqua ad libellam *ABIK* perducta in vno vase, ad eandem pertingat in altero vase, atque ibi quiescat.

Ducantur à punctis *D*, *C*, *H*, *G*, perpendiculares ad libellam

E 2

AK,

AK, rectæ DL, CM, HN, GO, referantque rectangula DLMC, HNOG, cylindros basibus DC, HG insistentes. His constructis, si in prioribus vasis (nondum intellectis cylindris illis) conciperemus posse moveri aquam; eadem quantitas quæ exit per osculum DC, ingrederetur aliud vas per osculum HG eodem tempore; quare, iuxta doctrinam Castellij, esset reciprocè vt sectio HG ad ipsam DC, ita velocitas per DC ad velocitatem per HG; quare momentum aquæ sectionis DC æquale est momento sectionis HG; sed momentum aquæ vasis ABCD æquale est momento aquæ vasis cylindrici LDCM; item illud aquæ vasis IHGK est æquale momento aquæ vasis cylindrici NHGO; & vt momentum aquæ vasis LDCM, ad momentum aquæ vasis NHGO, ita momentum aquæ sectionis DC ad momentum aquæ sectionis HG, (nam in vnoquoque cylindro ipsæ sectiones sunt æquales) ergo momentum aquæ vasis ADCB momento aquæ vasis IHGK est æquale, & propterea veluti in trutina, pondera illa aquarum in illo statu permanebunt.

Vides ergo quomodo liceat argumentari in præsentia materia.

PROP. IV. THEOR. IV.

**S**ED cum idem videamus contingere etiam si vasa sint ad horizontem inclinata; debemus modo ostendere, si fuerint duo vasa cylindrica alterum rectum, inclinatum aliud; sintque altitudines eorum ab horizonte æquales, eaq; vasa concipiantur inter se communicantia, vt diximus, & aqua repleta; momentum aquæ vnus esse æquale momento aquæ alterius vasis; quod cum præstiterimus, licebit præcedentem veritatem applicare quibuscunque generibus vasorum.

Fig. 5.  
Tab. 6.

Sint ergo duo vasa cylindrica, rectum vnum ABCD, & alterum inclinatum KIHG; sintq; plena humore, & per vas DEFG, luminibus DC, KG communicantia; demonstrandum est momentum aquæ vasis ABCD esse æquale momento aquæ alterius vasis KIHG.

A punctis H, G deducantur perpendiculares ad KI productam vbi opus est; sintque HP, GL. Patet cylindricum IKGH fore æquale cylindrico MHGL; fiat GM æqualis ipsi GL, & erigantur à punctis G, M, perpendiculares GO, MN, itaut rectangulum NMGO

NMGO referat cylindricum perpendicularem, cuius basis MG similis GL.

Momentum aquæ cylindrici pleni ABCD, ad illud cylindrici KIHG, componitur ex rationibus velocitatum aquarum per sectiones, dum istæ ponerentur in motu, & ponderum vrgentium aduersus planum DG; est autem ratio ponderum composita ex rationibus ponderum aquarum ABCD, ad NOGM; & NOGM ad aquæ pondus cylindrici KIHG super planum KG; quod est æquale ponderi aquæ NOGM; (nam momentum totale aquæ KIHG, seu LPHG ad id quod exercetur super planum DG existente inclinato cylindrico, est vt HG ad GO, in qua ratione est cylindricus LPHG, seu KIHG ad cylindricum MNOG) ergo pondus aquæ cylindrici ABCD ad pondus aquæ cylindrici KIHG in illa inclinatione, est vt sectio, seu basis DC ad basim, seu sectionem MG.

Deinde velocitas per DC ad velocitatem per KG componitur ex rationibus velocitatis per DC ad illam per MG, & huius ad illam per KG; velocitas verò per DC ad illam per MG est vt sectio MG ad ipsam DC; & illa per MG ad illam per KG, est vt longitudo GO ad longitudinem GH, (nam aquæ in illis cylindricis ascendunt eodem tempore illas longitudes, & propterea, vt spatia percurta æquabili motu, ita velocitates mobiliū); fitque velocitas GH ex duabus velocitatibus GO, OH; & OH horizontalis non consideratur in hoc casu, quia agitur de momentis perpendiculariter incumbentibus horizonti; ergo restat GO velocitas perpendicularis per cylindricum KIHG, quæ est eadem ac illa per MNOG; & ideo velocitas per MNOG ad velocitatem per KOHG est vt DC ad DC; itaque velocitas per DC ad velocitatem aquæ per KG, est perturbatè, vt sectio MG ad DC; hoc est vt reciprocè pondus aquæ ONMG, seu KOHG horizonti incumbens ad pondus aquæ ABCD, ergo momenta sunt equalia ipsarum aquarum, ideoq; ad eandem altitudinem permanebunt, tam in vasis inclinatis, quam in perpendiculis, quod &c.

PROP. V. PROB. I.

**D**ato vase cylindrico, vel prismatico, primum pleno, deinde ad minorem altitudinem depressâ aquâ tempore assignato, de-

Fig. 6.  
Tab. 6.

de-

debemus inuenire tempus, quo totum vas exhauriatur.

Esto propositum vas BGHC; & à signo B, ob defluentem aquam ex lumine K, descendat tempore L aquæ libella ad signum E, debemus vestigare, quo tempore totum vas exhauriatur.

Reperitur media proportionalis GI inter duas BG, GE rectas, & vt BI ad BG, ita fiat L ad M: dico M esse mensuram temporis, quo tota labitur aqua ex lumine K. Intelligatur ADG semiparabola, cuius axis GEB; semiqueapplicatæ AB, ED. Quia ex Torricellio sunt velocitates aquarum in punctis B, E, &c. vt semiappliatæ AB, DE &c., patet libellam aquæ BC descendere contrario modo, quo graue motu naturaliter accelerato; quare si ponatur tempus BG, quo nempe à libella BC percurritur totum spatium BG; à libella EF peragetur spatium EG tempore GI; itaque reliquum tempus BI spectat ad descensum libellæ BC per spatium BE; verum tempus per BE est ipsum L, estque vt BI ad BG, ita L ad M; ergo M est tempus per BG, quod &c.

## COROLLARIUM.

Hinc si facta fuisset vt BI ad IG, ita L ad quartam aliam, hæc esset mensura temporis quo libella E descendisset vsque ad G.

## PROP. VI. THEOR. V.

*Fig. 7. Tab. 6.* Sint duo vasa æquè alta, æqualiter foraminibus peruia, sed inæqualibus amplitudinibus, cylindrica tamen, vel prismatica ostendendum est, tempora quibus sunt ambarum aquarum emissiones esse inter se vt bases dictorum vasorum.

Sint vasa AC, BD, quorum lumina C, D, æqualia, & cætera vt diximus: dico tempora quibus dicta vasa siccantur esse inter se, vt bases dictorum vasorum, hoc est vt sectio A ad B. Fiat vt sectio B ad A, ita recta F ad H.

Componitur velocitas sectionis A ad velocitatem sectionis B, ex rationibus velocitatum sectionum A ad C ad D ad B; vt verò velocitas A ad C, ita sectio C ad A, vtque velocitas C ad D, ita C ad C (sunt enim æquè veloces C, D) & vt velocitas D ad B, ita sectio B ad D, seu ad C; ergo ex perturbata velocitas sectionis A ad velocitatem sectionis B erit vt B ad A. Sunt igitur duæ libellæ A, B, veluti duo graua naturaliter cadentia contrario modo; & percurrunt altitudines æquales, hoc est æqualia spatia, velocitatibus

E,

F, Hab initio; ex quo fit vt eadem æqualia spatia percurrant temporibus prædictis, sed velocitatibus subduplis, motuq; æquabili; verum cum duo mobilia motu æquabili, ac velocitatibus inæqualibus currunt æqualia spatia, sunt velocitates inter se, vt reciproçè tempora dictorum mobilium in dicto cursu; tempora igitur descensuum sectionum, siue libellarum A, B sunt vt dimidiæ linearum H ad F, vel vt totæ, hoc est vt sectio A ad B, quod &c.

## PROP. VII. THEOR. VI.

*Fig. 7. Tab. 6.* D Atis duobus vasis prismaticis, vel cylindricis, quorum amplitudines æquales, itemque altitudines, lumina verò sint inæqualia: dico tempus quo exhauritur vnum vas ad tempus quo alterum vas, esse reciproçè vt magnitudo ad magnitudinem luminum.

Sint vasa prorsus æqualia, cylindrica, vel prismatica A B, C D, luminumque sectiones per quæ defluunt aquæ sint B, D: dico tempus decursuum vsque ad exitum totius aquæ esse inter se reciproçè vt sectiones foraminum B, D.

Componitur velocitas sectionis A ad illam sectionis C ex rationibus velocitatum sectionis A ad B ad D ad C; sed prima velocitatum ratio est vt sectio B ad A; secunda vt A ad A (sunt enim iisdem luminibus B, D altitudines æquales), & tertia vt C, siue A ad D; ergo vt velocitas sectionis A ad illam sectionis C, ita sectio foraminis B ad illam foraminis D: sunt itaque libellæ A, C, vt graua naturaliter decrescentia, si nempe ab imo in altum perpendiculariter iaciantur; eorumque primæ velocitates sunt B, D. Quare iisdem temporibus, & mediocritatibus ipsarum velocitatum, percurrentur, vt prius, motu tamen æquabili, spatia æqualia, hoc est altitudines vasorum; sed dum mobilia percurrunt idem spatium motu æquabili tempora per ipsum sunt in reciproca ratione velocitatum; ergo tempora libellarum si motu æquabili descenderent per æquales altitudines vasorum essent reciproçè vt dimidiæ velocitates; hoc est tempus decursus libellæ vasis AB; ad tempus decursus libellæ per altitudinem vasis CD, æqualem nempe altitudini alterius vasis, quam peragit altera libella, erit vt dimidium sectionis D ad dimidium sectionis B; siue, vt eorum dupla, nempe vt sectio D ad B, quod &c.

PROP.

## PROP. VIII. THEOR. VII.

*Fig. 1. Tab. 7.* **S**I fuerint duo vasa cylindrica, vel prismatica, altitudinē, ac amplitudinē inæqualia; itemque sint inæquales sectiones foraminum: dico tempus quo siccat primum vas, ad id quo alterum vas, esse compositum ex rationibus basium, ex reciproca sectionum luminum, & ex subduplicata ratione altitudinum.

Sint duo vasa LAB, OIH, qualia proposita sunt, & sectiones foraminum sint B, H: dico hæc duo vasa ab initio plena siccati temporibus vt dictum est, videlicet tempus decursus aquæ vasis LB, ad tempus decursus alterius aquæ vasis GH esse in composita ratione sectionis L ad G, nempe basis ad basim; ex reciproca luminis H ad lumen B, & demum ex subduplicata ratione altitudinis A ad altitudinem I.

Contemplantur duo vasa CD, EF, æquē ampla ac propositum vas LB; & lumina D, F singula æqualia luminis H; præterea altitudo C sit æqualis altitudini A, & G altitudini I.

Componitur tempus decursus aquæ LAB ad id decursus aquæ OIH; ex rationibus temporum vasis AB ad id vasis CD; huius verò ad id vasis GF, & demum temporis huius vasis ad id vasis IH; sed tempora decursuum aquarum priorum vasorum (vt pote æquē alta, & æquē ampla) sunt vt sectio foraminis D, seu H ad sectionem foraminis B; ergo tempus decursus per vas CD ad id per vas GF cum foramina D, F sint æqualia, sunt in subduplicata ratione altitudinum C, seu A ad G, vel I; & demum tempus per vas GF ad id per vas IH, cum sint æquē alta, eorumq; foramina item æqualia, est vt sectio E, siue L ad sectionem O; seu vt basis vasis LB ad basim vasis IH; tempus ergo decursus aquæ per vas AB ad tempus decursus aquæ per alterum vas est in ratione composita basium, in reciproca luminum, & subduplicata altitudinum, quod &c.

## SCHOLIVM.

*Fig. 2. Tab. 7.* Cum plurimum difficultatis sit; quoties in lateribus vasorum foramina intelligimus; nescimus enim, quæ altitudo à libella ipsis foraminibus competat; ideo hæcenus posuimus ipsa foramina horizontalia, videlicet sub basi, sed nē præsens doctrina nimis contrahatur, cōmentum sumus, quomodo ad latera applicari possint horizontalia lumina, quorum nullo negotio queamus statuere altitudines.

Nam

Nam si sit vas AF, cuius vnum latus AB, eique sit applicandum foramen datum in altitudine AD; adstruatur eidem lateri aliud vasculum DCE infra D, communicans vasi AF per osculum, quod maius sit foramine proposito; deinde aperiatur in latere horizontali DE foramen E amplitudine æquali foramini dato, atque hoc pacto sublata erit omnis difficultas perindè ac si lumina constituta essent in basi.

## PROP. IX. THEOR. VIII.

**S**I fuerint duo vasa prismatica, aut cylindrica; & in ipsis quædam aquarum quantitates, quibus detur infra basim egressus: dico illas quantitates aquarum componi ex rationibus priorum velocitatum sectionum; ipsarum magnitudinum, & temporum, quibus vasa exhauriuntur.

Quantitates aquarum vasorum componuntur ex rationibus sectionum, & altitudinum; sunt enim aut prismata, aut cylindrica. Dicuntur autem aquæ dilapsæ ex vasis, cum superiores libellæ attigerint bases vasorum; hoc est cum percurrerint altitudines aquarum in ipsis vasis; sed ipsæ libellæ sunt veluti graua contrario modo cadentia, hoc est, quorum motus sunt naturaliter deficientes; dimidijs ergo temporibus, & iisdem velocitatibus, quas ab initio habebant ipsæ libellæ, motu æquabili percurrunt eadem spatia, hoc est easdem altitudines; quare ipsæ libellæ sunt duo mobilia, quæ percurrunt quædam spatia quibusdam velocitatibus, & ideo ex prop. 4. de motu æquabili Galilæi, erunt spatia ipsa percursa, hoc est ipsæ altitudines in ratione composita velocitatum ab initio sectionum, & temporum; itaque constat, aquæ quantitates delapsas componi ex rationibus sectionum vasorum; velocitatum illarum, & temporum decursuum, quod &c.

## PROP. X. THEOR. IX.

**S**I fuerint duo vasa AB, IH cylindrica, vel prismatica, quorum foramina BH: dico velocitatem aquæ ab initio motus vnius vasis, ad velocitatem aquæ ab initio motus alterius vasis, compositam esse ex ratione luminis B ad lumen H, ex subduplicata altitudinum A, I, & ex reciproca basium.

F

Sir



Sit vas CD æquè amplum, ac æquè altum quam vas AB; & foramen D sit æquale foramini H; sit item GF æquè altum ac vas IH; sed æquè amplum quam vas AB; foramen verò F sit æquale foramini H. His positis.

Velocitas sectionis L ad velocitatem sectionis H componitur ex rationibus velocitatum sectionis L ad eam sectionis vasis CD; & ex hac velocitate ad illam sectionis E; & ex velocitate sectionis E ad illam sectionis O; verum velocitas sectionis L ad illam sectionis vasis CD, est vt lumen B ad lumen D, siue H (hoc enim ostendimus in prop. 7. huius); velocitas verò sectionis vasis CD ad velocitatem sectionis F est in subduplicata ratione altitudinis C ad G, siue ad I; & velocitas sectionis E ad illam sectionis O, est reciprocè vt sectio G ad E, vel ad L; ergo ratio velocitatum sectionis L ad illam sectionis O, est composita ex rationibus luminum, ex reciproca basium, & ex subduplicata altitudinum, quod &c.



DE

## DE FLVMINIBVS.

## TRACTATVS QVARTVS.

## SVPPOSITIONES.

I.



Vpponimus vnamquamque sectionem fluminum esse secundum omnes sui partes æquè velocem. Licet hæc suppositio videri possit non vera, cum flumina medio velocius, quam iuxta ripas ob superficiem earundem inæqualem, atque asperam, ferantur; necesse est tamen more mathematico ab his abstrahere, vt locus sit demonstrationi; perito deinde linquimus rem denuo sic vestire, aut exuere circumstantijs, vt ad id, quod verum est quam proximè accedat.

II.

Accipimus aquam eodem pacto in oppositum sibi obijcem inuchi quemadmodum ventus in velum alicuius nauigij; quare sicut momentum huius crescit, quo aperitur maior veli pars; sic aquæ momentum fit validius vbi impellens sectio alicuius fluminis, & per consequens petita aggeris pars fuerit maior; Itaque hoc modo statuimus quemadmodum debeat in fluminibus concipi corpus impellens, ex quo vna cum velocitate allidentis sectionis confurgit, ac intelligitur fluminis momentum.

III.

Nullum corpus quatenus graue potest ex se moueri, nisi simul descendat.

Hinc sequitur, si vas plenum aquâ in aliquo nauigio statuatur, hiberque ipsi aditus permittatur infra basim, dum ipsum nauigium vehitur à flumine, maiori tempore, sed insensibili exhauriri, quam si aqua exiret immobili vase. Nam si vas rueret totali suo momento, quamdiu descenderet nihil aquæ efflueret; quia vniuersa aqua tanquam pars vasis rueret ex æquo cum ipso; contra immobili existente vase, diximus in scholio prop. primæ, vbi de vasis egimus, cylindricum illum aquæcum foramini vasis incumbentem

atenus descendere, quatenus exprimitur à circumiecta aqua. Iam in casu nostro, cum vas, nec totalem descensum, nec omnimodam quietem habeat, propter imperceptibilem descensum ortum ex decliuitate fluminis, hinc fit, vt minus aquæ transmittat motum secundo flumine, quam eodem tempore permanēs in statu quietis.

## IV.

Si fuerit corpus grauius specie, quam aqua, sed intus ita excauatum, vt positum in aqua nec ascendat, nec descendat, huiusmodi corpus demersum in flumine; assumimus moueri eodem pacto, eademque velocitate qua mouetur aqua eiusdem fluminis; nam intelligi potest per modum partis eiusdem currentis aquæ.

Hinc obiter inferri potest inæqualem grauitatem corporum oriri precisè ex maiori, vel minori raritate, quæ est instar cuiusdam cavitatis, quâ sublatâ haberent corpora mole æqualia idem pondus; Hoc fit manifestum in casu proposito, atque idem arguere licet in vniuersum. Nam corpus illud sic excauatum non differt à quantitate eiusdem molis, nisi, quod naturâ suâ aqua sic rarior, hoc verò densius, ideoque indiget excuari, vt reducatur ad æqualem grauitatem, quod ita demonstratur. Corpus illud sic excauatum, vt diximus, intelligitur veluti pars fluentis aquæ, ergo momentum huiusmodi corporis erit æquale momento eiusdem aquæ fluentis in eadem apparenti mole in qua est illud; sed momenta (ex mechanicis) componuntur ex rationibus velocitatum, ac corporum; ergo cum velocitates sint æquales, erunt etiam corpora in quantitate æqualia, sed sunt æqualia etiam in pondere ex insidentibus humido Archimedis, ergo omne discrimen est in minori, vel maiori raritate, quod &c.

## V.

Dato vase infra perforato, in quo, beneficio canalis influentis, in eadem altitudine perseueret aqua; si in libella eiusdem aquæ statuatur corpus illud sic excauatum; supponimus descensurum æquè velociter, ac ipsæ sectiones. Nam aqua quæ ex canali in vas immittitur non prohibet quin iam ingesta descendat; cum igitur ipsum corpus concipiatur per modum partis ipsius ingestæ aquæ mouebitur omnino eodem modo.

His omnibus positis puto me in tam difficili, & lubrico argumento nonnulla posse ostendere vtilia, atque iucunda.

PROP.

## PROP. I. THEOR. I.

SI solidum corpus demittatur in flumen, dico velocitatem quam habet à flumine ad velocitatem fluminis in eodem loco, si non esset corpus illud, esse reciproçè, vt tantundem aquæ occupantis dicti corporis locum ad ipsum corpus.

Nam si solidum immersum, ita excauatum esset, vt ex suppositione quarta concipi posset instar partis aquæ fluentis, esset æquè velox, ac ipsum flumen; sed quodcunque sit corpus, impellitur eodem semper fluminis momento; ergo cum momenta amborum corporum sint æqualia, necesse est, vt velocitas vnus corporis ad velocitatem alterius sit reciproçè vt corpus ad corpus.

## COROLLARIUM.

Hinc deducitur si corpus immersum fuerit grauius aqua fluminis, esse velocitatem eiusdem fluminis ad illam demersi corporis, quam ab impetu fluminis habet, vt totale eiusdem corporis pondus ad partem illam grauitatis, quæ ratione aquæ detrahitur: nam ex prop. 7. Arch. deijs quæ vehuntur in humido, corpora humido grauiora, si in ipso sint fiunt tantò leuiora, quanta est grauitas humidi molem habentis solidæ magnitudini æqualem.

## PROP. II. THEOR. II.

SI sit prismaticum, seu cylindricum vas semper plenum aquâ, aut ad eandem altitudinem seruata, licet deorsum ex foramine defluat; dico si corpus grauius aqua in ipsa demersum sit, momentum quod habet ab impulsu descendens aquæ ad illud quod à sola grauitate in aqua quiescente, esse, vt est differentia totius momenti, quo corpus nititur deorsum in aqua vasis descendente, & eius momenti, quod idem corpus habet in aqua stagnante, ad hoc ipsum momentum, id quod satis per se patet.

## PROP. III. THEOR. III.

SIT flumen, in quo suspensum detineatur corpus grauius specie, quam aqua; directio sibi quo sistitur idem graue sit CA, quæ occurrat fluminis libellæ in B, & erecta perpendiculari CD vsque ad

Fig. 3.  
Tab. 7.

ad

ad libellam, iungatur  $BD$ . Dico momentum, quod habet à fluminis impetu, ad illud quod à gravitate in ipsa aqua esse ut  $BD$  ad  $DC$ .

Quoniam funiculus  $CA$  in sua directione librat mobile  $C$  affectum duabus virtutibus, horizontali nempe, ac perpendiculari; si virtus librans statuatur  $CB$ , erit  $CD$  virtus perpendicularis, &  $BD$  horizontalis; quare momentum grauis à flumine ad momentum eiusdem à gravitate, est ut  $BD$  ad  $DC$ , quod &c.

## PROP. IV. PROB. I.

Fig. 4.  
Tab. 7.

**P**ropositis duobus locis eiusdem, vel duorum fluminum, utriusque velocitatem vnius penduli artificio inuenire.  
Sint duo loca  $F, Q$  eiusdem, vel duorum fluminum, quorum velocitates sint utrobique vestigandæ. Tam in  $F$ , quam in  $Q$  sistatur deinceps idem corpus  $\phi$  ope funiculi  $\phi L$ , aptata deinde ad inclinationem funiculi  $L \phi Q$  normâ  $MLN$ , itaut perpendicularum ex  $M$  pendens notet longitudinem  $LP$ ; idem fiat in inclinatione  $L \phi F$  eâdem normâ  $MLN$ , & inueniatur longitudo à perpendicularo designata  $LO$ : dico velocitatem fluminis in  $Q$  ad velocitatem fluminis eiusdem, vel alterius in  $F$ , esse reciprocè ut  $LO$  ad  $LP$ . Sint fluminum libellæ  $TR, VS$ , intelliganturque  $QR, FS$  perpendiculares à corpore  $\phi$  vsque ad illas libellas perductæ. Ex antecedenti propositione momentum corporis  $\phi$  in  $Q$ , acceptum à flumine, ad momentum acceptum à gravitate eiusdem corporis in aqua, est ut  $TR$  ad  $RQ$ , siue ut  $LM$  ad  $LP$ . Item in  $F$ , momentum corporis  $\phi$  à gravitate, ad momentum illius à flumine, est ut  $SF$  ad  $VS$ ; hoc est ut  $OL$  ad  $LM$ ; ergo ex perturbata, erit  $OL$  ad  $LP$ , ut momentum eiusdem grauis à flumine in  $Q$ , ad momentum ipsiusmet corporis à flumine in  $F$ ; at si intelligatur in utroque loco corpus ita excauatum, ut concipi possit per modum partis fluminis vel fluminum, habebit huiusmodi corpus eadem momenta in iisdem locis, quæ habuit immersum corpus  $\phi$ ; ergo ut momentum ab impetu fluminis in  $Q$  excauati corporis ad momentum ab impetu fluminis eiusdem excauati corporis, ita erit  $OL$  ad  $LP$ . Quia verò est idem corpus quod impellitur à flumine, imò eadem pars fluminis, erunt momenta inter se ut velocitates, & ideo velocitas fluminis in  $Q$ , ad velocitatem fluminis in  $F$ , erit ut  $OL$  ad  $LP$ , quod &c.

SCHO.

## SCHOLIUM.

Hinc vides nouum artificium ad explorandas rationes velocitatum, quas habent flumina.

Si verò in quocunque loco semel mensus fueris prædictam penduli declinationem docebo te sequenti propositione, quomodo dato tempore possis in quouis loco pronuntiare quantitates aquarum per locum illum decursas.

## PROP. V. PROB. II.

**D**ato fluminis loco, ibique eiusdem fluminis sectione, inuestigare quantitatem aquæ, quæ per eandem sectionem effluit tempore assignato.

Sit fluminis locus  $F$ , cuius libella  $VS$ ; datum verò tempus  $\phi$ , Fig. 3. Tab. 7. debemus inuenire quantitatem aquæ fluentis per datam sectionem  $X$ , tempore  $\phi$ . Esto vas prismaticum, cuius amplitudo, seu sectio sit  $R$ ; hoc admoveatur salienti cuidam uniformi, quæ aquam vasis, licet effluentem ex foramine inferiori, ad eandem altitudinem seruet. In hoc statu, ponderetur corpus penduli  $FL$ , sitque deprehensum pondus  $PQ$ ; idem corpus ponderetur in stagnanti aqua, inueniaturque pondus  $PB$ , quod erit minus pondere  $PQ$  ex vi Supp. 5., eritque differentia  $BQ$ ; mensuretur deinde quantitas aquæ, quæ in vase est, sitque  $V$ ; Tempus verò quo exhauritur vas cessante aqua influente sit  $T$ . His semel exploratis habebimus regulam vniuersalem ad dimensionem aquæ fluminum in quocunque loco. Aptetur enim pendulum  $FL$  in flumine, & inclinationi fili  $FL$  aptatâ normâ  $NLM$ , perpendicularum  $MO$  designet interuallum  $LO$ ; tum fiat  $PB$  ad  $BQ$ , ut  $LO$  ad  $C$ ; &  $V$  ad  $Z$  componatur ex rationibus datis,  $R$  ad  $X$ , ex dimidio temporis  $T$  ad  $\phi$ , &  $C$  ad  $LM$ : dico  $Z$  esse quantitatem aquæ elapsam per sectionem  $X$  tempore  $\phi$ ; quod ita demonstro.

Momentum corporis  $F$  à flumine, ad momentum eiusdem corporis à descendente aqua in vase, est in ratione composita momenti eiusdem corporis à flumine, ad momentum illius à gravitate in aqua stagnante, & ex hoc momento ad illud ab aqua in vase, est autem prior ratio  $LM$  ad  $LO$ , altera verò  $BP$  ad  $BQ$ , siue  $LO$  ad  $C$ ; ergo ex æquali momentum ab impetu fluminis, ad momentum eiusdem corporis ab impetu aquæ vasis, erit ut  $LM$  ad  $C$ ; sed  
mo-

momentum corporis  $F$  ab impetu fluminis, est æquale momento ab eiusdem fluminis impetu corporis sic excavati in eadem mole apparenti, ut per modum partis fluminis concipi possit; Item momentum corporis  $F$  ab impetu aquæ, quæ est in vase, est æquale momento quod habet corpus illud ita excavatum ab impetu descensus prædictæ aquæ, per modum cuius concipi potest; Cumq; hoc corpus sic excavatum utrobique sit idem; ergo ut momenta inter se, ita velocitates eiusdem excavati corporis, seu aquæ in utroque loco; est ergo velocitas fluminis in  $F$ , ad velocitatem aquæ vasis, hoc est velocitas sectionis  $X$  ad velocitatem sectionis  $R$ , ut  $LM$  ad  $C$ . Deinde quia tempus  $T$  illud est, quo exhauritur vas; eoque tempore decrevit velocitas  $C$  in modum gravium si ex humili in altum iaciantur; ergo dimidio temporis  $T$  per eandem sectionem  $R$  transibit motu æquabili eadem aquæ quantitas priori gradu velocitatis (nam hæc (ex Gal. doctrina) pertransit eandem altitudinem, quam habuit in vase utroque modo) Quibus positis licet nobis considerare sectionem  $R$  veluti sectionem fluminis, etenim velocitatem ad æquabilitatem reduximus, ut in fluminibus. Habemus ergo sectionem  $X$ , item  $R$ ; velocitatem aquæ per  $X$  ipsam  $LM$ , & per  $R$  ipsam  $C$ ; deinde tempus  $\ddagger$  decursus aquæ per  $X$ , ac tempus per  $R$  dimidium ipsius  $T$ , quo effluxit quantitas aquæ  $V$ ; ergo cum  $V$  ad  $Z$  composita sit ex rationibus sectionum, velocitatum, & temporum prædictorum, quantitas aquæ quæ per sectionem  $X$  tempore  $\ddagger$  transmittitur erit  $Z$ .

## L E M M A.

Vt autem monstremus aquarum quantitates per datas fluminum sectiones assignatis temporibus transmissas, esse in ratione composita magnitudinum sectionum, velocitatum, atque temporum, recurrendum est ad id, quod diximus in prop. 9. de vasis. Datis nempe duobus vasis, & in eis sint quædam aquarum quantitates; quibus dentur infra bases egressus, ostendimus inquam rationem illarum quantitatuum componi ex rationibus velocitatum ab initio sectionum; harum magnitudinum, & temporum quibus vasa exhauriuntur; verum quia dimidijs temporibus, iisdemque ab initio velocitatibus perseverantibus eadem vasa exhaurirentur; ergo cum perinde sit, ac si dictæ quantitates aquarum per fluminum

ntra sectiones æquabili motu excurrissent, patet, inquam, illas quantitates componi ex rationibus velocitatum, magnitudinumque sectionum, & temporum ipsarum decursuum, quod Sec.

## S C H O L I U M.

Sed quoniam ob decliuitatem fluminis perpendicularum  $FS$  non est exactè ad rectos angulos cum libellâ, ideoque in triangulo  $MLO$  simili  $VSF$  angulus qui ponitur rectus ad  $L$  aliquantulum deberet esse maior; sed ob imperceptibilem inclinationem eiusdem fluminis potest sine errore rectus intelligi. Tamen quia potest occurrere aliquis notabilis pendentia, volumus ad eundem effectum tradere exactissimum artificium.

## PROP. VI. PROB. III.

**D**ato flumine, primò ipsius pendentiam vestigare, & deinde proportionem assignare momenti corporis immerfi, quod habet à flumine, ad momentum ipsius, quod habet à pondere in aqua quiescente.

Sit flumen, cuius summa superficies  $BC$ , & horizon  $BD$ , volumus primùm inuestigare angulum  $DBC$ ; deinde quæ ratio sit inter momentum à flumine corporis immerfi  $A$ , & momentum eiusdem ratione gravitatis in aqua quiescente. Fig. 1. Tab. 8.

Notetur primùm pondus grauis  $A$  in aqua stagnante, sitque illud  $ST$ ; deinde libretur pendulum  $LA$  beneficio trochleæ conuertibilis in  $L$ , sitque pondus contrapositum  $\ast$ . Applicetur consueta norma  $MLN$  longitudini penduli, adeout perpendicularum  $MO$  notet punctum  $O$ , hoc peracto, habebitur triangulum rectangulum  $MLO$ ; itaque seorsim in chartâ ductâ lineâ  $TSYQ$ , fiat angulus  $QSR$  æqualis angulo  $MOL$ , & secetur  $SR$  æqualis ipsi  $\ast$ ; item factò angulo recto  $SRQ$  cadat perpendicularis  $RY$  ab  $R$  in  $QS$ ; demum iungamus  $RT$ , quam diuisam bifariam in  $V$  nequamus in  $VS$ , & protrahamus, ut ab ipsa secemus  $SX$  æqualem  $VS$ ; huius deinde ductâ parallelâ  $RZ$ : ostendam angulum  $YRZ$  æqualem angulo  $DBC$ ; &  $VX$  ad  $ST$  eam habere rationem, quam diximus, momenti corporis à flumine, ad momentum eiusdem corporis à gravitate.

Quia enim angulus  $QSR$  est æqualis ipsi  $MOL$ , anguli verò ad  $R$ ,  $L$  recti, erunt triangula  $QRS$ ,  $MLO$  similia, item ob perpendiculari-

diculares LD, RY similia triangula LDO, RYS; est ergo vt SR ad RY, ita OL ad LD; itemque vt SR ad SY, ita LO ad DO; cumque LO ad DO sit ratio virtutis librantis corpus in flumine ad totalem virtutem perpendicularem, quam ipsum corpus habet in flumine (quæ quidem vi Supp. 5. maior est quam virtus à gravitate in aqua quiescente) eadem verò virtus LO ad LD est illa potentia librantis, ad virtutem, quam corpus merè horizontaliter habet à flumine; ergo quia SR fuit librans potentia, erit YS virtus totalis perpendicularis in flumine, & RY virtus simpliciter horizontalis à flumine; habes ergo angulum consequentem RST ipsius RSQ, seu ipsius LOM, & propterea etiam positionem perpendiculi YST, in quo est virtus ST à pondere in aqua stagnante, itemque est data positio virtutis SR; cumque à puncto V dimidium notante ipsius RT, ducta sit VSX dupla ipsius VS; patet (per ea, quæ ostendimus in primo tractatu de potentijs obliquis) esse VSX illam virtutem, quæ librat duas oppositas SR, ST; itaque SR erit illa quæ sistit duas virtutes ST, VX; mobile nempe A in flumine affectum duabus virtutibus ST, VX; sed ST est virtus, seu momentum à gravitate in aqua stagnante, sequitur ergo reliquam virtutem, seu momentum VSX oriri ab impetu fluminis secundum illam directionem impellentis; est ergo VSX momentum corporis à flumine, & huius parallela RZ eiusdem fluminis directio; quare si intelligatur QIT perpendiculum, erit YR horizon, & YRZ angulus inclinationis cum horizonte æqualis angulo DBC pendentia fluminis BC cum horizonte BD, quod &c.

## SCHOLIUM.

Si ergo malueris vestigare quantitatem aquæ fluminis per aliquam sectionem decurrentem secundum veram declinationem fluminis, facile exequeris, si in antecedenti demonstratione atque figura, substitueris VX in locum ipsius LM.

## PROP. VII. PROB. IV.

**D**atis duobus Torrentibus in oppositum planum irrumpentibus inuenire incursum momenta.

*Fig. 7. Tab. 3.* Sit oppositum planum ABCD; torrentes verò sint, quorum directiones FD, EC, qui incurrant in idem planum sectionibus D, C;

D, C; volumus vestigare incursum momenta.

Reperiantur primò, vt docuimus, EC, FD velocitates fluminum, & à punctis E, F agantur perpendiculares EB, FA in planum parietis, & iungantur AD, BC; patet ex elem. vnamquamque linearum transeuntium per A, & B, ac iacentium in plano parietis AB, esse perpendiculares ipsis AF, BE; quare DAF, CBE erunt anguli recti: Verum quia ex duabus virtutibus FD, EC, quas habent torrentes, producuntur virtutes FA, EB perpendiculares ad planum ABCD, & AD, BC horizontales, quæ duæ stringunt dumtaxat parietem; ergo virtutes incurrentes in parietem sunt duæ priores perpendiculares ad ipsum parietem; sunt autem incursum sectiones D, C, ergo ex Supp. 2. erit momentum sectionis C, seu torrentis EC, ad momentum sectionis D, seu torrentis FD (est enim in quolibet loco fluminis, seu torrentis idem momentum) in ratione composita velocitatis FA ad velocitatem EB, & ex ratione sectionis D ad C, quod &c. Atque hæc dicta sit hæcenus de quatuor argumentis propositis.

## APPENDIX GEOMETRICA.

Ne vacet spatium in postrema figurarum tabella, addidi appendicis loco duas demonstrationes geometricas. In prima propono sectionem quandam ovalem regularem tamen, quæ ostenditur non elliptica, qua posita ellipsi inuenta esset quadratura circuli. In secunda assignatur centrum gravitatis superficiei hemisphærij.

## PROP. I. THEOR.

**S**IT recta LH in plano quodam NMHI, cuius super partem *Fig. 3. Tab. 3.* GH tanquam diametrum insistat perpendiculariter eidem plano semicirculus HCG. Tum in ipso plano circa centrum L conuertatur linea LH vnà cum erecto semicirculo CGH, donec ad eundem locum redeat vnde discesserat. Hinc generabitur solidum quoddam, quod semicircularem annulum appellabimus. Secetur modò huiusmodi annulus plano quodam, quod sit perpendiculare tum semicirculo, tum alteri plano subiecto, ita vt sectio resultans in superficie, sit linea conuexa ABCD. Quæritur modò an illa sit elliptica, nos ostendemus non esse. Sit enim, si fieri

fieri possit elliptica, & assumpto quolibet puncto E, iungatur LE, quæ producatut vtrinque in M, & T; per hanc verò lineam planum transeat perpendicularare subiecto plano, quod fecerit solidum, cuiusque sectio sit KBI, quæ semicirculus erit, utpote eodem pacto posita, ac genitrix figura GCH. Deinde quia duo plana ACD, GCH sunt perpendicularia eidem subiecto plano ANMD, erit item communis sectio FC eidem plano erecta, & propterea perpendicularis duabus AD, IK; ex quo sequitur etiam duas BE, FC inter se æquidistare. Protractâ nunc HL in N; quia ABCD conuexa linea ponitur elliptica, cuius axis esset AD. (nam præconcepto annulo tanquam genito ex rotatione integri circuli GCH, omnino similis ex altera parte prodiret sectio, si planum nempe ABCD protraheretur) erit rectangulum AFD ad ipsum AED, ut CF quadratum ad BE quadratum; est autem AFD rectangulum æquale rectangulo NFH, & AED rectangulum æquale ipsi MEI, item CF quadratum æquale rectangulo GFH, & BE quadratum æquale rectangulo KEI; ergo ut NFH ad MEI rectangula, ita rectangulum GFH ad KEI; & permutando, ut NFH rectangulum ad ipsum GFH, ita MEI rectangulum ad ipsum KEI. Diuisis itaque primâ, & secundâ per communem altitudinem FH; tertiâ verò, & quartâ per communem EI; erit ut NF ad GF, ita ME ad KE; sed diuidendo, permutandoque, erit NG ad MK, ut GF ad KE; cumque NG æquetur MK, etiam GF æquabitur KE; quod vtrique falsum est, nisi in casu, quo DF sit æqualis ipsi AE; non est ergo ellipsis prædicta sectio.

## PROP. II. PROB.

*Fig. 7. Tab. 8.* **C**entrum grauitatis superficiæ hemisphærij est in medio axe. Sit hemisphærij IGM, cuius basis IM, & axis KG; secetur bifariam in L. Dico punctum L fore centrum grauitatis superficiæ hemisphærij.

Intelligatur super planum eiusdem basis aliud Hemisphærij ACE, cuius axis KC sit sesquitercius axis KG. Ductis duobus quibuslibet radijs KFD, KHB manifestum est omnes lineas KE, KD, KB, KA in eadem ratione sesquitercia secari, in qua scilicet secta fuit KC à superficie suppositi hemisphærij. Sint puncta

diuisionum M, F; G, H, I. His positis considerentur ex lineæ, vt innumerabiles, ac inter se æquales, similiterq; positi conij, qui, vnâ cū interiectis conicis æqualibus inter se, & similiter positis, impleat totam soliditatem maioris hemisphærij. Cum igitur centra grauitatis conorum omnium KE, KD, KC, KB, KA &c. sint puncta M, F, G, H, I &c. erit pondus illorum expansum in tota superficie minoris hemisphærij, item pondus conicorum; ideoque centrum grauitatis superficiæ minoris hemisphærij erit centrum grauitatis conorum, & conicorum, atque compositæ magnitudinis ex ipsis. Verum composita magnitudo ex conis, conicisque est ipsum hemisphærij; ergo cū centrum grauitatis maioris hemisphærij sic diuidat axem, vt pars quæ est ad verticem sit ad reliquam vt 5 ad 3; erit componendo axis CK ad partem versus centrum sphaeræ vt 8 ad 3. Verum idem axis, est ad axem minoris hemisphærij, vt 8 ad 6; ergo ex æquali, KG dupla erit eius partis inter centrum grauitatis, & sphaeræ interiectæ; quare punctum L est centrum hemisphærij maioris, hoc est centrum grauitatis superficiæ suppositi hemisphærij minoris.

## SCHOLIUM.

Qui processerunt methodo Caualleriana, intellexerunt quasdam innumerabiles lineas inter se æquidistantes, quæ veluti parallelogramma complerent aliquam superficiem; item innumerabiles quasdam inter se æquidistantes superficies, quæ vt totidem parallelepipedâ componerent alicuius corporis soliditatem; sed notatu dignum est, innumerabiles rectas lineas ex eodem puncto egredientes, posse etiam intelligi veluti totidem triangula superficiem eam implentia, in qua sunt ipsæ lineæ; item nonnulla innumerabilia plana in eandem rectam coeuntia; & demum innumerabiles lineæ in idem punctum concurrentes possunt haberi vt quasdam pyramides, conij, vel conici, ex quibus pariter resultet soliditas.

FINIS.

Tot erratis in tam exiguo opere ignosce lector ; nam figuras  
seorsim incisas , conferre non licuit eum demonstrationibus  
eodem tempore impressis .

<i>Pag.</i>	<i>lin. Errata.</i>	<i>Corrections.</i>
7	14 libram	libra
8	13 DI	KI
8	17 MH, vt	MH, seu LI ad L H, vt
12	1 8 11 12 13 15 16 BFD, FM, FL	littera F comutari debet in E
12	4 librantem	ex illis resultantem
16	4 ACL	ICL
17	22 AFG	GFA
17	23 GFA	AFG
17	24 ex C	ex F
18	2 DN, DM	FN, FM
18	4 DN	FN
20	22 affectum	affectio
	27 quibus	quarum
31	32 AX	XH
	36 similiterque funiculi	similiterque virtutem funiculi
32	12 VR	VE
	13 FM	EM
	14 FM	ME
32	in margine Fig. 6. Tab. 5.	Fig. 5. Tab. 5.
39	in margine Fig. 7. Tab. 6.	Fig. 1. Tab. 7.
42	5 sectionis H	sectionis O
47	in margine Fig. 3. Tab. 7.	Fig. 5. Tab. 7.

IMPRIMATUR.

F. Michael Pius Torres Sac. Theol. Magister Commissarius  
S. Officij Mediolani.

Carolus I. Saita Laur. Basil. Archipresbyter pro Eminentissimo  
mo, ac Reuerendissimo D. D. Card. Archiepiscopo .

Franciscus Arbona pro Excellentissimo Senatu .




MEDIOLANI

Ex Typographia Ludouici Montiae.  
MDC LXXXII.

UNIVERSITA' DELLA CITTA' DI  
PAVIA  
BIBLIOTECA  
NUMERO 22870  
COMPTON


TAB. I.




Simon. Durellus Sculp.




TAB. II.





TAB. 3.




TAB. 4




TAB. 5.




TAB. 6.



TAB. 7.



TAB. 8.



FA-6B-225